



This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + *Refrain from automated querying* Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at <http://books.google.com/>

FAGAUT

DE

CHEF

67

T 14
R

IOAN.

617

TAGAVTII

AMBIANI VIMACI,

PARISIENSIS ME-

DICI,

DE CHIRVRGICA

Institutione libri quinque.

*His accessit sextus liber de Materia chirurgica, au-
thore Iacobo Hollerio Stempiano, medico
Parisiensi.*

*Laminas
perena*

Secunda Editio.

*Medic
Infernas*

REM MAXIMAM SIBI



PROMITTIT PRUDENTIA.



LVGDVNI,

Apud Guliel. Rouillium, sub Scuto Veneto,

1549

Cum Privilegio Regis.

*hoc semper cura vt profic. saltem ne
No an*

EXTRAICT DV

PRIVILEGE

DV ROY



AR GRACE ET PRIVILEGE du Roy est permis à Guillaume Rouille libraire de Lyon, de imprimer ou faire imprimer vne foys ou plusieurs vng liure intitulé *Ioannis Tagautij de Chirurgica Institutione libri quinque*, reueu corrigé & augmenté en plusieurs endroictz par ledict feu Tagaut. Et pource est faict defences de par ledict Seigneur à tous autres libraires, imprimeurs, & personnes quelconques de ne imprimer, ne faire imprimer, vèdre, ne distribuer en ses païs Terres & Seigneuries, ledict liure ainsi reueu corrigé & augmenté par ledict autheur si n'est par cōsentemēt dudiēt Rouille, sur les peines cōtenue esdictes lettres: Et ce iusques au temps & terme de cinq ans à compter du iour & datte qu'il seront paracheuez de imprimer, comme plus à plein est cōtenu par les lettres patētes surce données à Ville costerez le *X I X.* iour de Iuillet Mil cinq cens quarante sept.

*Par le Roy, maistre Lazare de Bayf maistre
des requestes de l'hostel present.*

Signé de l'Aubespine.
Et sceelé en Cyre iaulne à simple queue.

CHRISTIANIS-
SIMO GALLIARVM
REGI FRANCISCO,

EIVS NOMINIS

PRIMO,

Ioannes Tagautius medicus,

S. D.



NTER eximias præclarasque animi dotes, ac virtutes propè diuinas, quibus cæteris principibus tātum antecellis, quantum dignitate, opibus, potentiaque & imperij magnitudine illis omnibus præstas: ea mihi potissima semper visa est, Christianissime simul & inuictissime rex, quòd nullum vnquam temporis momentum præter labi sinis, quo non aliquid cogites aut agas, bono ac salutari principe dignum. Siquidem quicquid otij ac tēporis à necessaria cura corporis tibi superest, tu id omne vel reipub. tuæ sapienter moderandæ, vel honestis atque optimis disciplinis (quæ secundas res ornant, aduersas solantur) tribuis: vt ne in venatione quidem ipsa, qua colligendis & animi & corporis viribus interdum vteris, tibi temperes, quin vel de principatus tui administratione, vel de ferarum quas persequeris, aut stirpium quæ tunc se oculis obiciunt, aliarumve rerum natura, ferè semper disputes. Quo fit vt mineruam non minus quam

Epistola

Dianam errare in montibus & syluis subinde experiaris. Sed & in mensa illa tua regia, frequenti Principum, illustriumque virorum Cardinalium & Episcoporum conspectu ac consessu, semper aliquid ardui, doctique & honesti, contra morem & exemplum aliorum principum, non eorum modo qui nunc sunt, sed qui multis antehac sæculis fuerunt, è media philosophia atque antiquitate depromitur: vt rectè æstimanti ea sapientiæ verius officina, quàm epulum regiū videri possit. Aut enim humanæ, eademq; graues & te principe dignæ, aut diuinæ, quæ animum ad religionem informant, in ea recitantur historiæ, aut de omni genere artium, atque disciplinarum disputatur. Hinc factum est, vt Gallorum respub. inde adeo quòd illi præfuisi, virtute honesta, religione ac pietate integra, iure & legibus æqua, opibus firma, copiis locuples, & gloria ampla, semper fuerit. In hac autem assidua literarū concertatione, tu quasi arbiter honorarius, inter doctos homines de rebus controuersis, vt olim in encycliis & scholis suis (si parua magnis conferre phas est) facere solebant, magistri ac philosophi illi veteres, non minore eloquentia quàm dignitate iudicium interponis, grauiterque decernis. Quid quòd tu omnem omnium artium materiam rationē, & instrumenta, in numero habes, atque appositis nominibus exprimis. In quo Themistoclis, Mithridatis, Cyrique Persarū regis memoriam facile superas, vel obscuras potius. Sed & cum de re medica (vt aliquid de ipsa separatim dicamus) disputatio incidit (incidit autem frequenter) tu res medicas non aliter tractas quàm qui omni vita nihil aliud egerit. Nec aliter statuis, quàm qui in ea disciplina consenuerit:

vt

Nuncupatoria.

vt & præceptiones artis, & medicamentorum, præfertim simplicium nomina & vires, ipsamque corporum anatomen (cuius speculatione incredibiliter delectaris) ad vnguem teneas, consilia curandi sapientissimè distinguas, vim remediorum adnotes, quid vnumquodque proffit, quid noceat aptè & acutè definias. Quanquam verò hoc bonarum artium studium, quod nunquam intermittis, præposterè nati quidam, & ab omni ingenij cultu alieni, tanquam parum regium irrident atque damnant. Tu tamen, Princeps longè maxime ac sapientissime, regiarum virtutum fundamentum, & clarissimum boni ac salutaris principis ornamentum ponis, verè cum Platone nobilissimo totius Græciæ philosopho diiudicans, non aliter foelices fore respublicas, nisi si aut philosophis committeretur imperium, aut quibus imperium contigisset, philosophiam sequerentur. Salomon cum pro David patre suo, regnare cœpit, tantum sapientiam à Deo postulauit, qua rectè iudicare & populum sibi commissum sapienter gubernare posset : atque hic nihil aliud inculcabat filio suo quàm amorem ac studium sapientiæ.

Nec abs re quidem : nam fato sceptrum cadunt, doctrinæ autem gloria perennis. Quod tu etiam animo reputans, nihil vnquam charius, nihil antiquius duxisti, sapientiæ studio, atque assidua eiusmodi bonarum artium tractatione : ex qua tantos iam progressus in omni virtute, atque omni disciplinarum genere fecisti, vt Imperatores illos, & belli duces clarissimos, Alexandrum magnum, Iulium Cæsarem, Octavianum Augustum, Scipionem Africanum, non minus literarum scientia, quàm bellicis artibus

Epistola

præstātes, facile superaueris. Sed & hac doctrinæ cupiditate, qua semper totus sic flagras: tu nō solum eorū quibus imperas fortunis & corporibus, verum etiam animis excolendis, multarū rerū vſu ac ſciētia edoctus prudenter ac ſapienter (quod verē est imperare) cōſulis proſpiciſq;: dum ſcilicet infinitos propemodū homines, ac nobiles maximē, certatim ad ſtudia literarū tuo exemplo excitas atq; incendis. Regū enim mores, reliqui ciues ferē ſequuntur. Hinc nō abs re tanquam ad certiffimū rei literariæ præſidium, externi etiam homines, qui arte aliqua præſtant, ad te vnum vndiq; confugiunt, teq; muſarū patronum, ac fautorem eximū agnoſcunt & prædicāt. Quæ res effecit, princeps humaniſſime, vt de pulſo metu, aucta ſpe, hoīce de chirurgiā cōmentarios tibi cōſecrarem: vt ſcilicet in iſta tua foelici agricultura, qua ſemina omnium bonarum artium, in hunc foecundiſſimum agrū tuum, tum etiā in totū terrarum orbem, diſpergis, aliquā operæ partē ſuſtinerē: vtq; aliquid ex clariffimo tuo nomine patrocini j nāſcantur, auſpicatiusq; in vulgus prodeāt. Sed ad id etiam me vehementer impulit, quōd haud ita pridem, ſermone in menſa illa tua ſemel atque iterum de chirurgiā habito, quod in reliquis literis, græcis, latinis, hæbreis cœperas, idem in hac quoq; arte, quæ manu medetur, te facturū ſponduiſti, teq; vnum aut etiam alterū doctum, & longo iā vſu exercitatum medicum inſtituturum, qui chirurgiā Luteſtiæ Pariſiorū diligenter ac fideliter interpretentur. Atque hoc quidem tuum tam ſanctum tamq; ſalubre inſtitutum nobis aliquando retulerunt ἀρχιτρος Burgenſis, Capellanus pater, & Gulielmus Mucetus, medici tui clariffimi, ſimul & fideliffimi.

Fece

Nuncupatoria.

Fecerat idem quoque paulò ante amplissimus. Cardinalis Bellaius, vir omni virtutum ac scientiarum genere cumulatissimus, ac reipu. Gallicæ longe amantissimus. Qui omnes me vehementer aliquoties hortati sunt, vt chirurgicam hanc lectionem maturè aggrederer, etiam quidem tibi futuram quàm gratissimam affirmantes, teque itatuiffe vnum aut alterum eius artis professorem, Lutetiæ instituere: arbitratus amplissimo huic ac præpotenti tuo imperio rem non vtilem modo, sed & apprimè etiam necessariam futuram. Quippe quòd deinceps chirurgos non parum multos haberes in regno tuo, vulneribus & fracturis ritè curandis, luxatisq; decenter in suam sedem reponendis, maximè idoneos. Cæterum tametsi hac medicinæ parte, nulli sæpè non sit opus, nobilioribus tamen & principibus viris, atque iis etiam omnibus qui castra sequuntur & militiæ addicti sunt, in primis necessaria est. Hi enim dum æquis ad celeritatem dispositis huc atque illud excurrunt, dum ludis equestribus exercentur, dum in bello cum hoste conficiantur, & dimicant, fracturis & luxationibus, vt interim vulnera raceam, nunquam non expositi sunt: quibus, nisi ritè tractentur, vel subinde periclitantur, vel membri sic affectis, suo tandem robore destitutis, reliquum vitæ tempus, miseri & imbecilles trahunt. Sed vt vndè digressa est redeat oratio, quod nondum hæ nostræ chirurgicæ institutiones erant absolutæ, tantisper distuli clarissimorum, quos supra nominaui, virorum hortationi parere, quoad hoc, qualecunque est, opus absolueretur. Dum autem cudendo nimis cunctatur typographus, hominem vt alius medicinæ par-

Epistola

tibus præstantem, sic chirurgiæ peritia egregiè instructum, Vidum Vidium Florentinum, doctissimi vnde quaque viri, ac præstantium ingeniorum studiosissimi, D. Castellani Tutelensium episcopi, singulari iudicio conquisitum, maximo rei chirurgicæ studioforum, atque eorum qui deinceps chirurgiæ præsidio indigebunt, commodo, in hanc præclarissimam urbem misisti, qui partem hanc medicinæ, propè desertam & iacentem, quo ad fracta saltem & luxata pertinebat, susciperet, atque extolleret. Librosq; Hippocratis (qui primus hanc artem excoluit) inextricabilibus penè sententiis, ob fecundam & obscuram nimis breuitatem, vbique ipsi medicinæ parenti familiarem, ne dicam affectatam, refertos: & ab eo nuper cum doctissimis atque accuratissimis Galeni commentariis, latinos factos, magna sermonis elegantia, & rerum copia, interpretaretur. Quòd si hic, aut alius quispiam, pari doctrina & eruditione præditus, in hoc docendi curriculo perstiterit, bonis chirurgis, vt medicis, Galliam tuam breui refertam iri confidimus. Quòd non mediocri mortaliū bono, & cum sempiterna quoque nominis tui gloria eueniet. Quandoquidem effectus chirurgiæ (quæ Celso autore pars est Medicinæ vetustissima) inter cæteras artis medendi parteis euidentissimus est & maximè necessarius, nedum utilis. Siquidem in morbis cum multum (inquit ille) fortuna conferat, eademq; sæpè salutaria, sæpè vana sint, iure dubitari potest secunda valetudo, medicī ne industria, an corporis beneficio contigerit. In his quoque affectibus in quibus medicamentis extrinsecus admotis maxime vtimur, quamuis profectus euidentior est, tamen
sanita

Nuncupatoria.

sanitatem & per hæc frustra quæri, & sine his reddi sæpe manifestum est. Sicut in oculis vel Phlegmone, vel lippitudine arida, aut ea humorum defluxione, quam epiphoram appellant, laborantibus quotidieprehendimus, qui à medicis, collyriis, aut alterius generis medicamentis, diu vexati: sine his aliquando sanescunt. At in ea parte quæ manu curat (*χειρουργία* Græci nominant) euidens est omnem profectum, ut aliquid ab aliis adiuuetur, hinc tamen potissimum manare. Quot enim morbos, eosdemq; grauissimos, in rusticis & vrbanis, qui delicatiores sunt & medicinam auerfantur, quotidie videmus: sine illa victus ratione tam exacta, nullisq; adhibitis medicamentis naturæ duntaxat beneficio, euinci, & profligari? At si cui vel crus vel brachium fractum sit, vel luxatus humerus, aut quispiam articulus: nunquam sine manus opera, & chirurgi industria ad sanitatem perducetur. Itaque cum tanta sit eius artis dignitas, usus, necessitas, quis hoc tuum tam salubre de constituendis chirurgiæ professoribus, institutum non maxime probauerit? Opus sanè & liberali & magnifico principe dignum, & quo Romanorum olim imperatorum exempla, & laudata consilia reuocabis. Hi enim medicis (quos Reip. salutare & necessarios nouerant) amplissimum stipendium ducena & quinquagena annua sestertia, centena verò Rhetoribus & poetis, reliquarumq; disciplinarum professoribus pendebant. Intellexerunt nimirum illi semper Augusti imperatores, inter disciplinas excellentibus illustrium hominum ingeniis inuentas, & incredibili grauium virorum cura & industria perfectas expolitasq;, Medicinam principem ac reginam existimari

Epistola

sine controuersia debere. Hæc enim & honestatis splendore & vtilitatis magnitudine, & iucunditatis illecebris, reliquas omnes vincit, rebusq; humanis ceu altera secundum Deum vitæ parens & vindex apprimè est necessaria, atque ideo non solum à Philosophis, aut Medicis, sed & ab ipsis quoque Imperatoribus, Regibus, atque etiam Pontificibus, aliquando non oscitanter exulta. Neque enim puduit illos primi ordinis viros studium atque industriam in eo genere disciplinæ nonnunquam collocare. Et ut aliquot exempla proferamus: Augustus Cæsar, compositione medica à se inuenta lubèter utebatur, quam postea plerique medici in suos libros transfulerunt. Tyberius pastillum (græci Trochiscum vocant) ad herpetas, Galeno teste, composuit. Nero imperator illaudatus quidem, sed tamen apprimè doctus, partem studij in hoc genere doctrinæ posuisse fertur. Hadriani & Iustini antidota nomine ab eis accepto, hodie quoque apud medicos celebrantur. Princeps Arabs Auicenna in remediis medicis à se cōscriptis, testimonium Kabithi regis locis aliquot laudat. In Serapionis commentariis Iacibussa Medorum rex, & Kemud item Rex, velut medicinæ testes memorantur. Lyfimachus, Gentius, Eupator, & Clymenus reges, medicæ artis non ignari, sua ipsorum nomina plantis indita, æterno æuo memoranda reliquerunt. Taceo Iubam Mauritanix regem, qui herbâ Euphorbiam nomine, miris laudibus celebrauit. Prætereque Archelaum, Hieronem, Attalum, & Philometora reges, qui de plantis Græcè scripserunt. Ex Pontificibus autem Nicolaum quintum, & Eusebium arte & professione medicos fuisse, in historiis nostris legimus.

Ac

Nuncupatoria.

Ac de re quidem eiusmodi apud multos tam veteres quàm nostræ ætatis scriptores, facundia & eruditione percelebres, in commendationem dignitatis & excellentiæ medicæ artis, ac medicorum, longè plura litterarum monumentis tradita sunt, quæ hoc loco referre & longum esset & minimè necessarium, eoq; magis quod id iam cumulatè præstitit Andreas Tiracquellus tuus in curia Parisiensi consiliarius, vir optimis quibusque disciplinis instructissimus, ac linguæ vtriusque græcæ & latinæ, Iurisque prudentiæ, quàm summa cum humanitate & morum integritate coniunxit, peritissimus: in opere quod de nobilitate & Iure primigeniorum mox in lucem est æditurus. At verò non est, *R E X* illustrissime ac sapientissime, quod peregrina iam exempla commemorem, cum tu nulla in re veteribus cedas, adeò vt qui in posterum medicinam, ac bonas omnes disciplinas (quæ te princeps & autore suo splendori restitutæ sunt) autoritate principum commendare volent, non habebunt necesse veteres illos clarissimos Cæsares, Alexandros, Tyberios, Hadrianos, Iustinos, vel Reges alios, aut Pontifices amplius requirere, sed te vnum nominabunt, qui disciplinarum omnium intelligentia, & amplitudine stabilis ac præpotentis imperij, veterum nemine sis inferior. Fœlicissimam igitur Gallorum rempublicam iudico, quæ te regem tam prudentem, tamque salutarem, omnibusque virtutibus & disciplinis ornatissimum, diuino nomine consequuta, rebus omnibus ad beatè degendam vitam conferentibus, ita abundat, vt hodie vniuersi terrarum orbis tractus omnes, & omnem antiquitatem superet. Sed multò adhuc fœliciores eam fore confidimus, si te diutius incolumem,
& quo

Epistola

& quotidianis reip. vulneribus medentem, eiusq; partes omnes illustratē habuerit. Quamobrem Deum optimum maximum præcor, ut populum ab eo tibi commissum annos adhuc quamplurimos, hoc salutari imperio regere possis. Quo enim ij plures erunt, plus ad cumulum felicitatis huius amplissimi simul & Christianissimi regni haud dubie semper accesserit. Vale.

PETRI CRVSELII MEDICI in operis huius commendationem Hendecasyllabum.

Ars chirurgica diu malis magistris
Lanfranco, Albucasi, Guidone, Bruno,
Rollando, Rogerio, Vigonioq;
Indignam male passa servitutem
Cecis delituit gemens tenebris,
Olim iam medicas duas sorores
Emersisse videns: gradu citato
Ad claros studijs viros, & vsu
Illustres medico Lutetianos
Tendit suppetias petens, opemq;
Cunctantur reliqui: Tagaultus vnus
Afflicta lachrymas dolens, vicemq;
Et sordes, habitumq; non herilem,
Ornatu decorat nouo, reducens
Densis è tenebris, ut æmulari
Germanas meritò queat sorores,
Sic putres Arabum lacus repurgat.
Nam quod Cous habet senex, quod ipse
Huc spectans tot habet libris Galenus:
Hæc totum poteris videre Lector
Descriptum methodo breui. Proinde,
Summo, iudice me, est honore dignus
Vindex peonia Tagaultus armis.
Quo chirurgica tam bono magistro.
Et doctore tibi expolita prodit.

AD LECTOREM

P R A E F A T I O.



Hirurgicen Guidonis Cauliaci abhinc centum & septuaginta annos, tanto apud medicos iuxta ac chirurgos in pretio habitam, septennium ferè eius artis candidatis prælegi. Quam cum tot passim errorum ac mendarum portentis scatentem, tamq; inculta, squa lenti atque impura barbariè conspersam, ne dicam conspurcatam, reperissem: tum in animum induxi meum, opus eiusmodi, ab illis quibus ita refertum erat erroribus repurgare, & à vocabulis illis sordidioribus, atque ex intima ferè plebei sermonis face acceptis, si quando per ocium liceret, pro mea virili parte, vindicare. Videbam enim plerosq; omnes, qui in disciplinis humanioribus & elegantioribus literis probe erant instituti, fœdam eiusmodi, atque impuro nimis sermone traditam chirurgiâ auersari, ab eiusq; lectione, vel in ipso vestibulo adiuq; perterritos, statim se subducere: Nimirum existimantes (nec abs re quidem) disciplinam omnem detractò cultu orationis sordescere. Contrà autem considerabam, chirurgicos hosce commentarios, remedia quàm plurima, ad eos affectus quæ manus operam desiderant, longè optima & efficacissima continere: ac methodo tum ad rectè docendum tum ad facile discendum aptissimam conscriptos esse: Itaque operis huius non pœnitendi, nec vsque adeò (vt existimo) aspernandi prouinciam, eo consilio subini, vt ipsum à mendis, quibus scatebat, fœdioribus vindicatum, velut reformarem, & quanta maxima possem diligentia ac fide recognitum, in lucem proferrem. Plurima igitur ex Galeno & Hippocrate à Guidone ipso desumpta, deprauatè ac perperam ex vetere illo barbaro interprete citata, vel ex doctis & fidelibus latinis interpretibus in sensum germanum restituiimus, vel ad fidem græci exemplaris in Romanum sermonem fœlicius conuertimus: eaq; non raro, si quando obscuriora adparebant, sermone magis dilucido explicuiimus: quæ verò breuitas suppresserat aut ambigua effecerat, sic expressimus, vt omnis ambiguitas tolleretur. Corruptas morborum pene omnium, de quibus differebat, & remediorum præsertim simplicium voces propè innumeras, abiēcimus, & alias magis germanas, lectas, & proprias tum græcas tum latinas in locum illarum suffecimus. Ad hac, locos quàm plurimos densissimis obscuritatis tenebris obductos, penitus

Præfatio

penitusq; reclusos in lucem clarissimam, non mediocri labore, & diligentia reuocauimus. Græcæ item dictiones, & latinæ sanè multas cum barbaris & Arabicis aliud longè significantibus turpissimo errore confusas distinximus & explicauimus. Romanas quoque etymologias, græcis vocibus ineptissimè attributas, reiecimus: & veram illis interpretationem ex probatis autoribus iuxta linguæ viriusque proprietatem adiecimus. Quæ falsò erant ab eo posita, (erant autem non parum multa) emendauimus, & rationibus firmissimis, adiectis etiamnum classicorum autorum sententiis ad rem vel maximè faciètib; refutauimus. In reliquis, quæ crassam nimis, supinamq; barbariè residebant, ea paulo tersus ac nitidius, ne lectori serdescerent, expressimus. Denique Guidonis cémentarios de chirurgia conscriptos, expurissimis Græcorum, videlicet Hippocratis, Galeni, Pauli Aeginetæ & Aëtij Amideni fontibus, ac longè eruditissimis atque elegantissimis Cor. Celsi de re medica libris, ita locupletauimus & illustrauimus, à mendisq; illis sordidioribus, ac portentosis erroribus, quibus passim deformati erant, expurgauimus, vt non iam amplius Cauliaci illius opus, sed nostrum merito ab omnibus dici & æstimari possit. Quod & me etià tacente facile videbunt, ac (nisi iniqui fuerint æstimatores) ingenuè fatebuntur, quicunque nostras has institutiones chirurgicas accuratius perlustrauerint, & eas cum scriptis Guidonis conferre non fuerint grauati. In quibus (fateor) ordinem illi à Guidone constitutum (quod nobis, vt supra diximus, longè optimus videretur) vbique ferè obseruauimus. De quo nonnihil modo, quando id præsens locus postulare videtur, obiter dicemus. Itaque à definitione eius ipsius de quo agitur, iuxta Philosophorum præceptum, semper auspicamur. Mox quod iam definitione explicatum est, in suas differencias diuidimus. Post hæc causas, signa & iudicia cuiusque subiicimus. Denique vniuersalem curandi rationem apponimus. Vnde sic absolutis, à differencia ille primæ ac (vt ita dicam) generica, propria etià definitione circumscribuntur, & deinceps in suas veluti fibras finduntur, quæ notis cuique peculiaribus scitè designantur: præfagia demceps cuiusque propria notantur. postremò curandi methodus particularis describitur. Quo sanè ordine vix aliis (meo quidè iudicio) statui aut excogitari melior potuisset. Cæterum nos tantum vniuersalem methodum eorum affectuum, qui chirurgia subiecti sunt, hic sequuti sumus: quæ hæc abundè satis suis qui in rationali medicina probe sunt instituti, & corporum ægrotantium, ac singularum partium affectuum temperaturam, suam, connexum, substantiam, figuram, actionem, & sum, & si quæ sunt alia, ex scriptis medicorum, sed

Ad Lectorem.

sed Galeni maximè, didicerunt. Itaque superuacaneum iudicavi de
is rursus affectibus, quatenus in singulis partibus incidere consueue-
runt, differere. Anatomè quoque (cuius cognitio in primis chirurgo
est necessaria (prætermisimus, quòd hæc in longè eruditissimis ac pro-
pe diuinis Galeni commentariis de usu partium corporis humani, &
libris eiusdem de anatomicis administrationibus, ac quibusdam etià
aliis, summa tum arte tum eloquentia conscriptos (ut reliquos taceam,
qui hac de re nostra memoria scripserunt) amplissimè ac fidelissimè
doceatur & exponatur. Verum enim verò cum in eiusmodi libris plu-
rima sint quæ valde multis subobscura, quadam verò aliis prolixè
nimis dicta, & parum ad chirurgum pertinentia videntur, si in po-
sterum cognouerimus nostros hosce commentarios ab huius artis chi-
rurgicæ studiosis hominibus probari, atque ut his accedat anatome
(quod iam subodorati sumus) desiderari, quæ iam ante annos ali-
quot, ea qua fieri potuit breuitate & facilitate in hanc rem, quanti-
satis est chirurgo, conscripsimus, alia editione superis bene fauenti-
bus ne quid huic operi desit, in publicum emittemus. Quod autem ad
stylum attinet, quo in hoc opere, quod totum ad docendum res, eaq;
non indignas cognitum, est accommodatum, usus sum: non tam religio-
sus fui, ut illum tam anxium verborum delectum, tamq; splendidum
orationis cultum & ornatum ubique obseruarem, qualem ab omni-
bus qui in communem vtilitatem aliquid scribunt, exigere solent de-
licatuli isti laurioris eloquentiæ institutores, qui omnem dictionem, at-
que orationem ut putidam auersantur ac respuunt, quæ ex Tulliana
officina deprompta non sit: cum tamen Tullius ipse non requirat elo-
quentiam à philosopho, quam etiam neque Seneca vsquam desulerat,
nisi cum paruo cõstat, cumq; vltro adest, ut res magnas (inquit) ma-
gnificè prosequatur. Ceterum etsi res ipse etiam quas hic tractamus,
orationis cultum & ornamenta dicendi admitteret, ne vacabat qui-
dem, dum hæc horis succisiuis commentabamur, ut singulas tum vo-
ces, tum sententias ita supersitiosè expèderem, & ad eò curiose perse-
querer. Sed nec licet nobis etiam esse tam disertis, qui seueriores Musas
colimus: quiq; non ad ingenij ostentationem scribimus, aut ut famæ
vberem messem nobis comparemus, sed publicam duntaxat studiosorū
vtilitatem spectamus. Atque huius sanè rei nos subinde admonuit
Iacobus Syluius, archissima consuetudine vel ab ipsa ferè statim in-
eunte adolescentia mihi semper coniunctissimus: vir cum omni arte
ingenue liberaliq; doctrina, tum medicinæ scientia præstantissimus,
ut copiose & erudite eius lucubrationes abundè testantur. Itaque,
si rectè iudico, effeci ut stylus noster neque nimis neglectus, neque
anxiè

Præfatio.

anxiè nimis & ambitiosè elaboratus, sed temperatus & mediocriter cultus videri possit: quanquam duobus postremis libris & paulo cultior sit & æquabilior, quippe quòd in eis aliquant plus laboris & diligentie quam in reliquis adhibuerimus, & quos sequeremur autores optimos habuerimus. Ceterum alia editione, si detur interim nobis ocium, hoc, qualecunque est, opus acrius recoquendi, & diligentius castigandi, futurum confidimus, ut in eo styli disparitas nulla, sed eadè ubique, quoad fieri poterit, æquabilitas (quod artis benè dicendi, atque etiam interpretandi primum caput est) reperiat, Sed iam satis multa de præsentis operis materia, methodo, deq; toto labore nostro dictum sit: qui an à nobis frustra vel rectè susceptus sit ac perfectus, aliorum esto iudicium. Restat ut paucis dicamus, cur liber sextus, ad quem toties lectorem quinque nostris prioribus remittimus, nostro nomine non fuerit euulgatus. Id fuit in causa, quòd dum importunis amicorum efflagitationibus vrgerer, ut quæ de re chirurgica scripseram, ea ederem, non putabam sextum librum adiungendum: propterea quòd rudem duntaxat & impolitam quandam syluam congestam habebam eorum quæ ibi tractanda erant: quam negotiis plurimis & familiaribus & publicis occupatus haudquaquam recognoscere poteram. Itaque id oneris Iacobo Hollerio, lectissimo medico doctissimoq; philosopho, & arte dicendi instructissimo, dedimus, qui sic opus rude & inchoatum à me limavit, expoliuit, locupletavit & consummavit, sicq; totum immutavit, ut cum ad me rediret, meum esse nequaquam agnoscerem. Quocirca sub illius nomine, potius quam nostro, quicquid id erat censuimus euulgandum: ne hominem mihi amicissimum debita laude, meritaq; gloria fraudaremus. Tu lector utriusque labore frue,
& Vale.

INDEX IN SEX LIBROS SEQUENTES, cuius numerus prior paginam, posterior lineam denotat.

*



Abscessus apertio pag. 54.lin.1.	Adeps vetus quomodo fit recens 504.27
Abscessus aperien di ratio. 39.10	Adglutinatio diuiform duplex 212.9
Abscessus à qui bus fiant humoribus. 19.14	Adglutinatoria deligatura 212 34
Abscessuum iudicia 28.1	Adipes anodynus 555.12
Abscessus qui dicantur Galeno 21.36	Adipes pepticam vim habentes. 511.1
Abscessus quid 1.30	Adolescens ex cerebri vulnere curatus 179.2
Abscessus quando secandi 38.33	Adstringentia calida 488.7
Abscessus unde 20.15	Adurentia medicamenta 62.28
Abscessuum curatio in vniuer sum 37.5	Aeris ambiētis nomine quid in telligendum 275.37
Aceti vsus in malacticijs 505.16	Aeris arugo 383.18
Aceti vsus in scirrhis ibi. & 151.12	Aeris squamma 384.29
Acetum 489.1	Aerugo quid 93.33
Acetum mulfum incidit & de terget 502.31	Aeruginosa bilis 74.17
Acria vbi vitanda 529.14	Affectus cum luxatione compli cati 463.30
Acrimonia quomodo auferatur à medicamentis 529.16	Affectui contumaci & minus ca lenti remedia 500.21
Acrochordones quæ 9.10. & 91.20	Affectuum cum vlcere compli catorum curandi quatuor in tentiones 362.29
Acus forma & qualitas qua fu tura fit 216.12	Agaricus conuenit conuulsis ex crasis & pituitosis humori bus 247.3
Adenæ 44.25	Albara 11.7. & 12.9
Adeps & febū differunt 503.27	
Adeps recens laxar, vetus discutit 499.12	

AA

I N D E X.

Albara Punicorū est leuce Græ	Αποσκήματα	quæ	22.21
corum & Celſi	11.6	Apoſtema aliter à Græcis, aliter à	
Aldaron trochiſcus	69.9	recentioribus accipitur	1.26
Alhaſaphum	13.16	& deinde	
Alkali quid	552.23	Apoſtematis abſoluta definitio,	
Almatim Auicennæ Græcorum		& definitionis examinatio	4.5
terminthi	16.23	Apoſtematis curatio eſt extra-	
Almiſmar	92.3	ctio materiæ extraneæ quæ	
Aloë vulgaris	542.4	ipſum faciebat	38.28
Alphi duplices	11.12	Αποσπασαίς	429.31
Alphitidō facta fractura	429.28	Aquæ aluminosæ vis ad pituito-	
Althæa officinis biſmalua	474.	ſos abſceſſus	124.30
20		Aquæ fortes	553.24
Alterationes tres in animalis cor		Aqua vitæ	267.20
pore fiunt	352.34	Aquofi tumores	20.19
Altercum	374.12	Aquofi tumoris curatio	113.1
Alumen	383.38	Aquofum apoſtema	111.15
Αμυγδαλὰ quæ	547.19	Arabibus aliqua laus deferenda.	
Anadendromalache	148.20	282.23	
Analogia in tumoribus præter		Areotica cuius naturæ ſint	497.10
naturam	24.31	Ardor alicuius partis quomodo	
Αναστροφὴ cauſæ	287.31	extinguatur	493.35
Andronis trochiſcus	64.37	Argentum viuum ſublimatum	
Aneurisma quando fit	310.26	fiſtulis calloſis vtile	417.32
Αναστροφα quæ	554.24	Aſſenici uſus & meſura	136.19
Antecedentes tumorū cauſe	19.7	Aſſenicum ſublimatum	69.11. &
& 350.1		211.22	
Αντιδιαφύσις	516.30. & 517.6	Aſſenicū ſublimatū viuū à cor-	
Antidotarium quid	484.24	rupto optimè ſeparat	398.11
Anthraces qui	43.12. & 58.20	& 421.33	
Antimonium	383.31	Arteria incifa aliquando vnitur	
Antipſiſis	33.22. & 306.15	189.3	
Αντίρροια	445.32	Arteriarum vulnera	303.28
Απερίστατον vlcus	525.32	Articulorum doloribus conue-	
Apertis vaſis conueniunt adſtrin-		niens oleum	556.38
gentia	558.9	Aſcites vnde	111.27
Aphoriſmi 59. & 60. lib.6. in-		Aſcites à maiore frigidityte ſit	
terpretatio	468.21	quàm tympanites	112.22
Αποκοπή	429.32	Aſpanar	230.14
Αποκροσική	485.32	Aſtrictionis meſura	487.10
Apoplexia	250.28	Atheroma	118.18

arteria ſecta, per Athe
transuerſus citiſſime conglu-
tinatur & ſuſcipit ſe
ſitumet 345

INDEX.

Atheromata sub quo genere tumorum contineantur	8.3	Calidicon trochiscus	69.9
Atheromatis curatio	138.5	Calli curatio	549.18
Attractylis colleticasūme	542.9	Calli in osse fracto conueniens proportio	569.34
Attrahentia aduentitio calore	494.3	Calli in osse fracto magnitudo decens	451.2
Auersio sanguini duplex	305.37	Calli in osse fracto materia	449.37
Auersio cum vacuatione sanguinis	306.5	Calli ossis generari incepti notae	450.7
Auicennae locus de incisione medullae interpretatus	335.16	Calli siue πῶρον concreti signa	569.32
Auicenna myrmecias confundit cum herpetibus	86.19	Calore quæ trahunt	521.36
Aureū Mesuræ sarcoticō	531.22	Calor facit motum immodicum	260.15
Autoris antidotarij institutū & consiliū in libro describendo de materia chirurgica	485.9	Callos aufert helleborus	549.14
B Arbarum Galeni	543.29	Callosus labris vlcerum medicamentum conueniens	557.4
Batitura aris	384.31	Callosus vlceribus cōueniens medicamentum	387.18
Belulcum ferramentum	200.10	Callos quæ minuant	456.8
Bilis atra	73.30	Callum iustum firmantia in osse fracto	569.36
Bilis duplex	ibid.36	Callus	9.18.& 549.16
Bilis quid	ibid.33	Callus ossis dicitur, cuius interuentu ossis fracti partes adaligantur	188.15.& 437.15
Bocium	119.35	Callus quantum differt à clauo	92.21
Borago	230.12	Caluaria fracta solidescit trigintaquinque diebus	434.30
Bothor	4.17.& 9.38	Calx viua quid	311.4.& 369.28
Bothores iuncturarum	16.22	Cambil	385.22
Brachij caput quomodo luxetur	465.11	Canabil	374.20
Bronchocoele	115.16	Cancer à carcinomate differt	8.29
Bubo	120.16.& 360.17	Cancerosis vlceribus quæ imponuntur	522.15
C Acochymia quid	33.18	Cancer quid	154.13
Cacoethe vlcera	75.17.& 376.16	Cancer quando curationē, quando non admittit	156.35
Cacoethe vlcera iuuantia	523.15		
Cesim & percussim plagis factis medicamentum enbæmum necessarium	368.23		
Cadmia	383.3		
Calamentum officinarū	373.16		
Calcis modus lauandi	330.32		

INDEX.

Cancer vlceraſus cur lupus vo-		Caries	344.26.
cetur	425.5	Caries lignorum	528.38
Cancris exulcerati	75.16	Carnem detrahunt quæ vehē-	
Cancris ſigna	155.11	mēter exiccant & natura acria	
Cancris ſigna, ſcirrho Guido tri-		ſunt	282.111
buit	144.22	Carnem facere eſt naturæ opus	
Cancris medicamēta topica quæ		271.38. & 526.1	
conueniant	159.23	Carnē minuētū ſupercrēſcētē quæ	
Cancris quibus ad blandiendum		dā valētia qdā imbecilliora, &	
vera cura omiſſa	422.35	inter hæc quedā media	282.38
Cancris vlceraſi notæ	420.30	Carne replent ſiccantia & deter-	
Cancris vnde	143.30	gentia	405.34
Cancros aliquando Celſus gan-		Carni generandæ quæ obſunt	
grænam & ſphacelum appel-		526.13	
lat	432.23. & 445.6	Carne regignendæ quis ſanguis	
Cancroſa vlcera purgātia	523.9	aptus	271.30
Caninū cerebrū oſſa fracta qua-		Carnis excreſcentias reprimens	
tuordecim diebus ſolidat	567.21	med.	525.5
Canis rabiei notæ	295.11	Carnis generationi duplex adeſt	
Canis rabie ſapius capitur ibi.	5	excrementum	272.19
Cantharides quid mali adferant.		Carnis mutata à venenato telo	
552.6		notæ	204.12
Caphura	489.2	Carnis ſupercrēſcentis detractio	
Capitellū quomodo fiat	552.29	naturæ opus non eſt	282.111
Capitis luxationes	464.30	Carnoſi vulneris diuiſio	261.25
Capitis vlcera cōiūgēs	542.29	Carnoſi vulneris ſimplicis in	
Capnos græcè ſumaria latine di-		carne ſumma acceptis, curatio	
citur	147.1	262.24	
Capparidis cortex	385.13	Carnoſum vulnus & eius diſſe-	
Carbunculi	43.11	rentiæ	261.15
Carbunculi curatio	60.21	Caro temperamentum proprium	
Carbunculi iudicia	59.37	ſeruare debet priuſquam vlcus	
Carbunculi notæ	58.30. & 59.32	curari poſſit	365.32
Carbunculi qui peſſimi	59.37	Καταγμα	333.31. & 428.30
Carbunculis conueniens medi-		Καταγματικὴ	529.27
camen.	506.24	Καταγματικὴ deligatio	564.36
Carbunculum maturans & rum		Cataplaſma ad phlegmonas ex	
pens	63.14	fluxione natas conueniēs qua-	
Carbūculus vnde oritur	58.23	le	88.32
Caricarum decoctum pepticum		Cataplaſma ex orobi farina.	
eſt	511.22	63.30	

INDEX.

Cataplasmata vnde fiunt	489.28	Causæ tumoris præter naturam	
Κατὰ πλάτος curatio	329.10	speciales	18.37
Cathartica quæ	280.13	Cauistica dum admouemus, vi-	
Cathartica, & eorum pote-		dendū ne vicinæ partes inflā-	
stas	548.12	matione tententur	422.25
Cathartici quomodo vtēdum		Cauistica qualiter admouenda	
in vlceribus	519.35	370.2	
Cathartorum vlceri imposi-		Cauisticorū diuersi modi	550.22
torum probatio	521.21	Cauisticum ruptorium	41.15
Catheter quomodo trahit	495.5	Cauteria dū adhibentur quomo-	
Cathimia	383.4	do muniendus locus	551.6
Κατ'ἔξιν	47.33	Cauteria sunt leniora auro & ar-	
Cauitas omnis præter naturam		gento quā ferro & ære	550.38
impleri postulat	270.29	Cauteria hæmorrhagiis conue-	
Cauī vlceris implendi indicatio		nientia	561.12
à temperamento, tum corpo-		Cauteriorum & ferri vñs sem-	
ris totius ægri, tum laborantis		per suspectus in articulis	515.23
particulæ sumitur	263.23	Cauum vulnus priusquam im-	
Cauī vulneris cū amissione cutis		pleri possit, oportet parti-	
vtriusq; & carnis subiectæ ge-		culam siue carnem subiectam	
minus curandi finis	270.15	ad naturalem suum habitum	
Cauī vulnens curatio iuxta vul-		reducere	474.36
garem chirurgorum modum		Κίχριας	85.9
277.34		Centaurii facultas	329.37
Καυλὸς ἄν fractura	437.36	Centaurii minoris radix	330.9
Caules rubri	125.22	Κεφαλικά	529.27
Causa coniuncta nihil differt à		Cepalicorum materia	530.11
morbo	21.23	Cera alba quæ	490.12
Causæ duæ tātum morb. secun-		Cera & resina confusa valent	
dum quosdam	21.6	ad suppurandum	511.14
Causæ externæ curationem nō		Cera quali vtendum in cera-	
inducant sed affectum	174.7	tis	490.9
Causa effectrix in omni mor-		Ceratum κατὰ μαλακτικόν	566.19
bo primū tollenda	377.32.	Ceratum humidum	444.21
& 392.29		Ceratum myrtinnm	490.6
Causæ influxionis in partem ali-		Ceratum è psyllio	489.32
quam	32.17	Ceratum refrigerans	81.20
Causæ inuentio est principium		Ceratum rosaceum	489.36
curationis	31.28	Cerebri vulnera	178.5
Causæ tumorum præter natu-		Cerebri vulnera cur lethalia.	
ram generales	17.5	179.28	

INDEX.

Cerebrum promptissimè cōpati-	278.22	
tur nervosis partibus inflam-		
matīs	259.37	Cirrhū medic.
Κηρίλιον	503.18	Clauī Auicennæ
Cerōta vnde fiunt	489.28	Clauicula quō luxetur
Chalastica medicamēta quæ	37.8	Clauis cōueniēs medica.
χαλαστικά fiunt interdum	ἐκ πύ-	9.11.& 91.37
τικᾶ	509.26	Climia
Chalcadis	383.12	Κνημῆ
Chalcanthum	211.1.& 383.23	Coagulū
Chalcitis	383.11	Cochlearum carnes
Chalcitis cruda crustas inducit		Collectio in tumoribus fit bi-
ibid.14		fariam
Chironia vlcera	376.18	Καληντικά quæ
Chironiis vlceribus conueniens		Colleticon Dini
med.	388.20	Colleticon ē centaurio minore
Chironis vlceribus & malignis		ibi.25
quid vtiliter inspergatur	529.2	Colleticonū vtēdi mod⁹
Chironiis vlceribus med.conue-		Colcotor
niens in mollibus corporibus		Κόλπος
390.15		Colubri lapis quomodo acqui-
Chironium vlcus Celso quod di-		ritur
citur	376.28	Concoctionem iuuans drage-
Chirurgia non temerè adhiben-		ta
da in cancris	151.24	Concrefcere quæ debēt, oportet
Chirurgorū imperitia in vlceri-		mollia & humida esse
bus quibus admota sint medi-		436.32
camēta plus satis acria	360.33	Congestio
Chirurgicus nō purgabit, venāq;		17.10
incidit citra medici consi-		Conserua quid
lium	80.6.& 226.3	567.29
Chcerades	8.23.& 117.9	Confracta vniens med.
Chceradibus conueniētia	499.14	68.38
Cholera naturalis	72.32	Cōsolida maior
χολᾶ φυσικῇ	ibidem 34	63.32.& 228.37
Chryfocola	384.23	Consumptiua quæ
Cicatrice inducuro quid facien-		280.13
dum	279.33	Continētes vlcerū causæ
Cicatricem per accidens indu-		350.11
centia	280.9	Continētis causæ definitio
Cicatricis inducendæ methodus		21.4
		Conti vulgo probæ dicantur
		399.38
		Conuulsioni ex plenitudine fe-
		bris superueniēs bonū
		248.14
		Conuulsio vniuersalis
		240.28
		Conuulsio particularis
		ibid.33
		Conuulsis à quacunq; causa sem-
		per cerebrum corroborandū
		& quomodo
		249.26

Con

INDEX.

Conuulsis remedia cōtinuò adhibēda, interpositis tamē breuib. interuallis &c.	244.30	Crocus	511.31
Coriandrum	490.4	Crocus vtilis in anodynis	55.19
Cornua verrucarū genus dictū Auicennæ	9.17. & 92.19	Cruentis vtile quacunque cor. poris parte	543.20
Corpora quæ medicamenta leniora requirant, quæ fortiora	502.24	Crus fractū ne breuius fiat quid faciendum	433.24
Corpora dura vehementiora requirunt remedia, mollia contra	69.20	Crustæ à cauteriis factę quando & quibus detrahendę	551.13
Corporis figura multifariam vulnerati	193	Cubitus fractus diebus 30. occalescit	334.33
Corrosiuorum vsus in pituitosis affectis	137.18	Cubitus, manus, femur in omnes partes luxatur	475.24
Corruptelę particularum indicia	25.17	Cucurbitulę vsus in magnis moribus virulentorum animalium	301.17
Contundendo soluentia vnita-tem	304.28	Cucurbitula quō trahit	495.3
Contusa caro in gangranam degenerans quomodo tractanda	286.18	Cuniculosa vlcera omnia vulgus fistulas nominat	398.31
Contusum vulnus quomodo curatur	284.5	Curandi ratio optima tripliciter indicatur	37.23
Costę fracturę diuersę	435.13	Curatio morborum commoda nō ex nominū, sed rerū recta opinione contingit	262.14
Costa fracta quod dierum spatium ferrumē accipiat	414.34	Curationis ordo in vlcere	41.7
Coryledon	81.18	Curationum communis indicatio in tumoribus præter naturam	160.10
Coxa diebus quinquaginta coalescit	435.2	Curatio proprię est rei præsentis	174.19
Cranio fracto, quę imminere mala portendunt	ibid.22	Curatio tumorum in vniuersum	29.18
Crassa & viscida molliri volunt	502.3	Curatio tuta tria requirit	37.26
Crassa & viscida secans medicamen & discutiens	500.21	Cutis habenda ratio in glutinatione vulnerum	539.25
Cristę tumorum sequuntur analogiam humorum ex quibus constantur	24.29	Cutis regigni nō potest.	278.24
Crocea bilis	74.22	Cynoglosson	228.37
		Cistis fellis vulnera	182.9
		Cistis membrana dicitur, quę integrit ex crescentias	128.18
		D Acridion	79.14
		Dartre Gallicę	15.3

INDEX.

Declinatio in tumoribus præter naturam	25.11	Detergentia	40.23
Defœdationes cutis vnde	19.26	Detergentia quatenus vulnera requirunt	272.31
Defensiuæ quæ	490.37	Διὰ βρωσις	304.16
Deligandi fracturarum modus recentiorum Hippocrati dānatus	431.31	Διὰ χαλκίτιος	543.8
Deligatio ad repellentium genus refertur	491.4	Διὰ χαλκίτιος præparatio ad rheumata	490.19
Deligatio ferularum quādo sol uenda	449.10	Διὰ χαλκίτιος vsus in neruo vulnerato	331.21
Deligatio tuta oīsis repositi	441.16	Diachylon ireatum & cōmune confert œdematis	130.22
Deligatura cōueniens membro atrophia affecto	491.7	Diachylon Mefues prodest pituitosis tumoribus	ibid.26
Deligatura conueniens oīsis fracto	337.37	Διὰ χυλόν tria genera, & eorum diuersus vsus	508.16
Deligaturæ duabus fasciis factæ ratio atq; explicatio	442.27	Διακοπταίγιας medicamē	547.22
Deligaturæ indicationes vnde fumantur	215.15	Dia ireos	532.8
Deligaturæ instrumenta	562.34	Διὰ λαδάνου Critonis	535.24
Deligatura fracturæ coniunctæ cum vulnere	452.19	Διὰ λαδάνου emplastrū	387.18
Deligatura in œdemate	102.37	Diapalma	160.19. & 331.22
Deligatura retinens quomodo fiat	214.24	Diapedesis causæ	287.34
Deligaturarum tres differentiæ	212.27	Diaphoreticorum vsus, canon	501.15
Deligatura vlceribus conueniens	394.16	Diaphragmatis vulnera	180.32
Delirij ex vulnere curatio	260.17	Διὰ πλάστis	564.33
Deliriis opitulatur res frigidæ odoratæ	ibidem.35	Diaporpholigos vnguētū	160.21
Delirium quid	259.13	Διακυστικὰ debent esse emplastrica	502.15
Delitescentiæ regressiōis tumorum indicia	26.25	Digerentia siue resolutoria domestica	290.23
Deriuandum quando in vulneribus	227.36	Digerentibus quando vtédum, communis canon	292.36
Deriuatio	306.12	Diphriges	283.32
		Διπλώματα	546.12
		Directum in osse fracto reponendo quid dicatur	437.38
		Discissa quæ dicantur	189.25
		Dolia	200.8
		Dolor durans quæ symptoma inuehat	554.15
		Dolores acerrimos calor & frigus	

INDEX.

gus faciunt	ibid.33	ἐπιπλοῦς epulotica	533.38
Dolor fluxionē pritat, & phleg-		Emplastrū album epuloticum	
monē excitat 264.12. & 366.13		Auēuar.	537.37
Dolor in fracturis quomodo cu-		Emplastrum album epuloti-	
ratur 451.21		cum	537.32
Dolor in vulneribus quomodo		Emplastrum Auicennæ ad tu-	
sedetur 233.15		moresvulnerum & phlegmo-	
Dolor sedandus, læsæ particulæ		nas	234.35
dolorem faciens 260.28		Emplastrum Auicennæ ad for-	
Dolorum causæ 554.15		dida vlcera	397.25
Dorhienas adiuuans medicamen		Emplastrum ex canceris	161.13
501.6		Emplastrū ex metallicis	321.34
Dracontion morbus siue dracū		Emplastrū de arnoglossa	61.24
culus 9.21		Emplastrum Galeni conferens	
Dracontii radix curat maligna		strumis, panis, parotidibus &c.	
vlcera 385.36		130.5	
Dropacum vsus 546.5. & 18		Emplastrum Guidonis de lima-	
Dubelata 7.35		cibu ad cedemata resoluē-	
Duritieci in particulis causæ 149.5		da	131.24
Duritieci omni conueniens me-		Emplastrum Gulielmi de Sali-	
dic. 496.17		ceto	70.34
Δυσέλκῃς vlcus 540.21		Emplastrum nigrum	267.31
E Cchymoma quid 287.1		Emplastrū nigrū Aristi.	512.27
Ecchymomatis propria cu-		Emplastrum Rasis ad cedema-	
ratio 289.18		ta	102.15
Ecchymomatis species 288.4		Emplastrum viride Androma-	
Echecollaper se herent 509.34		chi	515.5
Εκπυτικὰ 509.16		Emunctoria	44.25
Ecthyrata 14.11. & 87.10		ἐναιμα quæ	396.13
Εκτιλατικὰ quæ 549.18		Enhæma qualia	406.31
E directo secare venā qd 47.35		Epidermis	73.5
ἐξώνιος figura 446.2		ἐπίθλαμος	444.12
ἐλκος ὀδονερῶν 357.6		ἐπίθεσις καταγματικὰ	564.36
ἐλκτικὰ quæ 491.18		ἐπίθλασις	513.30
Elongatio ligamentorū 463.5		ἐπικαιρὸν vulnus	540.18
Elychnion tarsicum 102.34		Epilepsia qd, & quantū distet à	
Emphysema quid 6.8		conuulsionibus aliis	240.38
Emplastra diuersa ad hæmorrha-		ἐπιλυσις quid	498.18
gias 560.19		Epinyctides	12.38
Emplastica medicamenta quæ		Epinyctis vnde dicta	13.7
sint 309.18		ἐπιπλοῦς epulotica	533.38

INDEX.

<i>Erysipelas</i> quæ	491.20	Erythrodanum	228.37
Epulotica quam facultatem ha-		Eschara quid	310.29
beant	279.38	Escharotica, & quibus conue-	
Epulotica recentiorum	537.18	niant	548.27
Epuloticis quando & quomo-		Escharotica recentiorum	561.19
do utimur	538.16	Essentia tumoris præter naturā	
Epuloticorum natura, & eorum		tria in se continet	30.11
triplex genus	532.32	Effere	1.11
Epuloticorum remedium di-		Esthiomenica corruptio	31.4
stinctio, & ex ea vitandi mo-		Esthiomenos herpes	85.24
di	533.17	Euphorbium	493.26
Epuloticum album è ceruſa & li-		Exanthemata	14.10. & 87.11
thargyro	536.16	Exarthrema	462.36. & 463.22
Epuloticū albū Galeni ibid.	36	Exeſis vaſis conueniunt ſarco-	
Epuloticum emplaſtrum non-		tica	558.10
dum tamen ſanans cacoëthe		Exciſis vtile quacunque corpo-	
vlcera	386.35	ris parte	543.22
Epuloticum medicamētū quod		Exiccantia aſſatim	385.16
279.11.		Exiccatio valida duos habet ſco-	
Erethriaſterra	374.23. & 385.20	pos	338.33
Eroſio ſi non cedat mitioribus		Exitura	101.24
medicamentis, vſtio adhiben-		Exituræ Arabib⁹ ſunt abſceſſus	
da erit	395.19	Latinis, Græcis ἀποστήματα	4.21
Eroſio venis vbi accidat	304.36	Exituræ Auicennæ quæ	1.32
Error interpretis Auicennæ in		Exituræ vnde	20.16
diſtinctionibus, myrmecia & for-		Expulſoria deligatura	213.33
mica	7.22	Extenuatorum membrorū in-	
Eryſipelas nō legitimum & eius		ſtauratio	571.15
ſpecies	73.11	ζυγκτις vlcus	540.22
Eryſipelas quid	72.23	F arina hordecea	510.27
Eryſipelatis curatio	77.15	Faſciæ latitudo & longitu-	
Eryſipelatis exulcerati curatio		do pro vulneris & partis ra-	
83.13		tione variatur	215.3
Eryſipelatis refrigerationis ter-		Faſciarum latitudinis modus	
minus	80.32	442.13	
Eryſipelatis ſummaria curatio		Faſciarum longitudo	442.31. &
explicata aphoriſmīs	83.26	443.30	
Eryſipelatis veri cauſæ	75.24. &	Febres à quibus ſiant humori-	
deinde iudicia & ſigna		bus	19.29
Eryſipelaton genus qui tumo-		Febris leui vulnere ſuperueniens	
res referunt	7.19	eſt pernicioſa	236.2
		Feb	

INDEX.

Febris quò excitatur in conuul.	148.20	Flatuosi tumores	20.25
fis ex plenitudine	148.20	Fluxio	17.7
Febris vulneratum prehensens	235.31	Fluxionis auersio quibus perficiatur	47.29
quomodo curanda	235.31	Fluxionum auersio quomodo fiat	33.3. & 45.22
Ferinos Auicennæ quid	145.2	Focilia quæ	335.6
Fermentum	494.14	Forceps ad amplianda vulnera in carne	409
Fermentum quò potenter molitur, coquit & digerit	499.16	Forceps ad globos & tela barbata educenda	207
Femur fractum non necessario breuius fit	433.15	Forcipes Albucasis ad extrahenda tela	206
Ferro quando vtimur, quæ partes vitandæ sunt	514.21	Formicæ Auicennæ 84.29. & 86.16	
Ferrum teli quomodo eximatur	200.6	Formicæ genus verrucarum 92.27	
Ferrum infixum quo instrumento commodè extrahatur, & quod vice terebræ inuersæ Guidonis esse possit	208	Fractura 335.31. & 428.27	
Ferulæ fracturis quando apponuntur	446.33	Fracturæ cū vulnere curatio ex Celso	338.6
Ferulæ quales esse debeant	447.21	Fracturæ curatio generalis.	454.20
Ferulæ quomodo applicandæ ossibus fractis	338.12	Fractura brachij, tibiæ, aut femoris quò deliganda	442.12
Ferularum vsus	447.21	Fracturarum causæ	431.9
Fibulæ Græcè ἀγυρῆες	211.12	Fracturarum generalis diuissio	426.1
Fibulæ quādo imponendæ vulnerei	211.34	Fracturarum prognostica	432.5
Fibulæ quatenus vtilis	217.22	Fracturarum veterinariarum aliorum quot præfagia	435.38
Fibula vbi adhibenda	541.20	Fraudulentum vlcus	396.23
Figura partis rectissima quæ	445.37	Fugillæ Auicennæ 115.21. & 120.25	
Fistulæ quomodo noscatur	411.1	Fuligines sarcoticæ	528.32
Fistula quid, & quomodo ex sinu fiat	398.31. & 410.13	Fumusterræ	147.1
Fistulæ quomodo inciduntur	517.11	Fuscus color	144.14
Fistularum curatio	413.16	G alla omphacitis	385.7
Fistularum vera curatio quæ	418.33	Gallicus morbus quando primum irrepsit	16.3
Fistula vnde sit dicta	410.19	Gallicus morbus veteribus ignotus	ibi.1
Flatibus ventris conueniens oleum	556.28	Gangliorum per chirurgiam curatio	129.18
		Ganglium	8.20. & 116.19
			Gan

INDEX.

Gangræna	43.12.& 65.23	Herpetas iueteratas curatio	90.5
Gangræna & splaceli curatio-		Herpetis curatio	87.15
nis capita	71.8	Hiera picra conuenit couulsis ex	
Gangræna signa	67.7	crasis & pituitosis humori-	
Genitalibus inspergitur vtiliter		bus	247.1
colophonia cum ture	528.36	Hiera Ruffi	118.29
Gentianæ radix quandoque pe-		Hipp. non fuit ambitiosus in fra-	
nicilli loco imponitur	222.1	cturis nominandis	430.3
Genu i tres partes luxatur	465.19	Hirudines supficiē sugunt	495.3
Glandosæ pustulæ	16.17	Hispanica lues	16.7
Glandulæ	44.25.& 360.2	Hordeatū vel hordeū munda-	
Glandula vnde dicta	116.4	tū est prissana hordeacea	230.7
Glaucium est memitha	90.22	Humores propriē qui	19.32
Glossocomi formula	460	Humores vniuersi in venis aut	
Glutinandi ratio	540.33	arteriis continentur	20.4
Glutinantia remedia recentio-		Hydrea	13.14
rum	543.37	Hydrophobia	295.22
Glutinantium facultas	267.2.&	Hydrophobiæ notæ	297.7
279.21.& 401.33		Hydropicorum aquas elicientia	
Glutinantium finis	406.7		494.34
Guidonis error in myrmeciis &		Hydropicorum vulnera quare	
formicis	86.23	difficuler sanantur	190.1
Gypsum	489.4	Hyoscyamus anodynum fami-	
H æmorrhagiæ causæ	558.6	liare	55.27
Hæmorrhagiæ varia re-		Hyperfarcosis	281.31
media	559.9	Hyperfarcosis oblatio	369.3
Hæmorrhagia quando cauteriis		ὑποσφομιδης	442.17.& 432.28
sisti debeat	559.17	Hypopia	288.5
Hæmorrhagia trifariam sisti-		ὑπνωτικὰ	554.38
tur	305.28	ὑπόφθοσις quid	516.29
Halitus oris grauis & foetens qua		Hypophagmata	288.6
re oppressis lue venerea	504.3	I Chthyocolla	384.22
ἅλοι	92.3	ἰχθύς quid	272.25.& 351.37
Hepatis vulnera	180.6	Ieiuni intestini vulnera	182.7
Hernia gutturis	115.17	Ignis sancti Antonii	66.16
Herpes	84.15	Imbecillitas partium ab intem-	
Herpes & erysipelas vlceratum		periei prouenit	364.3
differunt	86.31	Impages quid	222.6
Herpes exedens	75.13.& 84.38	Impetigo	10.13
Herpes miliaris	85.7	Incantamenta, infusurationes, &	
Herpes pustulosus	85.23	cōiurationes ad tela extrahen-	
		da non	

INDEX.

da non conducunt	204.31	L Acertæ caput	93.28
Incarntiua deligatura	212.31	Læfio melior quàm mors	
Incarntiua futura fit quinque		274.22. & 250.2	
modis	215.33	Lana fuccida vino austero infuc	
Incarntantium ordo	407.5	cara	488.35
Incidens materia quibus conue-		Lapis lazuli Græcis Cyaneus di-	
niat	497.35	citur	147.3
Incrementū in tumoribus præ-		Larigna pro terebinth. substitui	
ter naturam	25.2	potest	527.20
Indicatio communis omniū tu-		Laxatio	463.3
morū præter naturam	147.11	Λιπιδυλα	384.30
Indicationes communes tumor-		Lepra	10.34
um præter naturam quibus		Lepræ med. conueniens	543.22
variantur	29.28	Lepra Halyab. quid fit	12.12
Indicationum primarum diffe-		Leuce Græcorum & Celfi est	
rentiæ duæ	273.30	Punicorum albara	11.8
Indurationis tumorum indicia.		Leucophlegmatia vnde	111.19
44.20		Leucophlegmatia ad œdematiū	
Induratis tumoribus vtile cata-		species refertur	8.26
plasma	56.7	Lichene	10.12
Inflatio est apostema ventosum		Lienis scirrhis conueniens med.	
107.24		503.21	
Inflatiōis curatiōis capita	110.30	Lienis vulnera	183.3
Inflationum causæ	106.5	Ligamenta valentiſſima tole-	
Inflationum ſigna ibid.	27	rant remedia	318.7
Inflationum curatio	107.1	Limacum carnes	494.31
Inflammatio fracturis adiuncta		Linamenta	220.21
quomodo curatur	451.21	Lithargyrum nutritum	538.2
Intemperierum vulnecum ſigna		Lixium ſiculneum	553.1
& curationes	235.13	Loliū iuraia Fræcis dicitur	68.25
Intemperierū in vlcere ſumma-		Lupia quid	117.26
ria confideratio	364.31	Lupia curatio	127.26
Ioannis Tagautii laus	485.2	Lupia recentiorum, Auicennæ	
Ionthi	12.29	glandula, Græcorum gan-	
ἰόνθις	386.4	glio idem videntur	128.30
ἰσχυρὰ veterum	561.3	Lupus morbus	117.35
Iſchiadicis vbi ignem adhibe-		Lup⁹ cæcer vlcerar⁹ dicitur	425.5
mus	515.25	Luxatæ partis dolor vitandus &	
Iudicii ferendi formula de vul-		inflammatio arcenda	471.12
neratis	185.24	Luxatio cum fractura ſine vl-	
Iugulariū venarū vulnera	182.1	cere	474.4
		Luxa	

INDEX.

Luxatio cum fractura & vlcere		primum diem coeunt	434.38
ibid.	7	Maxilla superior immobilis in	
Luxatio pessima	467.4	omni animante excepto cro-	
Luxatio quid	462.27	codilo	464.10
Luxationum causae	465.35	Medicamenta acrimoniâ lotio-	
Luxationum curandarum sum-		ne deponunt	330.29
ma	473.13	Medicamenta hyperfarcæ sin tol-	
Luxationū curatio, & eius præ-		lentia	369.6
cipua indicatio	469.8	Medicamenta ignis vires haben-	
Luxationum generalis diuifio		tia	89.19
	461.1	Medicamenta quare varia mi-	
Luxationum signa	466.7	fcuntur	510.8
M Agnes	494.28	Medicamentū vnum idemque	
M agnum & paruum in		non est conueniens omnibus	
vulneribus quomodo acci-		corporibus	380.29
piendum	540.17	Medicum prudentē esse conue-	
<i>Μαλακτική</i>	501.20	nit in victu instituendo	232.3
Malactica quatenus à pepticis dif-		Medicus præfatiens de longin-	
ferunt	509.36	quo obuiam it malis	223.21
Malactican applicandi modus		Medullæ & adipēs quando acri-	
	503.11	moniam contrahunt	493.13
Malagmata quomodo confin-		Medulla panis	233.35
guntur	ibidem.16	Medulla recens laxat, vetus dis-	
Malicorium	385.7	cutit	499.12
Malum terræ	ibid.15	Medullarum natura & ordines	
Malum punicum vlceri inflam-			504.31
mato vtile	367.31	Medulla taurina ob acredinem	
Manna	369.29	non emollit	ibid.37
Marciaton frig. doloribus con-		<i>Μύα</i> vulnus	540.19
uenit	557.8	Melanacardinū	547.35
Marginem nonnulli subluxatio-		Melācholia fit ex sanguine & pi-	
nem nominant	46.1	tuita supercalefactis in corpore	
Materia fiens in tumoribus &			142.9
facta quæ sit	18.26	Melancholia differentiae	140.34
Matricis vulnera	182.8	Melancholicus humor in cancro	
Maturantia	52.38	quomodo vacuandus	158.6
Maxilla inferior solum luxatur		Meliceria	352.6
in anteriorem partem	464.13	Meliceridas, atheramata fteat	
Maxilla, iugulum, scapula, os tali		mata exedentia	139.1
calx, manus, plāta fracta inter		Melicerides sub quo genere tu-	
decimū quartū & vigesimum		morū contineantur	8.3
		Meli	

INDEX.

Meliceridis curatio	138.5	Myrrha ossa nudata carne ve-	
Meliceris	118.30	stit	337.22
Melligo vuæ passæ	111.33	Myrrhis	228.33
Mentagra	15.10	N ΑΡΧΟΤΙΣΚΑ 554.38. & 557.13	
Mesuræ laus	256.3	Narium fractura mala	
Metallica elota morsum demit-		435.20	
tunt, sed minus siccant	384.3	Nata tumor	8.18. & 120.5
Metallica quomodo tenuiora		Νάφθητες	448.16
sunt	495.20	Naturaliter se habentia sui custo-	
Μετανοητικῆ	546.10	diam per similia indicat: con-	
Misy	383.25	tra naturam verò ablationem	
Modice siccantia metalla	382.37	sui per contraria	273.36. &
Mollientium particularis mate-		275.34	
ria	503.1	Nervaceæ partes læduntur fri-	
Morbilli	14.8. & 87.1	gido	560.7. & 318.4
Morbis extremis extrema com-		Nervi, arteriæ, venæ diuise ali-	
petunt remedia	421.33	quando coalescunt	188.30
Morborum verus curator quis		Nervi cassim vulnerati confide-	
	173.11	ratio et curatiōis scopi	325.20
Morphea	11.6	Nervi contusi cute illaesa cura-	
Morsus animalium duplici con-		tio	333.8
stat differentia	292.24	Nervi & tēdonis pūctura	183.26
Morsus an sit factus à cane rabi-		Nervi puncti curatio	319.6
do, quomodo p̄betur ex Ori-		Nervi vulnerati & nudati cura-	
batio	296.7	tio	330.15
Morsus hominis quando viru-		Nervi vulnerati signa	316.36
lentus	293.1	Nervo contruso vnà cum cute	
Morsus omnis virulenti gemina		quæ adhibenda	332.32.
curandi indicatio	298.9	Nervosarum partium vulnere-	
Morsus virulenti signa	294.11	curatio	318.27
Morsus virulentos quæ anima-		Nervosarum partium vulne. dif-	
lia inferant	292.28	ferentia	316.9
Mortificatio alicuius partis quid		Nervus punctus quando præci-	
	44.26	dendus	234.22
Mortificationis causæ	65.17	Nitri loco quæ ponuntur	493.1.
Mortuus sanguis quid	290.35	& 112.13	
Μύρτα	309.15 & 312.20	Nodi Avicennæ	7.35. & 118.3
Myrmecia	9.9. & 91.7	Νόση vlcus quod dicatur	355.35
Myrmecia educi quomodo de-		Nomina apud Barbaros non at-	
bent	94.20	tendenda, sed rerū descriptio-	
Myrmecis conuenientia	93.6	nes	13.37
			Nomi

INDEX.

Nominibus parū fidendū propter diuersum vsum eorum apud autores	12.15	Ordo tractandorum in hoc libro	31.10
Notæ tumorum præter naturam vniuersales	23.10	Os adiutorii	335.5
O culus populi	489.3	Os corruptum quomodo tractandum	563.2
Oedema Barbari Vndiam vocant	6.18	Os fractum qualiter collocandum	565.15
Oedema maturantia	103.28	Ossa luxantur quatuor modis	464.3
Oedema non verum	111.36	Ossa nudata quomodo carne integuntur	526.34
Oedema quid	95.27	Osse fracto quæ intefiones præcipuè adfunt	564.21
Oedematis causæ tres	98.1	Osse fracto quomodo turunda vulneri applicanda	337.9
Oedematis curandi scopus duplex	98.33	Osse maiore fracto si medulla exeat periculofum	335.4
Oedematis signa	98.6	Osse nudato erysipelas malum	334.31
Oedematis curationis capita generalia	104.33	Osis fractis atque luxatis initio prohibenda fluxio, dolor, inflammatio	564.20
Oenostagma fccat, & putredinem prohibet	520.26	Osis caries altè descendens qualiter tractanda	375.6
Oesophagi vulnera	181.31	Osis cavitatis impleri non potest	337.5
Olea anadyna	555.1	Osis fracti rectè commissi signa	435.38
Olea cõposita resoluẽtia	499.38	Osis fracti & sua sede moti signa	440.34
Olea ectylotica	550.5	Osis fracti reponẽdi modus per fynes	439.14
Olea rarefacientia	498.26	Osis fracti repositi signa	439.22
Olea trahentia	495.22	Osis fracti repositio per tensionem	564.25
Oleorum vitia	489.11	Osis fracti sanationem celerem aut tardam faciunt, temperamentũ, ambiens aër, &c.	435.6
Oleum cum sale digerit	99.30	Osis vitiati notæ	374.5
Oleũ è sambuco & ebulo quid faciat	499.32	Osis vulnus quod	333.35
Oleum ex vitellis ouorũ	323.22	Osiũ abscessu incarnãtia	564.11
Oleum Sabinum	323.1	Ossium	
Oleum terebinthinum	556.16		
Oleum vitiosum quomodo eleuatur	489.16		
<i>ὀμφάκιον</i>	82.13, & 510.33		
Omphacium	488.17		
Omphacinum oleum	489.8		
Oppilãtia aliàs leniũt dolorẽ, aliàs acrimoniã hebetãt	487.36		
Oræ distantes vulneris trifariã in idẽ adducuntur	211.10		

INDEX.

Oſium affectus	562.12	Pes fractus ſexaginta diebus ſi quieſcat, conſaneſcit	435.3
Oſium glutinandorum qua- tuor ſcopi	336.10	Phagedæna	75.15. & 356.1
Oſium vitis celeriter medica- dum	562.5	Phlegma aquoſum, tenue, fla- tuoſum quod	96.29
Oſtracodermorum piſcum teſte cremata & lota ſiccant citra roſionem	385.1	Phlegmaticarū excreſcētiarum curatio	124.3
Oſtrea viua quid faciāt	494.36	Phlegmonarum genus tumores qui referunt	7.9
Oxycraton	49.25	Phlegmone quid	32.4
Oxyrhodini facultas	99.28	Phlegmones duplex acceptio. 41.32	
P Analithes ad diuerſa mala vtile	568.11	Phlegmones cauſæ tres	43.16
Panis fordidiſ	230.19	Phlegmones notæ	43.36
Papulæ	87.9	Phlegmones curatio	38.19
Papulæ duplices Celſo	14.32	Phlegmones curandæ quatuor intēctiones particulares	46.30
Paraliſis quid	250.18	phlegmones ex humorum influ- xu factæ ſummæ curationis capita	57.5
Paralyſeos curatio ex medicamē- tis forinſecus admotis & tan- tūm ad chirurgicū pertinen- tibus	255.27	Phlegmones ſymptomata	44.21
Pararthrema	463.2	Phlegmones ſymptomatum cu- ratio	54.18
Παρρηγορικὰ quæ	554.23	Phlegmones tria ſunt 4.	44.9
Parocheteuſis	306.14	Φλόγῳις	41.38
Parotidibus cōueniens medica- mentum optimum	496.17	Phlyctene vnde	111.27
Pars languida quando confir- manda	498.11	Phœnigmi viſus	546.6
Pastilli Fauſtiani	369.33	Phœnigmus quādo adhibendus & eiſ materia	547.16
Πελιδνὸς à plerique fuſcus color in corpore dicitur	144.16	Picari viſus apud veteres	566.22
Penicilla	220.21	Πίττα quæ	545.36
Περσικὰ	509.16	Πιττωτα quæ	ibidem
Pepticoſū vtendi modus	513.15	Pituitæ eruptiones	87.9
Περικάρια quomodo in viſum ve- niunt	499.23	Pituitam ducentia per aliuū	125.6
Periodi ſiue paroxiſmi tumorū, humorum eſt quibus cōſtan- tur ſequuntur analogiā	24.29	Pituita quid	96.14
Περὶ οὐ	335.7	Pituitoſorum abſceſſuum cauſæ 121.20	
Pes columbinus	228.35	Pituitoſorum abſceſſuum parti- cularis curatio	126.22
		Pituitoſorum tumorum mate- ria	121.26

INDEX.

Pituitosum tumorum genus qui tumores referant	7.32	Psoricum quomodo paretur ad trahendum	491.12
Pix peptica quomodo fit	511.8	Psyraces	14.2
Plagarum differentia	165.15	Psylli populi Italiae	63.12
Planta noctis	13.16	Psara	11.5
Plantago epulotica est	537.31	Πύραμα	546.12
Platyfina quid	388.25	Pulmonis vulnera	181.15
Plethora quid	33.6	Puluilli quomodo sunt	219.18
Plethoræ curatio	ibid.12	Puluilius quid	394.4
Plumaceoli qui fiunt	219.19	Pulus Auic. sistens sanguinem	315.2
Plumbi lamina epulotica est.	536.29	Pulus ruber	543.38
Plumbi recrementum	384.25	Pumicis præparatio	529.9
Plumbi vis in cancriosis	161.3	Purgatio necessar. interdum vul-	
Plumbum vstum	384.24	neratis	222.25
Podagricis quouis tempore conueniens remedium	508.1	Purgatio in vulneratis quando adhibenda	226.10
Pollen est farina volatilis molendini	217.35	Pus album, sene, & æquale quomodo fit	509.23
Polyidæ sphragis	65.5	Puris generatio vnde	352.30
Polyidæ pastillus	ibi.12	Pus optimum quod 29.1. & 354.14	
Porra Gallis verrucæ dicuntur	9.9. & 91.2	Pus mouentia	52.38
Porracea bilis	74.16	Pustula	4.16. & 9.28
Posca vel pusca quid	89. 28. & 102.1. & 397. 15	Pustula vnde	20.16
Posca inflammato ulceri utilis	367.25	Pustule corosive 75.18. & 84.20	
Πύρα	437.15	Putrefactæ particulae alicuius suppurantis curatio	56.28
Parus sarcoides 188.15. & 334.26		Putrescentia calido & humido constant	368.12
Pari generatio	449.34	Putridis medicamentum conueniens	68.22
Paro gignendo victus ratio conueniens	450.11. & 567.5	Πύρε	352.16
Παραλυτική quæ	566.36	Παραλυτική	545.33
Parolytica quæ	457.8	Pyulcus quomodo trahit	495.5
Parus quomodo augeatur & minuatur pro necessitate	455.35	Q Væ auferri non possunt transferuntur in locum alium	37.38
Prægressæ causæ	19.3	Quies optimum medicamentum vulneratis	230.28
Propolis quid	492.20	R Adix vasibus quæ sit	114.9
Propulsorium scemina & propulsorium mas	209	R Ραγανιδίου fractura	437.36
		Rectio	

INDEX.

Reſtorum vulnerũ labra quo- modo adducuntur	541.2	Sanies mala	354.24
Refrigerantia eryſipelas	81.15	Sandaracha	369.33
Refrigerantia vehemẽter	488.29	Sanſa quid	521.2
Renum vulnera	182.8	Sanguinis fluxuri ſupprimendi modus	312.9
Repellentium diſtinctio	34.20	Sanguinis in vulneratis mitteren- di quantitas	224.30
Repellentium uſus	485.31	Sanguinis in vulneribus mitteren- di ſcopi	224.10. & 234.10
Repellentium natura alia Arabi bus alia Græcis	486.19	Sanguinis miſſio in conuulſis	246.3
Repellere ubi non conuenit.	487.31	Sanguinis profuſionis ex vul- nere differentia	304.8
Repoſitio fracti membri apta	445.30	Sanguinis profuſionis curatio.	305.25
Reprimẽtia ſiue repellentia quæ ſint	88.17	Sanguinis ſiſtendi modus per uſionem & eſcharam	310.28
Repurgantium vlcera materia.	522.28	Sanguinis ſupprimendi præcepta aliquot	312.12
Res non naturales	47.4	Sanguis naturæ theſaurus	305.15
Reſolutionis tumorum indicia	26.16	Sanguis quid & quotuplex	42.12
Reſoluentium canon generalis iuxta diuerſa tempora morbi.	36.15	Sarcocolla	384.21
Reſoluentium vis qualiter con- ſideranda	497.21	Sarcothlaſma	287.13
Reuulſio	305.12	Sarcotica qualia ſint	526.8
Rhegma	287.11	Sarcoticorum facultas	ibidem
Rhuma	17.10	Sarcoticorum vtendi modus	532.21
Rheumatismi quãdo plurimum mouentur	485.31	Sarmentorum aqua	93.19
Rofaceum oleum	489.5	Scabies	11.1
Roſtrũ porcinũ inſtrumẽtũ ap- pellatum adeuellẽda tela	206	Scabiei conueniens med.	557.6
Rubi fructus & flores	488.19	Scabioſa	63.36
Rupta vaſa quõ deligãda	558.33	Scammonii ſuccus Dactrydion dicitur	79.13
S Agitræ & tela quomodo ex trahantur	195.4	Σχάται verbo quid voluerit Hip- pocrates	464.17
Saire	13.12	Schidacide facta fractura	429.14
Sambacino oleo vtimur pro ſa- bino	151.27	Scirrhi deſperati ſigna	502.19
Sanies quid	272.25. & 351.37	Scirrhi legitimi cauſæ	144.2
		Scirrhi legitimi notæ	144.34
		Scirrhi legitimi ſiue ſcirrhoſi tumoris curatio	145.11
		Scirrhi illegitimi gñatio	148.35

BB 1

ſandux quid 553

INDEX.

Scirrhi non exquisiti curatio.	Siccantia quatenus vulnera re-
148.35	quirunt 272.28
Scirrhi emolliendi modus & ra-	Siccantiū medicamentorū in vul-
tio 505.17	neribus curadi gradus 279.18
Σκίρρος græcè latinè durities, Ara-	Siccum sano vicinius, humidum
bicè Sephiros dicitur 6.21. &	non sano 267.18
143.11	Sigillum lemnium 382.38
Scirrhorum differentiae ex mix-	Simæ ferulæ 448.9
tione humorū, ortorū 143.21	Sinapismorum vsus 546.5
Scirrhosi tumores & qui ad atrā	Sinapismorum materia & præ-
bilem spectant 8.27. & 140.18	parandi modus 546.38
Scirrhosis 149.4	Sinus Gal. quid dicatur 410.2
Scirrhosorum tumorū curatio.	Sinus quid, & eius differentiae
nis capita 152.26	multiplices 398.34
Scirrhos hepatitis quomodo tra-	Sinum curandorum sanationis
ctari vult 503.22	ordo 401.35
Scirrhos verus ac legitimus vnde	Sinus curatio nondum callosi.
fiat 143.11	400.30
Sclerotica durities 44.31	Sinus qualitas vnde deprehen-
Scolodes vlcus 357.10	ditur ibid.5
Scolopomacherion 94.35	Siræon quid 511.19
Σκωρία μόλιβδος quid 384.26	Situs partis vulneratæ 313.5
Scorpio virus quod infixit retra-	Solani radix laudatur in sedan-
hit 494.37	do vulnere dolore 233.29
Scrofulæ 8.21. & 117.1	Solanum 488.18
Sebum coquit, laxat, mollit.	Solutæ vnitatis species apud
503.26	Auicē. 164.35
Sectionum siue apertionū sup-	Sordes quid 272.26. & 352.20. &
purati abiceſſus septem re-	353.30
gulæ 34.39	Sordida vlceres quos affectus se-
Sedantia dolores triplicia ge-	quantur 396.29
nere 554.24	Sordidi vlceris propria curatio.
Selaa 7.35	397.4
Sephiros Arabum quid 143.10	Sari 383.25
Septica Arabum 553.9	Spanadrapī vsus 472.19. & eius
Septica & eorū potestas 548.17	descriptio 570.16
Serosorum tumorū causæ 112.6	Spasmi curandi primum ac com-
Sere 13.11	mune præceptum 243.28
Serpentinum instrumentum ad	Spasmi signa 241.28
euellenda tela 206	Spasmus alius vniuersalis, alius
Sertula campana 424.33	particularis 240.27
	Spas

INDEX.

Spafinus omnis aut est à reple- tione aut inanitione	237.3	Stomoma	384.27
Spafmus ex vulnere lethalis quo modo interpretandum	184.2	Strumæ quid	8.23. & 117.15
Spafmus ex ficcitate absoluta in- curabilis	242.35	Strumarum inter fele differen- tiæ	123.14
Spafmus quid	236.9	Strumas diuino quodam numi- ne Galliarum reges fanant fo- lo tactu	126.10
Sphacelos	43.13. & 65.35. et 557.31	Strumas quoque rex Angliæ fa- nat sed per hymnos & cere- monias	126.16
Sphacelus à gangræna differt	66.10	Strumas detergentia	133.21
Sphaceli ex gangræna creati ex- tirpatio	67.32	Strumas incidendi modus	133.33
Spicula extrahentia	494.30. & 493.3. & 205.4	Strumas maturantia	133.5
Spiculorum discrimina	195.32	Strumofis affectibus quæ medi- camenta conducant	124.3
Spinacium & spinargium	230.15	Stupidū quādo crus euadi ex sup- purationis præfione	515.13
Spina dorfi quid & quibus atsi- milatur	256.25	Succorum vitium in vlcera- tione quomodo corrigitur	363.7
Spinam, Auicenna exquisitum erysipelas nominauit	73.3	Succorum vſus	489.23
Spinas, oſicula, vitri fragmenta, furculos extrahentia	205.4	Suctus quæ eliciat	495.4
Splenia quæ ſint	393.35	Sudamina	13.14
Splenia vnde dicta	444.11	Suendi vulneris ratio	216.15
Splenium magnitudo & appli- candi modus	564.6	Sugillata quæ	288.5
Squammas in oſſe fracto detra- hentia	563.34	Sugillatis remedium conueniens	500.5
Status in tumoribus præter na- turam	25.5	Sulphur	493.20
Steatoma	119.3	Sumach	89.2
Στεατώματα ſub quo genere tu- morum contineantur	8.4	Suppurantium natura	509.11
Steatomatis curatio	138.5	Suppurantibus quando vten- dum	ibid.5
Stercus bubulum	93.24	Suppurationis tumorū indicia.	25.17
Stercus pueri calidum eſt, pepti- cum	512.7	Sutor malus vnico calopodio omnes calceat	277.32
Stibi vel ſtibium	383.30	Suturæ remouendæ tempus & modus	219.8
Στίβμμ	383.30	Sutura in quibus partibus con- ueniat	541.17
Stomachus	249.21	Suturis quando opus eſt	211.12
		Syderatio oſium	66.3

I N D E X.

<i>Συμφυτικὰ</i> quæ	539.8	diata imperanda	231.13
Symphytum	228.36	Theriaca datur contra carbon-	
Symptomata phlegmones	54.21	culos	64.27
Symptomatu correctio in vul-		Theriaca purgat, incarnat & ci-	
neribus	232.25	catricem inducit	531.20
Syncope quid, & eius instantis		Thlasma	287.13
notæ	258.1	Thoracis vitia per quas vias pur-	
Syrion quid	511.20	gantur	519.16
T Alpa	8.15. & 119.28	Thorax læditur frigido	560.6
Tarfecum	92.18	Thrombos quid	309.14
Telephia vlcera	376.19	Tophis articulorum cõuenien-	
Tela quæ nostris corporibus in-		tia	499.15
figuntur quib ⁹ differunt.	195.22	Topica nõ sunt dura neque gra-	
Telis extrahendis octo instru-		uia	489.29
menta accommoda	196.33	Toto genere præter naturã per	
Telorum extrahendorum mœ-		chirurgiam amouenda	37.17
dus duplex	197.24	Trachææ arteriæ vulnera	181.24
Telorum extrahendorum obser-		<i>Τραυματικὰ</i> quæ	539.8
uationes	197.35	Trigener	531.3
Tempora tumorum præter na-		Triticum ore præmålum pepti-	
turam à tribus potissimũ dis-		cum est	510.16
crimen assument	25.19	Trochisci de arsenico	552.18
Tensionem facientia	304.32	Tabulus	200.7
Tensio quomodo & quanta fa-		Tumor crudus quis Hippocrati	
cienda, vt os fractum reduca-		intelligatur	317.31
tur	438.30	Tumores à bile creati	72.11
Tenta	220.18. & 399.37	Tumores præcipui quatuor qui	
Tentæ cannulæ	221.32	ex influxione fiunt	7.4. & 20.8
Terebra directæ ad ampliãda os-		Tumores præter naturam in tria	
sa quibus tela in hærent	208	genera diuiduntur	4.10
Terminationes tumorũ præter		Tumores de repete detumescen-	
naturam quæ meliores	25.23	tes malum portendunt	176.8.
Terra sigillata	383.2	& 317.15	
Testudo	8.14. & 119.12	Tumores præter naturã quatuor	
Tetrapharmacum	37.13	modis terminantur	25.23
Tetrapharmaco thus additũ facit		Tumoribus curandis quæ obser-	
Macedonicum	512.28	uare oportet	44.33
Tetrapharmacum natura	531.32	Tumorum accidentia	5.15
Tetrapharmacum est suppura-		Tumorum differentia à quibus	
torium	368.19	sumantur	4.28
Theodorici & Henrici error in		Tumorum præter naturam qua-	
		tuer	

INDEX.

tuor sunt tempora	24.35	Vermes aurii quæ enecâr	373.18
Tumorû præter naturam ex pi- tuita octo differentiæ	97.11	Vermes vnde nascantur in vlce- ribus & quomodo arceantur,	ibid.13
Turundæ 220. 21. & earum vñs		Verrucæ 9.5. & earum diuerfa genera	91.6
221.20		Verrucarum curatio & iudicia.	
Tusium	92.17	92.27	
Tumor	9.19. & 92.22	Verrucarum diuerfæ curâdi ra- tiones	94.2
Thymion	9.13. & 92.4	Vertebrarum spinæ luxationes	464.35
V Acuatio à toto fit duplici- ter	246.1	Vesicæ vulnera	182.8
Vacuatio duplex tumorû præ- ter naturam	80.20	Vibices	288.8
Vacuatio humoris in parte ali- qua influxi	48.33	Victus bona ratio præscribenda statim vulneratis	222.27
Vari	12.32	Victus ratio vulneratorû	129.27
Varices quæ	357.17	Vigiliæ conuulsionem ex sicci- tate augent	245.15
Varicibus conuenit deligatura expulforia	114.16	Vinculorum materia in vasis di- uifis	135.20
Varicum curationes	371.22	Vini natura	498.18
Varicum cum vlcere complica- tarum curatio	371.13	Vinum	488.37
Variolæ	14.9. & 87.4	Vinum quâdo & quare conuul- sis interdicensum	248.33
Vasis oîculû fundentis sanguinẽ quomodo obstruatur	309.12	Vini nigri austeri vñs & eius ta- cultas in vulneribus	541.12
Vasorum radix quæ	310.16	Vires non semper in ægris au- gendæ	231.32
Venæ secandæ electio vnde in- dicatur	48.6	Virgalis fractura	429.13
Venæ siue arteriæ incisæ signû.	305.6	Viride æris	383.21
Vena media duplex	225.6	Virus	352.19. & 353.26
Venarum & arteriarum vulnera an sint suenda	308.21	Virus sua natura ad cor serpit & eius destructionem appetit.	293.30
Venenata vulnera qui autores tractarunt præcipuè	292.9	Virus eiacularum in morfu va- cuan tia	298.13
Venenatis moribus remedium.	500.9	Vitellina bilis	74.15
Venenum quomodo exugatur ex vulneribus	204.21	Vitia corporum neq; eloquen- tia neque barbarismo abigun- tur	481.16
Ventriculi vulnera	182.7		
Ventus meridionalis vlceribus nocet	361.6		

INDEX.

Vitiligo quid	11.27	Vomitus in vulneribus utilis.	
Vitiliginis nomine alphō & leu-		227.29	
cam cōprehendit Cēlius	11.21	Vox perit quibus spinæ pars que	
Vlcera dysepulota quæ	376.9	in ceruice est afficitur	252.26
Vlcera insanabilia sunt quibus		Vnico calopodio omnes calcea-	
os corruptum subest	351.12	re	277.33
Vlcera maligna à quibus humo-		Vnio in quibus partibus possibi-	
ribus excitentur	391.31	lis, & in quibus non	187.24
Vlcera quibus abluenda	520.15	Vnitatis solutæ causæ vniuersa-	
Vlceribus sanādis tria summè cō-		les	173.28
uenientia enumerat	394.9	Vnitates solutæ curandi commu-	
Vlceris cum oīsiū corruptione		nis indicatio	191.26
complicati curatio	374.7	Vnitatis solutæ nomina ac diffe-	
Vlcerum causæ geminæ	349.25	rētiæ ex Gal. 164.11. & 170.19	
Vlcerum curatio in vniuersum.		Vnitatis solutæ species variæ.	
361.22		170.14.	
Vlcerū curationis vna præcipua		Vniuersalia manifestiora sunt	
indicatio est mediocris sicca-		nobis quam particularia	23.38
tio	89.12. & 361.35. & 370.27	Vnguentum Aegyptiacū	62.25
Vlcerum differentia	339.20	& 68.34. & 370.2	
Vlcerū differentia à quibus po-		Vnguentum album Rasis epu-	
tissimum fumantur	346.3	loticum	537.24
Vlcerum differentia veræ vnde		Vnguentum album communi-	
fumantur	347.29	tatis	537.19
Vlcerum generalis diuisio	339.1	Vnguentum Agrippa conuenit	
Vlcerum signa & iudicia	355.8	in frigidis doloribus	557.8
Vlcus & vulnus differunt	344.35	Vnguētum apostolorum & eius	
Vlcus qd vulgo chirurgis	343.31	virtus	525.12
Vlcus quō detergendum	394.33	Vnguentum basilicon	51.32
Vlcus simplex quod	347.30	Vnguentum diachylon	ibid.33
Vlmi foliis inclusiā aqua ad quæ		Vnguentū ex vermibus	326.20
utilis	542.11	Vnguentum gloriæ	545.8
Vomica aperienda ferro etiam si		Vnguentum optimum maligna	
nondum satis maturuit	515.17	vlcera ad cicatricem perdu-	
Vomicæ aperiendæ ratio	515.37	cens	385.38
Vomicæ aperiendæ locus vul-		Vnguentū Rogerii spasmo cō-	
neri quis aptissimus	516.26	ueniens corpore prius repur-	
Vomicarum aperiendarum cau-		gato	247.18
tionēs	518.29	Vrendi & redigendi in cinerem	
Vomicas aperiētia medicamē-		medicamenta, modus	528.21
ta	517.23	Vrédorū metallicorū ratio	533.10
		Vri	

INDEX.

Vrinam cienia in pituitosis af-	125.20	occasione ex temperamento	
fectibus	125.20	vulnerati nascuntur	222.35
Vinea quid	103.21	Vulnerum differentia extrinse-	
Vitio expeditissimū remedium		cus accedentes	167.25
ad morsus virulentos	302.20	Vulnerū generalis diuissio	164.1
Vitionem qui non ferunt debet		Vulnerū iudicia ex Celso quæ pe-	
vri medicamentis ignis vim		riculosa & quæ tutiora	190.36
habentibus	395.28	Vulnerum labia quomodo addu-	
Vitionis vtilitas in osse carioso.		cenda	539.35
375.20		Vulnerum signa & iudicia	175.2
Vulnera cacoethe	224.6	Vulnus cruentū quomodo pri-	
Vulnerantia	304.27	mo tractandum	540.24
Vulnera praua quæ	176.21	Vulnus degenerans in vlcus quo-	
Vulneratorū victus ratio	229.27	modo curandum	235.26
Vulnera triplici ratione magna		Vulnus & vlcus pro eodem	170.
æstimanda	175.16. & 224.1	35. & 343.34	
Vulnera tutissima & curationem		Vulnus nudum quomodo tra-	
facile habetia	185.9. & 191.19	ctandum	539.29
Vulneribus quæ nocent omnia		Vulnus quid	169.19. & 261.15
fere sanguinis vitio commo-		Vulnus quot modis fiat cum de-	
uentur	557.29	perditione substantiæ	261.35
Vulneris in vena curatio	315.19	Vulnus recens qualiter curatur	
Vulneris pars quæ superior &		405.29	
quæ inferior	214.7	Vulnus simplex quod	263.17
Vulnerum causæ	173.25	Vulnus simplex quomodo com-	
Vulnerum cruentorum differen-		mittitur	211.14
tia à tribus potissimum su-		Vulnus vnà cum fractura quo-	
muntur	165.15. & 171.12	modo curetur.	452.4
Vulnerum curandorum inten-		Vulvas molliens med.	511.19
tiones	191.38	Z Ambana	542.4
Vulnerum curandorum diuersæ		Z Zegi	383.12

Vulnera penetrant FINIS.

tia.

183-

BB 5

CATALOGVS LIBRORVM.

Primus Liber, tradit tumores præter naturam. Fol. I

Secundus Liber, generatim de plagis seu cruentis vulneribus tractat. 169

Tertius Liber, est de vlceribus curandis. 343


Quartus Liber, fracturas tradit, & curat. 428

Quintus Liber, luxata ossa distinguit & reponit. 462

Sextus Liber, materiam chirurgicam docet. 482

GENERALIS; ET COMPENDIARIA

*Chirurgi institutio, facili & ar-
tificioſa methodo tra-
dita.*



*N*perito ac rationali Chirurgo, Duo in chi-
duo potiſſimū deſiderantur: rurgo deſi-
derantur.

- 1 Exacta cognitio eius partis
tertiæ, therapeutices medici-
næ: quæ, quia manu medetur,
χειρουργικὰ Græcis nomina-
tur.
- 2 Peritia, ac ſolers promptitu-
do, ſeu prompta quædam dex-
teritas, exequendi ea omnia,

quæ ad affectus Chirurgiæ ſubiectos attineat.

1 *Ut exactè cognoscatur ſcientia ſive ars, quæ Chirurgica* *Quatuor ad*
dicitur, ſcire oportet. *chirurgiæ co-*

1 Quid ſit Chirurgia.

2 Quæ ſit ſubiecta Chirurgiæ materia,

3 Quis ſit finis Chirurgiæ.

4 Quis ordo ſeruandus ſit, in addiſcenda Chirurgia.

2 *Ut peritè, promptè, ac dexterè exequatur Chirurgus,*
quæ ad artem quam exercet, pertinent: eum cognoscere
oportet.

1 Quod nam ſit chirurgi officium, hoc eſt quas nam ope-
rationes in vniuerſum chirurgus exercere debeat in huma-
no corpore.

2 Quomodo manuales ſuas operationes hic artifex exequi
debeat.

3 Methodum, ac media, quibus de uentre poiſit in cognitiones
ſingularum operationum, quas exercere debet in humanis
corporibus.

Condi

Chirurgi Institutio.

4 Conditiones requisitas vt probè fiant huiusmodi manuum operationes.

Quibus cognoscatur quid chirurgia. ¹ Porro cognoscimus quid sit chirurgia per Rationem nominis, quam etymologiam Græci vocant. Diuisionem, quæ & partitio dicitur, ac distributio, diductio ve, Definitionem: quæ oratio est, eius ipsius quod definitur naturam breuiter & apertè ostendens atque explicans.

Ratio nominis. Chirurgia quod ad rationem nominis attinet, Idem sonat quod manuum operatio. Dicta enim est ἀπὸ τῆς χειρὸς καὶ τοῦ ἔργου, id est, à manu & opere vel ἀπὸ τῆς ἐργίας id est, ab operatiōe. Siquidem hæc ars manuum opere exercetur. Hinc chirurgus & chirurgicus, manualis operator, χειρουργός, enim quasi χειρουργός, & χειρουργία quasi χειρουργία dicitur.

Est igitur chirurgia, si nominis rationem spectes, manualis operatio, vel ars quæ docet rectum vsus operationum, quæ in humano corpore manu exercentur.

Diuisio chirurgiæ duplex. Chirurgia bifariam diuiditur: Nempe in suas Significationes diuersas. Partes.

Diuisio chirurgiæ in diuersas significationes.

Prima,
Secunda.

Prima diuisio chirurgiæ in diuersas significationes.

Chirurgia generaliter accepta.

Chirurgia speciatim sumpta.

Varie definitiones chirurgiæ. Chirurgia generatim accepta & considerata, est Ars quæ manus opera, morbos, & eorum symptomata profligat.

Chirurgia verò pressiore vocabulo, ac specialiter sumpta, est.

Tertium therapeutices [id est medicinæ curatricis] instrumentum, vel si mauis, parstertia therapeutices quæ morbis medetur incidendo, vrendo, artus luxatos, & ossa suis sedibus mota in naturalem locum reducendo, atque id genus alio conatu chirurgico, & manuum artificio.

Hæc diffinitio communis. Sed aliter quoque, ab omnibus serè recentioribus tum medicis, tum chirurgis definitur, Nempe hoc modo,

Chi

Generalis & compend.

Chirurgia, est scientia, quæ docet modum & qualitatem operandi præsertim ad glutinando incidendo, & alias id genus, quæ manu fiunt, operationes exercendo: Homines quatenus licet sanitati restituens.

*muniter for-
let chirur-
gia assigna-
ri, & essen-
tialis nomi-
nari.*

In Introductorio Verò medicorum hoc pacto diffinitur.

Chirurgia est alieni, ut propriè vocant, per diuisiones compositionesque cum via quadam & ratione ablatio: adhuc vulnere atque vlcere humano corpori accidentium curatio.

Alia definitio.

Nos autem ex ipsius subiecto & fine (ex quibus finitio omnis suscipitur) breuem, apertam & essentialem sic illi nunc definitionem accommodamus:

Chirurgia, est ars, quæ ad humani corporis (cuius præcipuè curam habet) aduersam valetudinem manus præsertim opera & administratione, profligandam, comparata est, vel sic,

*Propria &
essentialis
chirurgia
definitio.*

Chirurgia est ars, quæ præcipuè manus opera & artificio corporis humani morbos ac vitia propellit.

Secunda diuisio chirurgiæ, quantum ad illius significata attinet, communiter talis solet assignari.

*Secunda di-
uisio chirur-
giæ in sua
significata.*

Chirurgia theórica,
Chirurgia practica.

Chirurgia theórica, est

Quæ docet, & scientia dicitur.

Hæc enim per demonstrationem acquiritur, & per cognitionem principiorum artis. Hanc autem quis habere potest, tametsi nulla vnquam artis opera exercuerit, ut peritus medicus, qui ad vnguem tenet præceptiones artis chirurgiæ.

Scientia.

Chirurgia practica, est

Quæ per scientiam & rationem manuali opera rectè ac promptè ea quæ inuenta sunt perficimus. Et hæc inter artes mechanicas adnumeratur. In qua quidem nemo vnquam absolutus esse potest, nisi qui in ea frequenter se exercuerit, & alios

Arts.

Chirurgi Institutio.

alios artis huius peritos, sapissimè viderit operari, ac quæ viderit, diligenter obseruari. Hanc nonnulli vsualem etiam appellarunt.

Diuisio chirurgiæ in suas partes,
Diuisio chirurgiæ in suas partes.
 Generales,
 Speciales.

Chirurgia quantum ad illius partes generales, gemina est.

1. Exercens operationes in mēbris, seu particulis mollioribus,
2. Exercens operationes in particulis durioribus.

Partes chirurgiæ speciales, sunt scientia quæ docet recta cum ratione operari, circa

Tumores præter naturam

Plagas, seu vulnera [adhuc cruenta.]

Ulcera

Fracturas

Luxationes,

Et circa alia id genus, quæ manus operam desiderant.

Subiecta chirurgiæ materia id est, id quod maximè ac præcipuè consideratur in scientia chirurgica, & circa quod tota eius versatur intentio, est

Corpus humanum sanitati & ægritudini obnoxium, manus operam exposulans: omnia enim quæ ratione perlustrat chirurgia, & manu facere docet, ad ipsius vtilitatem refert & accommodat, Alia verò ratione consideratum, subiectum est alterius scientiæ.

Finis seu scopus chirurgiæ, est,

Manus opera & administratiōe, humani corporis morbos qui curationem admittunt profigare: Hunc autem scopum non semper assequitur, vt postea dicitur.

Modus procedendi in discenda chirurgiæ, est

A communioribus ad particularia, siue ab vniuersalioribus ad minus vniuersalia.

A rebus notioribus ad obscuriores, & minus notas, quod & in aliis, similiter disciplinis obseruari solet.

Hactenus de his quæ ad cognitionem chirurgiæ attinent. Nunc de

Generalis & Compen.

de his quæ ad eius executionem requiruntur: Et primum de operationibus.

[2] *Operationes quas exequi debet chirurgus ut assequatur finem, quem sibi proponit: sunt tres, Nempe* *Operationes ad finem scientiæ chirurgicæ assequendum necessarie.*

1 Continuum diuidere, seu separare.

2 Diuisum seu disunctum coniungere, atque in probam unionem reducere.

3 Superfluum demere.

Porro continuum separamus *Continui disortium.*

Incidendo, & excidendo.

Venam secando.

Scarificando.

Disunctum ac diuisum coniungimus,

Vulnera glutinando,

Luxata in locum suum adducendo:

Fracturas curando.

Coniunctio disorti cœsinui.

Superuacaneum demimus.

Tumores qui præter naturam consistunt, auferendo:

Ganglia, carcinomata, nodos, strumas, myrmecias, & id ge-

nus alia radicitus extirpando:

Serosum humorem ex ventre hydropicorum educendo:

Sextum, in manu aut pede, digitum reticando.

Superflui ablatio.

[2] *Manuales huiusmodi operationes obire atq; exequi debet chirurgus* *Modus exercendi manuales operationes*

Citò,

Tutò,

Citra dolorem,

Sine vlla fallacia, aut impostura,

Non lucri, aut corradendæ pecuniæ cupiditate, sed pio quodam erga proximum affectu.

Nullo modo apud ægrotum se iactans posse morbos curare, qui prorsus inexpugnabiles sunt atque insanabiles, cuiusmodi sunt canceri occulti & exulcerati, vel elephantiasis quæ iam inueterauit.

Rursus ut tuto curet chirurgus, tria sunt propria, quibus intentus sit oportet.

Vnum,

Chirurgi Institutio.

Lib. 14.
Methodi
med.

- 1 Vnum primumque vt omnino absolutionem operis consequatur.
- 2 Alterum, vt sicubi scopum hunc non consequatur, saltem cubantem non lædat.
- 3 Tertium, vt vitium non facile reuertatur.

[3] *Media quibus chirurgus deueniet in cognitionem eorum quæ illi agenda sunt, tria statuuntur à Galeno.*

- 1 Prima
 - 2 Secunda
 - 3 Tertia
- } Indicatio.

Prima indicatio quid sit.

1 *Prima indicatio (quæ insinuatio est eorum quæ agenda sunt) sumpta ex natura rei cuius finis intentio dicitur.*

Conseruatio eius quod secundum naturam est
Expulsio eorum quæ præter naturam sunt.

Enumeratio *Secundum naturam sunt,*

eorum quæ secundum naturam sunt.

- 1 Sanitas, id est affectus secundum naturam ad efficiendum actionem idoneus:
- 2 Causæ sanitatis.
- 3 Effectus sanitatis, id est, actiones quæ secundum naturam sunt.
- 4 Vires, id est, natura quæ præsens est & aduersus morbum certat.
- 5 Consuetudo, quæ velut altera est natura.
- 6 Temperatura. Quæ omnia similibus conseruantur.

Quæ dicantur præter naturam.

Præternaturam sunt,

- 1 Morbus, id est, affectus præter naturam per se ac primo actionem lædens
- 2 Morbi causa. Quæ non per se ac primo, sed per accidens, ac secundo (morbo scilicet interueniente) actionem lædit, & impedit.

Lib. de sym
ptom. differ.

- 3 Symptoma speciatim sumpto nomine, id est, accidens quod morbum sequitur, velut umbra corpus.
Hæc autem per contraria expelluntur.

Expulsio morbi (cui propriè debetur curatio)
Simplicis,

Com

Generalis & compend.

Compositi, & implexi.

Expulsio morbi simplicis, fit.

Admouendo ea quæ morbo contraria sunt.

Prima igitur indicatio, à re præter naturam sumpta, nobis manifesta fit ab ipsa contrarietate, vt

Vnitio	}	à	{	soluta continuitate.
Refrigeratio				caliditate.
Calefactio				frigidityte.
Humectatio				ficcitate
Deficcatio		ab		humiditate
Minutio	}	à	{	quantitate excedente
Augtio				quantitate minuta
Ablatio				numero excedente
Productio				numero deficiente
Apertio	}	ab	{	obstructione
Ampliatio				angustia
Astrictio				ampliatione
Reductio in propriam figuram				à figura mutata
Repositio in proprium locum				à positu variato, vt
membro luxato, intestino in scrotum delapso, & ita de aliis.				

Prima indicatio sumpta à re præternaturam vnde insinuetur.

In propulsione morbi compositi considerare oportet

Cuiusque morbi contrarietatem,
Ordinem contrarij cuiusque admouendi.

In morbo composito q̄ consideranda.

Vt ordo debitus contrarietatis admouende seruetur, cognoscere oportet

Quis affectus primum curari debeat.

Affectus qui primum curari debet, is est,

Cuius curatio causa est curationis alterius,

Sine quo, alter curari non potest,

Qui magis vrget, & periculosior est.

2 Secunda indicatio, est, quæ nobis declarat an id quod tendimus, & prima postulat indicatio, sperari possit, vt

Secunda indicatio quid insinuet.

Chirurgi Institutio.

An feruare possimus quæ secundum naturam sunt.

An quæ præter naturam sunt, expellere valeamus.

Secunda igitur indicatio, à re secundum naturam sumpta, disquiris, an

Sanitatis reuocatio speranda sit.

Vires ad vitam feruari possint,

Causæ sanitatis feruari possint,

Et ita de cæteris.

À re vero præter naturam sumpta hæc indicatio secunda, insinuat, an

Morbi aut symptomatis expulsio, sperari possit,

Causis possimus præcauere.

Modis tri-

bus potissimum cognoscimus morbi expulsionem fieri non posse.

1 Quando morbus ex sua natura, seu essentia incurabilis est, vt elephantiasis iam absoluta.

2 Quando laborans renuit auxilia, ad morbi alioqui ex se sanabilis curationem necessaria, exempli gratia, excisionem in cancro membrum aliquod particulare occupante. Aut in hydropse παρενθεσις, id est, prætensionem, & ita de aliis.

3 Quando curatio morbi nobis propositi occasione præbet maioris mali: vt si malum mortuum (quod Vocant) inueneratur, curetur. Aut diuturnæ hæmorrhoides omnino tolerantur. Si enim vna ex iis non seruetur, periculum est, aquam intercutem [maniam,] vel tabem adueniri.

Morbum autem ex se, siue ex sua natura incurabilem esse deprehendimus, ex læsa partis.

Substantia,

Actione,

Vsu,

Situ.

Indicatio à substantia sumitur, vel

Calido
Frigido
Humido
Sicco.

A mitione in

Morbus ex
sua essentia
incurabilis
à quibus de-
prehendatur.
Substantia.

A pri

Generalis & compend.

A primordio, vnde formata sit substantia, & eiusdem consistencia.

Indicatio à mistione, in calido frigido, humido, & sic. o.

Aequaliter vitiata Insinuat id non posse præstari quò tendimus.

Inæqualiter vitiata Insinuat id præstari posse quò tendimus.

Indicatio à primordio, ex quo formata est pars substantia, & eiusdem consistencia.

A substantia	{	Solida laxa	Insinuat non posse præstari id quo tendimus
		Carnosa vitiata	Insinuat id posse præstari quod prima
		Spirituali oblata	indicatio postulat.

Indicatio secunda ab actione partis.

Actio.

Per quam est vita

Sine qua vita esse non potest

Per quā melior est vita

Per quam conseruatur vita

}	Insinuat si perierit præstari non posse quo tendimus
	Insinuat si perierit aliquo mō p̄ta
	ri posse quò tēdim⁹, sed tamē nō xā successu tēporis maiore futurā.

Indicatio ab vsu seu commoditate, ad alterius assequutionē, vsus. à natura insita.

Partis



Necessaria
ad vitam

Insinuat si perierit præstari non posse id quò tendimus.

Actionis



Non necessaria
ad vitam

Insinuat si perierit præstari posse quo tēdimus.

Indicatio secunda à situ partis sumpta

Ad quam me dicamēta per-tingere

{	Possunt
	Nō possunt

}	posse
	nō posse

{	obteneri quod situs.
	prima indica-
	tio postulat in-

(insinuat.)

Chirurgi Institutio.

Tertia indicatio.

3 Tertia indicatio (quæ remedia inuenit quibus assequi possumus id quod prima indicatio postulat, & secunda fieri posse sperat) nobis insinuat.

Remedia

oportuna, †
ad finē quo
rendimus cō
sequendum.

† Auxilia oportuna, ad finem quo tendimus, assequendū.

* Vsum remediorum conuenientium.

† Auxilia conuenientia, quæ & instrumenta dicuntur
Communia,
Propria.

Remedia cōInstrumenta siue remedia communia dicta, hoc est, quæ omni
munia. nibus corporis partibus applicari possunt.

Medicinalia,

Ferrea.

Medicinalia Instrumenta medicinalia.

Optima viuendi ratio, in rebus sex non naturalibus.

Pharmacia

In ijs tribus primis

Phlebotomia

applicandis, chi-

Emplastra

rurgus debet peri-

Vnguenta

tum aliquem me-

Pulueres, & similia

dicum consulere.

Vnguenta. Vnguenta, quibus munitus esse debet chirurgus, vt commu-
nioribus suæ artis intentionibus satisfaciatur numero,
sunt quinque.

Basilicum

Apostoli-

cum

Aureum

Album

Dialthæum

ad

maturādū, & pus mouendū.

detergēdum siue purgandū.

implendū seu (vt dicunt)

[incarnandū.

glutinādū seu cōsolidandū.

demulcēdū, mitigandū ve

Ferrea in-
strumenta
communia.

Instrumenta ferrea communia, quibus vtitur chirurgus,
sunt.

Forfices

Novacula, seu culter rasorius

Scapellum chirurgicum quod

phlebotomon appellant.

}

Ad incidendū &
excidendū.

Caute

Generalis & compend.

Cauterium, ad vrendum.
 Forcipes, vulgo tenaculæ
 Vulsellæ, seu volsellæ,
 Hamus recuruus,
 Ferramentū, quod Diocleū era
 phiscū Græci vocāt. Cui⁹ descri
 ptionē & vsum vide apud Cor.
 Celsum. lib. 7. capi. 5.

Ad extrahendum.

Specillum,
 Acus

Ad explorandum.

Cannulæ

Ad fruendum.

*Ex his magis necessaria, & quæ in vsum veniunt quotidiana
 num atque ideo semper à chirurgo circumferri de
 bent, sunt,*

Instrumenta
 ferrea chi-
 rurgo magis
 necessaria
 6

- 1 Forcipes,
- 2 Volsellæ seu Vulsellæ,
- 3 Nouacula:
- 4 Specillum,
- 5 Scalpellum,
- 6 Acus.

Siseaulæ

Pincetes.

Rasoir.

Fproueite.

Lancette.

Aesguille.

} Gallis

Instrumenta propria ferrea, idest, quæ alicui particulari Ferrea in-
membro dicata sunt. strumenta
 propria.

Modiolus, quem *χολικιον* Græci vocant capiti.

Falx, seu fauceolus. fedi siue ano.

Speculum oris, Speculum matricis.

** Vsus remediorum convenientium ad finem propositum vsus reme-
 assequendum, ex singulis tractatibus habetur, iuxta* *artum.*
Varietatem rerum (vt vocant)

Naturalium,

Non naturalium.

Et præter naturam.

Item eorum quæ illis

annexa dicuntur.

Res natu-
 rales.

*Res naturales dicuntur, quæ corporis nostri constitutionē in-
 grediuntur. Et hæ numero sunt septem.*

1 Elementa, ignis, ær, aqua, terra.

2 Temperamenta, calidum, frigidum, humidum, sic-
 cum, &c.

Chirurgi Institutio.

His annexa sunt.

*Aetas
Sexus
Vitæ industria.*

3 Humores, sanguis, pituita, vtraque bilis.

Principalia, cerebrum, cor, hepar, testes.
Facultates sortita in fitas, & manantes à principibus, pulmo, ventriculus, renes.

4 Membra } Principibus subministrantia, arteriæ, venæ, nerui vasa spermatica.
Ab in fitis sibi à natura facultatibus gubernata, os, chartil. ligam. &c.

5 Virtutes

6 Operationes } Animales, vitales, naturales.

7 Spiritus

Res nō naturales.

Res non naturales, sunt, quæ corpus humanum si recte adhibentur, conseruant incolumè: si verò haud recte accommodantur corpori, tunc idem destrunt. Sunt autem numero sex.

Annexa sunt, tēpus regio, venti, balneæ coitus, cōsuetudo.

1 Aër ambiens.

2 Cibus & potus, siue ea quæ assumentur.

3 Motus & quies, & totius corporis, & partium singularum.

4 Somnus & vigiliæ.

5 Excreta retenta.

6 Animiaffectus.

Res præter naturam.

Res contra naturam, seu præter naturam dicuntur, quæ humana natura contraria sunt, ipsamq; demoliuntur, vel ledunt, aut ægrotare faciunt. Et hæ tres sunt numero, ut supra dictum est.

1 Morbus

2 Causa morbi

3 Accidens, morbum sequens

Græcis ουντις λεγεται.

Quorū definitiones supra descriptæ sunt: horū differētiæ Gal. peculari lib. explicuit.

Morborum tria genera.

Morborum in vniuersum tria sunt genera,

1 Intemperies siue mala complexio

2 Mala compositio

3 Vnitionis dissolutio

in

similibus partibus.

partibus instrumentariis.

utriusque.

Diuisio perficienda ex lib. de differentiis morborum.

Causæ

Generalis & Compen.

Causa morborum generica, recentioribus tres solent assignari, Morborum cause. 3.

- 1 Prægressæ, siue euidentes, quæ & primitiue dicuntur vulgò Græcis autem προκαταρκτησαι, Quæ extrinsecus corpori adueniunt.
- 2 Antecedentes seu præcedentes. Græcè προαγοιζουσαι, Quæ paratæ sunt statim morbos efficere.
- 3 Coniunctæ siue continentes. Græcè συνιστασαι, Quæ iam morbum excitarunt.

Symptoma siue accidens morbum sequens, trifariam distinguitur, Aliud enim est.

- 1 Actio laesa,
 - 2 Qualitas mutata, vt caliditas vehemens in phlegmone.
 - 3 Vergens ad mutationem, vt immodicæ excretionum.
- Symptoma
speciatim di-
ctum tri-
plex.
- Excretiones,
Suppressiones.

Actio laeditur trifariam

Quum est Abolita Diminuta Corrupta	}	vt	{	Cæcitas Visus hæbes Deprauata visio	}	in oculis
--	---	----	---	---	---	-----------

4 *Ea quæ requiruntur ad manuales operationes probe exercendas, multiplicia sunt. Alia enim spectant ad*

Chirurgos ipsos.
Laborantes,
Assidentes,
Exteriora.

Quatuor in vniuersum desiderantur in bono chirurgo: Bonæ chirurgi conditiones.
Nempe ut sit.

- 1 Doctus, & disciplinarum gnarus, earum præsertim quæ ad suam artem pertinent.
 - 2 Multa experientia exercitatus,
 - 3 Acri Ingenio,
 - 4 Bonis moribus dotatus.
- 1 *Doctrina atque eruditio boni chirurgi, consistit, In*

Doctrina.

Generalis & Compen.

Theoria seu speculatione rerum. { Naturalium,
Non naturalium.
Præter naturam.

Praxi { Exercendo probè, celeriter, concinnè, & expeditè
operationes manuales.
Consulendo medicum in iis quæ ad pharmaceuti-
cen attinent & diætericen.

Ex rebus naturalibus, præcipue hæc illi cognoscenda sunt,

Corporū tēperamēta, { Substantia } Ab his enim curā
Tēperamētū } di indicationes de-
Singularū partium { Cōformatio } iumuntur.
Cōpositio.

Experientia. 2 Experientia chirurgi, consistit

In iis quæ certatione excogitata sunt, & frequenti vſu confirmata:

Aliàs empiricus & temerarius censendus erit, nisi scilicet experientiam habuerit rationi coniunctam.

Ingenium. 3 Ad chirurgi ingenium pertinent,

Bona ac prompta apprehensio,

Tenax memoria,

Reminiscentia facilis,

Rectum iudicium,

Operandi dexteritas,

Solertia ac promptitudo in remediis inveniendis.

*Ad operandi dexteritatem ac promptitudinem, hæc requi-
runtur,*

Ex Cor.

Celſo. &

Hippo. liqui

κατ' ἑαυτοῖς

top. inscribi

tur.

Mores.

1 Acris oculorum acies claræque.

2 Manus strenua, stabilis, nec unquam tremiscens.

3 Vt non minus sinistra quam dextra sit promptus.

4 Optima corporis conformatio, atque habitudo.

4 *Mores qui decent chirurgum, sunt, ut sit*

Audax, & animo intrepidus, in rebus tutis, & necessariis.

In rebus dubiis ac periculosis non admodum præceps.

Comis & affabilis erga laborantes.

Mansuetus ac facilis erga suæ artis homines, & ut græcè dicam φιλαίσιμος.

Prudens ac circumspectus in præfagiendo.

Castus, ac temperans.

Generalis & Compen.

Misericors erga pauperes,
Pecuniæ non nimis cupidus, nec exactor iniquus.

Quæ ad laborantem attinent, tria sunt præcipua, vt

- 1 Pareat medico, non secus ac seruus domino, & in nullo sua *Laborantis*
indulgeat voluptati. *condiciones.*
- 2 Fidat medico, & chirurgo.
- 3 Patienter ferat omnia, quæ fiunt à chirurgo Dogmatico &
experto.

Qui assident agro, debent esse

Assidentes.

Prudentes,

Pacifici,

Fideles.

Exteriora omnia apparatus esse debent,

In utilitatem laborantis,

Et vt morbus desiderat.

Nomine exteriorum comprehenduntur

Habitationes vel { idoneæ, & omni turba vacantes.
parum commodæ, & turbarum plenæ.

Quæ nunciantur, aut aguntur.

Quæ iram, tristitiam, aut aliquem alium affectum infligunt
ærotanti.

Quæ summum abruptunt & interturbant.

FINIS COMPENDII CHIRURGIAE.

T V M O R V M

QVI PRÆTER N A-

turam consistunt Generalis Diuisio,

In primum Librum Chirurgi-

carum institutionum Ioan-

nis Tagautii

medici.

*

*Primæ ac generales tumorum præter naturam differ-
rentiæ.*

- | | | |
|--|---|-----------------------------------|
| 1 Phlegmone, | } Sanguinea fluxione
Biliofa fluxione
Tenuis pituitæ substantia
Limoso & faculéto sanguine
Ex flatuoso spiritu collecto nascitur. | } exupe-
rante pro-
creatur |
| 2 Erysipelas, | | |
| 3 Oedema, | | |
| 4 Scirrhus, | | |
| 5 Inflatio, seu
Flatuosus tumor | | |
| 6 Abscessus. Quod græci ἀπύημα nominant. | | |

● λεγμὸν 1 *Phlegmone duplex est,*

- | | |
|--|--|
| 1 Ex sanguine syncero, | Vera phlegmone vulgò appella-
tur. |
| 2 Ex sanguine optimo aliis
humoribus commisto | Recentioribus chirurgis phle-
gmone non vera nominatur. |

Ex sanguine aliis humoribus commisto, fit

Phlegmone { Erysipelatodes,
Oedematodes,
Scirrholes.

Phlegmonosi affectus sunt,

Dorhienes,	{ Furunculi Celso, Auicennæ Aldemure- nul. Tuberculum acutum, cum inflam- matione & dolore,
Bubo,	
Simplex lazarum partium inflammatio.	

Phyge

Genera. diuifio Tum. præ. nat. in lib. I.

Phygethlm, { Panus vocatur Celſo: Græcis Phlegmone Panus tu-
eryſipelatodes, vel eryſipelas phlegmono- moreſt non
des. in inguinibus & aliſ naſcitur. alius, ſed la

Phyma { Inflammatio glandularum, quæ citò augetur, tus panis ſi-
& ad ſuppurationem accelerat. Celſo tubercu- militudine
lum dicitur. referens.

Carbunculus. Græcis ἀνθήκη. { Cum puſtulis
Sine puſtulis.

Nihil aliud quoque quàm Phlegmonæ ſunt,

Vux, { Gurguhonis, qui Græcè Hippocrati γαργαρέων,
& σαρόλου: dicitur, Latinis etiam columella.

Tonſilla, { Glandularum, quæ in faucium principio ſibi
opponuntur, amygdalas vulgò appellant.

Parithmia, corporum, quæ in pharynge conſiſtunt.

Hæc morborum & partium ſunt nomina.

Phlegmonem ſequuntur, atque eius proles ſunt

Abſceſſus, { Qui etiam ſunt aliquândo protinus ab initio,
nulla inflammatione præcedente.

Sinus, { Græci κίστρον nominant, recetiores chirurgi vlcus
profundū & cauernoſum, quod nondū occalluit.

Fiſtula, { Græcis ſyrinx dicitur. Hæc nihil aliud eſt quàm
ſinus arcuus & oblongus, qui nō ſtatim curatus, tē
poris progreſſu obduruit, & callo obduſus eſt.

Gangræna, Partis affectæ νεκρωσις, Latinis mortification non
tamen abſoluta.

Sphacelus, { Latinis ſyderatio. Abſoluta atq; omnimoda
ptiū etiā ſolidarū mortification & corruptela.

2 Eryſipelas bilioſe fluxionis ſoboles: geminum eſt, ἱερσινίας

1 Verum ac legitimum, { Solius cutis paſſio eſt, & abſque
vlceratione incidit.

2 Non exquiſitum ſeu { Non ſolam cutim, ſed etiam ſubie-
illegitimum. { etiam carnem occupat, ac moleſtat.

Eryſipelas non legitimum, duplex eſt,

1 Ex bile craſſiore & acriore, { Nominatur eryſipelas cū vl-
exacta tamen & ſyncera, { ceratione.

Ex

Chirurgi Institutio.

- 2 Ex bile aliis humoribus permixta, alios tamen succos exuperante. } Dicitur erysipelas. } Phlegmonosum
Oedematosum
Scirrhum

Erysipelati similis est herpes Qui geminus est Galeno,

- 1 Herpes exedens, siue depascens. } Græcè *ἰσθίον*. A bile fit aciore & exacta tota cutim usque ad subiectam carnem exulcerante. Eiusdem generis est cum ulcerato erysipelate.
- 2 Herpes miliaris, siue pustulosus. } Cenchrias Græcè. Ex bile fit tenuiore & dilutiore, proinde & minus acri calidaque.

Ad erysipelas etiam pertinent

Bullæ similes iis, quæ in corpore à feruida aqua vstulato contingunt, Phlictenæ à Græcis vocatæ.

Οἰδήματα 3 *Oedema bifariam consideratur,*

- 1 Vt symptoma, } Tumor rarus, & sine doloris sensu: ex pituita, vel flatulento spiritu, periculosos quosdam affectus sequens, ut tabem, cachexiam, hydropem.
- 2 Vt morbus.

Oedema morbus duplicem habet originem,

- 1 Ex pituita sola, } Tumor etiam laxis, fungosus, & absque doloris sensu, ex tenuis pituitæ influxu ortum habens, quod verum ac legitimum oedema nominant.
- 2 Ex pituita aliis humoribus permixta, sed tamen illis præpollente. } Recentioribus oedema non verum atque illegitimum appellatur.

Oedema morbus ex pituita aliis humoribus commixta, in treis differentias findi solet: Nempe in

- 1 Oedema phlegmonodes,
2 Oedema erysipelatodes,
3 Oedema scirrhomodes.

Ad oedema referuntur,

Tumores oedematosi. Hydrocele, } Vulgò hernia aquosa. Quum humora aqueus in testium tunicis congregatur.

Afcites

Chirurgi Institutio.

Afcites, { Aquofus hydrops. Quum ferofus humor in mē-
brana abdominis interiore continetur.

Leucophlegmatia { Hypofarca, & anafarca etiam dicitur. *ἀνασάρκα*
Quum corpus inæquale est, tumori *uno vocabu-*
bus aliter, aliterque per totum id (vt *lo aut duo-*
Celfus ait) orientibus. *bis, ἀνὰ ἀρ-*
κα.

4 Scirrhus, tumor durus sine ullo dolore,

1 Exquisitus,

Sensu caret, nec curationem admittit.

2 Non exquisitus. { Non omnino est sine sensu, ægrè ta-
men admodum sentit.

Scirrhus tam exquisitus, quàm non exquisitus,

1 Statim ab initio paulatim concrefcens, & augescens,

2 Ex coincidentia creatus.

Scirrhi qui à principio paulatim concrefcunt, & augentur,

1 Ex pituita lenta, crassaq;, tenuiore eius substantia reſoluta,

2 Ex atra bile, seu melancholia.

Scirrhi ex atra bile, seu melancholia (vt vocant) naturali,

1 Sola, & aliis humori. { Legitimi & veri scirrhi nostræ
bus impermiſta, { ætatis chirurgis appellantur.

2 Aliis humoribus commiſta, dominium { Illegitimi cen-
tamen ſuper illos obtinente. { ſentur.

Scirrhus ex atra bile aliis permixta humoribus.

1 Phlegmonodes,

2 Oedematodes,

3 Eryſipelatodes.

Scirrhi ex coincidentia, vel tranſmutatione, ſunt

Phlegmone,

Eryſipellate,

Oedemate,

{ impendiò refrigeratis.

Melancholici ac ſcirrhoſi tumores cenſentur

Cancer, Græcè *κάρκινος* aut *carcinoma*. Fit ab atra bile,
ſine ebullitione.

Phagædena cum tu- { Cum cutē pariter ſubiectam attingit & depaſcitur. In quo differt ab
more. { herpete.

Vlcera

Generalis diuifio

Vlcera cacoëthe, id est }
 maligna, cum tumore, } vt sunt Chironia & Telephia.

Pfara, }
 Lepra, } Cutis tantum affectus sunt.

Elephas, seu }
 elephātiſis. } Ex ſanguine melancholico ducit originem,
 tempore verò bilis atra ſanguine copioſior
 redditur.

Satyriaſmus, id eſt, elephas incipiens.

Vicina ſcirrho ſunt.

Enchymomata }
 Melafmata, } Senibus ex venarū cōtuſiōe accideſcit. ſan-
 guine ex venis effuſo ob extremas earū ad-
 aptiōes: & interdū ob tunicarū cōtuſiōes.

Aneurifma, }
 Varices, } Arteriæ adaperitæ affectus, ex quo interdū,
 grumo ſcilicet innato, ſphacelus gignitur.

Id eſt venæ dilatatæ in cruribus à ſanguine
 craſſo.

Scirrho ſunt à parte affecta nomina ſortiti

Chœrades, }
 Sarcocœle, } id eſt } Strumæ glandularum.
 Ramex teſtiū vulgò hernia carnoſa,
 ſit cū caro inter tunicas teſtiū increſcit.

Inflatio. 5 Ex inflationum genere ſunt

Tympanias, ſeu }
 tympanites, } Hippocrati aqua intercutem ſicca vo-
 catur.

Priapiſmus, qui & }
 ſatyriaſmus qui } Pudendorū intētiōes nō remittētes, à ſpi-
 ritu halituſo cauernoſū neruū (q pro-
 buidam dicitur. priā colis ſubſtātiā cōſtituit) implente.

*Sunt & parui quidam tumores in cute naſcentes, qui ad
 prædicta genera referuntur, vt*

*Parui tumo-
 res in cute
 naſcentes.*

Achiores, }
 Melanxiſides, } Pituitæ ſalſæ & aluminofæ ſeboles. Parua in cu-
 te capitis vlcera, cum tumore modico.

Faui latinis. }
 Ex his humor melleus effluit. Cum tumore
 quodam & foraminibus plurimis eueniunt.

Ad

Tumo. præter natu.

Ad feir. { Myrmecia, { Verrucæ, quæ latiore sunt basi, &
rhû per. { Acrochor. { quasi seſiles. Latini formicantes
tinent. { dones, { verrucas appellant.

Penſiles verrucæ, & anguſtiore baſi.

Pſydraces ſeu { Tumores parum ſuprà ſummam cutem emi
pſydracia, { nentes, phlyctenis, hoc eſt bullis, quæ ab
igne excitantur, ſimiles.

Epynictides. { Liuentes puſtulæ, ſabæ magnitudinem nõ
excedentes, nõ ſtu quidem magis, quàm in-
terdiu infeſtantes.

Tumores etiam ſunt, ſed non ex humoribus,

Epiplocele, Cum omentum in ſcrotum deſcendit.

Enteroccele. { Inteſtinorum ramex,
Hernia inteſtinalis vulgò.

Enterœpipocele, Cùm inteſtinum ſimul cum omento in ſcrotum delabitur.

Cirſocele, { Vulgò hernia varicoſa. Fit cum teſtium inte-
gris tunicis ramex innaiſcitur.

Bubonoccele, id eſt, { Fit rupto peritonæo, aut vulnerato iuxta
inguinis ra { inguen. Ad obliquos vètris mūculos per-
mex, { tinet, & ad nerueam illorum tenuitatem,

Exomphalorum eminentia, { Hic affectus ad tranſuerſos
cū vmbilicus indecorè pro. { mūculos pertinet, & neruea
minet. { eorum tenuitatem.

Ex carne ſupercrescente ſiunt

Sarcocele, { Tumor teſtiū, Quùm caro inter tunicas ipſo-
rum increſcit.

*Tumores ex
carne ſuper-
crescente.*

Epulides, { Superflux carnes ex inflammatione in extre-
mo molari dente, cui dolor quandoque & fe-
bris iungitur.

Parulides, { Abſceſſuli circa gingiuas facti, qui niſi ſoluti
fuerint ſuppurantur.

Thymi, thymia, { Verruculæ infrà tenues, ſuprà latiores, ca-
vel thyma. { piriuli, id eſt, cacuminis ſoris thymi, ſigu-
ram verius quàm colorè representantes.

Polypi,

Genera. diuifio Tum. præ. natu. in lib. I.

Polypi, vel polypodes, id est multipedes.

In naribus.

Abscessus. 6 Abscessus fuit, vel

Natura fluorem vincente,

Natura à fluore victa.

Hi toto genere præter naturam sunt.

Abscessuum, qui toto genere præter naturam sunt, materia,

Humores,

Solida corpora.

Humor qui in abscessibus toto genere præter naturam continetur, alius est, veluti.

Lutum,

Cœnum,

Olei limus,

Vinifex,

Vrina,

Melleus mucosusq; succus.

Vniuersa
hæc, tuni-
ca quædã
membra-
nosa com-
prehendit.

Solida corpora in abscessibus inuenta sunt, ve

luti

Vngues,

Lapides,

Pili,

Pori,

Ossa,

Testæ,

Animalcula, propè omnibus, quæ ex putredine generationem habent, simillima.

Frequentissima abscessuum genera sunt tria, quorum natura ex nominibus constat.

Atheroma,
Meliceris,
Steatoma,

in

Eo pulticulæ quid simile inuenitur.

Quo melli quid simile reperitur.

Eo aliquid simile seuo visitur.


FINIS.

INSTITVTIO- NVM CHIRVRGI- CARVM IOANNIS

TAGAVTII ME-
DICI,

LIBER PRIMVS.

De tumoribus præter naturam, in
uniuersum.



*Quid sit tumor præter naturam, qui vulgò generali
nomine apostema dicitur, & multiplici eiusdem
definitionis examinatio, ac diuisio secundum re-
centiores.*

CAPVT

I.



Vmores omnes, qui præter
naturam consistunt, recens-
tiores tum medici tum chi-
rurgi, atque etiam vul-
gus ipsum sub nomine apo-
stematis comprehēderunt.

Quum tamen ἀπὸ σπυγμῶν Gal-
leno & Græcis omnibus,
vna sit species tumorum
præter naturam incidens

30 tium, quam Latini appositè abscessum nominave-
runt, & ipsa iuniorum turba, accepto ab Auicennæ
interprete vocabulo, exituram, de qua in sequenti-
bus fusiùs atque accuratiùs dicetur. Quinquā & re-
centiores ipsi apostema nonnunquā specie seu dif-
35 ferentiam faciunt tumoris præter naturam, cum sci-
licet ipsum diuersum faciunt ab exitura quam vos

ἀπὸ σπυγμῶν
Abscessus.

cant, & pustulis, de quibus etiam suo loco copiosius differemus. Nomine enim apostematis illi, ferè eos tumores passim intelligunt, qui & in magnam satis molem attolluntur, & ex humorum (vt loquuntur) naturalium influxu procreantur, atque ideò etià vera apostemata vocant. Itaque cum apostema generis nomen est, omnes præter naturam tumores sub se complectens, Auicennæ & eius sequacibus ita communiter definitur. Apostema, est ægritudo composita ex triplici genere morborum, in vnam magnitudinem aggregatorum. Quam diffinitionem essentiali esse contendunt. Quippe quæ genere consistit & differentia, naturam ipsius definiti sufficienter explicet. Porro, generis definiti locum in ea obtinet ægritudinis vocabulum. Reliqua verò appposita sunt, ad differentiam aliorum morborum, qui in compositione seu constructione instrumentorum contingunt, quorum differentias Galenus recenset libro primo de morbo & symptmate. Tria autem illa morborum genera, quæ in tumore hoc præter naturam, apostemate vulgò nūcupato, reperiuntur, vnius morbi essentiam constituentia, sunt, intemperies, quæ & malam complexionem appellat: incommoderatio, quæ etiam mala compositio dicitur: & continui, seu continuitatis, aut vnitatis solutio: Græcis autem vocibus dicuntur *εὐκαταία, ἀμετρία, καὶ συνεχέας λύσις*. Cæterum alias multas apostematis vulgariter dicti descriptiones adferunt, verius quàm definitiones, nā neque cum ipso definito conuertuntur, neque eius naturam satis explicat, aut eius essentiam sufficienter constituunt: proinde & accidentales eas vocat. Cuiusmodi est hæc ex initio libri de tumoribus præter naturam à Galeno conscripti, ab eis desumpta. Apostema seu tumor præter naturam vnū aliquid eorū est, quæ corporibus accidunt, partē quā occupat, secundū omnē dimensionem, distendens. Quæ descriptio ex his Gal. verbis descripta est, *ἡ ἐν τῷ σώματι συνέχεται τὰ τὰς ἀμφοτέρων ὁρίων, ἢ διὰ τὸ*

Apostematis definitio vulgaris.

Definitionis examinatio

Tria morborum genera tumoris præter naturam essentia constituentia.

Definitiones accidentales.

Prima.

De Tumorib. præter naturam.

3.

μενὸν πρᾶγμα πρὸς τῆς ὀγκοφωνίης. τὴν γὰρ εἰς μῆκος καὶ πλάτος
 33 καὶ βάθος διατάσσιν ὡς τὰς ὀνομάζουσιν. Hoc est. Quod tumo-
 33 ris vocabulo significatur, id eorū quæ corpori acci-
 33 dunt, vnū esse cōstat. Sic enim distensionē in lōgum, *Secunda.*
 33 latū, & profundū, nomināt. Talis quoque erit defini-
 33 tio si ita dixeris, Apostema, incrementū est, naturalē *Tertia.*
 33 statū excedēs. Item & quæ sequitur, ex lib. 13. Theraz
 33 peutices methodi deprōpta. Apostema tumor est, in
 33 quo partes à naturali habitu in quātitate seu magni-
 33 tudine recesserunt. Sic autem apud Galenū legitur:
 33 ἢ διὰ τῶδε τῷ πρὸς καθέκαστον τῆς ὅλης πραγματείας ὄντι, περὶ
 33 τῶν παρὰ φύσιν ὀγκῶν, ἀρξάμεθα λίγην, ἵνα οἷς διηλονότι κατὰ μέ-
 33 τρον ἐξέλκται τὰ μέλη τὰ κατὰ φύσιν: id est, In hoc verò toti⁹
 33 operis tertriodecimo de tumoribus, qui præter natu-
 33 ram incidūt, differere incipiemus, in quibus scilicet
 partes à naturali habitu in quantitate recesserunt.

Itaque nisi his definitionibus particulam hanc
 addideris, actiones lædens, seu euidentē actionis no-
 xam inducens, nequaquam absolutæ & essentielles
 20 erunt. Non enim tumor omnis, distensionē in longū,
 latū, & profundū, vltra naturæ habitū in toto cor-
 pore, aut particula aliqua efficiēs, vel incrementum
 quodcunque, naturalē statū excedēs, iuxta vulgare
 acceptionē, apostema, aut tumor præter naturā, stat-
 25 tim dici debet. Siquidē, vī libro de tumoribus præ-
 ter naturā Gal. ait, incrementū eiusmodi naturalē stas-
 tum excedens, non ægris modò, sed & sanis etiā, tam
 in toto corpore, quàm in qualibet particula accide-
 re potest. Obesi nanque tamen vltra naturæ habi-
 30 tum, in latum & profundum distenti sūt, non tamē
 iam præter naturā se habent, sed solum (inquit) nō
 naturaliter. Nōdū enim naturæ limites sūt egressi,
 neque in eis adhuc est actionis læsio, qui terminus
 est excessuum, qui præter naturam dicuntur. Tus
 35 mores quoque illi, qui in particulis adhuc sanis exis-
 stentibus, & citra omnem sensum doloris cōsistunt,
 rectē quidē suprā, seu vltra naturā non tamē præter

4 Institut. Chirurgicarum. Lib. I.

*Absoluta tu
præter natu
râ definitio
ex Gal. scri
ptis desum
pta.*

*Tumoris præ
ter naturâ
diuisio, in
suas species
iuxta recen
tiorû senten
tiam.*

*Apostemata
Pustule.*

Exitura.

naturam, dicuntur. Vt si vtraque mamma, vel altera duntaxat immodicè increuerit, ita tamen, vt ipsa partis essentia ab omni noxa videatur immunis, nequaquã appositè præter naturâ, hic tumor dicitur, sed vltra naturâ duntaxat. Ergo si absolutâ magis & essentialè tumoris præter naturâ, definitionè, ex Galeni mète ac scriptis eiusdè placet colligere, hoc pacto defines. Tumor præter naturâ, incrementû est naturalè statû in corpore excedès, & læsionè actiõis inducens. Cæterùm tumores eiusmodi, qui præter naturâ dicuntur, in tres species Guidoni & illius ætatis scriptoribus, solent diuidi, in apostemata scilicet pustulas, & exituras. Apostemata itaque tunc illi nominant tumores maiores, in quibus materia, ex qua creantur magis copia seu quãtitate peccat, quã qualitate. Pustulas verò, exiguos quosdã tumores, quos & Bothor appellant, in quibus substantia ex qua nascuntur, qualitate magis quàm copia, molesta esse solet, imo & plerunque in eis (vt volunt) venenositas subest. At exituras, eos tumores vocât, quos Latinis abscessus, & Græcis ἀποσφύραις rectè nominari iam suprâ diximus. Sed liceat cuique nominibus quibus velit, vti, modò à rerum natura (vt Gal. ait) non discedat.

*De differentijs tumorum, qui præter naturam
incidunt. C A P. I I.*

*Diuisio tu
moris in su
as differen
tias.*

*A quibus su
matur diffe
rentia tumo
rû pter na
turâ recetio
ribus.*



Vmorum præter naturam, qui vulgò generali nomine apostemata dicuntur, variæ ac multiplices sunt differentia: Quæ omnes recentioribus chirurgis sumuntur, vel à substantia rei vel à materia, vel ab accidentibus, vel à partibus affectis, vel à causis efficientibus. Differentia, quæ à substantia ipsius affectus desumuntur, his & eorum principi Auicennæ, sunt, tumor magnus, & tumor parvus. Ac magni quidè tumores illis censentur, phlegmonèsi, qui in carnosis particulis tumidioribus fiunt, itè ceder matossi

De Tumorib. præter naturam. 5

matōsi, erysipelatōsi, & scirrhotōsi, qui in molem ef-
 fatu dignā attolluntur. Parui verò tumores eisdem *Substantia.*
 dicuntur, minutæ eminentiæ, (quas pustulas & bo-
 thor appellant) in cute ac corporis superficiē nō in-
 frequentius apparentes: cuiusmodi sunt lepræ Græ-
 corū, psoræ. i. scabies, impetigines, & id genus alia,
 de quibus in sequentib⁹ latius dicemus. Materia p̄ di-
 ctōrū tumorū, sunt hūores quatuor tā naturales (ut
 vocār) q̄ nō naturales, sanguis .i. pituita, & vtraque *Materia.*
 bilis, itē humores qui toto gñe p̄ter naturā sunt, &
 solida aliquando quædā corpora flarus quoque &
 serofus humor: à quibus oībus, aliæ sumunt eorūdē
 tumorū differentiæ, ut in sequentibus ampli⁹ des-
 clarabitur. Symptomata autem seu accidentia, quæ *Accidentia.*
 cōmuniter ipsis tumoribus superuenire solent, sunt
 dolor, calor, mollities, durities, & id gen⁹ alia, à quib⁹
 etiam differentiæ sumendas esse volunt. Quæ à
 membris seu particulis ipsis laborantibus, sumuntur *Partes affe-*
 sunt, veluti ophthalmia, oculi inflāmatiō: synanche, *ctia.*
 gutturis phlegmōe: phymata, phygethla, laxarum,
 quas glāndulas vocam⁹ inflāmatiōes: itē & bubones.

Causæ verē efficiētes, à quibus & differentiæ quæ *Cause effi-*
 dam accipiuntur, sunt, congestio, & fluxio, crisis, id *cientes.*
 est, iudicium, quod in morbis fit: ac quædā aliæ tum
 interiores, tum exteriores causæ, de quibus copio-
 si⁹ atque accurati⁹ in sequentibus edisseremus.

Verumenimverò, tumorum huiusmodi præter na- *Tumorum*
 turam incidentium, varietates ac differentiæ om- *præter natu-*
 nes, ex eius quod influit natura, & substantia tu- *ræ differen-*
 morem committentem, nascuntur Galeno lib. quē *tia unde na-*
 de tumoribus præter naturam inscripsit. Item secū- *scatur Gal.*
 do libro ad Glauconem, & 13. methodi medendi,
 quibus lecis scribit, omnium tumorum qui præter
 naturam sunt, varietatem: ex eius quod influit natu- *Gal. 13.*
 ra, enasci. Vbi enim (inquit) flatulenta materia cor- *Metb.*
 piofior accessit, flatuosi magis tumores fiunt. Phleg-
 monæ verò magis similes, vbi sanguis: sicut erysip-

6 Institut. Chirurgicarum, Lib. I.

pelati, vbi flaua bilis: & œdematōsi magis, vbi pituita: similiter scirrholi, vbi vel crassius, vel admodū lentus humor parti est infixus. Itaque tumores omnes præter naturā ipsi Galeno fiunt, aut ab humoribus, aut à flatuoso spiritu, qui quandoque sub cute, quandoque sub circūossalibus mēbranis, quādoque in ventre, quandoque in intestinis, nonnunquā in medio horū, & peritonæi colligit. Græci emphysema, Auicennas apostema vêtosum vocat. Si ab humoribus tumores eiusmodi fiant, aut calidi, aut frigidi sunt, aut mixti. Calidi autem fiunt à sanguine optimo, id est, adamussim rubente, & consistētia mediocri, ac moderata qualitate, & tūc phlegmonē Græci, Latini inflāmationē vocant. Aut à flaua bile, vel à sanguine feruētī ac tenui, vel sanguine & bile calidioribus. erysipelas illi, hi sacrū ignē appellant. Frigidi verò vel à tenui pituita suscitantur, atque tū Græci œdema, nostri laxū tumorē vocant, Auicennæ interpres vndimiā appellat, aut ab humore atræ bilis, vel crassa & lenta, tenaciq; pituita, scirrholi, Latini duritiem, Arabes sephirum vocāt. Ex seroso quoque sanguinis recremento quandoque tumores fiunt, vt in sequentibus dicitur. Mixti dicuntur quū miscetur simul eiusmodi humores, atque si alter alteri dominetur, ab eo qui in mixtura exuperat, nomen ipsi tumori inditur. Vt sanguine bili dominante, phlegmonē dicemus erysipelatōdem. Sicuti ob flauam bilem præpollentē, erysipelas phlegmonōdes. Iam verò aliarum mixtionum, similis est interpretatio, phlegmone scirrholōsa, & scirrhus phlegmonōsus: œdema phlegmonōsum, & phlegmone œdematosa. Atque ad hoc exempli, reliquos quoque tumores, etiam si trium, vel quatuor humorum inuicem commixtio sit nominabis. Porro si pares sint, atque ex æquo mixti humores, ita vt alter alteri non præpollat, tunc per copulam eorum, quos excitant, tumorū nomina cōiūgemus. Vt si sanguis bili aequaliter

De Tumorib. præter naturam.

7

æqualiter misceatur, vitium illud per coniunctionem, phlegmone & erysipelas dicitur, vel cū Gale-
no, phlegmōnes, erysipelatisq; specie & natura mes-
dium. Et hi quidein sunt præcipui tumores, qui ex *Tumores*
humorum influxione fiunt Galeno: Phlegmone in- *præcipui, q*
quam, erysipelas, œdema scirrhus. Ad quos innus *ex influxu*
meriali naturæ modū excedētes tumores, reducun- *humorum*
tur, ac sub eis cōprehenduntur, tæcti variis ex caus *fiunt.*
sis diuersa sortiti sunt nomina. Itaq; ad phlegmona
10 rum genus pertinet, phygethlon, quod panus, Cel-
so autore, à nostris vocatur. Phyma, tuberculū eidē
Celsio nūcupatum. Termintho, phymatis species
Oribasio, sed Aëtio phygethli. Dothienes, quos Cel-
sus furunculōs vocat. Item gangræna partis *vix vix, i.*
21 mortificatio sed nō absoluta, & sphacelus, qui à La-
tinis syderatio, & ab Auicenna ascachilos, dicitur.
Carbūculus quoq; Græcis anthrax nominatus: de
quo scribit Auicennas capite de pruna & igne per-
fico: Ad erysipelata verò referuntur herpes, qui *Erysipelato*
20 specie sunt duplices miliares scilicet, & excedentes, *si tumores.*
quos *1810, 1811, 1812* Græci appellant. Vtranque speciem
Auicennæ interpretes formicas vocauit, sed eas cum
verrucis illis, quas Græci myrmecias, Latini formi-
cas vocant, nominis similitudine deceptus, eodem
25 capite turpissimo errore commiscuit. Eosdem herpe-
tas Celsus sub ignis sacri nomine videtur compre-
hendisse. Recentiores eos inter pustulas (vt loquun-
tur) cholicas adnumerant. A bile etiam ferè proue-
niunt, atq; idē ad erysipelas pertinent, phlyctenæ
30 à Græcis vocatæ, de quibus agit Auicennas capite
de vesicis & inflammationibus. Ad tumores pi-
tuitæ hoc est, œdemata, referuntur nonnulli tumo-
res sub apostematis nomine à Græcis comprehensi,
qui ab Auicenna nodi, ab Haly Abbate selaa & du-
35 beleta phlegmatica dicti sunt, Latini abscessus vo-
cant. Quorum iuxta diuersas materias in eis conten-
tas, diuersæ etiam sunt species.

24. Thera. Porro tria sunt Galeno eiusmodi abscessuum genera frequentissima, quorum singula propriam appellationē Græcè sunt sortita, ea sunt atheromata, steatomata, melicerides, à similitudine quidē contentorum in his corporū dicta, vt amplius in sequentibus declarabimus. Est & apostematum, hoc est abscessuum genus, in quo res aliæ cōtinentur, quæ nō humorum modò, sed & solidorū quorundā coporū proprietates repræsentant: verū hæc (inquit Galenus) rarius. Ac de iis quidem etiam in sequentibus, cum de abscessibus sermonē faciemus. Ad hæc autem modò dicta abscessuum genera pertinet, tumorū quādā nomina, à recentioribus excogitata, & nusquam apud antiquos scriptores reperta, vt testudo, mollis tumor caluariæ inhærens, & talpa: hæc ad atheroma, illa ad meliceridē magis spectare videtur. Ad steatoma verò ferè pertinet, tumor dolore carēs, quē natā, vel natā appellant, de quibus suo loco dicemus. Huc quoque, spectant vocata à Græcis gāglia, Ab Auicenna glandulæ, quæ à vocatis nodis differunt. Scrofulæ quoq; à vulgo vocatæ, à pituita fiūt, proinde & ad œdemata reducūtur: hæ Græcis charades, Latinis strumæ, dicūtur. Galenus tamen alicubi inter scirrhus, ob duritiem annumerat. Ad œdema etiam refertur Galeno ea hydropis species, quæ leucophlegmatia Græcis, & hypofarca nuncupatur. Cæterū tumores, qui ad atrā bilem spectant, & sub vocato scirrhus continētur, sunt cancri, qui à Græcis carcinī, & carcinomata dicuntur, Celsus tamen cancrum à carcinomate seiungit, vt illū ab his quæ extrinsecus incidunt, oriri dicat & serpere, hoc corrupta interius aliqua parte innasci. Idem cancrū in multas species diducit, erysipelas scilicet, gangrænam, & vlcus nigrum. Huius quoq; farinæ est elephantus. seu elephantia aut elephantiasis, à vulgò medicorū lepra vocata, & quibusdā sancti Lazari morbus, Itaq; lepræ nomen Auicennæ, & imperis
ta mul

Tumorum
noua quæ-
dam apud
recentiores
medicos no-
mina.

Testudo.

Talpa.

Nata.

Ganglium.

Struma.

Leucophle-
gmatia.

Scirrosi tu-
mores.

Cancer.

Carcino-
ma.

Elephantia
bis.

- ta multitudini, morbum, grauissimum ac pernicios-
 sissimum significat: cum tamen Gal. Paul. Aegine.
 ac reliquis Græcis, leuis sit morbus, non multum à
 scabie differens, que p̄sora eisdem dicitur. Ex scir-
 5 rhofo etiam tumorum genere censentur, verruca *Verruca.*
 ab Auicennæ interprete vocatæ Latina voce, quæ
 tumores sunt instar monticulorum quorundam in
 cute eminētes, vnde & nomen illis factū est. A vul-
 go porra dicuntur. Huius autem generis sint, myr-
 10 mecia, ac si formiculas diceret, & acrochordones,
 quæ nostris pensiles veri acæ dicuntur. Clauus, qui
 callus est figura teres, Græcis *ἄλῃ* vocatur, Auicennæ
 almismar. Thymion vel thymō verrucula thy-
 15 mi herbæ capita repræsentans, Auicennas videtur
 tusium, vel vt alia habet lectio, tarsecum nominasse.
 Ex verrucarum quoque genere sunt, vocata ab Auicenna
 cornua, ita quidem dicta, quòd cum oblonga *Cornua.*
 sint, instar cornuum recuruantur. Itē & calli, quos
 Græci *κάλυς* vocant: hi ex labore obdurata cute gi-
 20 gnuntur. Ad atram quoque bilem spectare videtur
 morbus, quem dracontion Græci appellant, Latini
 dracunculum ab eius nominis animalis similitudi-
 ne, Auic. venā medeni, Haly abbas, venā saniosam
 vocauit. De quo Paul. Aeg. c. vlt. li. iiii. Hic morbus
 25 apud nos parū est frequēs. Præter hosce, quos iam
 recēsuimus tumores, accidūt & alij, corporis super-
 ficiem nō rarò occupantes, nempe paruæ quædā emi-
 nētiæ, quas pustulas & bothor appellant. Quæ licet *Pustule.*
 & inter se, & ab ijs tumoribus quos suprà cōmemo-
 30 rauimus, differant: ab ijsdē tamen humoribus fiūt, à
 quibus & magni iam dicti tumores. Proinde maior-
 ris, minorisue ratione ab illis tantū distare videtur.
 Cæterū vt eiusmodi minuti tumores (quos sanē
 ignorare nō debet chirurgus) notiores, ac peruij ma-
 35 gis cuique euaderent, operæpretium me facturum
 putauī, si horū nomina tum Græca tū Latina, tum
 etiā Barbara, ac rudem quandam (vt in maioribus

10 Institut. Chirurgicarum, Lib. I.

fecimus) descriptionem hoc loco subiiceremus. Ergo ut rem ipsam aggrediamur, ex pustularum genere sunt, lepra Græcorum apud latinos nomen unum retinēs & psora iisdem scabies appellata, affectus quidem inter se admodum affines: cutis enim sunt aspredines, cum pruritu & corporis colliquatione, ab eodem humore progignitur, nempe atra bile. In hoc tamen differunt, quod lepra cum manifestis squamis cutem profundius in orbem depascitur. Psora vero superficiem tantum variis figuris lædit, & furfuracea quædam corpuscula remittit. Huc etiā spectat ea levis cutis infectio, quæ Græcis lichene, Latinis impetigo, & vulgò quibusdam (ut Manardus refert) volatica nominatur. Hæc fit mixtis saniebus tenuibus & acribus cum aliis crassis & frequenter ac facili in prædictos affectus, lepram scilicet & scabiem, quam psoram vocant, Galeno autore dēgenerat. Sunt tamen qui Græcorum leprā, impetiginem vocari à Celso contendāt. Verumenimvero cum ipse seorsum scribat de impetigine, & quatuor eius species faciat lib. quinto sue medicinæ, euidenti argumento conuincitur, eum aliam rem per impetiginem intellexisse, quam Græcorum lichenas. Quandoquidem nullus autor Græcus legitur, qui tot genera in lichenis vnquam agnouerit.

Quatuor
impetiginis
species.

Itaque si propriè & cum Galeno loqui volumus, Impetigo, lepra & lichene vel impetigo vnū & idem esse non possunt, alioquin idē in seipsum mutaretur. Ut igitur rem omnem in pauca contraham, quando leniter cutis inficitur, cum sola videlicet aspredine ac pruritu, id græce lichen, latinæ vero impetigo dicitur. Dum autē peior fit affectus nomen sicuti & formam mutat. Si enim manifestas squammas lichene excitat, atque altius cutem depascitur, lepra propriè dicitur. Si verò per extimam tantum superficiem extenditur, & corpora furfuracea emittit, psora à Græcis, à nobis propriè scabies vocatur. Quāquam scabiei

De Tumorib. præter naturam.

II

scabiei nomen vulgò & recentioribus medicis, latius longè pateat, qui omne cutis vitium, scabiem nominant. At improprie loquuntur, pura enim vera scabies Latinis, is procul dubio affectus est, qui Græcis spēra vocatur, ab Auicennæ etiam albaras & morpheā (contra quorundā opinionem) diuersus. Nam quòd illi & Punicis ferè omnibus albaras dicitur: à Græcis & Celsò leuce nuncupatur. Illorū verò morpheam, Græci alphon vocant: in quo quidem affectu non tota quidem caro afficitur: sed corporis duntaxat superficies: veluti (inquit Galenus) squammis quibusdam inspergitur. Sunt autem alphi ipsi Galeno genere duplices, nempe albi qui ex pituita: & nigri, qui ex melancholico humore prodeunt. Sed hæc à rerum consequētia tracti diximus. Neq; enim leucæ: neq; alphi ipsi, inter tumores præter naturam annumerandi veniūt: sed potiùs inter cutis defœdationes. Quæ licet minime lædant: quia tamen dehonestant, maiori plerunq; tædio præsertim mulieribus: esse consueuerunt, quàm multalijs lædentes quidē: sed latentes morbi. Vtrunq; autem hunc affectum, leucam inquam & alphon, vitiliginis nomine Celsus (qui tres eius species facit) complexus est: quamuis alijs medicinæ interpretes, Græca Latina facientes, leucam passim vitiliginem cōuertant, quod cum addito aptius fieret: vt si albam vitiliginē dicas. Vitiligo, itaq; si genere quodam cōprehendatur, fœdus cutis color est, ex malo particulæ habitu proueniens, quæ nutrimentum probe sibi assimilare non potuit. Maximo enim facultatis alteratricis errore, vitium hoc contingit: cuius duplicem speciem alijs constituunt. Vnam quidem, quæ solam cutim inficit: maculis (quæ illi infixæ adhærent) squammulis quibusdam similibus, alteram, quæ altius descendit, adeò vt carnem quoque ipsam attingat, ac pilos coloret. In ea enim cani & Lanugini similes enascuntur

Scabies.
Albaras.
Leuca.
Libr. 2. lt. de causis symptomatum.
Alphi duplices.
Vitiligo.

hac

12 Institut. Chirurgicarum, Lib. I.

hæc à viscosa glutinosaq; pituita cōtrahitur. Vtraq; autem albo vel nigro præcipue colore commaculat. Prior species quæ sublimior est, siue alba siue nigra sit, Græcis eadem voce alphos dicitur, quod colorem cutis immutet, Nam ἀλφεινός, (Vnde αλφός originē duxit, immutare significat apud veteres Græcos: Auicennas morpheam appellat. Altera verò species, quæ profundiorē diximus, Græcis & celso leuce, relisquis Latinis vitiligo alba, Auicennæ Albaras, nominatur. Halyab solus inter Arabes lepram nuncupauit fœdum quidem & difficile curabilem affectū, non tamen perniciosum significat apud quem hæc non vt apud Græcos leuem, & à scabie parum differentem aut vt apud Auicennam grauissimū ac perniciosissimum, sed fœdum. Ex quibus intelligi potest, quod parum nominibus sit fidendū, nisi res ad amulsim fuerit explorata. Eadem enim vox sæpe apud varios autores diuersam ac longè dissidentem habet significationem, vt passim in iis commentariis demonstratur. Hæc autem obiter, de eiusmodi maculis, & cutis defœdationibus annotauimus, vt rerū cōfusio, quæ ex perperam intellectis nominibus sequi solet, effugeretur. His igitur omisis, ad institutum reuertamur, ac reliquas pustulas breuiter, quantum fieri potest, percurramus. Ex quarum etiam genere præteriam enumeratas censentur Græcorum iōnthis, epinyctides, hydroa, psydraces, exanthemata, Celsi papulæ, & Plinij mentagra.

iōnthis.

Iōnthis, parui sunt, & duri in vultu, seu cute faciei tumores Galeno & Paulo, à crasso humore progeneriti, qui vel resoluuntur, vel exiguo ingenito pure maturantur: Latinis vari dicuntur. Meminit Galenus libro quinto de medicamentis secundum locos, iōnthosi cuiusdam affectus, quem principiū esse dicit elephantiasis: sub quo affectu videtur tertium & quartum genus impetiginis, Celsi comprehendisse.

Epinyctides

Epinyctides Celso pustulæ sunt pessimæ, colore vel

vel subliuido, vel subnigro, vel albo, fabæ magnitudinem non excedentes, in eminentibus partibus, ut tibiis & pedibus maximè, nascētes. Circa has vehemens inflammatio est, & cum ad apertæ sunt, reperitur intus exulceratio mucosa: color est humori suo similis: dolor verò ex eis suprà magnitudinem earum est. Neque enim ut diximus, faba maiores sunt. Nomina à nocte acceperunt, vel quia noctu grauiori dolore torqueant, vel (ut Celsus voluit) quòd noctu ferè oriantur. Plinius eas, pustulas liuētes ac noctibus inquietantes nominat: Arabes verò, effere, fere, vel faire eiusmodi pustulas sic noctu infestantes, vocauerunt.

Vnde dicta epinyctis. effere

Quæ Græcis sunt hydroa, Latinis quibusdā sudamina, & Plinio papulæ sudorū dicuntur: Auicennæ verò, plāta noctis: & Almanfori, alhasaphū. Quò fit, ut epinyctis à plāta noctis ipsius Auicennæ plurimum differat, tametsi vox ipsa Græca epinyctis (ut modò dicebamus) à nocte etiam originem trahat. Sunt autem sudamina hæc Galeno teste libro tertio aphorismorum, Aph. xxj. ex genere pustularum, in summa corporis parte hærentium, quæ instar vlcera cutis exasperat: proueniunt quæ, ut & nomē ipsum (inquit) indicat, ob multos sudores, vel biliosiores, vel mordaciores, qui cutem mordent, & pruriginosam reddunt, ac in modum vlcera exasperant. Porro hæc affectio, puerilis, atque iuuenibus, sed his præcipue, qui naturā sunt biliosi, æstus tempore cōmunis est, adeoque facilis curationis, ut per se absque villo præsidio albicantibus quibusdā squammulis dimissis sanescat. Auicennæ autem desudationes (ut ex earum constat descriptione) potius exanthematibus Celsi, quam sudaminibus Galeni, respondere videntur.

Desudationes Auicennæ.

Si quis tamen nomina attēdat, desudationes ipsas Auicennæ, putabit Græcorum hydroa, quæ Latini sudamina vocant. Verum enim verò, non tam nomina ipsa, apud Barbaros & Arabicæ sectæ autores, sequi

14 Institut. Chirurgicarum, Lib. I.

Psydraces. sequenda sunt, quàm ipsæ rerum descriptiones. *Psydraces*, seu *psydracia*, pustulæ sunt, parùm supra summam cutem eminentes, phlyctænis, hoc est, bullis, quæ ab igne excitantur, persimiles. Hæ in capite præcipuè nascuntur. *Psyzzacion* corruptè legitur apud Celsum pro *psydracion*.

Morbilli. Pustulæ illæ in cute florentes, à crassiss & cuti im-
Variolæ. pactis humoribus natæ, quæ vulgò morbilli & va-
Exanthemata. riolæ nūcupantur, Galeno, q̃ turgētū ad florē gemmarum instar tumeāt, exanthemata, Hippocrati ve-
Ecchymata. rò, quod spontè è cute erumpāt, in eaq̃ floreāt. ecchy-
Ecchymata. mata dicuntur. *Enim*, vnde exanthema fit, florē, verò, vnde ecchyma deducitur erumpere signi-
Ecchymata. ficat & efferuere. Plinius papulas & interdū pituitę eruptiones easdem pustulas vocat. Porro hæ dupli-
Ecchymata. ces sunt, quædam enim sublimes, quædam verò latę. Sublimiores à calidiore & tenuiore humore fiunt, pruritūq̃ excitāt, Latæ verò & humiles à frigidiore & crassiore humore proueniūt, neq̃ pruritū concitant, Atq̃ priores morbilli, posteriores verò variolę vulgaribus medicis dicuntur. Galli his nominibus præposterè abutētes, humiles istas è vix à cute extātes rubeolas, morbillos verò variolas, appellāt. Hip. lib. 3. Epī. hoc pustularū genus in maiora & minora ecchymata diducit, quemadmodum & sublimiores magnos herpetas nominat, vel quia (vt Galen⁹ ait) magnum occupant locū, vel quia cū maligna con-
Papulæ Cel. tingunt erosione, Hæ nāque, quandoque altero tan-
si. tum, quandoque vtroque modo magnæ visuntur.

Papulæ Cel. Cornelius Celsus libro quinto suæ medicinæ post
si. tractatum de impetigine, meminit duplicis papulæ: vnus quidem leuioris, quæ si ieiuna saliuā quotidie defricatur, sanescit: alterius maioris, in qua magis cutis exasperatur, exulceraturq̃, ac vehemētius & roditur, & rubet, difficiliusq̃ sanecit. Hanc *ἀγρία*, id est, feram dicit à Græcis appellari. In vtroque tamen genere, minus vitij, q̃ in impetiginibus agnos-
 scit

De Tumorib. præter naturam.

15

scit, adeo ut id quod difficilius sanescit, nisi sublatus sit, in impetiginē verti, ac transire adfirmet. Galli (si quid iudico) genus utrumque, sed prius, maxime dartras appellant. Id enim vitium maxime rotundū incipit, eademque ratione in orbem procedit, ac tardē serpit. Quæ omnia papulæ primi generis Celsi conveniunt. Has autē Celsi papulas, nihil à Græcorū lichenis aut Latinorū impetiginibus differre, nonnulli constanter asseverant. Eumque solū autorem inter Latinos, lichenas, papulas vertisse legimus. Mētagra, Latina vox est Plinio, qua rem omnino aliā ab impetigine, in principio libri xxvj. visus est significasse, longeque peiorem affectum, quam eū quē Græci lichenis nomine intellexerunt: licet in medicinis quandoque Græcorū lichenas impetiginē sit interpretatus, & morbum eiusmodi mētagrā appellatū, eo loco etiam lichenas vocet. Porro refert idē Plinius, malū hoc Tiberij Cesaris principatu, primū in Italiā irrepsisse, oīque auo priore uniuersę Europe, nedū Italię, incognitū: tāta quē fœditate, ut quæcūque mors huic præferenda esset: tāta etiā cōtagione, ut osculo solo veloci trāsitu inficeret, sed procures maxime. Hæc lues à mento ferē oriebat, vel id p̄cipuē afficiebat, vñ & nomē illi factum est mētagra. Hæc forsā ea est scabies quā Galilorum nonnulli malā dartrā appellant. Cæterum morbum hūc agnouisse videtur Galenus. Quinto enim libro de medicamentis cōpositis secundū locos, meminit fœdissimæ cuiusdā menti impetiginis, quæ pruritum (ut ex Critone refert) excitat: & affligit patientes, atque in discrimē non mediocre adducit. Nā inter dum, inquit, per uniuersam faciē serpit, & ad oculos usque procedit, & ferē supremę deformitatis cā efficitur. Quæ impetiginis descriptio, per omnia mētagre Plinij cōuenit. Errāt autē vehemēter, qui fœdissimū hunc lichenē, mētagrā à Plinio appellatū, morbum eū esse existimāt, quē hodie vulgō quidā Gallicum, alij Neapolitanum, alij citra odium & iniuriā nationū, Venetum

Dartra Gallica.

Mētagra.

Plini. li. 26

Mētagram agnouit Galenus.

Morbus Neapolitanus.

Morb. venereus quādo primū in orbem irrepfit. Venereum appellant. Hic enim veteribus & priori sæculo omninò ignotus fuit, primūq; apud Neapolim irrepfit anno à Christo nato 1493. Quo tempore Carolus octauus Gallorum Rex inuictissimus, alpes superabat, Italiam periturus, quanuis antea non longè per Hispanias (vt quidam referūt) serpsisset: quapropter tanquàm inde tracta origine, lues Hispanica cœpit appellari. Quæ pestis diuina veluti vltione (vt par est credere) ob fœdos, illicitos, atq; à Deo vetitos concubitus, in terras immissa, magnam generis humani partem sua contagione fœdauit, & prostravit. Id enim malum censere magistratus, sensere mancipia, sensere proceres, sensit humilis plebs, veloci vnus ad alterum transitu: iamq; per Hispanias, Gallias, Italiam: totamq; Europā magno mortaliū dispendio vagatur.

Pustula glādose. Sunt & pustulæ quædam præter has modò enumeratas, apud Auicennam libro quarto, glandosæ dictæ, quæ nihil à ganglio differre videntur, nisi minoris tantum maiorisve ratione. Mentio quoque est apud eundem Auicennam lib. 3. de quibusdam pustulis, quas ibidem iuncturarum bothores vocat, & libro quarto almatim, quas cum nigras esse dicat, & viridibus granis similes, Græcorum proculdubio terminthi erunt, quos paulò superius inter phymatis species enumerauimus. Has videtur Celsus similes varis facere, & putare à Græcis helcodes dici, id est vlcerosas.

Pustula alba. Pustulæ albæ vel lactæ Rasis & Serapionis, & bothor leues Auicennæ, si earum descriptiones penitus inspiciantur, ad iōnthos Græcorum, quos Latine varos nominauimus, pertinere videbuntur, quam eadem remedia, quæ ad illas scribit Auicenas, à Dioscoride ad ephelidas, id est aspredines & nigrities in facie ex ardore solis prognatas, præcipiantur.

Hactenus de differentiis tumorum præter naturam, qui præcipue foris in corpore fiunt, nunc ad

cor

De Tumorib. præter naturam.

17

eorum causas tranſeamus.

De cauſis Tumorum præter naturam, extrinſecus apparentium in vniuerſum. C. AP. III.

Cauſæ tumorum præter naturā, recētiōribus medicis & chirurgis, geminæ ſtatuantur, generales ſcilicet, & ſpeciales. *Cauſa tumorū præter naturam.*
Generales cauſæ ſunt, fluxio, quod Græci *Fluxionis cauſa 6.* *πρώτη* vocant, & congeſtio. Rurſus fluxionis cauſæ iūdem ſex numero cōſtituuntur. Nempe membri propellentis robur, excipientis imbecillitas, materiæ copia ſeu multitudo, meatuū deferentium, (id eſt, per quos fit fluxio) laxitas ſiue amplitudo, propellentium anguſtia, & loci fluxionē excipientis ſitus inferior. Hæ autem ad quatuor reduci poſſunt. Vtpotē ad membrū propellens, particulam ſuſcipientem, humoris fluentis conditionem, & ſpatium per quod fit deſluxio.

Cæterū fluxio concitatur ratione mēbri expellentis, vel propter robur facultatis expultricis ipſius, *Pars propellens.* vel propter connexum naturalem, quem habet cum membro excipiente, vel propter priorū meatuū anguſtiam. Pars verò aliqua fluxionem excipit, *Particula excipiens.* quia vel dolēs, aut calida, vel imbecillior, vel rarior, atque ignobilior, vel in inferiori loco ſita. Porro ratione humoris fit deſluxus in partē aliquā, quia ſit copia ſuperuacua, qualitate moleſtus, ſubſtantia tenuis: ſpatium autē fluxionis cauſa exiſtit, ob meatum amplitudinē, vtpotē venarū, arteriarū, & pororum. *Spatium.* Congeſtionis verò (quæ altera eſt cauſa generalis tumorū qui præter naturam incidunt) cauſa *Congeſtionis cauſa.* geminæ aſſignātur: nempe error virtutis quæ alteraſtrix & altrix dicitur, & imbecillitas expultricis.

Ex quibus colligitur, quod tumores calidi, magna ex parte fiunt à deſluxu humorum: frigidi verò eorundem congeſtione potiùs excitantur.

Quomodò autē calida fluxio tumorē excites aper

18 Institut. Chirurgicarum, Lib. I.

tè ac scitè demonstrat Galenus, libello illo cui titulū fecit de inequali intemperie, ad hūc modum scribēs.

*Quomodo
calida defluxio
tumorē
creet.*

Calida defluxio simul atque in musculū decubuit, primū arteriæ maiores, venæq; opplentur, ac distenduntur: ab iis verò minores, atque ita res procedit, donec ad minimas sit peruentum. In iis vbi valenter impacta fluxio est, nec ampliū contineri potest pars eius per ipsarum ora egreditur, pars per tunicarum foramina percolatur ac foras transmittitur atque tum fluxione implētur spatia ipsa vacua, quæ sunt inter prima corpora. Sic omnia ab humore omnig; ex parte incalescunt, ac perfunduntur. Sunt autē hæc nerui, ligamēta mēbrana, caro ipsa & ante hæc arteriæ & venæ: quæ scilicet & primæ & præter cætera vario dolore afficiuntur. Quippe interiūs à fluxione tum ex calfiunt, tum distenduntur, ac diuelluntur, distrahunturve. Exteriūs non modò excalfiunt, sed etiam premuntur, ac degrauātur. Reliquæ verò particulæ, aliæ quidem calfiunt tantū, vel comprimuntur, aliæ utroque modo laborāt. Atque hic morbus phlegmone nominatur. Hactenus Galenus itaque in eiusmodi tumoribus præter naturam, qui ex humorum influxu fiunt, aliquid iam (per initia saltē & antequā restiterit fluxio) factum ac generatū est, & aliqd adhuc futurum, atque in generatione est. Quod adhuc fit: materia est antecedens, quæ adhuc in fluxu est: factum verò, materia coniuncta, quæ iā influxit, & in parte laborante impacta est. Hinc non simplex, sed cōposita, in eiusmodi phlegmone, quæ in generatione adhuc est, (veluti in reliquis alijs tumoribus, ac morbis etiam omnibus, qui in gignēdo adhuc sunt, necdū absolutionē sunt nacti) medētis sollicitudo est Gal. lib. 13. methodi medendi, ex ea scilicet quæ prouidet, & ea quæ curat: sed hæc alterius sunt contemplationis.

Omniū morborū qui adhuc in gignēdo sunt dupliciter esse indicationem.

Causæ speciales tumores

Cæterū tempestiuum est, vt speciales tumorū: qui præter naturā sunt, causas subiiciamus. Hæ autē tres vulgò assignātur. Primitiua, quæ & pregressa &

& evidentes nobis dicuntur: antecedentes: & cons^{rum præter}
iunctæ, siue continentes Græcis dicuntur προκαταρκτικῆς ^{naturam.}
καί, προϋποκείμεναι, συνεκτικαί. Prægressæ seu primitivæ Prægressæ
causæ dicuntur, quæ dum aduersam valetudinē seu
morbosos affectus creant, separantur, vt casus per-
cussio, fractura, distensio, luxatio, aut error qui in vi-
ctus ratione committitur. Antecedentes seu præ^{Antecedentes.}
cedentes causæ dicuntur, quæ paratæ sunt morbos
efficere, vt sunt humores quatuor tam naturales quā
non naturales. Naturales humores sunt, qui cor-^{Naturales humores qui dicuntur.}
pori nutriendo sunt idonei, & in massa sanguinaria
continentur: proinde & vna sanguinis appellatione
comprehenduntur. Qui si ex venis aut arteriis effun-
dantur, subito cōcrescunt, siue extra corpus effluāt,
siue in ipso adhuc, quocunque loco contenti reman-
neant. Non naturales verò eos appellant, qui à san-<sup>Humores non natura-
les qui dicuntur.</sup>
guine, quo partes nutriuntur, separati inveniuntur,
& ob suam prauitatem vel corruptelam, ex seipsis,
hoc est, ex natura sua, inepti sunt ad corporis nutri-
tionem, qui quantumvis etiam in aëre nos ambi-
te permaneant, nunquam cōcrescunt. Hi autem vel
quadam naturæ prouidentia, certi alicuius vsus gra-
tia, in conceptacula quædā relegantur, aut foras ad
corporis extima propulsi, tumores non veros, ac il-
legitimos appellatos abscessus pustulas, scabies &
cutis defædationes decolorationes, & sudamina ge-
nerant. Interdum verò insensibili perspiratu, vel sen-
sibiliter per sudores, digeruntur, atque exhalant.
Nonnunquam intrinsecus putrescunt, & febres
excitant. Atque hi (inquiunt) æquiucocē & im-
propriè humores dicuntur, naturaliumq; nomina
sibi vsurpant. Solam enim eos succos, qui ab he-
pate in sanguinea generatione, nutritionis, ac
fluoris nostri corporis reparandi gratia conficiun-
tur, propriè humores censent appellandos. <sup>Qui succi propriè hu-
mores dicuntur.</sup>
Cuiusmodi est sanguis verus ac purus, biliosus, pis-
tuitosus, & melancholicus, quo singulæ nostri corporis

ris partes nutriuntur, instauranturq;. Aliæ quidem puriore, & (vt ita dicā) magis sanguineo, aliæ verò bilioso, aliæ pituitofo magis, aliæ melancholico, prout cuiusque natura expostulat. Itaque humores vniuersi in venis & arteriis contingunt, quod & coloris ipsius, & consistentiæ varietas indicat, vt libro de atra bile Galenus expressit.

Ex quatuor humoribus naturalibus quatuor fiunt legitimi ac præcipui tumores. Ex humoribus non naturalibus qui fiunt.

Porro ex iis quatuor humoribus naturalibus dictis, quatuor præcipui ac legitimi tumores præternaturā fiunt, quæ vulgò apostemata vera nominare solent. In quibus scilicet tumor ad sensum magnus est, & materia, vnde procreantur, magis quantitate peccat, quàm qualitate. Hi autem proprijs nominibus dicuntur phlegmone, erysipelas, œdema, scirrhus. Ex non naturalibus verò (vt iunioribus medicis placet) abscessus, quas exituras vocant, & pustulæ oriuntur, de quibus in præcedentibus abundè diximus, atque hos tumores, abscessus in quā & pustulæ, apostemata non vera eisdē censentur. Ad quæ, & alia duo tumorū genera reduci volunt, flatuosos scilicet & aquosos, qui ex serosa substantia procreantur, vulgò apostemata ventosa & aquosa nuncupant. Itaque sex sunt nomina simplicium tumorū, phlegmonosi, scilicet, erysipelatosi, œdematosi, scirrhosi, flatuosi, & aquosi. Compositis verò, (quoniā horū infinita propemodum turba est) non omnibus propria sunt indita nomina, sed illis duntaxat, in quibus humor aliquis suprā cæteros dominium obtinere euidenti rationeprehenditur, vt iam ex præcedentibus satis innotuit, & rursus in sequentibus suo loco plenius ostendemus.

Causa coniuncta tumorum præternaturam.

Cæterum causæ coniunctæ seu continentes tumorum præternaturam, quos apostemata, pustulæ, & exituras vocant, sunt materiæ, quæ in particula ipsa laborante aggregatæ & infarctæ reperiuntur, quæq; adhuc permanent, postquam tumorem excitarunt: ac dum crescunt, tumores ipsi augentur: cū decrescunt, minuuntur: & cū desinunt, finiuntur.

De Tumorib. præter naturam.

23

tur. Causa enim coniuncta siue continens, morborū
 omnium ac dispositionum quæ in corpore sunt, ita
 ab Auicenna, & vniuerso iuniorum medicorū cœtu
 definitur: Causa cōiuncta est quæ cūm præsens est, *Continens*
 eius quoque morbus adest: cūm verò tollitur, etiam *causa quæ*
 morbus euanesceat. Verumenimverò quidā huius *dicatur.*
 ætatis medici nō vulgariter eruditi, duas tantū esse
 morborū causas Galeno cōtendunt, externā videlicet
 & internam, seu vt nunc loquūtur primitiuam
 20 & antecedentē. Quarum illam esse dicit eam, quæ
 extrinsecus corpori aduenit, ipsumq; admodum als
 terat, atq; immutat, quæq; dum aduersam valetus
 dinem creauit, separatur: veluti calor, frigus scor
 pio pungens internā verò quæ in ipso animalis cor
 25 pore consistit, & iam morbū facit: vt sunt humores
 præter naturam affecti. Eam autē, quam cōiunctam
 appellant eum ne somniasse quidem: cū iuxta huius
 sententiam, affectus actionē impediens, aut vitians
 morbus sit, & nō morbi causa: cōiuncta autem illa
 30 causa: quā Auicennas eiusq; sequaces inuenerūt (vt
 ex data ab ipsis descriptione constat) affectus sit ac
 ctionem lædēs, quæ propria est morbi definitio. Ac
 proinde illam à morbo nihil prorsus differre, à quo
 primum ea, quæ secundum naturā est actio, læditur.
 35 Cæterū cūm hæc de triplici causarum morbificarū
 genere opinio ita inueterauerit, & apud omnes fer
 re nostræ etiamnū ætatis medicos irroboraauerit: nō
 absurdum videbitur, si eas morbosas causas passim
 in hoc opere: dilucidioris doctrinæ gratia tribus hus
 40 iusmodi speciebus distinguamus: nempe primitiua
 antecedente & coniuncta. Atq; hæc de causis tumo
 rum præter naturam dicta sufficiant: nunc postulat
 ordo ac orationis series: vt eorum signa, & iudicia
 subiiciamus: modò tamen pauca de abscessuum na
 45 tura & generatione præmiserimus.

*Cōiunctam
 causam vi
 bul à morbo
 differre, quo
 runda opi
 nione.*

Itaque abscessus: qui Grecis ἀρσενια, & vulgò Abscessus
 exituræ dicuntur, Galeno libro de tumoribus præ
 50 ter naturam, & secundo ad Glauconem, dispositis Galeno.

tiones sunt, in quibus abscedunt, atque inuicem distant, quæ prius se contingebant corpora. Materia enim quæ eiusmodi tumores excitat, extra carnem musculi propulsa, continentia à subiectis diducit, & abscedere facit. Spatium igitur (inquit Galenus) vacuum in medio fieri oportet, quod aliquam substantiam spirituosam, vel humidam, vel mixtam ex utrisque comprehendit, quæ temporis diuturnitate in multiformes & varias substantias alterantur.

Duplex autem est eiusmodi abscessuum genus: vnum, quādo inflammatione in pus versa, pus ipsum tanquam in sinu aliquo est collectum; alterum cum nulla præcedente inflammatione, humor aliquis, isque aliàs specie alius, vel spiritus aliquis vaporosus, aut substantia ex utrisque mixta, in parte aliqua colligitur. Quod bifariam accidit: nam vel in spatio ipso, quod abscedentes interiacer partes, eiusmodi substantia, sine præuia defluxione generatur, aut aliunde in ipsam laborantem particulam confluit, vel fratim quidem ab initio, vel ea ratione, qua fiunt illa quæ ἀποσκήματα vocantur. Nominat verò (inquit Galenus) sic huiusmodi dispositionē, cum qui prius vnum membrum infestabant humores, eo relicto, ad alterum transferuntur. Spatium autem sibi molitur eiusmodi substantia, quæ abscessum creat, vel inter duas tunicas, vel sub quibusdam membranis.

Porro excoriat tandem circumposita corpora, vel quia omnino acris, aut omnino ipsa copia distendēs, aut putredinem quandam tempore contrahens. Sed & iam tunc acris est. Quod si humores ipsi, quibus spatium, quod abscedentes interiacer partes, completur, & abscessus excitatur, longo interdum tempore perdurauerint, plures (ut supra diximus) habent alterationes, atque in varias substantias transmutantur, quæ non humorum modò, sed etiam solidorum quorundam corporum proprietates repræ-

sentant. Nam lapidibus, arenis, testis, lignis, caribus, bonibus, luto, amurcæ, id est olei luno, vini faci, stipulæ

Duplex genus abscessuum. Gal. lib. 14. therap. meth. & lib. 2. ad Glau.

ἀποσκήματα.

Que in abscessibus inveniuntur.

De Tumorib. præter naturam.

23

stipulæ, ac multis aliis talibus, similia corpora, in abscessibus contenta inueniuntur: vt iam supra de differentiis tumorum explicuimus. Quod plerique ignorantes incantationis cuiusdam vi ac potentia fieri arbitrantur.

De signis tumorum præter naturam extrinsecus apparentium, in vniuersum, & eorundem iudiciis.

CAP.

IIII.

10



Vires præter naturam summa corporis occupantes (quorum duntaxat speculatio ad chirurgum pertinet) iudicio sensus, conspecta ac manibus cōtrectata laborate particula, statim

Note. vniuersales tumorum præter naturam.

15

deprehenduntur. In quacunque enim corporis parte incrementum apparet, naturalem statum excedens, ac præter naturæ modum particulam quam occupat distendens, eiusque actionem lædens, quod vel humor aliquis: vel substantia quæ prius ex

20

humore procreata, aut quæ humoris naturam utcumque relapsa vel vaporosus spiritus excitauit, ibi & tumorem præter naturam, esse necesse est. Cæterum tumores, quæ vera apostemata appellant, tumore, dolore, & calore, magis vel minus intensis, dignoscuntur. Non vera autem, quæ pustulas & abscessus

25

nominauimus, præter tumorem, malignitate quoque quam Græci cocoethiam nominant & sequens stratione etiam maiore vel minore, determinata, deprehenduntur. Signa autem particularis cuiusque differentię, & materierum ex quibus fiunt, in sequentibus suo loco dicentur, dum scilicet de simplicibus ipsorum, qui præter naturam consistunt tumorum differentiis tractabitur. Ex quibus & cōpositæ faciliè dignoscuntur. Verum enim verò non prius ad particularia est accedendum, quam de vniuersalibus sermo fuerit absolutus: is enim ordo in disciplinis obseruari solet: nec immerito sanè.

30

Nam vniuersalia ipsa atque communia manifest

Particularia nota.

stiora sunt nobis quā particularia: quippe quæ magis promiscua, cōfusioraq; sint: vt primo cap. lib. i. physicorum docet Aristoteles. Nemo igitur miretur, si passim in hoc opere chirurgico, à cōmunioribus & plura cōprehendētibus, semper inceperimus.

IUDICIA. Sed ad propositum reuertamur, & iudicia tumorū præter naturam cōsistētū persequamur. Circa quæ primū aduertēdū est: omnes eos tumores quæ vera apostemata vocant, si Galeno & Auicennæ credimus, inuicem magna ex parte complicari, neq; facillē aliquem eorū syncerum & purū inueniri. Nam (vt Galenus inquit) phlegmonæ, hoc est, inflammationi ex sanguine, magna ex parte miscetur aliquid quod vel erysipelatis, vel œdematis: aut scirrhi naturā seruet. Erysipelati autem, quod phlegmones, aut œdematis, aut scirrhi speciem referat. Et ita in reliquis omnibus similiter perpende. At verò si præter naturam tumores, quæ nō vera apostemata appellitant: vt plurimum synceri ac puri reperiuntur. Cæterū simplicium ac syncerorū curationes in se quētib; persequemur, ex quibus & cōpositorum, & implexorū curatio facillē intelligetur. Nā omnes & persequi & cōponere superuacaneum mihi videtur. Si enim simplices ipsos tumores omnes cognoueris, deinde quo pacto inter sese cōponantur didiceris, satis idoneus eris, qui in reliquis particularitate exerceas. Sed iam reliqua quæ in vniuersum de tumoribus ipsis sumuntur iudicia subiiciamus.

2 Periodi, paroxysmi, & crises tumorum qui præter naturam sunt, humorum ex quibus confluunt analogiam (inquit Guido) sequuntur. Analogiam autem hīc interpretamur proprietatē, seu proportionem, naturam, ac substantiæ similitudinem, quā formam specificam & occultam appellant.

3 Tumores eiusmodi præsertim salubres, & qui quatuor tēpora tumorum præst. distinguuntur, principio, augmento, statu, & inclinatione. Principij nota est, cū particula incipit distendi,

De Tumorib. præter naturam. 25

stendi, & fluxionis adest initium, cum dolore adhuc
exiguo. Incrementum adesse iudicabis, cum vides
ris tumoris molem attolli, locumq; affectum imple
ri, ac sympt^amata, quæ vnumquëque tumorem, se
qui solent, manifestè augeri. Status verò indicium
est: cū prædicta omnia, tumor scilicet & sympt^ama
ta cuiusq; tumoris differentia, proprium vigorem
suū obtinent: nec amplius possunt incrementū assu
mere, quin materia faciens tumorem, in alterius ges
neris substantiam degeneret, & transmutetur.

Declinatio autem tunc adesse cognoscitur, cū tu
moris moles, & propria ipsius sympt^amata, immi
nuuntur: vel materia quæ tumore facit, in aliā sub
stantiā incipit transmutari. Itaq; tempora eiusmo
di à tribus potissimum suum discrimen accipiunt,
nempe ab ipsius tumoris essentia, hoc est, magnitu
dine: vel paruitate à materia dispositione, & accidē
tibus, quæ curandi indicationem plurimum immu
tant. Cæterum quatuor hæc tempora simul ali
quando coincidere videtur, propter breuem scilicet
ac penè imperceptibilem vniuscuiusque durationē,
vt contingit in venenosis inflammationibus nō læ
talibus, quæ statim vigent ac florent. Porro tumo
res huiusmodi, qui ex humorum præsertim fiunt in
fluxu nisi fieri prohibeantur, reprimendo materiā
influentem vel sponte, & citra vllam manifestam
occasionem intro recurrente fluxione delitescant,
aliquo istorū quatuor terminari necessum est in sen
sibili exhalatione seu resolutione, vel facta suppara
tione, vel corruptione, vel induratione.

Omnium autem istorum modorum optimus, &
magis expetendus, is est, qui per sensu impercepti
bilem fit dissolutionem: post illum verò, qui per sup
purationem. At quæ per indurationem fit terminas
tio, absolutè mala dicitur. Quæ autem fit per cor
ruptionem particulæ laborantis, omnium pessima
censenda est, vt apertè nobis Galenus insinuat, li
bello de inæquali intemperie, ad hūc modum scribēs.

1. Principiū
2. Augmen
tum.
3. Status.

4. Declina
tio.

Tempora tu
morū præ
ter naturā
à tribus po
tissimū
suis disci
men assu
munt.

Tumores
præter na
turam qua
tuor modū
terminantur.

Gai. lib. de inaequali in temperie. Itaq; duorum alterum sequi est necessarium: vel ^{cc} superante fluxione, corporum quæ succubuerit, se ^{cc} qui corruptionem: vel ea deuicta, musculum ad nat ^{cc} turalem habitum reuerti. Subiiciamus igitur ipsam ^{cc} primum fluxionem superari (rectius enim à meliori ^{cc} bus incipitur) Duplex hîc incidit curationis mo ^{cc} dus: quod scilicet vel digeretur, seu dissoluetur, ^{cc} quicquid humoris in particulam procubuit: vel ^{cc} concoquetur: verum dissolutio oprabilior existit. ^{cc} Ad concoctionem autem hæc duo necessariò conse ¹⁰ quuntur: nempe puris generatio, & eius in aliquod ^{cc} spacium abscessio. Et paucis interiectis subiungit, ^{cc} At si victa à fluxione particulæ fuerint, in tantam ^{cc} deuenient intemperiem: vt earum actio pereat, & ^{cc} ipsæ temporis processu corrumpantur. Hactenus ¹⁵ Ga ^{cc} lenus. Resolutionis indicia sunt, leuitas membri, ^{cc} & deficiens pulsatio. Signa tumorem verti in sup ^{cc} purationem, indicantia sunt, dolor internus pul ^{cc} satio, & caloris incrementum. Fluxionem victri ^{cc} cem esse, & particulæ laborantis corruptelam, tes ²⁰ ^{cc} stantur nigror, & liuiditas, quibus nonnunquam ^{cc} & graueolentia accedit. Tumorem in lapideâ abis ^{cc} re duritiem, apertè demonstrat, tumoris imminus ^{cc} tio, & cum hac, durities remanens.

*Dissolutio-
nis indicia.
Suppuratio
nis nota.
Corruptio-
nis signa.
Induratio-
nis nota.*

*Regressio-
nis & deli-
tescentiæ
indicia.*

Regressio-
nis & deli-
tescentiæ
indicia. Regressio-
nis vel delitescentiæ nota est, subita ²⁵ tumoris diminutio, quæ interdum propter nimiam refrigerationem, nonnunquam verò propter venositate (nullis forinsecus admotis reprimens-
tibus) accidit. Ad hanc autem subitam atque affas-
tim factam tumoris immutationem, febris statim ³⁰ consequitur, ac multa alia praua sympt-
mata.

Hactenus de signis & iudiciis eorum tumorum, quos vulgò apostematis nomine propriè censent appellandos. Pustularum autem vulgò nuncus-
patarum notæ & iudicia suo loco, cum de illis tra- ³⁵ ctabimus, dicentur. Abscessuum verò (quas exis-
turus vocant) iudicia, ac signa, quæ vel statim eos
futuros denunciant, vel iam præsentis adesse des-
mon

monstrant, hæc sunt:

Cùm videris (inquit Auicennas) pulsationem aut *Signa. mori*
duritiem, in longum iam tempus productam, vel *futuri ab-*
caliditatem, aut dolorem incrementem, tunc existis *scellus, ex*
ma proximum esse, vt apostema in suppurationem *Auic.*
vertatur, & fiat abscessus.

Cùm autem deprehenderis leuitatem quandã af- *Note absces-*
fectæ particulæ, & doloris sedationem, ac remis- *sus iam fa-*
sum calorem, quodq; tumentis loci pars aliqua *cti.*
10 cæteris emineat, atque in mucronem subducatur:
ad hæc cùm premendo digitis velut inundatio-
nem (vt loquuntur) perceperis, vidêrisq; gibbi
illius seu mucronis colorem iam albescere, tunc
iudica, pus eo loci subesse, & tumorem iam ab-
15 scelsisse.

Vnde & ab Hippocrate rectè est iudicatũ, Quòd *Ap. 47. li. 2.*
dum pus conficitur, dolores ac febres magis acci-
dunt, quàm iam confecto pure.

Porro notæ eiusmodi tum iam facti abscessus,
20 tum mox futuri, vulgaribus iis versiculis commu-
niter exprimuntur:

Durities longa, pulsus, dolor, & calor aucti,

Signant pus fieri: sed factum, dicta remissa,

Sub digitis vndans, albescens pars, & acuta.

25 Cæterum, in pure ipso cognoscendo ac diiudi-
cando, maximè te attentum esse oportet. Quan-
doquidem suppuratio ipsa, seu puris in loco aliquo
comprehensi notitia, sæpius occultatur, ac medis-
cum latet, ob loci scilicet & puris crassitudinem,
30 vt hac aphoristica sententia nobis expressit Hip-
pocrates:

35 Quibuscunque suppuratio in corpore existens, *Apho. 41.*

non innotescit, his ob crassitudinem puris, aut loci, *lib. 6.*

non innotescit.

35 Atque hæc de signis abscessum: dicta suffi-
ciant. De horum autem iudiciis, hæc ab Auicenna & recentioribus chirurgis memoriæ tradita sunt.

Absces

28 Institut. Chirurgicarum, Lib. I.

*Iudicia ab-
scessuum.*

Abscessus, qui iuxta membrum aliquod nobile, vel propè iuncturas fit, atq; adeò in venosis, aut nervosis ipsis partibus, quicq; in imbecilli particula, & nativo calore propemodùm destituta, prædura quosque & densa cute oblecta, consistit, ad hæc qui crassiore materia, & ad motum tardiore constat: planus etiam seu æquabilis, & in coni formulam nō subductus, suspectus admodùm est, ægreq; ac tardè maturatur. Qui verò huic ex aduerso respondet, boni moris est, & laudabilis. Citò enim & facile in suppurationem vertitur, sæpiusq; nullo forinsecus adhibito auxilio, per se dehiscit. Itaq; si abscessus tendit in acutiem, & puris substantia tenuis fuerit & acris, nec prædura aut densa cutis extiterit, natura seipsa, hoc est, sua facultate alienorum expultrice, & citra aduētitium aliquod subsidium conceptū humorem foras propellet, nisi quis facta incisione protinus ipsam spontaneam apertionē anteuertat. Abscessus eiusmodi nonnunq; per halitum digeruntur, nulla in cute facta continui solutione, vbi scilicet pus & modicum est, & bonum, tenue quoque & non in alto delitescēs. Sæpius tamen factio à naturā vel arte emissario, conceptus humor profunditur, q̃ digeratur. Quæ autem à natura fit apertio, multò tutior est, ea quæ manus opera fit, quòd si arte molienda sit, securius multò & melius scalpello aut candenti ferro illā efficies, q̃ adurente medicamento, quod raptorium appellāt. Ideò autem apertio eiusmodi, quam in abscessibus manu & arte molimur, deterior est ea quæ naturæ beneficio accedit, quòd saniem generet & in fistulā vertatur. Vbi tamen vrget necessitas, nec alio datur vti meliori & præsentiore auxilio, ea intrepidè aggrediūda est. Hæc autem modò cōmemorata incommoda vitabis, si facta cū res exposita latè apertione, pus mouentia, ad reliquiarum murationem & detergentia, laboranti particule, statim adhibueris. Caterum puris optimi, ac deterrimi notas, oraculo vltimo libri primi præfagiorum, nobis expr

Qui abscessus facile cōequantur.

Qui abscessus per resolutionē maturantur.

Melius ac tutius scalpello, quam raptorio abscessus aperiantur.

expr

expressit Hippocr. ad hunc modum inquiring: Pus il ^{Puri opti-}
 lud optimum censetur, quod album, æquale, [id est, ^{mi & deter}
 sibi vndique simile] læueq; [tangenti] & quàm ^{rimi note,}
 nimè foetidum est: Quod verò huic maximè contras ^{ex Hippo-}
 rium apparet, pessimum est. Porro reliquorum
 aliorum, tum humorum, tum solidorum corporum,
 quæ in abscissibus continentur, signa & iudicia in
 particularibus capitibus subsequentiis explicas
 buntur.

*De curatione tumorum præter naturam in vniuersum, eo-
 rum maximè, qui ex influxu humorum sunt, verag;
 apostemata vulgò dicuntur, & abscessuum, quas exitu-
 ras vocant.*

CAPVT V.



Vmorum omnium, qui præter naturã ^{Tumorũ o-}
 sunt, iam factorum, & qui non adhuc ^{mnũ curam}
 in generatione sunt, communis ac pri- ^{dorum cõs}
 ma curandi indicatio: vna est Galeno ^{indicatio.}
 libr. 13. & 14. meth. med. nẽpe vt quod
 præter naturam in particula est, & eã
 in tumorem attollit, totum vacuetur. Qui verò ad
 huc in generatione sunt, in his prior vacuatione est,
 confluentis ad affectum locum humoris inhibitiõ.
 Proinde in illis non simplex, sed composita est, mes
 dentis sollicitudo ac curandi indicatio. Hæ autem ^{Communes}
 communes indicationes pro tumoris ipsius differen- ^{curãdorum,}
 tia, & particulæ laborantis natura, plurimùm variãt, ^{tumorũ im-}
 & immutantur. Siquidem in omnibus iam factis tu- ^{dicationes,}
 moribus, & qualibet corporis parte, eius quod in- ^{pro tumorũ}
 festat vacuatio, haudquaquàm similiter administras ^{differentia,}
 tur, vt libro secundo ad Glauconem, & locis nuper ^{& laboran-}
 citatis docet Galenus: quod ex sequentiis etiam ^{te particula}
 euadet manifestum. Sed neque tisdem semper auxi- ^{variari.}
 liis, quibuscunque incipientibus adhuc tumoribus,
 & quamlibet particulam occupantibus, occurris
 mus.

30 Institut. Chirurgicalarum, Lib. I.

mus, aut quod in illis iam factum est, vacuamus: sed aliis atque aliis prout tumoris genus, & partis affectæ natura, postulat, inhibentibus fluxionem, & vacuantibus quod generatū est, præfidiis uti nimirum *Curandorū* cogimur, si rectam saltem agendorum rationem *tumorū in-* sequimur. Itaque ab iis duobus, nempe ab ipsa dispos- *dicaciones à* sitione, seu morbi essentia, & partis affectæ natura, *duobus po-* tumorum qui præter naturam sunt, curandi indica- *tissimum de* tiones potissimum desumuntur Galeno. *sumi.*

1 Porro dispositio ipsa, de qua nunc agimus, seu *Tumoris es-* morbi essentia, tria in se iuxta recentiorum placita *sentiā tria* complectitur: nempe quantitatem, qualitatem, & *in se conti-* materiam, seu substantiam quæ tumorem efficit. Quo- *vere.* rum ratione, prima illa & communis indicatio immu- *mutatur,* atque ab iis etiamnum particulares curandi *di indicationes* desumuntur. Aliter enim tumor magnus, aliter parvus curatur. Siquidem magnitudo & paruitas tumoris (ut existimant) differentiā constituit. Alia enim ratione ingens phlegmone, alia minutus herpes curatur. Aliter quoque qui per defluxionem fit, & adhuc in gignendo est, quam qui per congestionem procreatur, aut iam factus est. Sed & calidus tumor ut erysipelas, alia ratione quam frigidus, ut est œdema vel scirrhus, curatur. Quantitas igitur, in tumore præter naturam curationem euarians, est, magna, parua. Qualitas, fluxio, seu (ut loquuntur) deriuatio, & cōgestio. Materia, humor, calidus, frigidus.

2 Cæteram in partium laborantium natura, quatuor *In indicatio* potissimum spectanda sunt: temperatura, forma, *ne que à na-* matio, situs, virtus seu potentia. Quibus & quintū *tura partiu* addi potest, facilitas nempe (ut ita dicam) ac difficultas *desumitur,* sentiendi: nisi mauis istud cum Galeno, sub virtute *a. potissimu* comprehendere atque includi. Hæc itaq; communē *spectada es-* etiam illam, quæ per singula tumoris præter naturam, genera obseruatur, curationem plurimum euariant. Proinde & has omnes, quæ ab ipsis sumuntur indicationes, in curandis iis, qui præter naturam incidunt,

De Tumorib. præter naturam.

31

cidunt, tumoribus, memoriâ tenere oportet. Aliter
 nanque curatur phlegmone, aut quiuus alius tumor
 in carnofis partibus, quàm in neruofis: aliter in oculis
 lo, q̃ in genu vel collo: aliter in aderibus, q̃ in aliis
 5 partibus nō glâdofis. Breuiter particulæ ipsius labo-
 rantis, ac tumore obfesse, temperatura, & formatio,
 & situs, & virtus singulas quas ipfi in morbo curan-
 do molimur operationes, commutant: communẽ
 etiamnum intẽtione feruata, quam ſemper à morbo
 10 aſſumendam eſſe Galenus edocuit. Itaq; communẽ *Libr. 2. ad*
 nem curandorum tumorum præter naturam metho- *Glaucōẽ.*
 dum, eorum præſertim, qui ex humorum influxu *Ordo tra-*
 procreantur, ſumpta ab ipſo affectu indicatione, nul- *standorum.*
 la partis ipſius affectæ habita ratione, tradere hĩc pri- *in ſequenti-*
 15 mum inſtituimus. Deinceps eorundem, ſed maxime *buz.*
 inflammationũ, cũ in abſceſſum degenerauerint,
 vniuerſalem curationem ſubiiciemus. Poſt hæc ve-
 rô particularem ſingularum differentiarum, ſimplis-
 cium præſertim (ex quarum analogia compoſitoriũ
 20 curatio facilẽ addiſcetur) curandi rationem perſe-
 quemur. Atq; interim vbi locus expoſtulabit, non
 nulla de curandi indicationibus, quæ à laborantibus
 & tumore obſeſſis particulis aſſumuntur, ex Gale-
 nio proferemus. Quibus rectẽ intellectis, facilẽ erit
 25 cuiq; rationali medico ac chirurgo, tumores quos-
 cunque quibuiſvis partibus inſidentes, certa metho-
 do ac ratione curare.

Galenum igitur imitantes, principium curationis
 tumorum qui præter naturam dicuntur, ex humo- *Inuentio oc-*
 30 rum influxu procreatorum, ab inuentione occaſio- *caſiois prin-*
 nis ipſius affectus, deſumemus, vt ſcilicet quæ eum *cipiũ eſt cue-*
 excitant cauſæ, abſcindantur: quod verò in eo iam *rationis tu-*
 factum eſt, tollatur. Itaq; vnius differentię tumor *morũ præter*
 rum qui per defluxionem fiunt (de iis enim dun- *naturam.*
 35 taxat modò hĩc agimus) exemplo atque analogia,
 cæteras etiam differentias, quæ ex influxu humo-
 rum naſcũtur, intelligamus, vnius phlegmones bre-
 uem ac compẽdioſam curationem hĩc ſubiiciemus.

Hæc

*Phlegmone
quid.*

Hæc nãq; & frequentissimè incidit, & febres aliãq; symptomata periculosissima incitat. Nomine autè phlegmones hoc loco, non omnem calidam, ac veluti flammeam dispositionem, quam Græci etiã phlogosin appellant, intelligi volumus, sed eam duntaxat, quæ fluxionis sanguinæ soboles est, in carnosa corpora maximè incidens in qua dolor est vehemens, rubor per summa vigens, calor veluti deurens, tensio, renixus, & cùm malum increuerit, pulsationis sensus. Hanc enim inflammationem cum Galeno, & aliis, qui eum tanquàm ducè optimum sequuti sunt, Græcis scriptoribus, vt Paulo Aëtio, & Oribasio,

*Gal. lib. 13.
meth. med.
Communis omniū phlegmonarū generatio.*

propriè phlegmonem appellamus. Vt igitur rem ipsam aggrediamur hæc ipsius Galeni verba sunt, Communis omnium phlegmonarum generatio, ex sanguinis influxu est, copiosioris scilicet quàm sit parti ex vsu. Inluit autem copiosior sanguis, alia quapiam, aliisve particulis eum aliquando mittentibus, ac ea quæ phlegmone laborare incipit, recipiente: aliquando verò particula quæ affligitur, hunc ad se trahente. Partes autem quæ mittunt, vel vt copia superuacuum, vel vt qualitate molestū, vel utroq; nomine succum persequuntur. Quæ verò attrahūt, hæ morboso calore vel dolore trahunt.

Causæ coadiutrices fluxionis.

Sed & his coadiutrices causæ sunt, particule imbecillitas & ignobilitas, canalium seu viarū, per quas fit defluxio, amplitudo, meatuum quoq; partium expellentium angustia, & situs inferior, vt iam supra dictum fuerat.

TRES

scopi in curandis tumoribus, qui ex humorū influxu fiūt chirurgi proponunt.

Itaque ex omnibus his tres colliguntur recentiorum chirurgicorum turbæ, curandorum tumorum, qui ex defluxione ortum habent, intentiones.

Prima est, fluxionē auertere, ac eā oīnò intercipere.

Secunda est, dolorem demulcere, atque eam occasionem, propter quam particula fluxionem excipit, vel etiam attrahit, in totum summouere.

Tertia est, totum eum humorem, qui in partem affectam confluit, vacuare.

Cæc

De Tumorib. præter naturam. 33

Cæterùm quomodo prima intentio perfici debeat, appositè docuit Galenus lib. decimotertio *mes scopus.*
 rhodi medendi, vbi modos omnes auertendæ fluxionis, ac rationem inhibendæ phlegmones, quæ adhuc in generatione est, nobis expressit, ad hunc modum scribens. Vbi æqualiter succi inter se sunt adaptati (quod Græci plethoram vocant) imò etiam vbi purum ab excrementis totum corpus est, & succorum mediocritatem continet, dolore, & membri, in quo phlegmone sedet, calore fluxionem excitante: sanguinis missione incipienti adhuc phlegmone succurrimus. Curatur etiam plethora, tum frequentibus balneo, tum exercitatione, tum multa frictiōe. Prætereà digerentibus medicamentis, modò febris non adfit, & præter hæc omnia inedia, ac proba victus ratione, etiam si febricitet æger. Cùm verò flaua bile, vel atra, pituita, ve, aut serosis humoribus refertum corpus est (eum habitum Græci cacochymiam nominant) purgatione, quæ cuiusque suppuranti succo sit accommoda, vacuatio molienda est. Ac de iis quidem in particularibus capitibus diffusius tractabitur. Cæterùm antispasmi, id est, in contrarium reuulsio, commune est in omnibus huiusmodi tumoribus auxilium, dum fluxio adhuc valenter irruit, ut potè in principio morbi & in augmento: in fine vero status, & in ipsa declinatione, dum scilicet iam fluxio restitit, atque in membro inhæsit, & corpus totum abundè vacuatum est: vel ab ipsa quæ affligitur particula, vel à maximè vicina vacuatio molienda est.

Secunda intentio completur anodynis remediis, id est, sedantibus dolorem, item adstringentibus, & interceptantibus fluxionem. Ad hæc relaxantibus naturalibus meatibus, per quos membrum affectum consueuerat repurgari. Horum autem omnium materia lib. sexto abundè describitur.

Tertiam verò intentionem assequemur, iis quæ materia, tumorem excitatè, à loco affecto euacuant.

34 Institut. Chirurgicarum, Lib. I.

Euacuatur autem cōtenta iam in loco materia, non solum diaphoreticis, id est, euaporantibus seu resolu-
uentibus medicamentis, sed etiam repellētibus quæ
Græci ἀπορροιστικά vocant. Itaque incipientibus phleg-
monosis tumoribus, atque etiam aliis quibuscūque
qui ex humorum influxu procreantur, magis vtens
dum est reprimentibus, quàm euaporantibus, quib-
usdam exceptis casibus: ex quibus (inquit Guido)
Galenus visus est quatuor posuisse.

*Casus in
quibus non
licet repelle-
re siue reper-
cutere.*

Primus est, quando tumor eiusmodi fit in emun-
ctoriis. Secundus quando fit à materia venenosa.

Tertius, quando materia est crassa & repulsiōi
inobediens. Quartus, quando vehementer est im-
pacta. Auicēnas duos dūtaxat casus excipit: nempe
cū tumor est in emūctoriis, aut loco aliquo, ex quo
fit timēdus refluxus materiæ ad membrum aliquod
præcipuum & nobile. Alij vnicum tantum casum
eximunt, ali j sex, ali j decem, ali j 19. ali j 23.

*Repellentia
communia.*

Verum
enimvero priusquam de hac re tam ambigua, quic-
quam statuamus, sciendum est duplex esse genus re-
pellentium apud recentiores & Arabes, communia
scilicet propria. Repellentia communia, seu commu-
niter dicta sunt, quæcunque in fluxus prohibent,
compescunt ac refrenant, aut refrigerando, aut
incrassando, aut offarciendo, hoc est lento sub-
stantiæ crassamento, poros occludendo, & vias
intercipiendo, aut partes confirmando, influxum
frigore compescunt, & incrassant semperuium, la-
ctuca, psillium coryledon, id est vmbilicus veneris,
lenticula palustris, caphora. Offarciunt, id est, poros
imminenti fluxioni occludunt farina volatilis appel-
lata, è moletrinis, oui candidus liquor, amyllum, glu-
ten, & gummi genera. In summa, quæ cum lentore,
& sine morfu refrigerant. Confirmant ac roborant,
hoc est natiuam temperiem parti, restitunt, oleum
rosaceum, omphacinum, myrtinum, chamæmelinū,
absynthiū quoque, marrubium, nux cupressi, & id
genus alia, quæ affectā particulā, cui admouetur ro-
borando,

- borando, ab imminenti fluxione eam vindicant ac
 tuentur. Repellentia autem propriè dicta sunt, quæ *Repellentia*
 dum humores in partem aliquam irruunt, aut illas *ppriè dicta.*
 bñtur, vi sua illis occurrant, ac intro quasi possim
 5 nio redire cogunt. Hecq; sunt omnino crassarū par
 tium, quemadmodū attrahentia tenuium, ex his plu
 rima sunt qualitate frigida, quædam verò calida,
 vtraque tamē, id est, tam calida quàm frigida facul
 tate pollēt adstringēte, frigida propriè reprimētia di *Frigida re-*
 10 cta sunt: folia vitis, plātago, solanum, dipfacos, id est *primētia.*
 virga pastoris, & quæ pastoris bursa vocatur, glaus
 cium, balauistiū, omphacium, Rhus, id est, sumach,
 terra cimolia vulgò nuncupata, & terra sigillata, &
 eius generis alia. Et hæc quidē simplicia, ex quibus
 15 multa componi possunt, vt oxyeratū, linimentum
 ex bolo cōmuniter appellatū, cæratū Galeni, & si
 milia, quorū formulæ ex sexto libro requirēda sunt.
 Repellentia autē calida propriè dicta sunt, alumen, *Calida re-*
 galbulæ, id est, cupressi nuces, iuncus rotundus siue *pellentia.*
 20 odoratus, Græcis *χίτρος* & *ζυθος*, onix. i. blatta bizantia, lu
 pinorū farina, et vina quædā austera, ac alia permul
 ta. His positis rem vniuersam de repellentibus initio
 fluxionū adhibēdis, proloquiis duobus sequentibus
 Guidonis à Cauliaco cōplectamur, Principio om
 25 nium tumorū, qui ex humorū in fluxu fiūt, & ma
 ximè phlegmonosorū reprimētia, ppriè dicta cōdu
 cunt, his decē solū exceptis. Nempè cū tumor parti
 bus adenosif, aut cū ex materia venenosa fit, vel ad
 modū crassa, & ad repellendū inepta, atque etiā cū
 30 humor particulæ laborati iam vehemēter est impas
 cius. Si tumor criticus est, aut à cā primitiua excitatus.
 Si in corpe plethorico est, aut admodū debili. Si sedē
 habet iuxta principē aliquā partem. Denique si cum *Gale. 2. ad*
 vehementi dolore incidit, tunc enim mitigatoriis au *Glauc.*
 35 xiliis & non repellentibus propriè dictis opus est.
 Secundū proloquiū ad hunc modū habet. In prin *Secundū pro*
 cipio omnium tumorū præsertim phlegmonosorū *loquium.*
 cōferunt reprimētia cōia, tribus duntaxat exceptis,

Si glandulosas partes, quas vocant occupent, si critici fuerint, si ex materia venenosa procreati sint, atque in omnibus his, præcipuè verò quando ferè constitit fluxio, & tumor propè modum factus est, oportet materiam ipsam resolvere, ac discutere, ad motis ipsi tumentis particulæ diaphoreticis, non quidem mordacibus, & valde acribus, sed lenibus potius, ac moderatè calidis & humidis, maximè verò in tribus vltimis commemoratis, in quibus stuedendum materiam attrahere ad locum tumore obfessum, ipsumq; tumorem augere, & materiæ iam fluxæ & cõmixtæ refluxû prohibere. Quod interdum quidè facimus emplastris attrahentibus: nonnîquam verò cucurbitulis dolenti loco affixis, vt docet Auicennas. Sit ergo regula seu canon artis generalis, in principio omnium tumorum, qui ex humorum influxu creantur, exceptis tribus paulò antè memoratis, sola ac pura reprimentia esse adhibenda. In augmento verò ipsis repellentibus, nonnihil ex iis quæ discutunt, admiscendum. At in statu & paulò antè statum, æquis portionibus miscenda sunt reprimentia discutientibus. Cùm autem declinatio, vel finis status adfuerit, solis resoluentibus & relaxantibus vti licet. Breuiter quandiu humor adhuc affluit, repellendum est: vbi verò iam resistit fluxio digerendû. Verùm si medio modo res habeat, id est, partim iã aliquid fluxerit & loco in hæserit, partim verò aliquid adhuc influat, mixtis auxiliis vti oportebit, hoc est, partim resoluentibus, partim regerentibus, siue repellentibus. Coëuntibus enim vnâ contrariis indicationibus, compositum quoque esse præsidium oportet, vt 13. Therap. Galenus ait.

Porro hæc omnia sanè intelligenda sunt, vtpotè si tumor præter naturam resolutione seu (vt communiter dicunt) viâ resolutionis terminari debeat. Auxilia autem, quibus singulas modo dictas intentiones exequimur pro varia materia tumorem excitante,

excitante, in sequentibus particularibus capitibus,
& in sexto libro describentur.

De curatione abscessum in vniuersum.

- 5 **C**Aeterum si phlegmone, aut quouis alius tu- *Curatio tu-*
mor degeneret in abscessum eius curatio per *morū in ab-*
initia præstatur Gal. lib. 2. ad Glauconem, per *cessum quē*
mitigatoria auxilia, quæ Græci chalastica vocant, *exituras vo-*
id est, relaxantia, siue remittentia, cuiusmodi est me- *cāt degene-*
dicamentum, quod à Galeno tetrapharmacum ap- *rantium.*
pellatur, molle quidem & anodynum. Cui ex sen- *Tetraphar-*
tentia eiusdem 13. Therap. mellis paululum admi- *macium.*
xtum sit, oportet. Constat autem tetrapharma-
cum, ex ceræ, resinæ, colophonix picis, seu taurini,
15 pari portione. Procedete verò tēpore, ad ea quæ cō-
coquendi, seu maturadi, ac suppuradi vim habent,
transeundum est. Quæ autē in aliam speciem, hoc est,
in alienā substantiā, & toto genere præter naturam
degenerauerūt, ea per chirurgiā summouēda sunt.
20 Porro in iis amouendis iuxta Galeni consilium 14.
Therap. id agere oportebit: vt rationibus, quibus id
fiat, quod intēdis, pēsitatis, optimā semper earū de-
ligas. Sanē optimæ rationes tripliciter indicantur: *Optimā cu-*
nempe temporis curandi breuitate, curando citra *radī ratio-*
25 dolorem, & maximē tutē curando. Rursus vt tuto *nē triplici-*
cures, tria propria sunt quibus intentus sis oportet. *ter indicari.*
Vnum primumq; : vt omnino absolutionē ope-
ris consequaris. Alterum, vt sicubi hunc non conse-
30 quaris, saltem cubantem nō lædas. Tertiū, vt vitium
non facilē reuertatur. His cōsiderationibus si opti-
mam curationis viā indicaueris, inuenietur quidem
in omnibus modō propositis tumoribus, quando
potius chirurgiæ, & quādo potius medicamentorū
ope sit curandum. At chirurgiæ quidem studium
35 in his potissimum, quæ nunc dicta sunt, hoc est in
tumoribus, qui toto genere sunt præter naturam ad
Interemptionem eorum festinat, atque prorsus vt hi
tollatur sibi proponit. Quod si perficere nequeat,

38 Institut. Chirurgicarum, Lib. I.

proximum illud consilium habet, vt vitium transfe-
rat, veluti in hypochymatis, id est suffusionibus.
Quod verò ex medicamentis petitur, primùm huc
tendit, vt quod præter naturam est, tum in pus ver-
tat, tum putrefaciat: hoc verò secundo loco destinat. 5
Hæc Galenus. Itaque, vbi partes, quæ phlegmone
infestantur, vehementiùs pulsitant, sic vt iam despe-
retur de horum, citra pus, curatione veteres omnes
(inquit Galenus 4. Therap.) eiusmodi admovent
medicamenta, quæ celerrimè pus mouent: antè verò 15
nequaquàm.

Ex lib. 4.
The. meth.

Quanquàm sicubi cataplasmate quod calfaciat
humectetq; [& ad suppurationem perducatur] illis
nuntur quæ phlegmone infestantur, id nequaquàm
ex prima ratione fit, hoc est, vt remedium affectus,
sed vt symptomatis mitigatio, vt potè doloris. Si
quidem ipsius phlegmones remedia ficciorum sunt
virium. Et paucis interiectis subdit. Compendiosa
obfessorum phlegmone partium curatio, per id ge-
nus præsidia [hoc est, per ficcantia & resoluentia]
obitur ac perficitur, quæ sanè vel affectum prorsus
summouent: vel si quid exiguū quod suppuret, res-
liquerint, alterum medicamentū acre, quod educere
pus queat, requiritur: vel si tenuis circumposita cutis
sit, velisq; celerius explicatū ægrum, sectione seu 25

Auicennas.

incisione opus est. Et hoc sanè est, quod dicebat Aui-
cennas: nempe curationē apostematis, quatenus apo-
stema est, extractionem esse materiæ extraneæ, quæ
excitat apostema. Auxilia autē quibus mouere pus
expedit, & alia quæ suprà dicta sunt perficere ex
particularibus capitibus, & ex libro sexto, de sup-
purantibus requirenda sunt. Porro suppurato

Quando po-
tissimum se
candi sunt
abscessus.

iam abscessu, aut trāsinutato, vel valenter impa-
cto, si pus, aut alia quæuis materia ibi cōtenta non discu-
tiatur, vel si tempore conuenienti, & dum iam tem-
pestiua adest occasio, citra manus operam, non ape-
riatur: secare exitum ei quod digestionī, non celsit
oportet. Potissimè verò id moliedū erit, si timeatur
futura

futura aliqua erosio: vel aliud quoduis nocumentū,
imo si necessitas vrget, ex aduerso etiam nū aperiri
debet, & quā promptissimē ac tutissimē fieri pote-
rit, materia extrahi, ob causam superius adductam.

- 5 Tutius autem ferro, quā medicamentis causticis, & adurentibus aperitur: modō nihil ex iis, quæ
de aperiēda vomica libro sexto dicentur obstiterit. *Tutius ferro quā medicamentis adurentibus suppuratus tumor aperitur.*
- 10 Porro apertio ipsa, seu puris emissarium fieri debet pro ratione tum copię materię ibi collectę: tum etiam ipsius loci affecti. Quōd si computruisse portio aliqua suppurantis partis videbitur, excindi eā
est necesse, ad formam seu similitudinem folij oliuę
15 vel myrti, quo facilius sanescat. Cæterū Galenus maximas sectiones semper vitādas esse præcepit, sabinabatq; huiusmodi suppuratas particulas, etiam inguina & axillas sola vt plurimū incisione, & medicamentis valēter siccantibus. Quōd si aliquando
20 excindere aliquid propter multitudinem, nō puris modō, sed etiam corruptarum partium fuit opus, cōtentus erat sectione nō maiore quam myrti folium magna. Ex amplis enim sectionibus, vbi ad cicatricem perducta est particula, præterquā quod tur-
25 pissima redditur, fit etiam imbecilior, & ad motum ineptior. *Noxe ex amplis sectionibus.* Fiunt autem huiusmodi sectiones, myrtaceum folium imitantes, in iis potissimū tumoribus, *sectio i suppuratis bubonibus cur fiat per trāsversum.* qui in axillis & bubonibus suppurant. Et in iis quibudem longitudo per transuersum ducta esse debet, *Septē attendenda i apertione iā suppurati abscessus.*
- 30 non autem per cruris aut corporis rectitudinem.

Quippe ita cū crus aut brachium inflectimus, naturaliter cutis sibi applicatur. In aliis verō locis incisione simplici ferē semper vtimur. In ipsa autem apertione siue incisione, septem potissimum sunt attendenda iuxta recentiorum placita.

35 Primū, vt sectio fiat eo loco, quo materia continetur. Secundū, vt fiat in loco inferiori, quo melius purulenta illa colluies vacuari possit.

40 Institut. Chirurgicalium, Lib. I.

3 Tertium, vt fiat secundum rugas & processum
4 musculorum. Quartum, vt vitentur nerui, venæ
5 & arteriæ, quoad fieri poterit. Quintum, vt non
6 rota materia semel atque affatim educatur, præser-
tim in magnis abscessibus, ne scilicet ex nimia subis-
taq; inanitione, & spirituum resolutione: virtutis
sequatur prostratio. Sextum, vt blādus, & minis-
mo quàm fieri potest dolore, locus tractetur.

7 Septimum, vt facta aperture loci detergeatur,
Duo spectā carne impleatur, & ad cicatricem more aliorum vl- 10
tur Galeno cerum perducatur. Galenus autē lib. 13. Therap.
z aperture duo potissimum monet esse attendenda in sectione
suppurati suppurati abscessus, ad hunc modum scribens: Sin 11
abscessus. aliquando puris copia medicamenta superet, nec ea 12
videantur tibi totum digerere posse, secare exitum 13
1 ei quod digestionem non cessit, eo potissimum loco 14
2 oportet, quo est editissimum. Quippe tenuissimam 15
etiam illic inuenies cutem. Memineris præterea in 16
sectione: & alterius indicationis, quæ ad fluxum 17
petinet, atque ad ambo respiciens, ita quod suppu- 18
rauit, incide: ac deinceps medicamentum aliquod 19
eorum, quæ sine erosione siccent, impone. 20

Detergen- Auxilia autem deterforia post apertam vomica
tin. purgando vlceri fordido accommodata, sunt mollia
tomenta vel lintea, concerpta linamenta, emplaz- 21
sira, & vnguenta, quæ in particularibus capitibus,
Hic variāt & in sexto libro censebuntur. Primis diebus sufficit
exemplaria. Guidoni vitellus oui alumine zuccharino inspissas-
tus quo remedio etiā utebat, Gulielmus à Salicero.
Postea verò deueniendum est ad mel rosatū, & mū- 30
dificatiuum ex apio: & postremò, ad vnguentum
Apostolorum, & Aegyptiacum, si res ita desideret.

Vnguenta Suprà verò ad mouēda vnguēta, basilicon, diachylō
super tumo & diaphœnicon vulgò nūcupatū, atq; alia id genus
re iā aper- quæ ad vlcera instituuntur. Vbi enim abscessus ses- 31
tum appli- cueris, more aliorū vlcerū curari debetur, Galenus
canda. lib. 13. Therap. post excisam cutim in phlegmonis
axillarum & inguinum, medicamento quod Græ-
ci man

ci mannam, id est, thuris purgamentum vocant, af *Manne &*
 sectam partē implebat. Hęc autem leui adstrictione *thuris vsus*
 prædita est. Sed & mitigare (inquit) prius incisam *post incisio-*
 partem, quantum poscere videbitur, oportebit: for *nem, & eo-*
 5 mentis primum, dein cataplasmatibus, mox humectan *rum vires.*
 te aliquo medicamento, aut nō ficcante, singulis sciz *Partem in-*
 licet extrinsecus impositis. Nam in ipso vlcere, *cisam prius*
 tum manna (vt dictū est) tū ex præsidis, quę linteolis *mitigādā*
 excipiuntur: primum quidē ea quę pus citant, dein *esse.*
 10 ea quę expurgant, sunt imponenda. Post quę si cas *Quę in vl-*
 uitas etiā mansit, quę impleant adhibēda sunt: sin *cere ponēda:*
 aliter, ea quę cicatricem inducūt. Porro si laborans
 nec ferro candente, nec scalpello, fieri sectionem præ
 mollicie admiserit, medicamentis adurentibus erit
 15 emolienda apertio. Ad hoc autem laudat Auicennas, *Anicennas,*
 nas semen lini, fermentum, & sterus columbinum. *ī fine tract.*
 Hęc præstantiora efficies si cum sapone molli, aut *1. fen. 3.*
 muccagine seminis sinapis miscueris. Cæterum ru *lib. 4.*
 ptorium seu causticū, quod fit ex calce, & sapone,
 20 in hac re principatum obrinet. Hactenus de tumori
 bus præter naturam in vniuersum: ac deinceps de
 particularibus eorum differentiis.

De phlegmone vera, & aliis à sanguine procreatis tumo-
ribus. CAP. VI.

25



30

30 **A**bsoluto iam in vniuersum sermone de
 tumoribus, qui præter naturam consis
 stunt, tempestiuum est, de singulis eorū
 differentiis particularim disseramus, à
 phlegmone sumētes exordium: vt quę
 & frequentissimē incidat, & sympt^a mata (vt Ga
 lenus ait) periculosissima excitet. Itaq; phlegmos
 ne Galeno lib. primo de morbis & sympt^a matis, bi
 fariam accipitur. Vno modo communiter, veterum
 35 quante illum fuerunt, more pro omni partium ve
 luti inflammatione, & quadam efferuescentia, hoc
 est, pro omni calida, ac veluti flammea quadam dis
 spositione, quam Græci propriē *αἰσχροίτη* appellant. *Duplex ac-*
ceptio Phle-
gmones.
1
Phlegmone
prophlogosi.

Altero modo à Galeno & iunioribus accipitur

Phlegmone pro tumore ex sanguine verò ac puro, hoc est optimo, ac mediocrem crassitiem obtinente, procreato.

pro inflama Et hæc quidem generis sortitur appellationem: atq;

tionem ex san inflammatio æquiucòcè generi Latinis nominatur,

guine opti- Græcis verò absolute phlegmone. Ea autem recens

mo. tioribus duplex est: vera scilicet, & non vera. Vera

Phlegmone phlegmone fit à sanguine benigno, hoc est, qualitas

duplex. te, & substantia seu cōsistentia optimo, sed copiosio

1. Vera. re quā fit parti ex usu. Non vera & illegitima phle

2. Nō vera. gmone, ex prauo & non naturali sanguine efficitur.

Sanguis qd Est autem sanguis, humor calidus & humidus ex

et quatuor- temperationi parte ipsius chyli progenitus. Et hic

plex. quidem duplex est: Naturalis, & nō naturalis. Nas

turalis, est humor calidus & humidus, substantia

quidē mediocris, colore verò multū rubens, odore

autē & sapore dulcis, mitis, ac benignus. Verū non

naturalis ille dicitur, qui ab isto nuper descripto de

flexit, degenerauitq;: intra tamē suæ latitudinis ter

minos, quos si transgreditur, non iam sanguis: sed

alius humor venit appellandus. Hoc autem (sanguis

Sanguis bi- nem inquā degenerare à propria sua natura) cōtin

fariam de- git dupliciter. Vno modo (vt aiunt) in se, hoc est, ras

generat à tione sui permutata propria eius substantia, citra al

propria sua terius admistionē, Altero modo, per alrū seu rationē

natura. alterius. Et per se quidē adhuc bifariam nempe: vel

quā eius substantia crassior est: aut tenuior quā

debeat: vel quia aduritur, & quod ex eo tenuius est

in flauam bilē mutatur: quod verò crassius, in atrā,

idq; absque separatione. Alterius verò ratione sang

guis fit non naturalis, quando alius humor illi per

miscetur. Quòd multifariam contingere potest,

prout scilicet variæ species bilis, pituitæ, aut melan

choliæ, cum ipso sanguine misceri possunt. Ex qui

bus liquet, quòd ex sanguine quatuor species seu

Quatuor differentia tumorum præter naturam procreantur.

differentia Primum ex sanguine naturali & benigno genera

tumorum ex tur vera phlegmone. Ex sanguine verò illauidabili

sanguine. factō

facto per admixtionē aliorum humorum, tres enas-
cuntur differētiæ phlegmones non veræ, atq; illegi-
timæ: quippe quod tres ali j humores (pituita inquā
& vtracq; bilis) ipsi sanguini permisceri possunt.

- 5 Ita q; si flaua bilis sanguini cōmisceatur, quod ex
ambobus tum est cōflatū, vocatur phlegmone ery-
sipelates: si pituita, phlegmone œdematodes: si
atra bilis seu melācholia, phlegmone scirrhus. At
ex sanguine illauidabili & maligno per aduersionem
10 & corruptionē propriæ substantiæ, pro ratione tes-
nitatis aut crassitiei ipsius, generantur vel carbun-
culi, qui Græcis anthraces dicuntur: vel gangræna
vel sphacelus. De quibus in sequentibus dicemus.

De causis signis & iudiciis phlegmones.

- 15 **P**hlegmones causæ sunt tres: vt & aliorum *Causæ phle-
gmones. 3.*
mnium tumorū præter naturam qui per deflu-
xionem fiunt. Primitiua scilicet, quā & præ-
gressam & euidentem appellamus: antecedens, & sa-
20 coniuncta. Euidentes causæ inflammationis, sunt
occasiones externæ: vt contusio, disruptio, conuul-
sio, fractura, vulnus, vlcus spontaneum, luxatio, &
alia id genus, quæ quatenus dolorē in laborāte parti-
cula excitāt, fluxionē accersunt. Antecedēs, vt san-
25 guinis exuberātia, probi quidē & inculpati: vt cum
ad immoderatā venarum repletionē venæ pertine-
gunt. Tunc enim cogitur sanguis (veluti quid su-
perfluū) ad partē aliquā vel imbecillā, vel plus iusto
exalactam: vel dolore affectam, effundi, ac deflue-
30 re. Vbi tandē cōpingitur, atq; impactus manet, nisi
protinus ab initio reprimatur: vt iā suprà in capite
vniuersali dictū est. Ad quod subinde recurrēdū tibi
est: vt absolutam magis particulariū tumorum, de
3. *Cōiuncta.*
quibus nūc agimus, intelligētiā cōsequaris. Cōiū-
35 cta causa seu cōtinēs, est ipse sanguis, q; iā loco affe-
cto infartus est. Phlegmones notæ sunt, tumor, seu
incrementū ptis supra naturalē habitū. Calor vehes-
mēs, adeo vt mēbrū cōburi videat. Rubor p
summa *NOTAE
vere ac le-
gitima phle-
gmones.*
vigens

44 Institut. Chirurgicarum, Lib. I.

Libr. de tu- mo. præ. na- tur. & 13. metho. vigens, qualis ex balneis, vel igne, aut quouis alio modo calfactis aduenit. Dolor vehemens, nisi membrum difficilem omninò sensum habuerit. Pulsus, seu pulsationis sensus in profundo molestus. Tensio seu extensio membri, quam non modò ipsi tantùm s deprehendimus, sed etià ipse æger proprio sensu aduertit. Renixus partis tangenti eà, pro tensionis modo. Et si quæ sint alia, quæ præsentē sanguinis abundantiam in parte aliqua testantur. *Phlegmone tempora 4. IUDICIA.* Phlegmone quatuor habet tempora, principium, augmentum, 10 statum, & declinationem: nisi saltem fluxio intrò rescurrat, vel repellentibus medicamentis statim reprimatur. Vbi autem quatuor hæc tēpora percurrerit, necesse est vt eius materia vel resoluatur atq; exhalet vel suppuretur, vel corrumpatur atq; putrescat, 15 vel in scirrhosam ac lapideā duritiem abeat. Et horū quidem omnium signa ex capite vniuersali sunt requirenda: vbi explicatæ sunt notæ omnium temporum, & modorum terminationis tumorum præter naturam, quæ vulgò apostemata vocāt. *Symptomata quæ phlegmone curantur in- terpellant.* Cæterum 20 phlegmonem plerunque mala comitantur symptomata, quæ eius curandi rationem interpellāt, immutantq;. Cuiusmodi sunt, dolor vehemēs, partem admodum sensibilem occupans: recursus materiæ ex glandulis (quas Græci adenas & vulgò emunctoria 25 vocant) ad partes internas: item partis affectæ mortificatio (quam corruptionem esthiomenicam appellant) ex nimia scilicet refrigeratione & valido infartu, ipsius materiæ (quæ inflammationem committerbat) proueniens: durities quoque lapidea & pene indissolubilis, vulgò sclerotica nūcupata, ex perperam 30 ac temerè facta tenuioris humoris dissolutione. Quocircà diligenter ac sapius quidem obseruare oportet, in curandis tumoribus, qui præter naturam consistunt, quò quisque tandem sit euasurus, & quæ inopinatè superuenerint accidentia, vt circa id quod apparet, & virgens est, maximè insistamus.

Galenus.

Quod nos probè Galenus admonuit libro secūdo ad

ad Glauconem, & 13. Therap. ad hunc modum in-
 25 quies: In morbis quidem qui difficulter resoluun-
 25 tur, verendum est, ne eorum reliquæ præduræ relin-
 25 quantur. Quare in singulis resolutionibus attendes
 5 re oportet, ad quid transmutetur omnis, cuius curas
 25 tio suscipitur, tumor. Nam ea quæ cum fortiter exic-
 cantibus agitur, reliquias præduras operatur. Hæc
 Galenus. Sed tempestiuum est, ipsius phlegmones
 curationem aggrediamur.

10

*Ratio curandæ phlegmones ex defluxione concitata, corpo-
 ris summa occupantis.*

15 **C**VM inflammatio, quæ Græcis peculiariter phle- *Methodus*
 gmone dicitur, ex influxu sanguinis, copiosis *curandæ*
 15 ris scilicet quàm sit parti ex vñu, nascatur: flux *phlegmones*
 xio autem incipiēte adhuc phlegmone, parum fiat, *que adhuc*
 partim iam facta sit: geminus sanè erit curationis *in generatio*
 20 ipsius adhuc incipientis phlegmones scopus, nempe *ne est.*
 20 vacuandi quod influxit, & prohibēdi quod influit,
 Porro fluxionem inhibebimus, si humorē influen-
 tem retraxerimus ac repulerimus, si afflicte parti *Fluxio qui-*
 bur addiderimus, & si quid fluxionē accersit, sum- *bus probi-*
 25 mouerimus. Retrahemus autem atque in contrariū *beat.*
 25 humorum defluxum reuocabimus, venæ sectione, si *1. Retractio*
 quidem vires valeant, & ætas permiserit. Sin minus,
 admotis cucurbitulis, vel ligaturis, vel frictionibus,
 vel calfactis partibus, directè affecto loco respondē-
 tibus. Regeremus autem repellēmūve, admotis *2. Repulsio.*
 30 medicamētis, quæ hac facultate prædita sint, hoc est,
 quæ aliò fluxionem propellere ac transmittere poss-
 sint. Causas verò defluxionem ad partem iam phle- *3. Cause*
 gmone obsessam accerfentes summuemus, particu *summotio.*
 lam ipsam, si imbecilla sit, confirmātes, roborantēs
 35 ue: si laxa nimis, adstringentes: si calida est, vt esse so-
 let, refrigerantes: & dolorem, si discrutiat, demul-
 centes: ac corpus vniuersum, si sanguine abundet,
 & parti contagium transmittat, venæ sectione va-
 cuan

46 Institut. Chirurgicarum, Lib. I.

cuantes: de quibus omnibus mox dicitur.

Vacuatio 2 Vacuamus autem quod iam influxit, & in partē
ius quod iā affectam se recepit, non modò medicamentis iis quæ
influxit. digerunt, hoc est, discutiunt ac resoluunt, sed etiam
Gale. 13. quæ astringunt, & refrigerant. Magisq; profectò
Therap. (inquit Galenus) ad incipientes phlegmonas, frigidis,
 astringentibusq; quàm iis quæ digerunt est vtē-
 dum. Atque etiam magis, vbi crassum quod cōfluit
 non est. Sed si sanguis in particula, quam phlegmonē
 neprehendit, vehementer est impactus, non est am-
 pliùs repercutientibus vtendū: vt in præcedentibus
 dictum est, sed tum digerere est tempestiuum. In ve-
 terascente quoque inflammatione, quæ post totius
 corporis vacuationem, aliamq; idoneam curationē,
 duritiem quandam ac nigrorē in partibus reliquit,
Scarificatio. sanguinem scarificationibus auferre (Galeno etiam
 autore) non est incommodum. Atque hæc summas-
 tim ac vniuersali quadam methodo dicta sint de cus-
 ratione inflammationum, quas Græci peculiariter
 phlegmonas appellare consueuerunt, ex humorum
 defluxu incidentium. Quæ certè rationali medico, &
 in artis operibus exercitato, satis esse possent. Verū
 enim uerò quoniam chirurgiæ candidatis, & non ita
 eruditis, hæc scribenda suscepimus, non abs re, neq;
 alienum à nostro instituto factum videbitur, si quæ
 de phlegmonarum curatione nō modò veteres me-
 dici, sed & recentiores chirurgi nobis scripto reli-
 querunt, post hanc vniuersalem ac compendiariam
 methodum sermone magis peculiari, & practico
 subiiciamus. Itaque rationem curandi phlegmonem
 præter regimen (vt vocant) vniuersale, in quatuor
 scopos, seu intentiones, particulares, reuocare solent
 posterioris huius seculi chirurgi: nempe in debitam
 vitæ rationis obseruationem: influxionis inhibiti-
 1 nem, seu materiæ (quod aiunt) antecedentis auersio-
 2 nem: in humoris, qui iam se in parte recepit (quam
 3 materiam coniunctam vocant) vacuationem, & in
 4 symptomaticum correctionem.

Prim

De Tumorib. præter naturam. 47

Prima itaq; intentio perficitur debita sex rerum 1
vulgò non naturalium appellatarum & eorum quæ Prima intē
illis annexa dicuntur administratione. tio quæ est

Sunt autē res non naturales à medicis dictæ nume vita institu
ro sex, vt statim ab initio huius operis dictū est, aër, tio.
cibus & potus, motus & quies, somnus & vigilia, Res non na
inanitio & repletio, animi affectus, seu accidentia. turales.

Quæ omnia (quoniā phlegmone subindē febres accē
dit) ad frigiditatē, & moderatā humiditatē spectare
10 debent. Pro quibus sequentia subiecinus præcepta.

Aërem syncerum & clarum eūdemq; frigidiuscu Aër.
lum deligito.

Victū tenuē frigidū & moderatē humidū seruato. Cibus.

Vinum debile & pauciferum, id est, quod in tem Potus.
15 perando haud multam aque mitionē sustinet (Græ Vinum oli
ci oligophoron vocant) assumito. Quòd si febris ve grophoron.
hemens (vt sæpè assolet) accesserit, abstemius esto. Motus.

Partem phlegmone obsessam ne exercitato.

Quietem quantum potes, præsertim si plurima suc Quies.
20 corum abundantia sit, seruato.

In somno & vigiliis modum teneto. Somnū diur Somnus.
num, & præsertim meridianum, vitato.

A crapula & ingluuie summoperè caueto. Repletio.

Alius fusa, & mollis tibi semper esto, atque eam Inanitio.
25 interdū, si opus est, clysteribus subducito.

Iram, clamorem, contentionē, vt inimica, fugito. Animi pa

A veneris vsu, velut ab hoste infestissimo, te sub themat.
frahito. Venus.

Secundus scopus curandę phlegmones, qui est flu 2
30 xionis auersio, pficitur venę sectione, si vires & etas Auersio flu
ferār. Semper autē in omnibus mēbris ē regiōe siue ē xionis, qua
directiō (quod Græcè κατὰ τὴν dicitur) siue reuellere, id secunda est
est, in contrarium retrahere velis, siue ad latus deris intentio.
uare: vena secanda est, etiam si plethora adsit: ē dire Vena semp
35 cto autem sunt dextra dextris, & sinistra sinistris. è directio se
Ergo si ophthalmia oculum dextrum infestet, vel canda.
synanche partem gutturis dextram occupet, huius
meralis vena, vel eius loco, (si non appareat) alia,
statim

48 Institut. Chirurgicarum, Lib. I.

statim per initia fluxionis, in brachio dextro incidenda est. At si humor in genu confluat, secanda est cubiti vena, vel interna, vel media, nisi alterū crus magis scarificare, aut in eo venam pertundere, vt alicubi Galenus consuluit.

*Vene secan-
de electio à
laborante
particula
indicatur.*

Itaq; venæ secandæ electio, & auersionis in contrarium (quæ ab Hippocrate antispasis dicitur) inuentio, à laborante particula, & curandi membri positu præstatur, indicaturq; vt 13. & 14. meth. med. ac sæpè alibi Gal. docet. Cæterum corpus ipsum, quod phlegmone occupatur, non modò cum plethoricum est, sed etiam vbi morbi magnitudo suadet, cum mediocritatem succorum continet, sanguinis emissionem vacuamus, si saltem Galeni consilium sequamur, qui lib. 13. metho. medendi ita fieri præcipit, inquit: Dolor siquidem, & membri, in quo phlegmone sedet, calor, etiam si purum ab excrementis totum corpus sit, fluxionis causa fiunt. Expedit autem tunc partius id efficere [hoc est, sanguinem detrahere] ac vacuare quidem, prout maximè tum ætati laborantis, tum naturæ congruit. Aestimatis præterea tum anni tempore, tum regione, tum hominis ipsius consuetudine. Conferunt etiam non parùm ad retractionem sanguinis in partem affectam confluentis, motus, frictio, & ligatura partis oppositæ, sed maximè celebrata prius (vt dictum est) sanguinis detractione. Itaque si in manibus phlegmone est orta, crura exercitanda sunt, vincienda, fricanda. Sin in cruribus, manus. Sed hæc magis ad medicum quàm chirurgum pertinent.

3 Tertius scopus qui est humoris in parte recepti vacuatio.

Tertium scopum assequimur solis, per initia phlegmones, repellentibus (exceptis prius memoratis casibus) parti inflammatione laboranti admotis. Vacuatur enim (vt Galenus ait) quod impletum est, non modò medicamentis iis quæ digerunt, sed etiam quæ adstringunt & refrigerant: cuius generis sunt, quæ repellentia & reagentia dicuntur. In augmento autem ad præsentem intentionem, id est, ad vacuandum

cuandū quod iam influxit, simul & prohibēdum ne
 deinceps amplius aliquid confluat, miscenda sunt di-
 gerentibus reprimētia: ita tamen vt horum copia *Reprimētia*
 ac potētia, illis adhuc præpolleat. In statu verò æquis *in augmēto*
 5 portionibus inuicē cōmiscenda sunt, ac mitigatoria *ppollere de-*
 (cūm vehementissimi tunc dolores adsint) applican- *bent digerē-*
 da. At in fine status, & in declinatione, solis digeren- *tibus.*
 tibus quod impactum est, vacuare oportet, si saltem
 ipsa phlegmone resolutione seu discussione termi-
 10 nari debeat. Si verò degeneret in abscessum, & fieri *si phlegmōe*
 non possit, vt puris collectio ac eruptio impediatur, *in abscessū*
 tum suppurantibus, aperientibus, ac detergentibus *degeneret.*
 medicamentis vti licebit. Porro exiccantia cons-
 15 ferunt in fine vtriusque affectus, hoc est, phlegmos-
 nes & abscessus. Hæc enim quod reliquum humo-
 ris est prorsus absument. Verū facta sectione in
 abscessu iam suppurato, medicamētū quod sine eros-
 sione siccet imponendū est, vt in sequentibus dices-
 20 tur. Ad incipientes autem phlegmonas repellendo *Repellentia*
 aptissimum auxilium est Galeno oxycraton, [quod *circa initium*
 Latini puscā aquosā nominant. Est autē mistus *phlegmones*
 ra ex aqua & aceto, ita quidem temperata, vt adhuc *admonēda.*
 bibi possit: spongia ergo hoc ipso oxycrato perfusa
 25 atque imbuta, parti, in qua phlegmone residet, im-
 ponenda est. Loco autem oxycrati, Galeni ipsius *Oxycraton.*
 consilio, sumi potest vinum aliquod austerū, vel fris-
 gida solū in particulis scilicet, quæ circa artus sunt.
 Galeni verba hæc sunt. In particulis, quæ circa artus *Li. 13. meth.*
 30 sunt, sat fuerit [per initia phlegmones] etiā spongiā *med.*
 vel ex frigida aqua, cui paululum aceti sit immixtū,
 vel aqua sola imponere, sicut etiam ex vino aliquo
 austero. Ad idem summè efficax est eiusdem Galeni
 35 cataplasma, ex semperuiuo, & malicorio in vino *Galeni cata-*
 decoctis, rhu. i. sumach, & polenta. Repellit enim *plasma lib.*
 quod influit stringendo, atque id quod continetur *2. ad Glau.*
 exiccando vacuat, affectasq; partes vtroque nomi-
 ne confirmat & corroborat. Hoc remedium à res-
 centioribus, ex Auicenna, sub hac formula postea

50 Institut. Chirurgicarum, Lib. I.

descriptum est. Recipe succi semperuiui libram ¹⁰
Fen. 3. lib. 4. vnam, vini quod crassæ sit substantiæ, & sapor ¹¹
tract. 1. c. 3. ris acerbi lib. semissem, farinæ hordei quar. vnum ¹²
 corticis malorum granatorum, & sumach pulueris ¹³
 3 satorum singulorum vnciæ semissem, coquantur, & ¹⁴
Halyab. fiat linimentum. Aliud quod ad idem efficaciter au ¹⁵
Linimentu. xiliatur, ex Halyab. Santali albi & rubri singulorū ¹⁶
 drach. tres, memithæ, id est, glaucij drach. duas, terre ¹⁷
 cimoliæ, boli armenicæ, singulorum drach. vnam & ¹⁸
 semissem: omnia in tenuissimum pollinem terantur, ¹⁹
 & diligenter cribrentur, postea dissoluantur in suc ²⁰
 co semperuiui, aut portulacæ vel lactucæ, & fiat li ²¹
 4 nimentum. Aliud ad incipiētes etiam inflammationes ²²
 phlegmonosas, tritum & vulgare, quod & recentis ²³
 bus vulneribus, & nuper acceptis contusionibus, ²⁴
 valde vtile est. Constat oui-cādido liquore, rosaceo, ²⁵
 & stillaticia rosa, hoc est, aqua rosarū. Panniculi hoc ²⁶
 imbuuntur, parti inflammatae apponuntur, & sub ²⁷
 indè mutatur. Cæterum plurima alia cum simplicia, ²⁸
 tum composita medicamenta, ad incipientes phleg ²⁹
 monas stringendo, & fluxionem reprimendo con ³⁰
 ferunt, quæ partim ex libro sexto partim ex aliis au ³¹
 toribus, quide hac re scripserunt, requirenda sunt. ³²
 Sed hæc ad præsens nobis visa sunt sufficere.

Remedia in Inter remedia, quæ phlegmonarum incremento ³³
phlegmo-t.) forinsecus admota subueniūt, efficaciter auxiliatur ³⁴
narum cre- rosaceum, Græci rhodinon vocāt. Hoc enim partim ³⁵
mēto ad mo repellit, partim per halitum digerit: quippè quod ³⁶
uenda. olei rosæq; mediam ad vnguem naturam obtineat. ³⁷
Lib. 3. de Itaque rosaceo paucula quædam inest adstrictio, quæ ³⁸
simp. medi. tenues ipsius particulas præuerrere quidem (inquit ³⁹
 Galenus) nequit: sed vbi illæ altius penetrauerint, ⁴⁰
 in ipsam iam superficiem agere incipit, pro viribus ⁴¹
Rosaceu in constipando, contrahendo, ac condensando. Proinde ⁴²
phlegmona- fit, vt rosaceum phlegmonarum augmentis opti ⁴³
2.) rū aug- mum sit & aptissimum præsidium. Aliud Aui ⁴⁴
mēto optimū cennæ, phlegmonarum incremento valde efficax. ⁴⁵
esse p̄sidiū. Concipit foliorum maluæ M. vnum, absinthij, ros ⁴⁶
 sarum

De Tumorib. præter naturam. 51

farū singulorū vncię semissem, farinae hordei vnciā
vnā, olei chamæmelini quart. semissem: coquātur, &
pinfantur, ac in formam emplastri mollis redigan- 3
tur. Aliud eiusdem, habet vini ad dimidias vel
tertias cocti (hoc sãpam, illud defrutum appella-
mus) quart. vnum aquæ rosaceæ, aceti ana quat. ses-
miss. croci, drachmas duas: moderato igne parū
ferueant postea colentur, & panni eo liquore im-
buti parti phlegmone obsessæ applicentur, epithes
10 matris more.

Porro eiusmodi præsidia, quæ in augmento in-
flammationis adhibentur mixtæque ex reprimen-
tibus & digerentibus facultates habent, tardius
amoueri, & mutari debent, quàm pura repellentia,
15 initio ipsius phlegmones accommoda.

Auxilia, in vigore seu statu phlegmones, & cum *Quæ in sta-
tu phlegmo-*
in ea vehementes vrgent dolores, idonea sunt Aë- *tu phlegmo-*
tio, malua priuatim, & cum modico pane, & rosa- *nes conue-*
ceo illita. Melilotum quoque in passo decoctum, & *niant.*
20 cum pane admodum. Idem possunt (inquit) & pal-
mulæ in passo clixatæ & cum pane & rosaceo confe-
ctæ & mixtæ. Aliud quod per halitum digerit, in vi-
gore phlegmones summè efficax. Perdicij, id est, pas-
rietariæ, malux ana, M. i. furfuris, subtilis farinae vo-
latilis, ana. p. i. fœnigræci, aneti, ana, vnciæ semis. olei
37 chamæmelini quart. semis. vino incoquātur, & ex-
acto subigantur, donec in vnitatē coëant, & fiat em-
plastrū. Aliud ex Gale. de sumptū lib. 13. Therap. Re-
cipit medullæ panis frumentacei lib. vnam, macera- *Emplastrū
Galen.*
tur spatio vnius horæ in aqua feruenti, postea expris-
30 mitur, & huic admiscetur mellis optimi quart. vnū,
formaturq; cataplasma. Hoc discutit, & dolores
mulcet. Vnguentū basilicon, & quod è succis confis-
citur, diachylon nominatur, in vigore phlegmones
ad mouenda esse consuluit Arabs ille Auic. verum
35 hoc remolliendo, illud verò maturando magis est
idoneum: quāquā tamē vtrumque vi aliqua etiam
digerēte polleat. Horum autem descriptiones lib. 6.

52 Institut. Chirurgicarum, Lib. I.

requirendæ sunt, vbi & valdè multa discutientia tū simplicia, tum composita recensentur, quæ in statu eiusmodi inflammationum efficaciter auxiliantur. Cæterum hæc & similia, quæ ad discutiendū quod iam influxit, & ad dolores mitigandos, præsidia adferuntur, cum multa humiditate participet, tardissime mutanda erūt. Porro cū ex admotis nuper memoratis auxiliis, humor in particulā phlegmōe obsessam delapsus discutitur, tumorq; & extensio minuuntur, doloresq; mitiores fiūt: tūc inflammationis declinationē adesse putato, quo tēpore solis discutientibus vtendū est. Cuiusmodi sunt, agrestis malua illita, & passulæ exemptis acinis cum pane & modico melle, & hordei farina cum melle applicata. Item lana succida, stupæ, spōgia, aut quid simile, vino lente imbuta, postea expressa & apposita: hæc enim omnia discutiendi vi pollent, & dolorē non excitant. Cæterum si ob morbi pertinaciā & difficultatē locus affectus nimis multā, & resolutioni contumacē materiā continuerit, non ideo protinus, vt quidā faciunt, ad chirurgiā, id est, sectionē aut vstionem, protrumpere oportet, sed enitī, vt collectus humor discussorij medicamentis per alitum digeratur. Moliri enim prius digestionem oportet, medicamētis ad id conducētibus, quā inflammationem incidere. Quod si tumor digerentibus medicamentis non cedat nulla amplius discutiendi quod in eo continetur, spes relinquatur: sed videatur potius materia ad suppurationem spectare, ad ea quæ maturant, & pus mouent, transeundum erit. Speramus autem tumorem (etiam si iam in abscessum degenerauerit) per halitū digeri posse, si materia, quæ eū excitauit, tenuis & pauca, resoluēq; idonea fuerit: si & in loco minime profundo delitescat, cutisq; particulæ laborātis rarsa extiterit. Si verò humor multus sit & crassius atq; in alto sinu reconditus, cutis verò densa, exhalatio seu resolutio nequaquam speranda est.

*Quibus sit
vtendū au-
xilijs in de-
clinatione
phlegmones.*

*Quādo sperā
da resolutio.*

*Pus mouen-
tia.*

Proinde ad maturantia & pus mouentia veniendum

dum erit: cuiusmodi est cataplasma, quod ex farina triticea, in aqua & oleo temperatè cocta, cōstat: hoc enim celeriter inflāmationes, quæ digestionī nō cessant, ad suppurationem perducit, vt etiam Galen. *lib. 2. ad Glauc.*

5 nobis autor extitit. Siquidem & calorē habet nostro calori persimilē, nempe temperatū ac mediocrem, & ratione farinæ, & olei quæ lentoris quippiā habet, quo meatus obstruendo partis calorem narium dēgeri prohibent, vi emplastica præditum est. Quæ

10 duo maximè in maturatibus & pus mouētibz medicamentis desiderantur. Sunt qui huic cataplasmati croci momentū coloris gratia adiciunt. Cæterū si tumor, ob infarctos in eo crassos & viscosos humores, ægrè ad suppurationem ducitur, eximie subueniet cataplasma ex radicū althææ, & caricarū dulciū ac pinguium decocto, quod mellis crassitudinem res

15 præsentet, & farina triticea compositū. Ergo accipe prædicti decocti lib. vnā, farinæ triticeæ selibra, incoquātur simul, & in formā cataplasmatīs reducātur.

20 Si autē loco farinæ triticeæ hordeacea apponat, vel cibariorū panis, quem Græci *συνκρίσιον* vocant, discutiendæ inflāmationi magis quā suppurandæ conueniet, vt libro ad Glauconem secundo Galenus annotauit. Aliud in declinatione phlegmones puri mouēdo apprimē idoneū, quod à vulgaribus chirurgis communiter vsurpatur. Habet autem corticis radicis maluauiſci, id est, althææ, radicis lilij, senecionis, Græcis erigerō dicitur, & foliorū maluæ singulorū

30 M. vnū, farinæ triticeæ quart. vnum, farinæ sem. lini vnciam vnā, axungia suillæ recentis libra semis sem. coquātur herba in aqua quantum satis esse vis debetur, & tundantur cū reliquis in mortario, fiatq; cataplasma. Pleraq; alia puri mouēdo accommoda, libro sexto descripta sunt, ex quibus peritus quisque chirurgus, & in artis huius, quam docemus, operibus exercitatus, præstantiora, & naturæ laborantis, ac particulæ cui medetur, magis idonea seligere atque in vsum præsentem assumere poterit. Cæ

Huius cataplasmatīs meminit Haliab.

Cataplasma commune.

terum si collecto ac iam confecto pure, abscessus in quem phlegmone degenerauit, sponte non aperias-
tur, scalpello: vel cauterio, aut medicamento quos-
piam erodente (liberis iam ab inflammatione par-
tibus) molienda puri, quod digerit non potuit, eua-
cuatio est. Deinde vlcus ad cicatricem, similiter res-
liquis vlceribus, perducendū est, nepe detergendo,
carne implendo, glutinādo, & demum cicatricē in-
ducendo. Porro si materia, quæ tumorem parit,
crassā est, & resolutioni, atque etiam concoctioni
contumax, vehementerq; carnis meatibus impas-
cta (qualis esse solet in diuturnis inflammationibus
malè curatis, resoluta scilicet tenuiori humoris par-
te, & crassiore in meatibus relicta) scarificatio tis-
menda non est, præsertim (vt 2. lib. ad Glauc. Ga-
lenus admonuit) vbi durities, liuor, ac nigror,
apparuerint.

4 Quartus scopus, qui in curanda phlegmone chi-
Surgo ac medico proponebatur, est symptoma-
tum corre- tum, quæ ipsi inflammationi superueniunt, cor-
ctio. rectio, & summorio. Ea autem ferè sunt, dolor,
regressus materię, ex qua tumor excitatur, ad inter-
iora putredo & corruptela partis suppuratis, & ve-
luti lapidea quædā durities, ex valèter exiccatis
& digerētibus relicta. Ergo si vehemens dolor inflā-
1. Dolor. mationi accesserit, modis omnibus laborādū est, vt
statim mitigetur. Quādoquidē præterquā quod vi-
res prostermit, & legitimas actiones impedit: fluxio-
nes quoq; accersit, & sanguinē ad se allicit. Itaq; si
dolor acrius vrget in phlegmone, cōfestim impenē
da medicamēta sunt, quæ doloris vehemētiā citra
vllā noxam leuēt, & demulceāt. Quale est, quod ex
Dolorem in phlegmone lenientia. passo, oleo rosaceo, & paucula cera, cum his ambo-
bus liquata conficitur Galeno: hoc autē lana succis-
da, quæ plurimū habet œsypi, excipiendum est, ac
æstate quidē frigidū: hyeme verò repidū apponēdū.
Itaq; medicamentum eiusmodi, sic vt dictū est attē-
peratum & admodum, rarefacit, extenuat, digerit,
euacuat

euacuat: humorem acrem, lentū, crassū, aut mul-
 tum, partibus dolentibus hærentem, æquabilē red-
 dit, vaporemq; crassū, commodum exitum non
 habentem discutit, atque sic dolorē mulcet: nullam
 verò sua caliditate noxam inuehit: rosaceum nam-
 5 que calorem retundit. Quo fit, vt hoc remedium ci-
 tra noxam vllam dolorem mitiget, & affectui non
 incommodet: vt aqua calida, oleum, & triticea fas-
 rina, quæ in inflammatione eum dolore incidente
 10 ex vñ esse non possunt: vt testis est Galenus. Hæc
 enim calfaciendo ac humectando relaxant, ac robur
 partis resoluūt, vnde & imbecillior redditur, & ad
 fluxionem excipiendam pronior. Ad eundem vsū
 (nempe ad mitigationem doloris in phlegmone) ef-
 15 ficaciter apponitur, rosaceum, ouorū lutea, quæ &
 vitellos appellāt, mica panis albi, in aqua calēte ma-
 cerata, postea expressa, & rosaceo permixta. Presen-
 ti etiā auxilio sunt, maluæ in aqua decoctæ, mixtæ
 cum fursure & rosaceo: vel oleo violaceo. Crocum *Crocum.*
 20 autē in omnibus sedandis doloribus assumitur. Aui-
 cennæ, atq; aliis anodynīs, id est, dolorē mitigantibus
 vtiliter cōmiscetur. Porro si tanta tamq; vehemens
 sit doloris acerbitas: vt iis quæ à sedādo, leniendōq;
 dolore quasi suppetiis latis naturæ, propriè anody-
 25 na & paregorica dicta sunt, demulceri nō possit, ad
 narcotica, id est, stupefacientia, transeundum erit.
 Inter quæ hyoscyamum admirandam opem sæpe
 contulisse, frequenti experimento præter quorū-
 30 dam auctoritatem comprobatum est. Itaque folia
 eius sub calidis cineribus coquito, recenti axun-
 giæ misceto, & admovento. Hoc vehementes do-
 lores mulcet, & phlegmonosos tumores ad sup-
 purationem perducit. Cauenda autem semper
 est, dum hoc moliris, nimia humectatio: quippe
 35 quæ per initia inflammationum, cum magno dolo-
 re fluxu incidente, perniciofa sit, vt paulo antè di-
 ximus. Cæterū si metus adsit recursus materiæ
 phlegmonē excitātis, ad loca penitiora, & maximè *interiora.*

*Libr. 2. ad
 Glauc.*

Crocum.

*Nota de hyo-
 scyano.*

*2. Recursus
 materiæ ad
 interiora.*

versus principes partes, trahentibus medicamentis (de quibus lib. sexto fusissimè egimus) vel etià ad motis cucurbitulis, quæ vehemētius & ex penitioribus partibus trahunt, eam foras euocare oportet.

Si verò à vehementer exiccantibus ac digerentibus inflammationi temerè ad motis, reliquæ tumoris in scirrhum abierint, radices cucumeris agrestis (qui vulgò herbariis & officinis cucumer asininus dicitur) aut bryoniæ, aut asari, in aqua incoques: sæpe quidem (vt præcipit Galenus) has solas, nonnunquam verò & caricas pingues adiiciens. Deinde farinam cum aqua misceto, cui & aliquid adipis, præferim anserini aut gallinacei, adiicito. Quòd si horum copia non sit, suillum addito, & cataplasma cōficito. Hoc scirrhosum affectum, ex valentius exiccantibus & digerentibus medicamentis in parte, quæ phlegmone occupabatur, relictum, efficaciter sanat. Prædictarum quoque herbarum, & cum his altheæ radices, post moderatam decoctionem cum pane & adipe contritæ, & amotæ, eiusmodi induratos tumores discutunt: vt libro secundo ad Glauconem luculenter docet Galenus. Itaque si phlegmonosos tumores, qui agrè per halitum digeruntur, nec facilè concoquuntur, in scirrhum mutari timuerimus, valenter digerentibus semper emollientia remiscebimus. Sed de iis iterum libro sexto locupletius dicemus.

4. Putrefactio.

Porro si portio aliqua suppurantis particulæ cōputruerit, eam protinus excidere oportet: vel plurimis scarificationibus profundis incidere: dein aqua salsa perfundere: & demum emplastrum apponere, ex fabarum, aut orobi farina cocta in oxymelite. Reliqua quoque tibi molienda erunt, quæ in curatione gangrænæ mox subiiciemus.

Sed melius fuerit capita curationis eiusmodi phlegmonosi affectus, brevibus quibusdam sententiis complecti.

Capita

De Tumorib. præter naturam.

57

*Capita curationis rheumatica, id est, ex humorum influxu
facta phlegmones adhuc incipientis, & cum dolore
non usque adeo magno, affligentis.*

Ex Galeno lib. 2. ad Glau.

COrpus vniuersum cōgruis vacuationibus, sed
præsertim venę sectione, modo nihil obstitet
rit, inanito.

Partem inflammata[m] his, quæ influentis humor
ris repellendi vim habeant, perfundito, ac illinito.

Humorē qui in affecto loco continetur, ad motis
exiccantibus, ac digerētibus medicamētis, vacuato.

Robur ac virtutem affectæ parti, & eam circums
stantibus addito.

*Capita curationis eiusdem phlegmones, quando
cum grauiore dolore affligit.*

Vbi inflammatio ex defluxione orta, grauiore
cum dolore affligit, doloris vehementiam ci
tra vllam noxam, mitigato.

Ergo quæ vehementer stringunt, aut quæ calfa
ciendo & humectando relaxāt, ac robur resoluunt,
ne ad moueto.

Sed quę quod influit, mediocriter stringendo, res
pellunt, & quod iam affectam partem obsidet, vas
cuant, inflammato loco adhibeto.

Spongiam acerbo vino, aut poscā imbutam, vt
fluenti humori via præcludatur applicato.

Si hæc profecerint, & nusquam adhuc pus appa
reat, mollibus, & iis quæ aduersus fluxiones tempe
rantur emplastris, vtitor.

Ex iis autē, quæ exiccare, & fluentē sanguinē res
pellere citra dolorē possint, tāquā optima deligito,
Quale est, q̄ chalcite constat, rosaceo resolutū, De
inde lanā purā, ex vino acerbo madētē, supponito.

Vbi verò pus in parte ipsa apparuerit, semel atq̄
iterum supradictum cataplasma, aut potius quod ex
hordei farina constat, ad moueto.

58 Institut. Chirurgicarum, Lib. I.

- 8 Si puris, eiusq; crassi copia, medicamenta superet, adeo vt nulla resolutionis spes habeatur, exitu ei quod digestionem non celsit, eo potissimum loco, quo est editissimum parato.
- 9 Post sectionem, nisi dolor vrgeat, vulnus exiccato, ac citra dolorem detergito.
- 10 Si post sectionem dolor vrgeat, eum fomentis pri- mu, deinde cataplasmate, mox humectante aliquo medicamento, aut saltem non siccante, mitigato.
- 11 Si vero pars adhuc inflamata sit, cataplasma ex lenticula, quod vacuat, & repellit imponito.

De carbunculo, gangrena & sphacelo, quas sanguineas pustulas vocant. CAP. VII.

De carbun-
culo.

ῥοδραξ.

γανγραίνα

σφακελός.

Gangrena

& sphace-

lus magnas

cōsequitur

phlegmonas

Carbunculi

generatio

& descri-

ptio.

Carbūculus

duplex.

NOTAE

carbunculi.

1. Vlcus cru-

stosum.

2. Pustula

vna maius-

cula, vel plu-

res exiguae.



Postquam de phlegmone prima inflam-
mationem differentia, & nostris corpori-
bus frequentissime incidente, abunde
satis, quantū ad chirurgum attinet, dis-
seruimus: consequens visum est: vt pri-
mum de carbone seu carbunculo, qui Græcis ῥοδραξ
dicitur: deinde gangrena & sphacelo (quem vulgō
cū Auicēnæ interprete esthiomenon appellāt) dica-
mus. Ille enim ex sanguinea fluxione: vti & phles-
gmone, ortum habet, febremq; acutissimam infert.
Hæc verò magnas phlegmonas subindē cōcomitari
solent. Vt libello de tumoribus præter naturā: &
plerisq; aliis locis Galenus annotauit. Itaq; carbo ex
influyente sanguine, nigro, crassoq; ac feculento, eo-
demq; feruente, atq; impense calido, nascitur. Cui si
tenues quædā humiditates admixtæ fuerint, pustulæ
quædā ambustis cōsimiles, per summa cutis exci-
tantur, appellaturq; tūc hæc inflammatio, carbuncu-
lus cū pustula. Quod vitium sanē frequentissime inci-
dit. Interim tamen (licet raro) & citra pustulā pustu-
læ sue incipit: verū omnibus crustosum vlcus fit. Dis-
xi autē, citra pustulā, pustulæ sue, quoniam vna duntaxat
aliquando pustula maiuscula cum hoc morbo
exoritur, qua rupta, vlcus cū crusta gignitur. Sæpē
verò

verò non vna tantùm pustula erūpit, sed multæ exis-
les, veluti milij semina, crebræ in particula residētes:
quibus præruptis, similiter crustaceum vlcus proue-
nit, quale ferramenta candentia excitant. Cæterùm
5 inter initia priusquàm pustulæ enascantur, scabunt
particulam omninò. Crusta autem ipsa modò cine-
reū colorem, modò nigrorem præ se fert, eoq; loco
leuari cutis nō potest, sed inferiori carni quasi affixa
est. Circumiaccens caro in summam ac feruidam pers-
10 uenit inflammationem, quam Græci phlogosin ap-
pellant, & colore nigrescit, splendetq; bituminis &
pice modo, veluti si plusculo rubro minùs misceas
nigri. Talis autem est color bilis exactæ atræ. Et hæc
quidē notæ sunt carbūculi ex ipso affectu desum-
15 ptæ. Quibus accedit grauis & molestus admodum
laborantis particulæ dolor, perindè ac si vinculis es-
set vehementer confricta. Necessariò quoque qui
ita sunt affecti, febricitant, idq; etiam magis, quàm
illi, quibus erysipelatosa est phlegmone. Quòd si
20 venenositas aliqua sub sit (vt ferè iemp. assolet) nau-
sea quoq; & frequēti vomitu, vnà cum omnimoda
appetitus prostratione miserè torquentur laboran-
tes. Sed & cordis tremor, & palpitatio, & frequēs
animi defectio illis adsunt.

25 Quod vitium tunc huius ætatis chirurgis pecu-
liari nomine anthrax appellatur, à carbunculo quis-
dem malignitate & venenositate (vt volunt) diffes-
rens. Cùm ramen ἀνθραξ Græcis sit idem, quod carbo,
vel carbunculus Latinis. Proindè superuacaneum
30 est, eorum signa & curationē, quod ferè omnes chis-
rurgi faciūt) distinguere, & in diuersis capitibus de
his pertractare. Cæterùm carbunculi ipsi ex cau-
sis populatim grauantibus, magna ex parte oriun-
tur, & pestiferam luem consequuntur. Quocircà dis-
35 ligenti animaduersione circa eos opus est, tātum ab-
est, vt negligi debeant.

Porro tamen si ἀνθραξ seu carbunculus omnis, mor-
bus sit acutus, periculosus & cōtagiōe inficiēs, oīm
IUDICIA.
1. Carbūcu-
ramen

3. Crustæ co-
lor cineræ
aut niger.

4. Carnis
circūpositæ
inflammatio
cū nigrore.

5. Dolor gra-
uis.

6. Febris ve-
hemens.

7. Nausea.

8. Vomitus.

9. Prostra-
tio appeten-
tiæ.

10. Cordis
tremor.

11. Animī
deliquium.

Carbunculi
luem pestife-
rā ferè sem-
per cōsequun-
tur.

60 Institut. Chirurgicarum, Lib. I.

lus quando tamen pessimus est Auicennæ, & maximè lethalis, *maximè le-* qui in emunctoriis, & propè mèbra principalia ena-
thalis, sum- scitur. Timendum enim est ne ad interiora & partē
pto à loco af- aliquam principem materia hæc venenosa, quæ car-
fecto iudi- bunculum excitauit, subito recurrat. Quod si acci-
gio. derit, in maximo vitæ discrimine æger est, præser-
tim si mala aliquot signa se prodiderint. Quin sola
illius purida, & plusquàm lerneò tincta veneno ex-
halatio, sufficiens est hominem enecare.

2. Aliud iudicium à loco affecto. Si circa stomachum, siue œsophagū, faucēve inci-
dat carbunculus, subito (vt ait Celsus) spiritum sæ-
pe elidit. Minus lethalis est carbunculus, Auicennæ,
3. Iudicium à colore. qui primū ruber, deindē citrinus apparet. Qui ve-
rò liuescit, aut nigricat, neminē ferē non iugulat. nul-
4. Iudicium ab accidentibus. lus tamen ex sua natura non periculosissimus cense-
tur. Si accidentia quæ morbum hunc comitari solēt,
plurimū remittantur, spes aliqua nobis promitti-
tur. Si verò magis atq; magis semper intendātur, &
vehementiora fiant, tum planē est desperandum.

De curatione carbunculi.

Carbunculi **C**arbunculi curationem (supposita conueniens
curatio à sã ti victus ratione) statim ab initio (si nihil obsti-
guinis mis- terit ex iis, quæ venam incidi verant) auspican-
fione statim dam esse à sectione venæ Gal. præcepit libro meth. 25
auspicanda. med. 14. & secundo ad Glauconem: vultq; sanguinis
vacuationem, ad animi defectionē vsque fieri. Quip-
pe quæ plurimum cōmodi hoc vitio laborātibus sit
allatura: idq; perpetuò est obseruandum, vt vena è
directo pertūdatur. Venæ autem secundæ electio ex 30
Vena è dire- laborante particula (vt in curatione phlegmones di-
cto secunda. ctum est) nobis indicatur. Quocircà ea in re cōsulens
dus est à chirurgo peritus aliquis medicus, qui vn-
dē, & quatenus sanguis mittendus sit, probè nouerit
definire. Secta vt decet vena, si nihil, vt dixi prohi 35
Scarificatio buerit, alienū nō fuerit eiusmodi tumorē scarificare,
nes profun- plagis quidē (ob infestāis succi crassitudinem) satis
da. profundis: nepe quæ mediocribus (vt Galeno visum
est)

est) sint altiores. Sunt qui præcipiant ipsos scarificatus in crustaceo vlcere duntaxat esse faciendos. Ipsas verò incisiones aqua salia calente statim perfundunt, *Perfusio ex aqua salia* ne in illis sanguis coeat, concreascitve, sed foras egrediatur. Interdum etiam erodens aliquod medicamentum imponunt, cuiusmodi est arsenicum, quod in ea *Arсенicum* re inter cætera primatum obtinet. Quidam verò loco scarificato sanguiifugas admovent. Cæterum laboranti particulæ (tamen si quod ad inflammationem spectat, refrigerantia desideret) validè repellentia haudquaquam admoventi debent. Nec enim eiusmodi fluxionem, propter humoris crassitiam, atq; etiã carbunculo malitiã auertere poteris. Et si quãdò id feceris, aliud quippiam (vt Galenus ait) quod in alto sit corpore offendes. Atqui nec affatim affluere is humor, ipso Galeno autore, permittendus est. Inquirenda igitur remedia sunt, quæ cum modicè reprimendo, etiã digerere seu dissipare possint. Tale profectò est cataplasma, tum quod ex plantagine conficitur, tum quod ex bis cocta lente constat. Sed hic admiscenda nobis erit mica panis, qui furno sit coctus. Esto autem panis (ex Galeni consilio) nec omninò à furfure purus, nec nimium eius habens. Huiusmodi autem cataplasma recentioribus appellatur emplastrum de arno glossa, cuius forma apud eos est talis. & arnoglossi, lentium, panis furnacei, singulorum partes equales, coquantur in aqua. His gallas addidit Auicēnas, qui & ad eandem intentionem probat cataplasma, quod constat duobus malis granatis, coctis in aceto, aut aqua acetosâ. Et hæc quidem tum parti ipsi laboranti, tum circumiacentibus imponunt. Huic sententiæ accedit & Paulus Aegineta, inquiens, Vt radicis citus carbunculos diuellas, dirimasq; ab adiacentium commertio, malum Punicum acidũ minutatim cõsum in aceto coques: vbi autem intabuerit, in lauorem deteres, linteoq; illitum induces: cùm ficescit, aceto humectabis. Itē nucis auellanæ veteris, vel etiam non veteris medulla, carbūculos maturat, rûp

pitq;.

62 Institut. Chirurgicarum, Lib. I.

Quæ auellane carbunculos maturat, et rumpit.
Auxilia attrahentia videntur.
 pitq̃. Optimum autem etiam fuerit perpetuò circumiacentibus ipsis partibus vnguentum ex bolo Armenia, rosaceo, vel myrtaceo oleo, & aceto confectū, inducere: ne scilicet intrò, qui iam fluxit humor, recurrat. Sunt qui virus ipsum, & malignū humore in pestilenti carbunculo, suctu, cucurbitulis, & medicamentis attrahentibus ad locū carbone obfessum euocant & alliciunt. Quod sanè & faciendum consuluerim, si artus, & minoris notæ partes, *ὠνέπαι* occupet, & pigrè moueatur fluxio. Si verò validè, atque affatim irruat, modicè reprimentibus (vt modò ex Galeno adductum est) infrenandus vtcunque est fluxionis impetus, ne scilicet ingens nimis dolor ex fluxione tam valenter irruente in laborante particula excitetur, atq̃ ita malum exasperetur. Super ipsum verò vlcus crustosum, vbi præcipuè membrum putrefit, valens aliquod medicamentum, & quod vehementer exiccet, non autem quod concoquat, & pus moueat (quando ita putredinem particulæ foueris) imponendū est. Cuiusmodi est Andronis, Musæ, Pafionis, vel Polyidæ: diluicq̃ id vino aliquo dulci, vel sapa, ad sordium crassitudinē debebit. Cataplasma etiā, quod ex orobi farina, & oxymelite constat Galeno, rectè apponitur, vbi vlcus malignum & cū putredine fuerit. In communi autem vsu est vnguentū vulgò Aegyptiacum nominatum. Quòd si hæc parum proficiat, ad aciora, & quæ ignis vires habeāt, deueniendum erit. Cuius generis sunt, radix dracunculi, vel aristolochiæ, ex aceto trita, & imposta, calx, arsenicū, & sandaracha, & alia huiusmodi, quæ non aliter, quàm ignis adurunt. Hæc proficiunt satis, si protinùs à viua corruptam partem resoluunt. Quo factò, quicquid corruptum est & emortuum, protinùs auellere & radicitus extirpare oportet. Cū autem sub ipsis erodentibus medicamentis se quatur crusta, vndique à viua carne ducta, vulnus quidem, quod ex eis excitatur, vt cætera adusta curandum est. Caterū cum extremis morbis (vt inquit

quit Hipp.) exquisitè extrema remedia optima sint, *usitione pro-*
 cogimur aliquandò victis scilicet malo medicamen *perandum.*
 tis) malignum carbunculū, cauterio, vt vocāt, actua-
 li, hoc est, candente ferro extirpare. Finis autē adu *Finis adurē*
 5 rendi est, dum ex omni parte sensus doloris est, vt res *di.*
 ctè Celsus admonuit. Post hæc crusta vlceribus ins-
 ducta, auxiliis ad id accōmodis, resoluēda est. Quod
 si adustionem laborās pati recusauerit, aliquis ex hu-
 10 mili plebe adhibēdus est, qui carbonem ipsum mor-
 dicus apprehensum radicis euellat. Quales olim
 erant Pysylli in Italia nominati, qui vulnera ex mor- *Pysylli.*
 su serpentū illata, innocuē exugebant. Porro auul- *auulso vel*
 so sic vel quomodocunque absumpto carbunculo, *absumpto*
 15 sinus, cessante iam inflammatione, primūm detergez *carbunculo,*
 ri; deindē iam purus factus, implentibus medicamen *quid postea*
 tis (quæ Græci fynulotica vocant) curari debet. Vbi *agendum.*
 verò iam penitus fuerit impletus, nec ampliūs quies-
 quam illi cauum remanserit, ea quæ cicatricem indu-
 20 cunt, similiter reliquis vlceribus adhibere fuerit tem-
 pestiuum. Horum autem omniū materia ex libr. vj.
 & tractatu de vlceribus requirenda est. Cæterū si
 non admodū sauiat malum, nobisq; aliquas dede-
 rit inducias, maturatur, & aperitur Auicennæ, admo *Matura-*
 25 tis ficubus, fermento, & sale adinuicem mixtis. Vbi *ticum Auicennæ.*
 autem bis vel ter appositum fuerit huiusmodi cata-
 plasma, locus omninò niger & dehiscens apparere
 solet. Atque tunc mundificatio ex apio locus deter- *Mundifica-*
 gendus erit. Medicamen quoque ex vitellis ouorum *ticum ex a-*
 & sale confectum, si sepius admoueatur, maturat & *pio.*
 30 aperit carbunculū, vt scribit Theodoricus. Ad eūdē
 finē in comuni vsu est hodiē medicamentū quod
 melle, sale, triticea farina, & ouorū luteis cōstat. Cō-
 solida maior (quod Græci symphyton appellāt) ins- *quod vsur-*
 ter duos lapides contrita, diuino quodā (vt referunt) *patur in pa-*
 35 miraculo anthracē sanat, & ex toto intra diē vnū in- *risiorū No-*
 terimit, ita vt nulla ampliūs deinceps curatione *socomio.*
 egeat, præterquā ea, quæ cōis est aliis vulneribus. *Consolida*
 Miranda etiam narrant alij de scabiosa; nempe quod *maior.*
scabiosa.

64 Institut. Chirurgicarum, Lib. I.

comeſta vel ex vino pota, internos tumores ad exte-
riora protrudit, et inſenſibiliter diſſoluit, diſcutitq̃.

Quæ cruſtas vlceribus reſoluunt.

Cruſtas huiuſmodi carbunculi vlceribus reſol-
uunt, butyrum recens, axungia porci, & alia
id genus pingua. Ad id etiã mirè proficit ſubſe-
quens emplaſtrum. Nam præterquàm quòd eſcha-
ram, id eſt, cruſtam, citiùs multò quàm prædicta reſ-
ſoluit, dolorem etiam ab acribus & adurètibz me-
dicamentis, vel candente ferro excitatum, demulcet:
atque malignum ipſum ſuccum, qui carbunculum
creabat, potenter diſcutit. Habet autem farine tritis
ceæ & hordeaceę, ſingulorũ vncias tres. Ex quibus
cum decocto maluarum, violarum, & radicum al-
theæ fit ſolidũ emplaſtrum, addendo butyri, & axũ
giæ ſuillæ liquefactæ ſingulorum vncias duas, vitel-
los quoque duorum ouorum, qui adiici debèt quan-
do ab igne remouentur: atque hæc omnia ruriſ cū
radice & foliis prænominatis, diligẽter tuſis, & ſub-
actis, ac per incerniculum cretis, adinuicem miſcen-
da ſunt. Viſtus ratio, epithemata, opiata, & alia id
genus, quæ cordi roborãdo dicata ſunt: Item vacua-
tiones, ſi quæ neceſſariæ ſint, ad diæteticen & phar-
maceuticen omninò pertinent. Quare in iis admini-
ſtrandis peritus aliquis medicus erit conſulendus. In
communi autem vſu eſt apud omnes theriace, quæ
ad fabæ magnitudinem exhiberi ſolet, ex aqua ſcas-
bioſæ, vel ſi febris adſit admodũ acuta & vehe-
mens, ex aqua roſacea vel bugloſſi: debetq̃ à labo-
rante aſſumi ſex horis à paſtu. Cæterũ quoniam ſu-
perius facta eſt mentio de trochiſcis Andronis, Po-
lyidæ, Paſionis, & Muſæ, quoſ tantoperè celebrat
Galenus, non alienum fuerit eorum deſcriptionem
hîc ſubiicere.

Andronis trochiſcus hæc recipit.

Cytinorum, id eſt, florum ſeu capitulorum mali
Gran

De Tumorib. præter naturam.

65

Granati, drachmas decē. aluminis scissilis drachmas quatuor, chalcanthi drach. duodecim, myrrhæ drachmas quatuor, thuris, aristolochiæ, gallæ, singulorum drach. octo, salis ammoniaci drach. quatuor.

Polyidæ sphragis pastillus hæc continet.

Malicorni* pondo sex, myrrhæ* pondo octo, aluminis scissilis* pondo quinque, thuris* pondo quatuor, chalcanthi* pondo trium, fellis taurini* pondo sex: vino dulci excipiuntur.

*Quod sic
stellatim
decussatur,
nota est de-
naty, quæ p
drachma hic
ponitur.*

Polyidæ pastillus alius.

Aluminis fissi pondo denariū trium, thuris pōdo denarium quatuor, myrrhæ tantundem, chalcanthi pondo denarium duum, cytinorum pondo denariū duodecim, fellis taurini pondo denarium sex, aloës pondo denarium octo: vino austero excipiuntur.

Musa trachiscus hæc habet.

Aluminis scissi, aloës, myrrhæ, chalcanthi, singulorum pondo* sex, croci, crocomagmaris singulorum pondo* 3. cytini pondo* 4. mulso ex falerno factō assumuntur.

De Gangræna & sphacelo.

GAngrænas nominat Gale. lib. 2. ad Glauco, eas quæ ex magnitudine inflamationis fiunt mortificationes, nondū tamē integrè faciæ sunt, & iam cōfirmatæ. Eius mali tanta vis est ac tyrānis, ut nisi celerrimè succurras, facilè affecta pars mortis habitum repræsentet, hoc est, prōptissimè, vitæ, sensus & motus extinctionē contrahat. Vbi verò membrū sic vitiatū, & languens, in totum sensu fuerit destitutū, ac omninò emortuū, ita ut percussū, vel sectū vel adustū, non sentiat quæ patitur, affectū hunc nō iam ampliūs gangrænā, sed sphacelon Græci nominant, Latini verò syderationē, recentiores esthiomenon appellant: quod nomen etiā ad gangrænā extendunt. Auicenna autem esthiomenon vocauit, quando ad partes continuas trāsit corruptio, quo nomine

*Gangræna
quid, et vn-
de ortum
habeat.
Gangræna
pessimus ty-
rannus.*

Sphacelus.

66 Institut. Chirurgicarum, Lib. I.

in re alia vtuntur Græci. Quidā affectū hunc modō
herpeta esthiomenon, modō cancrū vlceratū impro-
priē tamē, nomināt. Accidit autē hic affectus etiā
osibus, cū caro ipsis circūdata ac circūfusa tetros
gignēs ichoras, id est, deprauatā sanie generans hoc
tetro virū ea imbuerit, ac foetidissimā putrilagine
cōsumpserit. Cū itaque membrū ita ex toto, vita,
sensu, motuq; priuatū apparuerit, cōfestim ad viuū
vsque, quā proximē sanæ parti erit resecandū. Itaq;
differt sphacelus à gangræna, quod ille osibus etiā
(vt dictum est) innascatur, nedum carni & vasis: hæc
verò osibus non adueniat: vna tamen species sphas-
celi est, sed proprium nomen & singulare præter cō-
mune sortita. Huiusmodi absolutam partis affectæ
corruptionem, sensum, penitus auferentem, vulgus
Gallicum appellat ignē Sancti Antonij, aliās Sancti
Martialis. Accidit autem trifariā eiusmodi mem-
brorum mortificatio, seu vitæ in mēbris extinctio,
ac destructio, Vno modo, quando membrum nō am-
plius potest recipere vitam sibi à corde per arterias
transmissam: propter dissolutionē mixtionis atque
harmoniae ipsius laborantis membri. Dissoluitur au-
tem ac deperit mixtio atque harmonia partis, vel
ob nimiam frigiditatem, vt aliquando contingit per
hyemem validam atque asperā: vel ab immoderata,
& inconsultē ac temerē molita inflammationū refri-
geratione: aut ab excedēti ac suprā modū vehemēti
caliditate, & venenositate inflammationum ac malis
gnarum (vt vocant) pustularum. Altero modo gan-
grænā & sphacelū fieri cōtingit, quando vita in mē-
bro recepta præfocatur, atque extinguatur, vt non
nunquam euenit in magnis inflammationibus, quæ
ita interdū venas, arterias, & poros cutis obturant,
cōstipantq; vt spiritus ibidē, prohibita in totā efflu-
uū vaporosi trāspiratiōe, & aeris externi attractio-
ne, strāguletur, suffoceturq;. Tercio modo, hæc mor-
tificatiōes & vitæ extinctiōes fiunt in mēbris, quā-
dō prohibetur transitus atque influxus vitalis spiri-
tus

Ossium sy-
deratio.

Syderatum
membrum
confestim
resecandū.

Ignis sancti
Antonij.

Mortificatio
nis cause 3.

Que mēbris
mixtionem
dissolunt.

2

3

5

10

15

20

25

30

35

tus à corde ad mēbrum aliquod, idēq; vel propter ves
 heimentē ligaturā, vel contusionē aliquam in vijs, ac
 meatibus ipsis, per quos defertur spiritus, faciām. In
 summa, gangræna & syderatio, quam Græci necros
 sin, & sphacelū vocant, nostris corporibus accidunt
 vel denegata, parti vitali, facultate, vel nativo cor
 poris calore, ac temperiē pereunte. Cæterum signa ^{SIGNA}
 gangrænæ & syderationis, Galeno in opusculo de ^{gangrænæ}
 tumoribus præter naturam sunt hæc. Primū quidē ^{& sphaceli.}
 illud coloris floridū, quod phlegmonis, id est, inflā
 mationibus adfuerat, in ipsis extinguitur. ¹
 Deinde dolor & pulsus seu pulsatio, hoc est, arteriarū mo
 tus ipsi ægro sensibilis, recedunt, non finita adhuc
 dispositione, verū sensu iam emortuo. Vnde mem
 briū mox nigrū cōspicitur, molle quoque & putridū ²
 foetoremq; expirās, cadauerosum efficitur. Quo fit, ³
 vt cū præmitur digitis, facilē cedat in profundum,
 nec postea reuertitur aut resilit, imò apparet cutis à
 carne seiūcta. Hæc autē partis affectæ mortificatio, ⁴
 quā Græci gangrænā appellāt, tātæ est (inquit Pau
 lus) ferocitatis, vt nisi quis rupta omni mora præsen
 tissimas tulerit suppetias, laborans particula facilē
 emoriai, & vicinas sedes inuadat, ac hominē ipsum
 iugulet. At si (vt refert Celsus) nodū planē tenet, sed ^{Lib. 4.}
 adhuc incipit, eam curare non difficillimum est, vt
 que in corpore iuuenili, & magis etiā si muscoli in
 tegri sunt, si nerui vel læsi nō sunt, vel leuiter affecti
 sunt. Vbi verò penitus insedit hoc malum, & iam in
 sphacelum abiit, insanabile est, plurimiq; sub frigid
 o sudore moriuntur. ^{Lib. 5.}

*De curatione Gangrænæ ex magnis inflammatio
 nibus genita, & sphaceli ex gangrænâ creati
 extirpatione.*

³⁵ **C**VM sanguinis copia gāgrenā genereet eius ^{Corrupti}
 rādi ratio statim auspicāda est à copiosa corru ^{sanguinis}
 pri sanguinis, qui in mēbro laborāte cōpingit ^{vacuatio.}
 tur, vacuatiōe. Sed interim negligi nō debēt, quæ ad

68 Institut. Chirurgicarum, Lib. I.

diæticam, pharmaceuticā, venæ sectionē (si neces-
 saria fuerit) & cordis tutelā pertinere videbuntur,
 pro quibus cōsulendus erit chirurgus peritus aliquis
 medicus, qui omnia probē, & vt res exigit, norit in-
 stituere. Fit autē larga illa sanguinis ita impacti (cui⁹
 occasiōe fiūt mortificatiōes) ex pte affecta emissio,
 vel vena incisa, si quæ amplior, ac turgēs circa eandē
 partē cōspicitur, vel cute ynuerſa partis affecte, vnā
 cum subiecta substantia, excisa, vel pluribus & altis
 scarificationibus diuisa. Alij ad eundē finē sanguis
 gas admovent, & venas minores proximas aperiūt.
 Verūm profundæ illæ ac frequētes sectiones aut scar-
 ificationes, multō sunt ad eius mali curatiōē effica-
 ciores. Cæterū pro affectus magnitudine, vel maxis-
 mæ sectiones fiunt, vel incisuræ (quas scarificatiōes
 appellamus) vtræq; frequētes: illæ, vbi putredini vis-
 cinus malum est: hæ, vbi tantū putrescere incipit.
 Quo enim vitium mai⁹ est, eo maiore remedio, vt cui⁹
 que cōstat, indiget. Vbi autē abūdē sanguinē ex altis
 illis plagis emanare permiseris, locus aqua salſa ab-
 luēdus erit, vt sanguis craſſior, & qui alioqui ibidē
 cōcresceret, foras egrediatur. Deinde medicamentū
 aliquod putridis consecratū, id est, quod putrefactio
 nem prohibeat, ac resoluat, induci debet, quale est fa-
 rina orobi, aut lolij (quod Franci iuriam, quod vini
 modo remulentiā cōcitet, appellāt) aut si harū facul-
 tas nō sit, fabacea ex oxy melite, vel syropo acetoſo.
 Vtile etiam fuerit, locū scarificatū bis in die aceto ca-
 lente, sed mulſo præſertim lauare. Hæc enim ſua ſic-
 citate ſaniē & putrilaginē abſumunt, eamq; deter-
 gunt: frigiditate verò, quod nondum vitiatū ac cor-
 ruptū est, à putredine vindicant. Vbi autē iam ipſe
 veluti feruor subſederit, ac mali furia ſeſe remiſerit,
 vnguētū id, quod vulgò Aegyptiacū appellatur, ex
 flore æris, alumine, melle, & aceto, ad æquas portio-
 nes mixtis & coctis cōpoſitū, ſuperimponendū erit.
 Hoc enim putrefactionē prohibet, ac resoluit: putre-
 factū quoq; ac corruptū ab integro & ſano adhuc
 diri

Post scarifi-
 cationē lo-
 cus aqua sal-
 ſa abluēdus.
 Medicamē-
 ta putridis
 cōsecrata.

Vnguenti
 Aegyptiaci
 vis.

dirimit, & decidere cogit. Deniq; crustam inducens
do, quod sanū est, conseruat, ac tuetur. Quod si va-
lentius atque efficacius medicamen velis apponere,
salem prædictis adice: aut si malū magis adhuc in-
creuerit, aliquē ex trochiscis paulo antè memoratis
exquisitissimè tritū aceto & vino dilutum: utpote
vel Andronis: vel Polyidæ, vel Musæ: vel Pasio-
nis: vel vnū ex iis qui recentioribus dicuntur, calidi-
con, aldaron, & ex asphodelo, qui ob suā vim causti-
cam corruptū à sano dirimūt. Probatum in ea re an-
tè omnia arsenicon quod vocant sublimatū, purum
aut correctū, idē vel in puluere, vel ex vino dissolu-
tū, & linamēto, aut xylo, quod Galli coronē appel-
lant, exceptū, inter sanū & corruptū applicatū. Hoc
enim cōfestim malū sistit, & id quidem sine dolore.
Quod si necessitas exigat, spathula vel specillo se-
parandū est sanū à corrupto. In eiusmodi autē medi-
camētis adhibēdis: vt res securius tractetur, attētos
sedulo nos esse oportet circa naturā corporis ægroti
sicuti rectè nos Gale. admonuit inquit, Si corpus
rūsticū fuerit, & durū natura, vehementiora de-
derat medicamenta: scēmineū verò, & mollem car-
nē habens, imbecilliora. Infantes quoq; vel pueri, &
quicūq; inter viros & balneas amant, & in otio des-
gūt, mollia exigunt medicamina. Cōsideranda insu-
per est partium, quæ malè affectæ sunt, nedū corpo-
ris totius natura: quando abscindis, aut circūcidis id
quod iam cōputruit. Quædam enim sunt, quæ citis-
simè ad putredinem veniunt, si negligenter curentur:
aliæ verò tardiusculè: quædam item medicami-
num vires ac beneficia tardius sentiunt aliæ citius.
Porro si nihilo magis malū his causticis medica-
mentis constiterit: vri id quod est inter integrum,
ac vitiatum locum debet. Solent verò hæc auxilia
omnia, nihil interdum proficere, atque tunc vnū
cum: tametsi (vt Celsus ait) miserum auxilium est,
membrum quod paulatim emoritur, abscindere: vt
cætera pars corporis tuta sit. Nam quod cōputruit,

Trochisci
caustici.Arsenicum
sublimatū.Lib. 2. Ad
Glaucō.Vt si quā-
do adhi-
gen-
da.si gangre-
na in spha-
celum abi-

erit.

70 Institut. Chirurgicarum, Lib. I.

veneni in modum suo contactu, quod adhuc sanum & integrum est, inficit, & corrumpit. Si quando autem putrefactam huiusmodi atque emortuam partem abscideris, vel quod in membro quopiam com-
 putruit vsque ad sanum corpus concideris, eam que
 veluti quædam radix est, sanæ atque integræ parti
 adiunctam, ob maiorem securitatem, ex Galeni consilio
 candenti ferro adurere conuenit. Ita enim celes-
 riter sanguinis profluium compesces, & putredinē
 arcebis. Facta verò adustione, porri succo, vel (vt
 Paulus ait) sale cum porro vtendum est, vel aliquo
 ex iis, quæ paulò antè diximus. Hæc enim siccant, &
 stringūt putredinem, atque humorum affluxū pro-
 hibent. Vbi verò tibi videbitur his remediis adhibi-
 tis cessare putredo, vt crustæ citius decidāt, cataplas-
 matæ vtendum est ex pane vel hordeacea farina, vel
 triticea ex hydrelæo incocta. Itē medicamento, quod
 cephalicū vocant, ex melle illitum. Hæc enim deter-
 gendo, crustā à subiecta carne resoluunt. Quinetiam
 medicamētū, quod tetrapharmacū dicitur: præterea
 & Macedonicū, pus mouendo ac emolliēdo, crustas
 à subiectis corporibus diducūt. Quemadmodum &
 reliqua omnia, quæ ad suppurationē perducūt. Hæc
 enim præterquàm quòd emolliunt, pus sub crusta
 conficiunt, quod eam resoluit, scilicet inter carnem
 subiectā & crustā ipsam interiacens. Panis quoque
 cum apio tritus, aut ocymo, optimè crustas à sanis
 partibus citra erosionem detergēdo, detrahīt. Sic &
 iris, vel radix panacis, vel aristolochiæ, vel acori cū
 melle. Solent autē vulgò ad crustas resoluendas vt
 butyro, aut alio quouis vnctiuoso. Vbi verò crusta
 exciderit, locum aceto abluunt, postea sequens em-
 plastrū admovent, quod ad Gulielmū à Saliceto re-
 fertur. Recipit autē mellis selibrā, vitellos ouorū cru-
 dos tres, aut quatuor numero, farinæ hordei selibrā:
 hæc miscentur in formā emplastri. Post biduū verò
 vel triduū, vt melior fiat mundificatio, huic emplas-
 tro addi possunt drachmæ decem myrrhæ electæ. In
 teneris

Lib. 2. ad
Glauc.

Lib. 4.

Crustas à
partibus
excisus solue-
tia.

Butyrum.

Emplastrū
Gulielmi à
Saliceto.

teneris autē corporibus ad crustæ separationem, & sordium deterfionem, abundè sufficit Galeno orobi *Libr. 2. ad Glau.* farina cum melle, vel thure. His ritè peractis huius modi vlcera ad sanitatem perducenda sunt medicamentis, quæ carnem producant, & cicatricem inducant: synulotica, & epulotica Græci vocant.

Capita curationis gangræne & sphaceli.

Vitiatum sanguinem in affecta parte impactū affatim vacuato. 1

Post scarificatus aut sectiones, locum affectū aqua salia abluito, Deinde medicamentum putridis consecratum inducito. 2

Vbi mali furia se remiserit, vnguentum Aegyptiacum superimponito. 3

Si malum iis remediis non cesserit, id quod inter vitiatum & integrum est, ferro candente adurito. 4

Quòd si hæc omnia nihil profecerint, & iam gangræna in sphacelū degenerauerit, membrū quod sic planè emortuum fuerit, vsq; ad partem sanam, ita vt nihil prorsus putridi relinquatur, ocyssimè abscindito. 5

Vbi q; cōputruit resecueris, quo securius mali radicem euellas, ferramenta igne flagrantia adigito. 6

Post exustionē porri succū, atq; alia id genus, quæ siccāt, stringunt, & fluxionem arcent, admoueto. 7

Crustā vel medicamentis adurētibus: vel ignito ferro inductam, à subiectis corporibus resolvere (solet enim inde sanguinis profluuiū sequi) ne pperato. 8

Cū putredo cessauerit, nec amplius sanguinis profluuium reformidaueris, ea quæ crustam detrahunt, applicato. 9

Vbi crustæ exciderint, curationem reliquis vlceribus communem adhibeto. 10

Qui sequuntur aphorismi, ad medicum pertinent.

Victum tenuem, & refrigerantē, gangræna & sphacelo laborantibus instituito. 1

Fluxionē sanguinis missiōe, si nihil obstiterit auertito: atq; eadē plenitudinē (si adfuerit) vacuato. 2

- 3 Medicamento quod catholicon appellatur, vel nigra cassię fistularis medulla, ad hæc tamarindorū, lupuli, ac fumariz decocto, sanguinem depurato.
- 4 Theriacam, atque id genus alia, quę cor vitę fontem ac principium, à putridis, & graucolentibus illis, à parte vitiata sublati effluuiis, tuentur, laborāti sumenda exhibeto.

De erysipellate, & aliis tumoribus à bile creatis.

CAP.

VIII.

10

Pituita i hu
mori gene-
ratione san-
guini proxi-
ma.



Amet si pituita, in generatione humo-
rum, sanguinem cōsequatur, maiorq;
eius humoris portio sit in corpore se-
cundū sanguinem, quā aliorū humo-
rum: quia tamen tumores præter na-
turam à bile procreati (quæ aposte-
mata cholerica communiter vocant) in valde multis

15

20

25

30

35

Erysipelas
quid.

Erysipelas
exquisitū.

cōspirant cū sanguineis: consequens est, post deter-
minationē phlegmones, & aliorum qui à sanguine
fiunt, tumorū præter naturā cōsistentiū, de iis nunc
dicamus, qui à bile excitātur, & nomine qdē cōmu-
ni erysipelata vocantur Græcis, Latinis verò anti-
quioribus ignes sacri. Est igitur erysipelas biliosę
fluxionis germē, circa cutim vtramq; maximē cōsis-
tens, & eā scilicet, quæ foris est, omniū partiū com-
mune tegumētū: & membranosa illā ac tenuem,
quæ singulis internarū est circumdata. Nōnunquam
verò & aliquid quoq; subiectę sibi carnis occupat,
sicuti & phlegmone (quę fluxionis sanguineę sobo-
les est, in carnosa corpora maximē incidens) etiā cu-
tis aliquid apprehendit. Itaq; cū flaua bilis verē tes-
nis: vel sanguis feruēs & cōsistētia tentis (qui res-
centioribus cholera dicitur naturalis, Galeno verò
χολέξανθός) per solā cutem diffusus fuerit, nihil infes-
riorē carnē molestans: particulā tamen in tumorē ali-
quātum attollēs, cū inflāmatione & rubore in flauū
elāguescente, ac protinus ad tactum euanescente, as-
fectus hic priuatim ac propriē Galeno verum atq;
exqui

- exquisitū erysipelas nūcupatur. Hoc autē vnus rationis est, seu (vt dicūt) vniforme, & absq; vlceratione incidit. Auicennas ipinā vocauit. Cū verò amaræ *spina.* bilis succus crassior acriorq;, quā pro naturæ modo redditus fuerit, summā cuticulam (quā epidermida Græci vocāt) exulcerat, excoriātue, atq; aliquando cutis exulceratio spacio tēporis ad profundū peruenit, ita vt inferiore seu subiectā eamē attingat. Nuncupaturq; tunc eiusmodi affectus etiam erysipelas: *Erysipelas cum vlceratione.* sed cū vlceratione, quod (Galeno autore) eiusdē generis est cū herpete. Verū enim uero, si nec planē biliosa, nec sanguinea fluxio sit: sed ex ambabus mixta, nō iam tātū erysipelas, sed dispositio permixta erysipelate atq; inflāmatione nominatur Galeno. *Erysipelas nō legitur & eius species.* Ab eo autē quod in mistura exuperat, nomen vitio indetur. Etenim vbi sanguis præcellit, phlegmone erysipelatosā dicitur. Vbi verò flaua bilis præpoller, erysipelas phlegmonosum appellabitur. Verū vbi neutrū vincit, & æqualia vtriusq; apparuerint *phlegmone erysipelatodes.* accidētia: tunc vitium id phlegmones erysipelatosq; mediū vocabitur. Iam verò & aliarum mixtionum similis vtiq; erit interpretatio: nempe si multa bilis paucō humori pituitoso aut atribilario remisceatur erysipelas œdematosum: vel scirrhosum dicitur. *Erysi. phlegmonodes. Medium vitium.* Porro cum simpliciter bilē dicimus: vel biliosum *Bilis.* humorē, more Galeni & aliorū Medicorum, nos pallidā bilem seu flauam, & amaram, non autē acidam & nigram, inaudimus. Hæc autē naturalis cholera, & certa aliis nominatur, ex sanguine quidem tenui & feruente generationem obtinens. Atram verò bilem nunquam absolutē bilem nominamus, sed semper cum adiectione humoris, appellationis colorem adiungente. Est igitur bilis, quæ *χολα* Græcis dicitur, vulgō autem cholera, humor calidus & ficcus, ex tenuiori & calidiori parte chyli: vel ex sanguine tenui & feruente: vt modō diximus, procreatus. Hæc autem duplex est iuxta næotericorum diuisionem, *Bilis flaua duplex.* naturalis scilicet, & non naturalis. Naturalis, est huius *1 Naturalis.*

mor calidus & siccus potestate: substantiâ quidem
 tenuis, colore verò flauus, aut ruber, declinans ad
 quandam citrinitatē seu flauitiem: sapore verò ex-
 2 actē amarus, nō autē acutus siue acris: vt quidā malē
 affirmarunt. Nō naturalis verò, bilis dicitur, quæ à
 7. *Non natu- ralis.* prædicto humore vere bilioso degenerat, intra ter-
 minos tamē suæ latitudinis cōtinetur, quos si egres-
 diatur, nō iā bilis: sed alius humor reputabitur. Hoc
 autem (bilem inquā egredi limites suæ latitudinis)
 7. *Bilis duo- bus modis deficit à sua natura.* cōtingit bifariā: vno modo (vt sic dicatur) per se, & 10
 in se. Altero modo, per admixtionem. Per se, & in se
 adhuc dupliciter: Vno modò, quādo bilis illa natura
 7. *Vitellina ex meraca bile.* lis putrefcit, & aduritur, & talis dicitur adusta p pu-
 trefactionē. Altero modo, quādo bilis nō naturalis
 7. *Bilis porra- cea.* vitellina dicta, igneo calore percoquitur in hepate, 15
 aut in vētriculo, aut in venis, & efficitur porracea,
 7. *Ærugino- sa.* quā etiā prasinā vocāt, vel æruginosa, quæ extremē
 non naturalis: seu præter naturā, cū aliis humor illi
 7. *Crocea bi- lis.* extrinsecus accedit. Et hoc quidem fit multifariam. 20
 Nēpe si phlegma tenue & aquosum illi admisceatur
 7. *Vitellina, ex admi- xtionē pitui- tæ.* citrina seu crocea efficitur, si crassum & viscosum,
 7. *Auicenn.* vitellina: si verò melācholia adusta illi permisceatur,
 7. *Haly.* efficitur bilis adusta p admixtionē. Et sic iuxta Auicennæ placitum, sex sunt species bilis non naturalis. 25
 Apud Haly ab. verò quatuor duntaxat. Nullā enim
 prorsus mētionē fecit de duabus speciebus adustis.
 Galeno autē libr. 2. de virtutibus naturalibus, nulla
 bilis præter naturā esse dicitur, præter vitellinā, quæ
 7. *Porracea bilis quò gi- gnatur.* ouorū vitellis, tum colore, tū crassitudine est adsumi 30
 lis. Siquidem porraceā & æruginosam ex prauis ac
 corruptis humoribus, propter quorūdā esculētorū
 aut olerū cruditatē, qualia sunt, beta, cepa, brassica
 sæpenuero in vētriculo ait generari. Atq; etiā in-
 7. *Quatuor in flāmationū differentiæ, ex flaua bile oriuntur.* terdū talibus nequaquā ingestis, ratiōe ægritudinis 35
 aut malē alicuius dispositiōis in venis ipsis generas-
 tur. Ex iis itaq; colligitur, quatuor species seu dif-
 ferentias inflammationum (quæ vulgus cholericā
 apo

apostemata vocat) ex bile ipsa generari. Nempe ex
 bile vera, syncera, & laudabili (quam tenuem feruē-
 temq; sanguinem appellamus) procreatur ea species
 inflammationis, quæ Galeno verum atque exquisi-
 tum erysipelas appellatur, lib. 2. ad Glauc. quod tan- Verū erysi-
 quam cutis solius passio est. Græcè autem *ἀριστὸς ἴψος* pelas.
οστία nominatur. Ex bile verò non naturali, & Tria erysipa-
 aliis humoribus permixta, tres aliæ nascuntur diffe- lata illegiti-
 rētæ, utpote erysipelas phlegmonôdes, erysipelas ma.
 œdematôdes, & erysipelas scirrhôdes. Ex bile autē
 quæ præter naturam ex adustione facta est, pro ra-
 tione tenuitatis aut crassitiei substantiæ ipsius gene-
 rantur, vel herpes esthiomeni, id est, exedētes (qui Herpes ex-
 eiusdem generis sunt cum erysipelatis, quæ cum ex- edens.
 15 ulceratione incidunt) vel phagedænæ (quæ cum cu- Phagedæna
 te pariter subiectam carnem altius erodunt) & exul- Cancris ex-
 cerati cancri, aliæq; eiusmodi erodentia, & cacoëthæ, ulcerati.
 id est, maligna vlcera, quæ pustulæ corrosivæ recen-
 tioribus chirurgis dicuntur. Itaque tenuissimus quis
 20 dem in eiusmodi humoribus, est is, qui ex ulceratum
 herpetem excitat: crassissimus, qui cancrum. Proxi-
 mum deinceps locum occupat, quod ad crassitudi-
 nem attinet, qui phagedænas creat, ut libro 14. me-
 thodi medēdi Galenus annotavit. Causæ veri ery- Cause veri
 25 sipelatis utri & phlegmones veræ, sunt tres. Prægres erysipelat.
 sæ, quæ & primitivæ dicuntur: antecedentes, & con-
 iunctæ. Cæterum rarò fit erysipelas à causa prægres-
 sa, frictiones tamen violentæ, insolatio & admotio
 medicaminum attrahentium ipsum nonnunquam
 30 excitant.

De signis & iudiciis veri erysipelatis.

Signa & iudicia veri atque exquisiti erysipelatis
 sumuntur ex collatione ipsius ad phlegmonē ius-
 35 **S**xta Galeni doctrinā, 14. Therap. & 2. ad Glauco-
 nem: ex quo aperte colligitur verū ac legitimū erysi-
 pelas veluti quandā speciē esse phlegmones, id est, NOTA
 inflammationis generaliter acceptæ. Notæ igitur erysipelat.
erysi

76 Institut. Chirurgicalarum. Lib. I.

1. *Rubor erysipelatis sunt, color aspectu rubidus, in flauū elāz
flauescens, guescēs, qui (rubor inquā flauescēs) ad tactū, hoc est,
ad tactum digitorū appōitū facile iuberfugit, rursusq; illabitur.
subterfugiēs* Tumor exiguus, in cute potius consistens, quā
2. *Tumor altē descendens.*
 3. *Calor* Calor vehemens febrem excitans maiorem, eā,
4. *Calor* quā ex phlegmone accenditur. Si quidem calidius
5. *vehemens.* multo est erysipelas, quā phlegmone. Pulsatio
6. *Pulsatio* (quā magnē phlegmones proprium est symptomata) non
7. *exigua.* admodū fortis. Dolor mordicans & pungens
8. *Dolor* nullā (vt in phlegmone contingit) inuehens tensio-
9. *pūtorius.* nem, & si quā sunt alia bilis dominiū significantia.
- IVDICIA.** Quod autem ad iudicia pertinet, erysipelas vt pluris-
 1. mū faciemprehendit, incipitq; maximē in ea nasi
parte quā vulgō lepus appellatur. Deinde mox in
2. faciem totam expanditur, gemina quidem occasio-
ne: nempe ob faciei raritatem, & ipsius bilis leuitas
3. tem. In ossis autem exutione seu denudatione,
erysipelas superueniens, malo est, vt scribit Hippo-
4. crates Aphor. 19. libro septimo, hoc est, symptomata
5. prauum est, si os nudato caro circumstans ab erysi-
6. pelate occupari videatur. Hoc autem Galeno teste,
7. rarissimē accidit. Rursus sequēti aphorismo scribitur
8. ab eodem Hippocra. quod ab erysipelate putres-
9. do aut suppuratio, malum. Hæc enim (inquit Gale-
 1. nus) nunquā erysipelatis superueniunt, nisi valde
2. malignis. Verum ac legitimū erysipelas quatuor
3. habet tempora, vt & alij præter naturam tumores.
4. Horum autem signa ex præcedentibus sunt requi-
5. renda. Exquisitum erysipelas rarō terminatur sup-
6. puratione, sed magna ex parte insensibili transpiras-
7. tione seu resolutione. In erysipelate quædam ins-
8. terdū contingunt symptomata, quā nonnun-
9. quā magnitudine ipsius morbi causā exuperat, atque ideo
 1. curandi rationem interpellant, hoc est, 35
2. curationis ordinem euariāt, peruertuntq; vt etiam
3. superius de phlegmone dictum est. Ad hæc ery-
4. sipelas motum sequitur tertianæ febris, nam ad eius
5. materiam

*In cō. præ-
dict. Aph.*

*Erysipelas
motū sequi-
tur tertianæ
febris.*

materiam quandam habet analogiam. Vtriusque enim materia, humor est biliosus. Cæterum erysipelas ab exterioribus verti ad interiora non est bonum: 8
 ab interioribus autem ad exteriora, bonum, ut ab Hippocrate scriptum est aph. 25. li. 6. Erysipelata verò, quæ circa caput curatu diffusi-
 capiti oboriuntur, plus faciunt negotij, adeoque (ut cillima.
 Paulus ait) periculosa esse solent, ut nisi efficax consequantur auxilium, interdum affectos strangulent. 9
 Scribit etiam Hippo. lethale esse, si erysipelas sit in 10
 utero mulieris prægnantis. Factio enim sic in utero erysipelate, foetus ex necessitate moritur. Siquidem Erysipelas
 acuta febris (ut Galenus ait in commentario) sæpe in utero præ-
 eum citra inflammationem interimit. gnantis fa-
tu enecat.

Erysipelatis curatio.

15 **C**um erysipelas, sicuti & phlegmone, de qua paulo antè egimus, affectus calidus sit, & ex humorum defluxione fiat, geminus etiam erit totius curationis ipsius scopus, nempe refrigeratio Curationis
erysipelatis,
scopi vniuersales duo.
20 & vacuatio. At veluti vacuationis indicatio in phlegmone, refrigerationis indicatione vincebat: ita refrigerationis indicatio in erysipelate, magis urget quam vacuationis. Illa enim quantitate, hoc verò qualitate magis premit & discrutiat. Itaque erysipelas
25 magis refrigerari, & minus vacuari. Inflammatio contra magis vacuari, & minus refrigerari debet. Quamquam utriusque affectus curandi (ut inquit Galenus) commune caput sit, infestationis scilicet humoris vacuatio. Ideoque postquam refrigeratum erysipelas fuerit, ad ea
30 quæ digerunt seu discutiunt medicamenta conuertimur. Porro ut geminum hunc scopum vniuersalem, refrigerationem inquam & humoris infestationis vacuationem, assequamur, quatuor aliis scopis particularibus iuxta posterioris ætatis chirurgorum placita, est opus, Particula-
res curandi
erysipelatis
scopi. 4.
35 Primus scopus, consistit in recta vitæ institutione atque obseruatione. 1

Secundus, humoris ad partem affectam confluētis, quæ antecedentem materiam appellat, auersionem cōcernit. 2

Tert

78 Institut. Chirurgicarum, Lib. I.

- 3 Tertius in humoris, qui iam in partem ægram in-
fluxit (quem materiam coniunctam dicunt) vacua-
4 tione consistit. Quartus verò & postremus circa
symptomatum correctionem, ac propulsionem vers-
atur. Primū scopum faciliè assequemur, si rerū o-
mnium, quas non naturales vocant, administratio,
ad humiditatem & frigiditatem (vt in febre tertiaz
na) spectauerit. Quādoquidē erysipelas ex flaua bis-
le ortū habet, quæ temperaturæ est calidæ & siccæ.

*Primus sco-
pus.*

*Æris dele-
ctus.*

*Ambientis
preparatio.*

Ergo ærem quoad fieri potest, frigidiorē & 10
humidiorē deligito, præparatoq;.

Æstate igitur subterraneas domos frigidissimas,
maximè perfilas, & ad Arcton versas, tibi deligis-
to. Siloci huiusmodi occasio non datur, & calidior
aër extiterit, ipsum sic præparato. 15

Aquā frigidā ex vasis in vasa subīde trāsfundito.

Pauimenta domus assidue aqua, quæ prorsus ge-
lida sit, aspergito.

Rosas, & violas plurimas, vitium folia, & capreo-
los, salicis quoque ramulos, & reliquos flores ac ger- 20
mina, quæ frigidæ humidæq; facultatis sunt, humi
spargito, ac in ærem proiicito.

Turbam hominum conclauo laborantis ingredi
prohibeto.

Cibus.

Pinguia, dulcia, acria, calidāq; omnia vitato. 25

Lactuca, cucurbita, portulaca, oxalide, (quam ace-
tosam vocant) hordeato, oriza, & aliis id genus, quæ
sanguinem incrassant, & refrigerāt, lubēs vescitor,

Potus.

A vino in totum abstineto.

Cremor ptisanæ, aut aqua hordei tibi potus esto. 30

Repletio.

Victus temperantiam seruato.

Inanitio.

Aluus tibi semper mollis esto.

Motus.

Ab omni motu, præsertim vehementi atq; inmo-
derato abstineto.

*Animi affe-
ctus.*

Iram, contentionem, atq; omnem animi vehemen- 35
tiorē motum, aut perturbationem, tanquā ad-
uersissima fugito.

Nitida, ac munda circa te omnia sunt.

Vene

Venerem ne exerceto.

Atq; hæc de Venus.

primo scopo dicta sufficiant.

- Secundum autem scopum curationis erysipelatis
 cōsequemur, si succum in corpore delinquentē com
 5 moda vacuatione ademerimus. Ergo in vero acle^{pus},
 gitino erysipelate nō necessariō, vt in phlegmone,
 sanguinem ex vena detrahemus: sed medicamento
 quod flauam bilem exigat (cholag^{gon} Græci vo
 cant) ventrem per inferiora expurgabimus, si saltē
 10 affectus magnus sit, & corpus bile abundare videat
 tur. Itaque cum erysipelas febres accendat, & eas ve
 hementiores quā phlegmone, medicamenta, quæ
 impensē calida sunt, & scammonij succum, quod res
 centior Græcia dacrydion vocat, recipiūt: (cuiusmo
 15 di est, quod vulgō in officinis electuariū de succo ro
 farum appellatur) huic affectui minimē idonea sunt.
 Ergo vel rhabarbarū offerēdū est, vel potio, quæ Ra
 si aqua tamarindorū dicitur. Recipit autē pruna Das
 mascena 24, tamarindorū recentij drachmas decem,
 20 sacchari violati quat. semissem. Cui vt efficacior red
 datur, aliquid diluti rhabarbari adiici potest. Quod
 si exigua sit affectio, ne hæc quidem cholag^{ga} me
 dicamēta necessaria erūt, sed abundē fuerit, tunc acri
 clystere vtī, vt Galeno visum est. At in erysipilate
 25 phlegmonoso nō abs re feceris: modō nihil obstitet
 rit) si curationē à sanguinis missione auspīcatus fue
 ris. Tale autē sepius faciē apprehēdit, vnde & Paulus
 protinūs ab initio venā in cubito præsertim humera
 lem in eo incidī iubet. Sin autē hæc nō appareat, eam
 30 quæ se cōspectui magis obiiicit. Si quid verō sangui
 nis detractionē impediāt, purgatione ex medicamen
 to, quod bili ducendę dicatū est, vtēdū præcipit. Nō
 pugnat tamē Paulus cū Galeno. Nēpe cū Paulus
 secādā esse venā præcepit in erysipelate, quod capiti
 35 seu faciei oboritur, de phlegmonoso erysipelate in
 tellexit, q̄ sepius faciē apprehēdit: Galen. verō de
 legitio erysipelate locut⁹ est, i quo sanguinē nō mit
 tit. At in œdematoso aut scirrroso erysipelate, pur
 gatio

Secūduſ ſco

pus.

2. ad Glau
 In eryſipel
 te phlegmo
 noso compe
 rit phlebot
 mia.

80 Institut. Chirurgicarum, Lib. I.

Chirurgus gatione vtēdū est, quę mixtras habeat facultates, hoc
is quę ad est, partim flauābilem, partim verò pituitosum, aut
phlebotomiā melancholicum succum educat. Atque in iis quibz
et purgatio dem omnibus consulendus est doctus aliquis ac pru-
ne attinent, dens medicus, à cuius consilio & decretis ne trāsuert
nihil atten- sum quidem vnguē discedere debet chirurgus. Sitq;
tare debet, hoc satis semel monuisse, quòd chirurgus nihil vn-
citra periti quàm in iis, quę ad purgationem, & sanguinis mis-
alicuius me sionem per phlebotomiam, attinent, attētare debet,
dici cōsiliū. citra periti alicuius medici consilium, nisi forsā sit
 quando vrgeat necessitas, & vbi nullus pręstō adest
 medicus.

3 Tertia intē- Terciam intentionem complent refrige-
tio. rantia & reprimētia, in principio fluxionis, exces-
 ptis casibus in capite vniuersali cōmemoratis. Trās-
 actio verò principio, & statā iam fluxione, quod mēs
 bro inhæsit, & impactum est, digerentibus seu euas-
 porantibus medicamentis extrinsecus admotis, vas-
 cuandum est, per occultam scilicet sensui transpiras-
 tionem. Omnium siquidem huiusmodi tumorū sic
 pręter naturam consistentium, vacuatio duplex est
 Gal. 14. Therap. Vna quidem repellentium ad alias
 partes: altera forās digerētium, per eum qui sensum
 fugiat halitum. At quoniam erysipelas non quan-
 titate modò affligit, sed etiam, ex vehēmenti scilicet
 inflammatione, qualitate ipsa cruciat, ampliorem
 refrigerationem, quàm phlegmone requirit. Post to-
 tius igitur corporis (vt paulò antè dictum est) vacua-
 tionem, reprimētibz auxiliis vtemur, afflictam
 particulam, seu ipsam quę patitur cutem, vt decet,
 refrigerantes, pręsertim cū sine manifesta aliqua
 occasione factum fuerit erysipelas.

Quatenus Est autem refrigerationis terminus, ipsa coloris
refrigerādū mutatio. Etenim quod purum erysipelas est, statim
in erysipela cum hoc quiescit. Quod nō purum est, sed iam quoz
te. dammodò phlegmonōdes, si plusculum refrigeres, 35
 liuidam cutim pręfert. Sin ne sic quidem quis desis-
 fiat, nigricat, potissimū in senili corpore: sic vt quę
 dam ita refrigeratoriū, ne digerētibus quidē postea
 me

medicamentis ad perfectionē possint sanari: sed scirrhusus quidē tumor in particula derelinquat. Ergo satius est (inquit Gal.) ubi laborātis particulæ alter *Lib. 14.*
 ratum colorem videris, à refrigerantibus rerundēti *Therap.*
 5 busq; ad contraria, id est, dissipantia seu digerentia
 & exiccāria, transire, priusquā vel liuida vel nigra
 prorsus fiat. Adhibenda autē semper cura est, vt quæ
 illinūtur, perliquida sint atque humida, eaq; sæpius
 cōmutentur, ac per spongiās frigido aliquo liquore
 10 imbutas, subinde quæ admora sunt, abluātur. Si quis
 dem multus particulæ feruor celeriter in vaporē erū
 pens, hæc desiccet. Cæterū inter ea quæ refrigerā
 di, atque repellendi facultatē obtinēt, in hoc affectu
 conuenientē, laudat imprimis Auicennas ex simpli
 15 cibus, perfusionē aquæ frigidæ. Gal. verò cōmendat *Materia re-*
 succum solani, semperuiui, portulacæ, psyllij, alter *frigerantiū*
 ci, id est, hyoscyami, lactucæ, vmbilici Veneris (quæ *ex Gal.*
 herbula Græcis cotyledon appellatur) intybi, id est, *Adiecta ex*
 cichorij, lenticulæ palustris, cucurbitæ atque alia id *Paulo.*
 20 genus. Ceratum quoque ex aqua admodū frigida, quod recipiat quadruplū rosacei ad cerā albā. Sit
 aut rosaceū ex oleo omphacino, id est, immaturo sine
 sale confectō, quibus in pila emollitis aquæ frigidæ
 superfunditur, quantū potest recipi. Si verò aceti tes
 25 nuis & pellucidī momentū admiscueris, præstātius
 atque efficacius medicamentum reddideris. Porro
 hæc omnia actū frigida sunt admouenda, & subindē
 mutanda, priusquā manifestē incaleant, aut ares
 cant. Conducit etiā plurimū ad rem præsentem
 si pars erysipelate obfessa, illinatur cerusa sola, vel
 30 mixta cum aceto & lycio, vel terra cimolia, aut fig
 ulari cum solano, aut argenti spuma cum rosaceo,
 item acacia cū aceto. Ad idem cōfert plurimū & ses
 quens cōpositio. Succī plātaginis vncia vna, rosacei, *Compositū*
 vnciæ tres, lichargyri nutriti, vncia vna, cerusæ lotæ *medicamen*
 35 drach. tres, lactis muliebris semūcia, miscētur omnia *tum.*
 simul in mortario plumbeo, & fit linimētum. Teri
 debent priūm lichargyrum & cerusa: deindē oleū

82 Institut. Chirurgicarum, Lib. I.

& succus paulatim & sensim affundi debent, donec exactè misceantur. Quòd si ampliorem refrigerationem desyderes, his & aliis prius enumeratis ex Pauli sententia admisceri potest, opij aliquid, vel cicute, vel mādragoræ. Verùm ab iis, & similibus, quæ frigus pefaciendi vim habent, abstinendum esse cenleo, nisi maxima vrgeat necessitas. Cæterùm vbi inflāmatio ægrotātis membri iam desiit, ac feruor erysipelatis sese remisit, Galenus humorem in particula receptū quam coniunctam materiam vocant, priusquàm ex refrigeratione liuor appareat, discutit, imposito cataplasmate, ex hordei farina, seu ex cruda polenta, *ὀμὴν λήθην* Græcè vocant, & aliis in ratione curandæ phlegmone superius dictis. Quemadmodum enim signa erysipelatis sumebantur ex analogia signorū phlegmones, ita & curationis ipsius erysipelatis auxilia, ex analogia remediorum curationis phlegmones sumenda sunt. Porro talia medicamenta, quæ dissoluendi, seu euaporandi facultatem obtinent, in hoc affectu conuenientem: plurima tum simplicia, tum composita referuntur à Paulo Aegineta lib. 4. c. 21. Item ab Aëtio libro de re medica decimo quarto. Satis autem fuerit, nunc vnum ex multis recēdere quod omnium mihi præstantissimum visum est. Altheæ nouellæ foliorum pendo id est libra assumitur, concoquuntur in hydrelæo: cocta verò probè teruntur, adiecto ὃς rosacei triente. i. vncijs quatuor, argenti spumæ, & cerusæ, singulorū vncijs duabus & semisse, id est, dimidia: iterum læuigantur cum succo coriani, aut semperuiui, aut solani: deindè micis panis adiunctis, vt emplastri formam induat, illinitur. Quod si fortè liuor iam locum occuparit, incisa antè cute, cataplasma superponendū est, perfundendusq; locus, plurimū quidē (vt Galenus præcipit) aqua calida: digerit enim, & plagas abluit: sed & aqua, & muria interim conducet locum fouere, cū scilicet crassior est. Hæc enim crassitudine incidunt, ac detergent. Quarta intentio curationis erysipelatis, quæ est

*Euacuatio
coniunctæ ma-
terię, p euapo-
rantia.*

ὀμὴν λήθην

*Hydrelæū
est. mistura
ex aqua &
oleo, seu oleū
dilutum.
Si liuor iam
locum occu-
parit.*

*4
Quarta in-
tentio.*

est accidentium correctio, perficitur ut in curatione phlegmones dictum est, cum agebatur de rediva materia, de induratione, & corruptione. Item de dolore & ardore. Hæc enim symptomata etiam erysipelas, uti & phlegmonæ accidere solent.

Porro optimum doloris ac vehementis ardoris mitigatorium auxiliū fit, ex folijs, & radicibus hyoscyami, inuolutis in stupis, & coctis sub prunis: deinde mixtis cum unguento, quod populeon vulgo appellatur, vel cum axungia, ut superius dictum est in curatione phlegmones.

Doloris & ardoris mitigatorium,

Si verò contingeret ipsum erysipelas exulcerari, curetur admotione unguenti albi, aut unguenti de lithargyro, quorum descriptiones ex sexto libro requirendæ sunt. Quod si illis adderetur aliquid scorix, hoc est, recrementi plumbi, optimum sanè atque efficacissimum foret remedium. Sed præstat ut totam curandi erysipelatis rationem, breuibus quibusdam sententiis in modum epilogi complectamur, ut quæ diffusius à nobis supra dicta sunt, memoriæ tenacius hæreant.

Septem de erysipelate aphorismi, totam ipsius curationem summam complectentes, ex Galeno.

IN exquisito erysipelate, sanguinēne detrahito. Si bile corpus abundet, & affectus magnus sit ventrem medicamento cholagogo, per inferiora purgato.

Quod si exiguus morbus sit, & corpus bile vacuum, à medicamento flauam bilem per aluum ducente, abstineto, & acri clystere contentus esto.

Vniuerso, ut oportet, corpore purgato, partem affectam per initia moderatè reprimentibus medicamentis, & abundè refrigerantibus, usque ad coloris mutationem, perfundito, atque illinito.

Vbi laborantis particulæ alteratum colorem videris, & feruorē erysipelatis iam remissum, ac inflas-

mationem defuisse, à refrigerantibus, astringentibusq; priusquam vel liuida, vel nigra prorsus particula fiat, ad contraria, hoc est, digerentia seu discutientia, & exiccantia transito.

6 Quæ ex vlcerebus, alijsq; euidentibus causis fiūt erysipelata, primū scarificato, deindē cataplasma ex hordeacea farina imposito,

7 Si erysipelas non exquisitum fuerit, sed phlegmonodes, præsertim vbi sanguis in corpore exuberat, intrepidē sanguinem mittito.

10

De Tumoribus, qui cum erysipelate societatem habent, hoc est, de herpete miliari, & exedente, quæ pustulae cholerica recentioribus chirurgis dicuntur.

De Herpete. **T**VMores illos præter naturā, qui cum suprā cōprehensio erysipelate societatem habēt, atque ad ipsum quodammodō pertinere videntur: ex bile autem non naturali, & secreta, id est, alijs humoribus, minimē permixta, generationem obtinent, recentiores tum medici, tum chirurgi, pustulas malas cholicas appellant: Græci verō, (vt Hippoc. Gale. & Paulus) herpetas vocant. Quæ vox Latinis ferē sonat, malum quod serpit: *ἑρπης* enim idem quod *serpo*, vnde *ἑρπης* serpens dicitur. Herpes tamen nō absolute malū quod serpit, significat apud medicos, sed certum morbi genus, de quo nunc agitur. Itaque malum quod serpit, latius patet quā herpes. Nam & phagedæna serpentia etiam vlcera dicuntur. Huiusmodi autem vniuersas pustulas Auicennas formicas appellauit: Galenus verō eas inter inflammationes adnumerauit, sed Celsus sub ignis sacri nomine has intellexisse videtur lib. 5. cap. 28. Fit igitur herpes, quando flaua bilis, non naturalis, sola, & secreta, id est, nullo alio illi admixto humore, in partem aliquam confluit, atque ibidem cōsistit: quæ si consistentia sua crassior sit, acriorq; totam exulcerat cutem, vsque ad carnē suppositā, vocaturq; tunc vitiū huiusmodi Hippocra. & Græcis *ἑρπης* idiomus, Latinis

*Pustulae male
le & chole-
rice vulgō
dictæ.
Herpetes.*

*Formica
Auicenna.
Herpes
quādo fiat.
Herpetus spe-
cies duæ.*

*ἑρπης idiomus
vitiū, id est*

20

25

30

35

Latinis verò herpes exedens: vel depascens: & deci- exedens, vel
 moquarto Therap. Galeno absoluto nomine her- depascens.
 pes. Si verò tenuior & minus acris, calidaq; fuerit bi-
 lis, pustulas exiguas per summā cutem, id est, in solā
 superficie cutis (hāc enim tātū veluti deīrit) milio,
 hoc est, milij seminibus, similes excitat: ob quā simi-
 litudinē affectus tunc Latinis miliaris herpes nomi-
 natur: Græcis verò quibusdā post Hippocratis æta-
 tem κίχρητας ob eādē rationem dictus est: κίχρητις enim 2
 Græcis, miliū nobis dicitur. Atq; hęc species Gale- Herpes mi-
 no autore lib. 2. ad Glaucon. generis sortitur appella- liaris, sine
 tionē, cū simpliciter, & sine additione illi herpes vo- cenchria.
 cetur. Alibi tamē herpetis nomine, Galenus herpes Lib. 14.
 tē esthiomenum, id est, exedentē intelligit: vt paulō Therap.
 post dicitur. Hic autem nō protinus vlcus facit: vt
 alter qui exedens dicitur: sed vt dictū est, admodum
 exiguas pustulas ad speciē milij excitat, quæ & ipsæ
 interposito spacio, ac procedente tēpore, cū disrump-
 untur scilicet, in vlcus abeunt. Proinde nō sine raz Ex Paulo
 tione Oribasio & quibusdā aliis etiam antē Galeni et Gal.
 tēpora visum est, in eiusmodi vitio, bili esse aliquid
 pituitæ tenuis admixtū, quę pustulas illas minutus-
 las procreat. Vnde & nōnullis pustulosus herpes di-
 ctus est. Alter verò, qui esthiomenos appellatur, nō Lib. de 11
 ita pituitæ commixtus est, sed exactæ bilis, ac nullo præter nat
 alio humore infectæ, esse videtur: ideoq; cū erosione
 accidit, affectu cutis cōtinuitatē præhēdēte, vnde &
 nomen illi impositū est. Esthiomenos enim idem est
 quod erodens vel exedens. Atq; hic affectus quidem
 eiusdē generis est cum pustuloso atque exulcerato
 erysipelate: à quo tamē differt humoris ipsius bilio-
 si (ex quo vitii vtrumq; ortum habet) tenuitate. Id Lib. 14.
 quod testatur Gal. his verbis: Est enim (inquit) ad- met. medē.
 modū tenuis humor qui herpetē excitat, adeō profe Humor b
 cō: vt non solū omnes interiores partes, quę vtique liosus qu
 carnosæ substantiā sunt, trāseat: sed etiā cutim ipsam herpetē ex
 ad summam vsque cuticulā (epidermida Græci vo- tar, admo
 cant) quam solā, propterea quod ab ea remoratur, tenuis est.

86 Institut. Chirurgicalarum, Lib. I.

tum erodit, tum exedit: quando si hanc quoque fur-
 doris vice transiret, haudquaquam vlcerum excitaret.
 Quippe id, vlcerum quæ ex mordente humore oriū-
 tur, quæ nimirum spontanea vocant, commune est,
 quod humor qui ea facit, sistitur in exitu, ac tardat.
 Haecenus Gale. ubi nomine herpetis simpliciter &
 sine additione, intelligit herpetem esthiomenū, ut ex
 ipso cōtextu signis, & curatione, facile est deprehē-
 dere. Atque ita illo in loco generis sortitur appella-
 tionē, cum simpliciter, & absolutē herpes nomine-
 tur: quæadmodum & in libello, de tumoribus præter
 naturam, ubi de eo sic idem. Gal. ad verbum scribit.

*Herpes so-
 lius cutis est
 exulceratio.*

Depascitur quidem & herpes, vicina, id est, ea quæ
 in circuitu sunt, erodens: verum solius cutis est exul-
 ceratio. Cæterum utrâque herpetis speciem, id est,
 tam miliarem, quam exedentem, sub nomine formicæ
 Barbari ferè omnes nœotici cōprehēdunt. Quibus
 ea in re, ut & in multis aliis, erroris occasionem pri-
 mus præbuit Auicennas, qui nominis similitudine
 deceptus, quoniā Græci myrmecias, id est, formicas,
 genus quoddā verrucarū vocant, eodē capite ver-
 rucas illas cum herperibus errore fœdissimō cōmis-
 scuit. Guido tamen discrimen ponit, inter herpetem
 & formicā, cōfunditq; nomē formicæ modò cū ver-
 rucis (quas myrmecias & acrochordonas Græci vo-
 cant) modò cum herpete exedente: qui (comedēs in-
 quam herpes) modò etiam illi herpestē, modò herpes
 absolutē nominatur: putaturq; eidē nihil aliud esse

*Herpetem
 esthiomenū
 & erysip-
 elas vlceratū
 non omnino
 idem esse.*

quàm erysipelas pustulosum, & vlceratū. Cum ta-
 men ille (ut ex Galeno adductum est) ab hoc differat
 humoris tenuitate. Tenuior enim est bilis quæ her-
 peta creat, quàm quæ vlceratum erysipelas. Ad hoc
 erysipelas quod cū exulceratione incidit, non tantū
 cutem, sed cum ea etiā aliquid subiectæ carnis occu-
 pat. Herpes verò, quo de hîc agitur, solā cutim appre-

*Morbilli ex
 herpetū sunt
 genere.*

hēdit, exulceratq;. Itaq; tametsi hæc eiisdē sint gene-
 ri, (ut Gale. visum est) non tamē omnino sunt idem.
 Porro pustulas illas, quæ Auicenne interpreti, &
 imperitæ

imperitæ medicorū turbæ, morbili appellātur, sub
herpete cōprehendisse videtur Hippocrat. lib. 3. Epi-
demiarū. Fiunt autē morbili huiusmodi à tenuiore
materia, quā pustulæ illæ, quæ vulgò variolæ dicun-
tur. Hæ enim (vt voluit Auicennas) ex sanguine, illi
verò ex bilis sanguinisq; fiūt mixtione. Si quis autē
desyderat, quo nomine eiusmodi pustulæ apud anti-
quiores dictæ sint, diximus Latine à Plinio vocari
papularū, & interdū pituitæ eruptiones: Græcè verò
Hippocrati ecchymata li. 3. Epidemiarū: Galeno
autē exanthemata. Cæterū vtriusq; herpetis notæ,
iudicia, & causæ, ex præcedentibus satis innotescūt.
Superest igitur: vt eorum curationem subiiciamus.

Variolæ

Papularum
eruptiones
Ecchymata
Exanthema-
mata.*Herpetis curatio.*Herpetis cu-
ratio tres

15 **I**N curādis herpetibus, sicut & in aliis eiusmodi habet scopos
spontaneis vlceribus, quæ ex mordēti & acri hu-
more oriunt, tres scopi cōmunes sunt obseruādi. rones.
Primus est, vt humoris in partem affectam con-
fluxio inhibeatur.

20 Secundus, vt quicquid in laborātem particulam
confluxit, & eidem inhæsit, vacuetur.

Tertius, vt sanetur vlcus.

Primū scopum, assequimur: totum corpus, me-
dicamine, humorem (vnde vitium enascitur) educē-
te, expurgando. Mox repurgato corpore humorem
influentem reprimendo, regerendoq;. Ergo in her-
pete exedente, medicamēto vtendum est, quod fla-
uam bilē per aluū exigit. Hūc enim purus, ac synce-
rus (vti diximus) biliosus procreat succus. Proinde
fit, vt quātum ad totius corporis euacuationē atti-
net, comedētes herpetas similiter vt erysipelata cu-
rare oporteat. Itaq; quoniā tenuis humor est, qui id
vitiū creat, abūde est Galeno, etiā aluū leniter sol-
uissē, vel vrinas, p ea quæ id modicē efficiūt, citasse.
In altero verò herpetum genere, quē à similitudine
quā habet cū milio, miliarē & cēchriā Græcè appella-
ri diximus: medicamēto opus est, quod mixtæ sit cat.

habet scopos
sine inten-
tiones.

3

1

Primus sco-
pus.Herpes ex-
edens medi-
camētū ex-
git cholaga-
gon.Herpes mi-
liaris medi-
camentum
desyderat,quod bilē
simul ex-
sintam ed

facultatis, hoc est, quod bilem simul & pituitā educat. Quibusdam enim non sine ratione (vt Galenus ait) visum est in eiusmodi vitio bili esse aliquid pituitæ admixtum. Porro vacuato: vt decet, eo qui in corpore redūdat, ac vitium cōmittit, humore: medicamentis vtendū est, quæ influentem humorē reprīmāt, regerātq;. Tutiōr namq; ac cōuenientior tunc fuerit eorū vius. Quādoquidē (inquit Gale.) si quis exiguū vitiosi humoris, post ritē factā purgationē adhuc in corpore remanens ad viscera, & magnas venas retrudat: nullum profectō quod sensu percipiatur malum cōmittet. At si, eius non leuis quantitas sit, in princeps aliquod membrū aliquando procumbit. Vbi scilicet prius naturæ viribus totū corpus expurgantis, non sit: vel per deiectionem: vel vrinas: vel cutim, quæ totū corpus includit, vacuatus. Cæterū reprimunt quidem regeruntq; nō solū ea quæ adstringūt: sed etiā quæ sine adstrictione refrigerāt. Cuiusmodi sunt lactuca, poligonion, ex stagnis lens, portulaca, seris, semperuiuum, & id genus alia, quæ erysipelatibus valde erāt oportuna. Verū eiusmodi medicamenta, quæ scilicet præter id quod refrigerāt, etiā humectare naturā apta sunt, herpes res præsertim depascentes, minimē desyderāt: sed sola ea admittunt refrigerantia, quæ etiā maximē possunt exiccare. Quæ enim refrigerādi, atq; vnā exiccandi vim habent: sed mediocrem (cuiusmodi est solanum) nō satis illis cōueniūt. Apponere igitur ipsis oportet ex Gale. cōsilio, ab initio quidē, ex vite caspreolos, & folia rubi, & rubi canini, & arnoglosi. Post hæc verō & lenticulā his adnigere oportet, & aliquādo mel, & farinā hordeaceā. Item cataplasma sine semperuiuo, quod ad phlegmonas, quæ ex fluxione eueniunt, inscribitur. Repellit enim quod influit, atq; id quod in pte affecta continetur, exiccat, & mēbra corroborat. Proinde trāfacto morbi principio efficax erit remediū. Itaq; fiet huiusmodi cataplasma, ex corticibus malorū Punicorū in vino decoct

Reprimēdi
tempus.
Lib. 14.
Therap.

Non esse re-
primēdum,
si multus sit
vitiosus suc-
cus.
Regerentiū
materia.

Quæ refri-
gerant præ-
sertim hu-
mechtāt, non
conueniunt
herpetibus
exedentibus.
Reprimen-
tia herpeti-
bus exeden-
tibus acco-
moda.

Hæc com-
plent secun-
dam inten-
tionem.

Cataplas-
ma.

- coctis & Rhu, siue Rhoë. i. semine coriarij fruticis
(quod posteriori medicinæ Sumach appellatur) & *sumach.*
farina hordei. Cæterum hoc cataplasmate secūdam
intentionem, seu scopū curandi herpetis probè asse
queris. Quippe cū sufficienter digerere possit,
quod iam in affectum locum cōfluxerit. Cōstat au
tem, quod in generatiōe vlcis exuperare debebūt
quæ reprimendi facultatem habent: vbi verò non
amplius confluit in ægrotantem particulam vitio
sus humor, quæ digerunt. Quod ad tertium scopum
attinet, qui vlcus sanandum proponit, summam
hæc te cognoscere oportet. Nempe quod omne vl
cus siue sponte siue ex accidenti factum fuerit, exic
cari desyderat medicamento (vt inquit Hippo.) non
aspero, hoc est: nō mordente, neq; vehementer irri
tante, præterquā vbi malignum, & cum putrilagi
ne fuerit. Talia enim (inquit Galenus) aciora expe
sunt medicamina, & quæ ignis vires habeāt: quale
est myfi, & chalcitis, & arsemicum, & calx, & san
daracha, atq; id genus alia, quæ nō aliter, quā ignis
adurunt. Loca igitur exulcerata in herpete exeden
te, inungenda sunt pastillis, seu trochiscis, in libris,
qui pharmaceutici dicuntur, ad herpetas inscriptis.
Qui cū res exigit: vt illis vtamur, pasto, vel vino
aliquo dulci: vel si dulce non adfuerit, vino tenui
& subaustero non nimis veteri (hoc est, quod non
aliquam ingustu ob antiquitatem cōtraxerit acritu
dinem) aut posca aquosa (quod oxycratum vocant)
diluuntur. Paulus his vtitur remediis, ad herpetem,
qui sub cute affligit. Retrimentum plumbi, rutæ le
uigatæ succo excipitur, aut ceratum myrteum in vi
cem rutæ. Aliud, Lanæ veteris illotæ, circa redam
combustæ, drachmæ duodecim & semissis, id est, di
midia, ceræ drachmæ viginti quinque, recrementi
plumbi drachma, seu capilli curati lotiq; ex aqua
drachmæ viginti quinque, myrtei vnciæ quinque. Ad
herpetas verò acutè seu acriter depascentes, hoc res
medium iubet admoueri. Corij mali Punici dulcis

³
Vlcis cu
ratio i her
pete, qua
tertius est
scopus.

Vlcus omne
exicari de
syderat.

Lib. 2. ad
Glauc.

Loca exul
cerata qui
bus inunge
da.

Posca vel
pusca.
Remedia
ex Paulo
sumpta.

Ad herpetas
depascentes.

*Ad inuete-
rata iā vl-
cera.*

*Si pustule
miliares in
vltus abeūt
quid agen-
dum.
Libr. 2. ad
Glauc.*

drachmæ sex, argēti spumæ rātūdē, lanę illotæ, tedæ seu tedaceo ligno adhærentis, & cōbuitæ drachmæ tres, ceræ drachmę duodecim, cerusæ drachmæ octo thuris, aluminis scissi, singulorū drachma, vino aut myrteo excipiūtur. Iā verò in lōgū tempus protra-
ctis vlceribus, neque vino dulci, circuli parui, id est, trochisci, & huiusmodi alia medicamenta, quæ ad herpetas scribūtur, dilui debent: sed neq; pusca adhuc aquosa, quin potiùs vino satis austero, præcipuè verò nigro, & si id non affuerit, albo. Medicamenta autē in hoc tēpore, hoc est, inueteratis iā vlceribus, efficacia, & maximè accōmoda sunt, pastilli Musæ, & Andronis, & Polyide: quorum descriptiones in fine curationis carbūculi positæ sunt. Itē trochisci, qui calidicō & aldaron dicuntur Auicennæ & recē-
tioribus, quorum descriptiones ex lib. 6. requirendæ sunt. Herpetas verò, qui tātū summā cutem exulcerant: vt sunt, quos miliares diximus, nullo horum medicamentorum superius cōmemoratorum (si saltem Galeno credimus) iungere oportet. Vehemen-
tia enim sunt ac validè exiccāt: verum istis sufficiūt quæcunq; vim glaucij, id est, memithæ habent, eaq; diluere oportet, maximè quidē aqua. Quod si hæc nihil profecerint, etiam acetum miscendum est. Quod si etiam solani succo intinxis, aut arnoglossi, magis adhuc iuueris. Hactenus de herpete. Cæterum quoniam de formicis nonnihil obiter in superioribus attigimus, quas turpiter (vt diximus) recentiores, & Arabes cū herpetibus confundunt, præfens locus exposulat, vt de iis & aliis in cute eminentibus excrecentiis, quas Latini verrucas vocāt, pauca annotemus.

De formicis, & aliis verrucarū differētiis. CAP. IX.



Vmores illos exiguos, seu humiles illas excrecentias, quæ instar monticulorum quorundam in cute eminentes conspiciuntur, Latini appositè verrucas appellarunt:

verru

verruca enim propriè editiorem montis partē signi *Verruca*
 ficat. Vulgus autem porra nūcupat. Quia quādoq; *Porra*
 intra se fila quædam cōtinent porrorum radicibus
 non dissimilia. Græci nomen nō habent, quo omnia
 5 eiusmodi verrucarum genera complectantur, sed
 quāq; proprio nomine speciem nuncupāt. Hæ au-
 tem ferè sunt, *μυρμηκία, ακροχορδονες, ἄλος, βύμιον*. Itaque *Verrucatū*
 Myrmecia illis dicuntur verrucæ, quæ latiore sunt *diuersa ge-*
 basi, & quasi sēsiles, similē vellicātis, seu mordētis *nera.*
 10 formicæ iensum, dum attrectantur, inducentes: vn- *Myrmecia*
 de & nomen illis factum est Græci enim, *μυρμηκα* for-
 micam nominant. Quare Latini eas (nomine quidē
 ad Græcum vocabulum sese accomodante) formi-
 cas, verrucas dixerunt. A figura verò & formatio-
 15 ne, sēsiles verrucas. Hæ nascuntur Celfo, aut in pal- *Sēsiles ver-*
 mis, aut in inferioribus partibus pedum: radices au- *ruca.*
 tem altius agunt ac humiliores sunt thymio durio- *Lib. 5.*
 resq; maioremq; dolorem mouent: sed minus san-
 guinis mittunt, vixq; vnquam magnitudine lupini
 20 modū excedunt. Acrochordon verò pēsilis, & angu *Acrochordo.*
 stiore basi verruca est, hoc est, rotunda quædam in *Pēsilis ver-*
 cute eminentia seu excrescentia, quæ basim, id est, *ruca.*
 partem imam ad cutem angustam habet: sic qui-
 dem dicta, quòd chordæ nexu suspēsa pendere vi-
 25 deatur. Itaq; hoc discrimine acrochordones à myr- *Myrmecia*
 meciis dirimūtur, q̄ illi ima parte ad cutē angustio- *et acrochordones qui-*
 res sint, supremā verò latiores: myrmecia cōtra, ba- *bus inuicē*
 si sint (vt dictū est) latiore, sup̄ aut̄ tennes. Sed & hæ *disiideant.*
 nōnunquā cū summa cute prorsus sunt æquales. A-
 30 crochordones verò semp̄ à cute extāt: vt libro deci-
 mo quarto de morbis curādis Galenus scriptū reli-
 quit. Adhæc acrochordones Celfo ferè plures nas-
 cuntur, pueros maximè infestant, nonnunquā su-
 bito desinunt: quandoque verò mediocrem inflam-
 35 mationem excitant. Sunt quæ etiam in pus cōuer-
 tuntur. Rarò autem fabæ magnitudinem excedūt:
 Auicennæ clauī dicuntur. Verū Latinis clauī appel- *Clauī.*
 lantur verrucæ albæ, rotundæ, clauorū capiti similes.

Hi in

92 Institut. Chirurgicarum, Lib. I.

Hi in digitis, plantisq; pedū maximè cōtingunt, vbi
 dolorē, si non aliās, tamen ingredienti mouent. Hos
 Græci ἄλως vocant: Auicenna verò almismar. Ex con-
 tuso sepius nascuntur, interdū etiam aliter. At thy-
 mion vel thymon Celfo & Græcis, verrucula est, su-
 per corpus eminens, infrā seu ima parte ad cutē, &
 ipsa (vt acrochordon) tenuis, suprā verò latior: sub-
 dura quoque, & in summo peraspera. Idēq; summū,
 colorem floris thymi representat, vnde ei nomē est,
 ibiq; facillē funditur, & cruentatur. Nōnunquā &
 aliquantum sanguinis fundit, fereq; circa magnitudi-
 nē fabæ Aegyptiæ est, rarō maius, interdū per
 exiguum: modō vnum, modō autē plura nascuntur,
 vel in talis, vel palmis, vel inferioribus pedum par-
 tibus, hoc est, in plantis. Pessima tamen in obscenis
 sunt, maximeq; vbi sanguinem fundunt. Auicēnas
 videtur huiusmodi verrucæ genus tussitū, vel vt alia
 habet lectio, tarsecū nominasse. Ex verrucarū quoq;
 genere sunt, vocata ab Auicenna cornua non alio à
 cæteris distātia, quā quod ob longa sunt, & instar
 cornuum recuruantur. A clauis non magnoperè dif-
 ferunt calli, quos Græci vocant κάλλος, nisi quod per
 se anodynī. i. indolentes sunt, eodē quo cutis colore,
 neq; spontē, sed ex labore obdurata cute gignūtur.

Verrucarum iudicia, & curatio.

Acrochordo. **E**X his acrochordon & thymion sæpe etiam per
 Thymion. se (vt retulit Celsus) finiuntur, & quo minora
 Lib. 5. sunt, eò magis. Myrmecia, & clauī sine curatio-
 Myrmecia. ne vix vnquā desinūt. Acrochordon si excisa est,
 Clauī. nullam radiculā relinquit, ideoq; ne renascitur quis-
 dem. Thymo clauoq; excisis, subter rotūda radícula
 nascitur, quē penitus descendit ad carnē, eaq; relicta,
 idē rursus exigit. Myrmecia latissimis radicibus in-
 hærēt, ideoq; ne excidi quidem sine vlceratione ma-
 gna possunt. Clauum subindē deradere, commodissi-
 mum est, & aqua tepida perfundere. Nā sine vlla vi
 sic emollescit. Ac si sanguinis quoq; aliqd emissum
 est,

- est, sæpe emoritur. Tollitur etiam, si quis eum circũ
purgat, deinde imponat resinam, cui miscuit pulue-
ris paulum, quẽ ex lapide molari contrito fecit. Cæte-
ra verò genera, vt ab eodem Celso traditur, medicas
mentis adurenda sunt. Aliisq; id quod ex fece vini:
myrmecis, id quod ex alumine & sandaracha fit, *Myrmecia.*
aptissimũ. Paulus Aegineta, li. 4. cap. 15. plurima enu-
merat, quæ verrucas huiusmodi, præsertim sessiles
10 & pẽsiles tollunt, exterũtq;. Cuius generis sunt, ela-
terium (quod succus est fructus cucumeris agrestis) per medica-
cum sale infricatum, thuris cortex cũ aceto, grossi, *mẽta cura-*
id est, primitiua ficus, quæ velut præcoces nõ matu- *tio ex Pau-*
rescunt, cum aceto, farina, & nitro. Idem quoque illi *lo.*
15 præstat succus, seu liquor fici arboris illitus, tithys
mali, smaridis piscis caput falsum concrematũ, ærus-
go cũ sulphure viuo, hoc est ignem nõ experto com-
busta, ocy mi folia cũ atramẽto sutorio, quod Græci
chalcãrhũ vocãt, sarmentorũ adhuc viridiũ vstorũ, *Aqua ex fer-*
20 quod distillat, fimus ouillus cũ aceto, hircinũ fel illi- *mẽtis distil-*
tum, heliotropij magni fructus per se illitus, vel cũ *lans.*
vino applicatus, ruta cum nitro & pipere, nitrũ cũ
yrina pueri impubis & nondũ Venerem experti, *Stercus bu-*
stercus bouis gregarij, seu armentarij adhiberetur in *bulum.*
25 aceto. Cæterũ hæc quæ ad myrmecias & acrochor-
donas exterendas cõmemorata sunt, ferẽ omnia &
ad clauos, & thymia etiam magnoperẽ conducunt.
Tradunt etiam lacertæ caput myrmecias, acrochor-
donas, & clauos tollere. Sunt qui decoquant capita *Lacerta ca-*
30 salforũ piscium in aqua illa, quæ distillat ex sarmen- *put.*
tis viridibus, dũ comburuntur: idq; præstantissimũ
ad prædicta vitia remedium esse prædicant. Alij ad
eamdem exterenda linimentum conficiunt ex ærugis *Ærugo qd.*
ne (quæ recentioribus viride æris, & flos æris dici-
tur) sulphure, & aqua, seu instillatione illa sarmen-
35 torum. Atque hic vnus est curandi modus, quo vti
solent ad verrucas e medio tollendas, per medicamẽ-
ta scilicet erodentia, adurentiaq;. Id autem vnũ sum-
ma cura obseruandum est, in eiusmodi medicamẽtis
admi

94 Institut. Chirurgicarum, Lib. I.

adminiſtrandis, quod Celfus monet libro quinto: nē
 pe quòd ea quæ circa ſunt, foliis contegi debent, ne
 ipſa quoque exulcerentur. Alij ob eandem cauſam
 circuniacentes partes illinunt, vnguento ex bolo ar
 do probant. menia, terra ſigillata, aqua roſacea, & aceto. Porro
 acrochordonas, myrmecia, & thymia non ſolū
 præſcriptis hiſce adurentibus medicamentis abole
 mus: ſed & ignis flamma, vel candente ferro, illis ri
 tē admoto. Ea quoque nonnunquā excidimus. In
 terdū verò ligatura ſcitē illis coaptata (vt fit in ve
 ro ficu) vel primoribus dentibus, vt quidam Rome
 Galeni tempore facere ſolebat, euellimus, ac radici
 tū extirpamus. Cæterū ſi ignem aut candens ali
 quod ferrum verrucæ admoueris, lamina quædam
 ferrea pertuſa, vel ſimile quidpiam, ita verrucæ adu
 rendæ coaptari debet, vt foramen eam exactē com
 prehendam, adeo vt nihil circūpoſita cutis appareat.
 Facta verò aduſtione, cruſta butyro vel aliquo alio
 vnctuoſo illito reſoluenda eſt. Deindē vlcus ſimilis
 ter reliquis vlceribus curandum erit. Quo pacto au
 tem myrmeciæ quæ à cute non exrant, ſed illi pror
 ſus ſunt æquales, educi debeant, atq; excidi, pulchrè
 docet Galenus libro decimoquarto methodi in eden
 di: vbi refert quendam fuiſſe Romæ ſuo tēpore, qui
 nouam huiusmodi verrucarum curationem excogit
 tauit. Nimirū has certā primū labiorum appli
 catione, ceu ſuctu ad ſe trahebat, atq; (quod mirum
 videbatur) à radice euellebat. Deinde primoribus
 apprehenſis dentibus, totas ſimul eximebat. Acro
 chordonas verò, vt pote à cute extantes ſtatim mor
 dicis prehēdebat, & ita protinū educebat. Harum
 quoque & geminam aliam curandi rationem mox
 ſubiungit Galenus, inquiens: Sed & ſcalpro ad myr
 tacei folij ſpeciem formato, & ferramento eo, quod
 ſcolopomacherion Græci vocant, quiſpiam mani
 bus exercitatus, facilē eas excidat: cū propriis li
 neamentis à circūpoſita cute circūſcriptæ diſcern
 nantur. Aequè verò & valente aliqua pinna, circulo
 myrme

Hoc Haly-
 ab. & Gui-
 do probant.

Alia curandi
 rationes.

Quomodo
 videntur
 tūdo verru-
 cæ.

Myrmecia-
 ra cū ſum-
 ma cute æ-
 qualium cu-
 racio.

Myrmecia-
 ra noua cu-
 ratio ex Ga-
 leno.

Alia cura-
 tio myrme-
 ciarum. 14.
 meth. med.

Scolopoma-
 cherion.

Alia cura-
 tio per pin-
 nam.

20 myrmeciae imposita, ipsam educimus. Debebit por
 20 rò pinnae fistula esse myrmeciae crassitudini par, vt
 20 eam vndique prorsus constringat. Quæ postea cir
 20 cūacta, ac simul deorsum impulsā, celerrimè ita myr
 20 meciam etiam cum ipsa radice totam educet. Cōstat
 20 verò, & quòd finis ipse pinnae, quæ eam circulo secas
 20 bat, non tenuis modò, sed etiam acutus & firmus esse
 20 debebit. Itaq; tum Galli veteris pinna, tum vel mas
 20 gis aquilæ, ad hunc vsū est accommoda. Abscides
 10 re verò ab his tantū radicem versus oportet, quæ *Pinna scitè*
 20 tenuis reliquæ partis fistula complecti myrmeciam *radicē ver-*
 20 possit. Sanè ex ipsa statim abscissione, si modò scitè *sus abscin-*
 20 fiat, etiam acumen ipsi cōparabis. Hæc Galenus hæc *denda.*
 20 ctenus. Vlcus verò quod relinquitur sic auulsa ver
 15 ruca, similiter reliquis vlceribus impleri debet, &
 ad cicatricem perducī.

De œdemate, & tumoribus frigidis, pituitosis, & flatuosis.

C A P. X.

20 **C**um de tumoribus, qui succis calidior
 ribus procreantur, iatis disputatū sit,
 de iis quæ à materia frigida ortum ha
 bent, nunc tractare rursum instituis
 mus: principium quidem ab eo quod
 25 *ῥιόμα* Græcis dicitur, sumentes. Quæ
 admodū enim ex biliosa fluxione erysipelas, ita ex
 pituitosi humoris confluxu œdema excitatur. Est au
 tem œdema (definitore Gale.) laxus quidam atq; in
 dolens tumor, seu rara quædam atque expers dolo
 30 ris moles, ex pituitoso humore in particulam aliquā
 influente exurgens. Ita quidem Galenus censuit li
 bro 14. Therap. de œdemate, quod morbus est, non
 14. Ther. &
 2. ad Glauco.
 sympt. ma. Equidem scimus (inquit) aliter quoque
 [quā ex pituitosi scilicet humoris fluxione] œdes
 35 mata prouenire. Nēpe ex pituitoso humore aut spiri
 tu vaporoso, in parte aliqua collecto, & in eadem
 aliquando genito, vt in cruribus & pedibus eorum,
 qui aquæ subter cutem affectu laborant. Et phthoc,
 id est,

id est, corporis habitu contabescente: & cachexia, hoc est malo habitu corporis. In illis quippe periculosis dispositionibus, oedema, affectus eius qui hominem premit, symptoma est, hoc est accidens necessario consequens, nullā seorsum propriā, præcipuāq; curationē postulās, vt in sequentibus dicitur.

Oedema du-plex. Oedema, vti & phlegmone atque erysipelas, in duas chirurgis finditur differentias, in verum scilicet oedema, & non verum, seu illegitimum. Verum oedema fit ex pituita naturali, quæ certē nihil aliud est, quàm sanguis crudus aut diminutē coctus; qui in massa quidem sanguinaria inuenitur, membrīs pituitosis enutriendis accommodus. Non verū, seu illegitimum. *1* illegitimum oedema, fit ex pituita non naturali. Est autem pituita naturalis (ne quid obscurum relinquantur) humor frigidus & humidus, substantia crudus, colore vergens ad quandam albedinem, sapore vero, & (si licet dicere) odore ad dulcedinem. Non naturalis pituita, ea est, quæ à modò descripta degenerat, intra tamen suæ latitudinis terminos, quos si forsā pertranseat, nō iam ampliūs phlegma pituitaue, sed aliud humor, dici debet. *2* Cōtingit autem bifariam pituitam ipsam à propria sua natura degenerare: Vno quidem modo (vt loquuntur) in se, quando scilicet in propria suū ipsius substantia citra alterius admixtionem permutatur. Quod sanē multifariam accidit. Aut enim in substantiam aquosam conuertitur, aut in flatuosam, aut in admodum tenuem. Diciturq; tūc phlegma aquosum, flatuosum, aut tenue: aut crassius ac viscosius redditur: idēq; tūc phlegma crassum, & mucilaginosum efficitur, & per maiore, seu, (vt dicitur) vltiorem indurationem, gypseū, seu vitreum. Aut ipsum putrescit, & alteratur, efficiturq; tunc salsum, nitrosum, & corrosiuum. Altero modo pituita efficitur nō naturalis, per admixtionem: quando scilicet alius quispiam humor illi extrinsecus accedit, verbi gratia, vel sanguis, vel bilis flaua, aut atra. Si sanguis pituitæ permisceatur, hæc

De Tumorib. præternaturam. 97

hæc dulcis efficitur: si flaua bilis, falsa: si melancholia, pontica, & acida. Sunt ergo octo species phlegmatis non naturalis iuxta Auicennæ placita. Halyabas tamen quatuor tantum constituit. Gale. autem *Galen. duo*
 5 (inquit Guido) videtur, duo solum genera assignare, tantum pituitæ, nempe falsum & acidum. Tamen si libro secundo *ta genera*
 de differentijs febrium, & libro secundo de locis affe- *posuit.*
 10 ctis, atque in multis alijs locis, mentionem faciat de vitreo, quod subinde sub acido (propter eam, quam cum eo habet affinitatem ac conuenientiam) reponit. Ex iis igitur colligitur, quod ex pituita generantur octo species, seu differentiæ tumorum præternaturam. Primò enim ex pituita seu phlegmate naturali, fit œdema verum, ac certum, seu legitimum. *Octo differentiæ tumorum præternaturæ ex pituita.*
 15 Secundò ex pituita non naturali per admixtionem generantur tres aliæ differentiæ tumorum: quippe quod tres alij humores cum ea possunt commisceri. Nominantur autem, œdema phlegmonodes, œdema erysipelatodes & œdema scirrhus. Tertiò ex pituita non naturali, per alterationem propriæ substantiæ quatuor aliæ exurgunt differentiæ. Primò namque ex flatuoso & vaporoso phlegmate fit tumor is, qui propriè Latinis inflatio, vulgò autem medicorum apostema vëtosum
 20 dicitur. Secundò, ex aquoso, aquosum. Tertiò, ex crudo phlegmate, crasso, & mucoso, procreantur tumores illi, qui leues nodi quibusdā dicuntur, & abscessus pituitosi, quos vulgò exituras phlegmaticas appellant. Auicennæ verò interpreti dubilet
 30 frigida nominantur. Cuiusmodi sunt steatomata, atheromata, & melicerides. Ganglia quoque (quæ Auicennæ glandulæ dicuntur) & id genus alia, quæ in sequentibus declarabuntur. Ex duro verò, seu magis indurato, & (vt sic dicatur) gypseo phlegmate, fiunt nodi omnes duri, qui in iuncturis maxime
 35 reperiuntur, & strumæ, quæ vulgò scrofulæ nominantur. Quartò ex corrupta & putrefacta pituita generatur fistulæ, & vlcera, quæ scrufulosa vocant.

98 Institut. Chirurgicarum, Lib. I.

CAUSAE
œdematis
ætes.

Causæ œdematis, vt & aliorum tumorum præter naturam, sunt triplices. Primitiua, vt sunt casus ab alto, percussio deprauata viuendi ratio. Antecedentes, vt exuberantia humoris pituitosi in partem aliam quam decurrentis. Coniunctæ, ipsa pituita, in membro tumore obfesso, iam in farta, & accumulata. Signa œdematis hæc sunt, tumor latus & mollis, qui prementi digito cedit, & foueæ modo cauatur, nec amoto digito resilit, sed prementis vestigium retinet. Dolor aut exiguus, aut ferè nullus. Calor modicus. Color vergens ad albedinè, hoc est, subalbidus, seu (vt volunt alij) inter album & pallidum medius. Et alia id genus, quæ pituitæ dominium testantur.

SIGNA
œdematis.

1
2
3
4

IUDICIA.

1
2
3
4

Oedema, vt & cæteri tumores, quatuor habet tempora: principium, augmentum, statum, & declinationem. Hoc genus tumoris vt plurimum terminatur per resolutionem seu exhalationem, raro per supurationem sæpissimè per conuersionem, seu permutationem in nodos, & alias (vt vocant) excrescencias, quæ Græcis apostemata, Latinis verò abscessus dicuntur. Harum autem terminationum notæ, & agnitiones, superius in tractatu vniuersali dictæ sunt. Tumores hi œdematosi hyeme magis, quam aliis temporibus, excitantur. Plurima enim tunc in corporibus colligitur pituita. Senes quoque & crapulæ deditos magis ac sæpius infestant.

Oedematis, ex pituitoso humore in particulam aliquam conflente, curatio.

Curandi œdematis scopus duplex cum adhuc gignitur-

Q Vonia œdemata, ex humorum in aliquam partem fluxione, aliorum tumorum more suscitantur, duplex etiam eorum curandi scopus erit. Alter, vt horum humorum, qui iam partem occupant, substantia dissoluatur; alter, vt fluxio coartatur, restringatur. Atque prout alter scopus alterum superat, remedia sunt miscenda, alterum quidem cum altero copiosius, aut parcius. Vbi igitur restringendi indicatio, eam quæ vacuandum seu digerendum

dum esse suadet, superabit, augenda restringentium vis erit. Vbi verò plus vacuandum quàm restringendum erit: digerentium seu discutientium ac exiccantium materia, & facultas prepollere in mixtione des-
 5 bebit. Porro maiorem restringentium vim miscensdam esse ostendit tum copiosior fluxio, tum parciore in affecta parte materia. Contrà, exiccantium ac digerentium vberioremodum adhibere oportet, vbi copiosior materia locum obsidet, & fluxio mis-
 10 nor est. In inueterato autem œdemate, & quod non adhuc in gignendo est, non ampliùs hac curandi ratione, mistam facultatem quasi scopum habente, sed ad digerendam disseccandamq; materiam declinante vtendum erit. Quod & in omnibus ferè diuturnis
 15 affectibus obseruandum est. Caterùm œdema quod symptoma est periculosos affectus sequens, vt tabē, aquam intercutem, & vitiatum corporis habitum, quem Græci cachexiam vocant, nullam seorsum (vt
 20 suprà diximus) propriam, præcipuamq; curationem desiderat. Curari enim, nisi affectu ex quo nascitur, profligato, non potest. Aliquid tamen ex eo remittendum est, si quidem vires demoliatur, aut primarium affectum augeat, aut curationem impediat. Satis ergo fuerit, si quidem curatione egebit, ipsum
 25 tumentem locum perfricare, aliàs oxyrhodino, aliàs oleo cum sale, aut etiam oxyrhodino salein habēte. Eiusmodi enim frictio tumorem remittit & dolorē, si ex nimia distensione, (vt aliquandò cōtingit) excitetur, demulcet. Oxyrhodinon fluxionem ar-
 30 cet, oleum cum sale vim habet digerēdi, & vacuandi quod impactum est: oxyrhodinon verò, cui sal admixtum est, partim digerit, & exiccat, partim res-
 stringit, & humorum affluxum prohibet. Sed præmissa hac vniuersali methodo, ad propriā ipsius legi-
 35 timi œdematis, quod ex tenuis pituitæ influxu ortum habet, curandi rationem, sermonem conuertamus. Hæc aut in rebus quatuor (sicuti de phlegmōe & erysipelate dictū est, posterioris huius ætatis chi-

*Oedematis
inueterati
curandi ra-
tio.*

*Oedematis
vt sympto-
ma est cura-
tio.*

100 Institut. Chirurgicalium. Lib. I.

Quatuor 1 rurgis, consistit. Nempe, in debita viuendi ratione, scopi par- 2 in pituosi humoris præparatione, quam æquationē-
 ticularēs 3 vocant, & eiusdem expurgatione: in fluxi & iam
 in curando particulam occupantis humoris, repressiōe, diffu-
 legitimo 4 lutione, & exiccatione, & postremò in symptoma-
 œdemate ob tum seu accidentium ipsum œdema consequentium
 seruandi. correctiōe & summotione. Hæ itaque sunt quas

tuor intentiones particulares, quibus duas illas ge-
 nerales suprapositas indicationes assequimur. Pri-
 ma igitur intentio perficitur, debita ac congrua sex 10
 rerum non naturalium administratione.

Porro, ritè ac commodè, res ipsæ non naturales
 corpori laborantis adhibebuntur, si ad caliditatem
 & siccitatē, cum quadam attenuatiōe, declinauer-
 rint vniuersæ. Ergo tenuem & siccum aërem deli- 15
 Aër. gito, præparatōve. Vinum defecatum, pellucidum,
 Potus. album, vel subrubellum (quod claretum vocant)
 in suo genere optimum, & modicè aqua dilutum, in
 Cibus. potu assumito. Panis probè coctus, & ritè præpa-
 ratus esto. Carnibus ouillis, aut ex montanis & 20
 campestribus auiculis lubens vescitor, iisq; assis po-
 tius, quàm elixis. Iusculis, oleribus, & offis parcè
 vtor. Ab azymis, id est, non fermentatis, crudis
 quoque & præhumidis, abstinet. Legumina, ca-
 seum, fructus præsertim horarios & immaturos, pi- 25
 fces quoque (nisi forsan saxatiles, eosq; vel assos, vel
 vino incoctos) ne gustato. Assa in vniuersum melio-
 ra sunt elixis, & iis quæ pistoris industria præpara-
 tur. Parùm comedito, ac minùs bibito. In summa vi-
 tæ luxum, atque ingluuiem fugito. Si alius non re- 30
 spondet, eam ficibus & carthamo soluit. Ergo fi-
 cus aridas quinque vel sex numero accipito, easq;
 medulla feminis carthami impleto, & manè vel pri-
 ma mensa comedito. Corpus moderatè exerceto, 35
 si tamen particula laborans citra noxam id admise-
 rit. Somnus brevis esto. Balneum atque omnia
 humectantia prorsus vitato. Secunda intentio com-
 pletur præparantibus seu æquantibus (quæ vulgò
 digest

Repletio.
 Inanitiō.

Motus.
 Somnus.
 Balneum.

2
 Secunda in-
 tentio.

digestiua vocant) & vacuantibus materiã illam
 pituitosam, qua scætet corpus laborantis. Ergo ge-
 nus aliquod oxy melitis offerendum est, quod pitui-
 tam in corpore delitescens possit incidere & des-
 5 tergere. Deindè præparata hoc modo expulsion-
 antecedens materia, medicamento aliquo phlegmas-
 g⁴go, id est, pituitam expurgante, ex periti alicuius
 medici præscripto vacuanda est. Quod si (inquit
 Guido à Cauliaco) plethora adesset, tuto vena ape-
 10 riri posset: non citra tamen periti alicuius etiam me-
 dici consilium, At vix vnquam in corpore plethoris
 co visuntur œdemata saltẽ legitima. Nam in eo non
 magis pituita, quàm cæteri humores abundant.
 Proindè vix sola, & non aliis humoribus remixta,
 15 in particulam aliquam corporis plethorici influere
 potest, Quare venæ sectio in œdemate saltem legit-
 mo nequaquàm ex usu esse videtur. Tertia inten-
 tio perficitur in principio, admotis reperiçtiëtibus:
 20 non iis quidem quæ natua sua frigiditate vehemen-
 ter stringendo repellunt, sed quæ non inualidè siccân-
 di, & modicè digerendi vim habeant: ea aggregan-
 tia exiccationem & resolutionẽ vocant. In augmẽto
 verò discutientibus paulò fortioribus. At in statu,
 25 circa eius finem præsertim, & stata iam fluxione, pu-
 ris, iisq; fortissimis digerentibus seu resoluentibus.
 In declinatione autem absumentibus & exiccantibus,
 si resolutione saltem terminari debeat. Si verò
 degeneret in abscessum, quem exituram vocant, ma-
 30 turantibus, & reliquis quæ in curandis abscessibus
 proposita sunt auxiliis, curabitur.

Porro auxilia reprimentia, siccandi simul & di-
 gerendi facultate prædita, quæ competunt initio
 œdematis ex pituitosi humoris influxu creati, tri-
 35 bus præsertim formulis comprehenduntur. Prima
 est Galeni libro dicimoquarto Therapeutices, &
 secundo ad Glauconem: vbi inquit. At si ex pitui-
 30 toso humore in particulam influente œdema cõstitit
 35 abundè aliquando satisfacit spongia, quæ ex aqua,

3
Tertia inti-
tio.

Auxilia i
principio
œdematis
admoneda

Posca aquo in qua sit aceti aliquid, maduerit. Porro hæc ita ¹ *sa.* attemperabuntur, vt vel bibi possint: vel vt non multum supra hoc aceti habeant. Deligare verò ² spongiam debebis, ab inferiore parte incipiens, ac supra finiens. Esto autem spongia modò condur-
³ *Emplastrū* *Ra.* ctura sit, omnino noua. Huius si occasio non est [hoc est, si nouæ copia non sit] hanc detergebis, expurgabisq; exquisitè abluendo nitro, & aphro-
 nitro, & aqua lixiua. Auicennas iubet: vt loco spon-
 gix aliquando admoueat^{ur} pannus lineus duplex, ¹⁰ aut quid simile. Secunda formula est ipsius Auicennæ. Recipit autem aquæ decoctionis baurach, id est, nitri vel spumæ nitri, & cinerum, & aceti, ana, quantum satis esse videbitur. Tertia formula
 est à Raze descripta ad hunc modum. *R.* aloës, myr- ¹⁵
 rhæ, lycij acaciæ, sief memithg, id est, de glaucio, cy-
 peri, croci orientalis, boli armenici singulorū par-
 tes æquales: pulueriscentur, & cū succo caulium hoc
 est brassicarum, & aceto misceantur: & fiat empla-
 strum. Porro eadem nuper commemorata auxilia, ²⁰
Remedia 7- cremēti tem in huius cedematosi tumoris incremento, etiam be-
pore admo- ne faciunt: adiecto saltem illis aceto copiosiore: vel
nenda. modico alumine, in corporibus præsertim robustio-
 ribus: & cutem durā habentibus, atque vbi aquorū
 fior posca non profuerit. Ergo si sub his paulò antè ²⁵
 memoratis auxiliis cedema nō subsidat, quiescātue
 vbi rursus deligabis, paulo plus aceti miscebis, vt
 posca valentior sit: vel pusillum aliquid aluminis
 conicies, ac nouā spongiā admouebis. Hæc enim &
 copiosum medicamentū excipit, diuq; continet, & ³⁰
 sua substantia affectā partem exiccat. Si nouæ copia
 non sit melius est, inquit Galenus eo, q̃ vulgus vocat
 elychnion vtare. Id verò antè omnia molle est: quod
 genus Tarsicum est, cuius si facultas est, audacter
 vtitur: vtilius enim experire, quā spongiam. ³⁵
 Madeat verò ex pusca, quæ & aliquid habeat alu-
 minis. Tum (vt præscriptū est) deligetur, ab inferior-
 re sursum: hoc est, ligatura incipiat in imis partibus
 & de.

& definat in altioribus. Sit autem arctatio mediocris: velut in ossis fractura. Ac primæ quidem infectiones fasciæ, quæ scilicet infernè incipiunt, magis arctandę: quæ deinceps sunt, sensim remittendę, cæterum non adeo: vt laxa sit aliqua deligationis pars. Remedia autem, quæ post vigorem status: vbi iam constitit fluxio, & in declinatione vniuersali admouenda sunt: si œdema tendat ad resolutionem, sub triplici etiam formula describi solent.

- 10 Prima est Auicennæ: nempe spongia imbuta aqua lixiua, ex cinere fici, vitis, & illicis, quæ species est quercus: & particulæ admota: siquidem huic magna vis inest exiccandi, ac detergendi.

1
Status &
declinationis remedia
Spongia lixiui imbuta.

Secunda est Bruni, quam & vsurpauit Thodoriscus. Recipit autem aluminis sulphuris, myrrhæ, & salis, singulorum pares portiones: miscentur hæc omnia cum rosaceo, & aceto, & fit linimētum, quod præcedenti remedio potentiùs adhuc exiccat.

2
Linimētum.

- 20 Tertia rursus est Auicennæ, cuius descriptio est talis: R. stercoris vaccini, libræ semissem olibani, styracis vsnæ, id est, musci arborum, qui Græcis bryon dicitur: calami aromatici, spicæ, absynthij, singulorum semunciam: confice omnia cum aceto, & decoctio caulium: siue brasiçæ, & fiat emplastrum.

3
Emplastrum
Auicenn.
Vsnæ quid

- 25 Atque hæc quidē ratio est curandi œdematis: quod resolutione terminatur. Si verò digestionem non cessat: sed ad suppurationem spectet, vnguentum e succis diachylon nominatum, atque id maximè, quod à Rogerio compositum est, perquam vtiliter apponitur. Ad id etiam confert vel inagnopere & sequens emplastrum, quod recipit maluam, brascam vrsinam, (vel, si mauis dicere hircinam, quæ & achantus, & achanta dicitur) radicem althææ radicem lilij, cæpas assas limaces fermentum: & semen
- 35 lini: cocta, & subacta: & cum axungia vel butyro mixta, rediguntur in formam emplastri seu potius cataplasmatris Aliud ad idem summè efficax. Accipe succi ebuli, sambuci, oxylapathi, quod

Concoquantia seu maturantia.

Hoc ad Theodorici refertur.

nostrates officinæ lapatiū acutū nominant: leuisti, seu ligustici, & marathri: ex horū singulis quātum lubet, pari tamē pondere: deinde vt oportet coquito vnā cum dialthea, melle, oleo, & butyro, atq; ex iis cataplasma conficito. Maturato apostemate, nō ex-

Apertio.

aperitio, qua pus excernatur, iuxta modū & formā superius expressam. Deinde sordes detergeantur, vnguento vulgò Apostolorū dicto, vel mundifica-

Vnguentum mundificatiuum quod ad Diuum refertur.

tio ex apio, & succo absinthij, vel vnguento subscripto, quod pus crassioris substantiæ attrahit, & mūdificat. Accipit autē id galbani, ammoniaci, resis-
næ terebinthinæ picis, sepi vaccini, olei antiqui, ana-
partes æquales: dissoluuntur gummi ex aceto, & li-
quesiunt ad ignem cum reliquis, & fit vnguentum. Post hæc verò similiter reliquis vlceribus sordidis
curetur. Cæterum quartā intētiōnē assequimur, pro

Quarta intētiō.

ratione & natura accidentiū superuenientium, vt si
accidat dolor, imprimis sedandus erit, admota (iux-
ta Auicēnæ doctrinam) æsipo humida, vel vino co-
cto, vel cerato cōposito ex oleo chamamelino, oleo
de absinthio, oleo de spica, & cera. Si verò duris-
sies adfuerit dissoluenda, atque emollienda est. mes-
dulla bubula: vel ceruina: vel quāpiam aliā fimi-
li, vt in sequentibus dicitur. Galenus autem in
diuturno œdemate partem oleo liniens, spongiā
ex lixiuio apponebat, atque stringens arctius, affe-
ctum perfectē curabat.

Libr. 2. Ad Glau.

Oedemati inueterato.

Capita curationis œdematis.

*I
Oedema morbi acci- dens.*

O Edemati quod symptoma est, hoc est, accidēs
altis morbis superueniens: vt aquæ inter cutē
tabi, & cachexiæ, medicamenta, quæ discuz-
riunt, & sine molestia desiccant adhibero.

2

Ergo tumentem locum oxy melite: vel oxyrhodi-
no, aut oleo cum sale, aut etiam oxyrhodino salem
habente

habente, perfricato. Hac enim frictione & dolorem (si quis ex distensione excitetur) mitigabis, & tumorem remittes.

Oedemati verò ex tenuis pituitæ influxu excitato
5 si nõdñ restitit fluxio, medicamēta quæ partim digerant, partim verò cogant, restringantq; adinoueto. Oedema morbus.

Ergo spongiā nouam, vel aliam lixiuio ablutam,
initio posca dilutiore in mollioribus præsertim cor
poribus madentē alligato, vinculaq; (si artus tumor
10 occupet) ab inferiori parte ad superiorem, vt in fracturis, ducito & mediocriter constringito.

Quòd si p̄ hęc tumor nõ remittit, subsideatue, posca, id est, oxycrato, aluminis momentum adiicito.

At si iam in vetustate affectus inciderit, non amplius
15 plius remedia mistam hanc facultatem (digerentem scilicet & restringentem) habentia; sed digerētia ac
dissecantia potius adhibeto. Oedema v. ueteratum.

Igitur, parte oleo prius inuncta, spōgiam qualem
suprà diximus, lixiuio delibutam, imposito, ac fac
20 scias arctius deligato.

De tumoribus præter naturam, qui inflationes dicuntur

Latinis, vulgò autem apostemata ventosa.

CAP.

XI.

25 **N**unc tempestiuum est: vt de inflationibus disseramus, quibus diuersa ab oedematis curatio est. Illa namque: vt Galenus ait lib. 14. Therap. ex pituito
30 so succo ortum habent: proinde præmentibus nobis cedunt, digitiq; admodum altè in ipsa descendunt. Inflationes verò, ex flatuoso spiritu collecto nascuntur, aliàs sub cute, aliàs sub membranis, quæ ossibus circūdantur, aut musculos, viscerumve aliquod includunt. Porro
35 colligitur aliquando non parum etiam in ventriculo & intestinis: itemq; in medio spatio horum, & peritonæi: vt in aquæ (inquit Paulus) subtercutē Inflationis & oedematis differentia. Lib. 4.

genere, cui nomen est tympanias. Differunt quoq;

hæ ab œdematis: quòd & pressæ digitis non retis-
nent vestigium, & sonitum veluti tympanum
reddunt: itemq; quòd in cavitate sensibili subinde
continentur, arque hac nonnunquam maxima.

*Inflationū
causa.*

*Libr. 6. de
morbis &
Symp. 10.*

Causa huiusmodi inflationum est caloris naturæ im-
becillitas, in materia pituitosa, ad flatum excitans
disposita. Calor namque eiusmodi suscitare quis-
dem vaporem ex humida materia potest: sed non
discutere. Quemadmodum enim (inquit Gale-
nus) in externis rebus videmus: ut frigidissima
constitutio, maximè spirante Borea, aërem tere-
niorem reddit, ac calidissima per æstatem consti-
tutio ambientem nos aërem purum efficit, mediæ
verò constitutiones nebulas pariunt: ita in animan-
tibus accidit. Neque enim calor per extremam im-
becillitatem, neque cum vehementes sunt ei vires:
sed cum medium inter has affectiones obtinet, flat-
tum gignere potest. Retinetur autem flatum eius-
modi in loco quopiam (ut dicit Avicennas) vel pro-
pter densitatem, seu spissitudinem membri vel
propter ipsius vaporis seu spiritus crassitiem.

Lib. 4. Quòd & iis verbis Paulus ex Galeni sententia tes-
tatur est. Membrorum (inquit) densitas, tum spir-
itus simul crassities efficit: ut idem spiritus non
dissipetur.

De signis & iudiciis inflationum.

*Inflationū
nota.*

*Inflationū
prognosti-
ca.*

Signa inflationū sunt, tumor renitens tactui, cum
lucido quodā splendore sonum: ut vter: vel tym-
panum, dum percutitur reddens. Ad hæc persæ-
pè sentitur flatum per totū corpus, modò huc, modò
illuc discurrens, ac dolorem extensivū paries. Quòd
autē ad iudicia pertinet, flatulētus seu vaporosus spi-
ritus q̄ nō discutit, multa parit incōmoda. Halituo-
sus verò huc atq; illuc per corpus discurrens cum do-
lore & anxietatibus magnoperè verēdus est. Quip-
pe qui à materia aliqua venenosa attolli videatur.

De inflationum seu flatulentorum tumorum curatione.

Cum

Cum tria hæc, materia humida, caloris imbecil-
 litas, & meatuum densitas, ad inflationis gene-
 rationem, vt in præcedentibus ostensum est) Inflationis
curatio.
 concurrât: curationis ipsius scopus erit, caloris sub-
 stantiam roborare, vaporem seu flatulentam mates-
 riam extenuare, & meatus corporum (in quibus va-
 porosus ille spiritus collectus cōtinetur) densitatem
 recludere. Porro posteriora duo, nempe densi corpo-
 ris rarefactionem, & crassi spiritus extenuationem,
 10 iisdem omnino auxiliis assequimur, medicamentis
 scilicet tenuitate partium pollentibus, siue extenuan-
 tibus, & calfacientibus, magis aut minus, pro par-
 tium inflatione afflictarum densitate, vel raritate, &
 vaporum quoque crassitudine, vel tenuitate. Pro
 15 horum nāque differentia facultas medicamentorum
 quæ admoventur, intendi ac remitti debet. Itaque ra-
 ræ partes, & vapor seu spiritus non admodum cras-
 sus, minus densæ verò, & vapor multa crassitie præ-
 ditus, magis extenuantibus, & calidis egent. Calor
 20 ris autem substantia, si periit, aut imminuta est, pro-
 ratione iacturæ eius, refarcienda erit. Si verò altera
 ta fuerit, ad mediocritatem reducenda. Quod si vnâ
 dolor excruciet ad anodyna transeundum erit. Non
 absurdè igitur, inflationum (quas ventosa aposte-
 25 mata vocant) curationem tribus intentionibus per-
 fici dixerunt posterioris nostræ ætatis chirurgi: pri-
 ma in debita viuendi ratione, secunda in proba cons-
 coctione, & tertia in flatulenti spiritus, qui in partis
 cula collectus est, discussione consistit. Itaque vitæ
 30 institutio talis erit. Abstinendum imprimis ab omni-
 bus crassis, viscosis, crudis, pituitosis, & flatuosis.
 Cuiusmodi sunt, dulcia, legumina, fructus crudi, ra-
 pum, castaneæ, & alia id genus, quæ spiritum flat-
 tuosum procreant. Utendum autem calidis & sic-
 35 cis: item attenuantibus, & flatum discutientibus, vt
 est panis hordeaceus, qui aliquid salis & cumini re-
 ceperit. Laborantis potus sit vinū album, vel subru-
 bellum (quod clareum vocant) aut vinum Græcū.
Tres scopi
curandarū
inflationū.
I
Prima int
tio.
Cibus.
Potus.
Vt ac

108 Institut. Chirurgicarum, Lib. I.

Vtatur decocto cicerum alterato cū cepis, apio hor-
tensi, quod vulgò petroselinum appellatur, calamin-
tha, ruta, & cumino. Carnes sint aliæ potius, quàm
elixæ, & præsertim ex volatilibus, vt in præcedenti
capite dictum est. Vt autem secundam intentionē

²
*Secunda in-
tentio.*

assequaris, roboranda tibi est virtus concoctrix bo-
nis quibusdam speciebus aromaticis, & confectionis
bus, atque (vt vocant) electuariis ad hoc dicatis, vt
sunt, diacuminum, diacalaminthe, aromaticum ro-
satum, & sequens confectio, quam dragetam appel-
lant. R. anisi, maratri, carui, dauci, cymini, baccarum
lauri, tritorum, singulorum vnciam vnam, glycyrr-
hizæ, quam liquiritiam vocant, galangæ, zingibe-
ris albi, singulorum semūciam, charyophyllorum,
cubebarum, piperis longi, seminis rutæ, singulorum
drachmas duas, anisi saccharo incrustati, quadrantē,
id est, vncias tres, sacchari selibram, fiat puluis. Ex-
trinsecus verò inungatur ventriculus oleis de spica,
de costo, & ruta: vel fiat epithema, quod ea recipiat,
quæ & flatus discutiunt, & iuuandæ coctioni dica-
ta sunt, atque hoc stomacho admoueat. Sed hæc
ad medicinam magis, quàm chirurgiam pertinent.

*Drageta co-
ctionem ad-
iuuans.*

³
*Tertia intē-
tio.*

Tertia intentio completur medicamento, cui mi-
xta facultas sit, hoc est, quod simul concoquat, dige-
rat, & modicè adstringat, nec doloremaugeat. Ad
hæc autem consequenda instituuntur tres formulæ
auxiliorum, libr. 14. Therap. Prima ad hunc modum
posita est à Galeno:

¹
*Ad inflatio-
nem ex cotu-
sione in ar-
tubus mu-
sculis, &
membranis,
quæ ossa con-
tegnunt.*

In artubus (inquit) & musculis, qui sub cute aut
etiam membranis, quæ ossa vestiunt, inflatione orta,
si citra dolorem sit, liquor aliquis tenuissimarū par-
tium, cuiusmodi est lixiuium noua spongia exces-
ptum, satisfecerit. Sin dolor quoque vrget, vngen-
da pars est oleo, quod relaxandi, remittendiq; vim
habeat. Incidūt porrò ex percussioneibus eiusmodi
affectus, vbi vel musculus, vel membrana quæ os
circuit, est contusa. Ac super membranam quidem
quæ os ambit, antedicta imponenda est spongia.

Secunda

De Tumorib. præter naturam. 109

Secunda formula ibidem ita descripta est. Ad mu-
 sculos verò (namque hi aliquandò dolent) medica-
 mentum quod magis mitiget, est adhibendum. Quò-
 fit, vt ad hos solo lixiuio non vtantur, sed immissa ei-
 tum sapa, tum pauculo oleo. Satiùs autem fuerit in-
 principio, non addidisse lixiuium, sed sapa cum vino
 & exiguo aceto vti, ac quod mediocre fit, olei adiis-
 cere. Vbi mixta sunt, modicè excalfacere, ac lanam
 non lotam, quam succidam vocant, ipsis imbutam
 imponere. Quòd si eiusmodi lanæ facultas non sit,
 ipsius œsopus, miscellæ supradictæ est iniiciendus.
 Vbi verò œsopus præstò non est, aliquid cerati, quod
 ex œsipo componitur, rectè admiscueris. Debent
 enim contusi musculi leniri medicamento cui mixta
 facultas sit, quippe quæ simul cōcoquat, digerat, &
 modicè adstringat. Quandò si nihil habet adstrictio-
 nis, auget aliquandò phlegmonas, ac maxime in iis
 corporibus, quæ sunt plethorica. Ergo trium iam
 comprehensarum indicationum [concoquendi scilicet
 cet, digerendi, & modicè adstringendi] in inflatis ex
 plaga musculis memor, vbi dolor maior vrget, mis-
 tigatiua magis ratione vteris: [plus olei & vini adiu-
 ciendo] vbi abest, maiore vi intabis. Maiorem vim
 intelligo, cum breui vta properatur ad finem. Porro
 brevis via fit, per ea quæ valentes habent vires. Hæc
 autem maxime in lixiuio & aceto habentur, post
 hæc in vino. Quoties igitur de mitigando non labo-
 ras, horum [lixiui inquam & aceti] plus in mixtu-
 ram coniicies. Rursus vbi repellere studes, vini plus
 quàm horum immittes. Porro id optimum in hunc
 vsum fuerit, si nigrum austerumq; sit. At si digerere
 males, lixiui plus indes. Acetum verò si his misce-
 bis, ad ambo utilis erit mixtura, propterea quòd ace-
 tum mixtas habet facultates. Vbi verò musculus si-
 ne dolore est, licet sanè in lixiui penuria, pro ea
 aphronitrum immittere. Esto autem id minimè lapi-
 dosum, sed magis spumofum. Tertia formula est em-
 plasticum, quod fit ex strigmentis gymnastiorum,
 id est,

2

Ad muscu-

los cū infla-

tione dolen-

tes ex conta-

sione.

Sapa-

Lana succi-

da.

œsopus.

Cerati ex

œsipo.

Aceti, vini,

& lixiui

collatio.

Pro lixiuio

aphronitri.

id est,

3

110 Institut. Chirurgicarum, Lib. I.

id est, sordibus, quæ à corporibus luctantium deter-
 gebantur, & calce viua ex aqua & vino simul co-
 ctis. Gale. verba hæc sunt, libro decimoquarto The-
 rapeu. Quæ verò huius generis inflationes neglectæ.
 inueterarunt, primo quidem loco his, ea quæ ex lixi-
 uo cõponuntur (vt prædictũ est) adhibeas. Secũdo lo-
 co emplasticum aliquod. Dicam autem & horũ exẽ-
 plum. Strigmenta gymnasiõrum feruefacta, per co-
 la primũ, sic vt pura sint: deinde rursum in cacabũ
 immisis, calcem viua in farinæ speciem tusam in-
 sperge, ad luti vsque crassitudinem. Salutare his est
 & medicamen, quod ex sycomoro cõponitur, aliãq;
 id genus. Caterũ si huiusmodi flatuosus spiri-
 tus, qui inflationẽ cõmittit, fumosus fuerit, malus,
 corruptus, à materiaq; venenosa excitatus, cum do-
 lore intolerabili, & vehementi calore, per membra
 discurrens, nullũ tutius ac melius consilium dari pos-
 test, quàm quod vbi in parte quapiam substerit,
 pars ipsa protinũs infrà supràq; deligetur, ac in me-
 dio nouacula, vel ferro cãdente tumor aperiatur, ita
 vt facilẽ vapor ille venenosus egredi possit. Deinde
 hians plaga, implenda erit aloẽ, & bolo armenia, ex
 rosaceo & aceto dissolutis. Trãfactis verò diebus tri-
 bus, aut quatuor, vulnus carne opplẽdũ erit, & ad ci-
 catricẽ perducendũ. Porro in venenosis eiusmodi in-
 flationibus, victus ratio tenuior esse debet, egetq;
 corpus medicamento purgatorio. Quod si theriace
 fumenda daretur laboranti, rectẽ illi cõsultum esset.

Si flatuosus
 spiritus ve-
 nenatus fue-
 rit.

Victus ra-
 tio.
 Theriaca.

Capita curationis tumoris flatulenti.

30

I Mbecillam caloris affectæ partis substantiam ro-
 borato, deperditam instaurato, alteratam ad me-
 diocritatem reducito.

Vapores seu flatulẽtum spiritum crassiores,
 vnde tumor eiusmodi suscitatus est, extenuato.

Densatos cutis, ac totius laborantis particulæ,
 meatus, medicamenti tenuitate partiũ pollentibus,
 recludito; deinde flatuosum spiritum discutito.

Pro

Pro locorum autem affectorum differentia, & va-
poris ipsius flatuosi crassitudine vel tenuitate medi-
camentorum quæ admoventur, tum materiam, tum
facultatem intendito, ac remittito.

Porro si cum dolore & inflammatione tumor eius-
modi flatulentus inciderit (vt contingit in musculis
ob cõtusionem flatu repletis) mitigatoria initio ad-
moueto: procedente verò tempore, quæ discutiendi
vi polleant, eorum copiam paulatim augendo, ad-
hibeto.

Inflationes quæ ob negligentiam antiquatæ fue-
rint, primò quidem lixiuio foueto, deinde emplastrũ
quodpiã ex his quæ molliũt, & discutiũt, admooueto.

*De tumore è serosa substantia creato, quod aquosum apo-
stema nominant. C A P. X I I.*

Pituitam, si per vniuersum corpus incre-
uerit, ea species aquæ intercutis, quam
leucophlegmatiam vocant, comitatur, *Leucophle-
gmatisia.* vt Galenus annotauit lib. sexto de sym-
ptomatum causis. Cũ verò in vna dun-
taxat parte pituitosa hæc substantia redundat, œde-
ma enascitur: ita enim appellant tumorem laxum, ac
doloris expertem. Serosa autẽ excrementa si abun-
dant, aquam intercutem (quam ascitem nominant) *Serosum ve-
crementum.* generare solent. Quæ si in vnam aliquam partem in-
cubuerint, in ea phlyctænas, id est, pustulas excitât. *Phlyctæna.*
Porro serosum eiusmodi recrementum, recentiores
aquosum phlegma nominare consueuerunt. Quem-
admodũ etiam & pituitam illam, quæ reperitur in
pedibus & cruribus eorum, quos aqua inter cutem
vexat, & in tabidis, & aliis qui malo habitu (Græci
cachexiam vocant) laborant. Ad hæc, tumores ex hu-
iusmodi aquoso phlegmate, aut seroso iam dicto re-
cremento procreatos, illegitima ac nõ vera œdema-
ta vocitât. Cæterũ in periculosis illis dispositioni-
bus seu affectibus, tæbe inquam, hydropæ, & caches-
xia:

112 Institut. Chirurgicarum, Lib. I.

xia: oedema (vt superius ex Galeni sententia dictum est) symptomatis, rationem obtinet, non morbi: nulla quidem propria præcipuaq; curatione indigens.

Libr. 2. ad Glauc. Sola enim frictio ex oxyrhodino, aut nonnunquam ex sale & oleo, vel etiam ex sale & oxyrhodino, fit; *14. theraz.* fit ipsum, aliaq; huiusmodi multa. Horum autem *Causæ tumoru aquosorum.* tumorum causæ sunt, alteratrix facultas frigida in temperie viciata, & alimentorum prauitas, ad aquo-

Aquosorum tumoru nota. sitatem declinans, vt ex libro sexto de symptomaz tum causis facile est colligere. Signa & iudicia ferè 10 eadem sunt, quæ & veri oedematis. Hoc tamen differunt, quòd in istis aquosis tumoribus laxus magis tumor est, quàm in oedemate legitimo: atque ideo

non tantum renititur tactui, sonatq; non vt flatus, sed vt aqua potius. Ad hæc aliquo modò splendere 15 videtur, cum ad lucem quis ipsum intuetur. Quod vero ad huiusmodi tumoris iudicia attinet, aquosus

IUDICIA. 1 haud dubiè tumor à maiori enascitur frigiditate q; flatuosus, vt Galenus autor est, cōmentario vndecimo libri quarti aphorismorum, super hunc aphorismum: Quibus tormina, & circa vmbilicum labor- 20 res &c. Videtur autē (inquit) à maiori frigiditate ge-

Ascites à maiore frigiditate generatur, quā tympanites. nerari aquosus hydrops, quem ascitem vocant: à minore verò tympanias, quæ ab Hippocrate aqua in- 25 ter cutem sicca nominatur. Neq; enim humida substantia in flatuosum aërem sine calore aliquo potest

transmutari. Tumores præterea aquosi sæpius in pedibus, testiculis, scroto, capite, & iuncturis accidunt, quàm in aliis quibusvis corporis partibus: tñ quod 30 humor eiusmodi in eas partes promptius irruat, tum quòd caliditas in ipsis modica sit: quippe quæ procul à calidissimis absunt partibus, vt secūdo Progn.

3 ait Galenus. Quemadmodum etiam flatuosus spiritus rarò inuenitur absque humore aquoso, ita vix vnquam aquosus siue serosus humor in particula 35 aliqua concluditur absque flatu. Hactenus de generatione, causis, signis, & iudiciis aquosi tumoris, nunc de curatione.

Aquosi

Aquosi tumoris curatio.

5 **C**um aquosi tumores, ex serosi (vbi diximus)
 recrementi fluxione excitentur, non alia certè
 curandi via & ratione saltem vniuersali, in illis
 10 profligandis vtendum est, quàm ea, quæ in aliis
 supra memoratis tumoribus, qui ex humorû in partem
 aliquam influxu procreantur, persanandis, à nobis
 supra explicata est. Duplex igitur curandi indicatio
 15 per initia in eiusmodi tumoribus erit: nempe
 vacuandi quod influxit, & fluxionem inhibendi. *Curandi aquosi tumoris duplex indicatio.*
 Quocirca & composita fuerit de talibus affectibus,
 veluti & de reliquis morbis omnibus, quicunque in
 generatione adhuc sunt, medentis sollicitudo, ex ea
 20 scilicet quæ curat, & ea quæ prouidet. Itaque prima
 indicatio ei medicinæ artis parti subiicitur, quæ morbos
 curat: secunda verò ei parti subiacet, quæ futurum
 morbum præcauet. Porro vt geminum hunc scopum
 vniuersalè assequamur, aliis quinque partis
 25 cularibus intentionibus est opus, à nostro Guidone
 à Cauliaco in curatione tumoris aquosi hoc ordine
 & modo qui sequitur expressis. Prima in probè
 vitæ institutione atque obseruatione consistit. *Quinque particulares intentiones curationis aquosi tumoris.*
 30 Secunda in concoctionis emendatione, seu (vt ait) re-
 cificatione. Tertia, in aquosi humoris per alium expur-
 gatione. Quarta, in eiusdem serosi recrementi per
 35 vrinarios meatus educatione. Quinta & vltima, in
 coniunctæ (vt loquuntur) seu contentæ in particula
 humiditatis aquosæ, euaporatione, atque exiccatione.
 40 Caterùm cum primæ quatuor intentiones magis
 ad medicum spectent, quàm ad chirurgum, quem
 hoc opere instituendum suscepimus, atque etiam ex
 iis quæ in præcedentibus dicta sunt, satis innoscant:
 45 consilium fuit, tantùm de postrema, quæ topica desy-
 derat auxilia, hoc loco agere. Quinta igitur inten-
 tio perficitur cum exiccantibus & resoluentibus
 huiusmodi aquosas ac serosas humiditates, quæ in
 particula laborante continentur. Horum autem tres

114 Institut. Chirurgicarum, Lib. I.

- 1 communiter formulæ statuuntur. Prima est Galeni libro secundo ad Glauconem & decimoquarto methodi medendi: nempe quæ constat oxyrhodino, &
- 2 sale, vt superius dictum est. Secunda est eiusdē: spongia scilicet noua, lixiuio perfusa, & reliqua alia auxilia, quæ supra ad œdemata scripta sunt. Quibus vt potentiùs exiccent, & discutiant, addenda sunt,
- 3 aphronitrum, alumen, & sulphur. Tertia formula est cuiusdam emplastri, ab Auicenna descripti in curatione scrofularū, quod Galeno attribuit in libro de compositione medicamentorum *cap. xvi.* Hoc autem (vt ille prædicat) intra hebdomadam vnā ad summum: plærunque verò intra triduum omnem duritiem resoluit. Porro tamen si emplastrum hoc apud Galenum lib. nuper citato non reperiatur, eo tamen cōmodè vtī possumus ad aquosam & flatuosam duritiem dissoluendam: eius autē descriptio talis est Auicennæ: R. seminis sinapis, seminis vrticæ, sulphuris, spumæ maris, aristolochiæ [rotundæ] & bdellij ana vnciam vnā, ammoniaci, olei antiqui, & ceræ, ana vncias duas. Quòd si hoc emplastro non discutitur, non aliud auxilium melius ac præsentius excogitari potest, quàm vt ferro aperiatur, deinde detergeatur: & aliorum sordidorum vlcerum more curetur.

*Emplastrū
Auicennæ
discutiens
aquosos tu-
mores.*

Capita curationis aquosi tumoris.

- 1 **V**ictum attenuantem, calfactorium, & desiccatorium laboranti instituito.
- 2 Vt corpus moderatè exerceat, parcè edat & bibat, non multum dormiat, ventrem & vesicam sapiùs ad excretionem exuscitet, imperato.
- 3 Vt probè alimenta concoquat, & flatus minimè gignat, curato.
- 4 Serofas humiditates, quibus laborantis corpus scatet vniuersum, per aluum, & vrinarios meatus expurgato.
- 5 Serofum illud recrementum, quod in affecta parte

te

te continetur deficcato, & per halitum digerito.

Quodd si discuti non possit, scalpellum vel potiùs igne candens ferramentum in tumorem, si artus occupet, adigito, atque eum parte procliuiore (quò faciliùs inde humor emanet) referato.

Humore qui tumorem committebat, per emissarium vacuato, reliqua quæ ad sordidorum, & aliorum consimilis naturæ vlcerum, curationem pertinent, sine mora perficito.

De glandulis, nodis, strumis, & cæteris abscessibus, quas excrementas phlegmaticas vocant.

C A P.

X I I I.

G Ræcorum gæglia, chærades, id est, strumæ, quas etiam scrofulas vocant, bronchocèle, quod bocium, & herniam gutturis nominât, melicerides, steatoma, & atheroma: ad hæc testudo, talpa, & nata siue napta, tumorum nomina à recetioribus medicis inuenta, & nusquam apud antiquos reperta: ite fugile Auicennæ: nodi quoque & vulgaris bubo, aliæque id genus multa, quacunque corporis parte nascantur, ferè ex pituita generatione habent: atque ob id ad pituitosos tumores merito referuntur. Cæterum tamen nonnulli ex iis nuper memoratis abscessibus in torphaceam duritiem, & scirrhosos affectus aliquando degenerent: radix tamen & origo illorum parte maiore pituita extitit, ut voluit Auicenna. Quanquam non imus inficias, quin & alius humor ipsi pituitæ, cuius eiusmodi abscessus propriè soboles sunt, interdum admisceatur: atque ita compositi & heterogenei nascantur abscessus. Verum de simplicibus solum nobis hic sermo erit, ex quorum analogia compositorum etiam cognitio facile habebitur. Hæc enim ad illa veluti ad quosdam certos canones, semper adigenda sunt, ut alibi quoque diximus. Itaque prædicti omnes tumores sub genere abscessuum pituitosorum, seu (ut vulgas

Enumeratio abscessuum pituitosorum.

Simplicia sunt regulæ compositorum.

116 Institut. Chirurgicarum, Lib. I.

rium chirurgicorum more loquar) ex crescentiarum phlegmaticarū, reponūtur, habētq; speciales qualisdam inter se differentias, vt ex sequentibus patebit.

Glandula Guidonis. Glandula enim (vt Guido putauit) à glandis forma, quam præ se ferre videtur, nomenclaturam accepit: estq; (inquit) vtcunque mollis, vnica, mobilis, & separata à partibus circumiacentibus: in emunctoriis plærunque nascens. Auicennæ autem glandulæ nascuntur vel in manu, vel in pede, vel in loco aliquo neruis & tendinibus cōiuncto, & has quidem tum velle extirpari, ne scilicet laborans in spasmodū incidat. Eueniunt quoque, ait, summæ volæ manus, & frontis, vocatq; eas modò apostemata glandulosa, modò nodos. De iis enim inconsideratè tractat in diuersis capitibus, vtpotè in capite de nodis ad finem, & ca.

Glandula Guidonis diffidet à glandula Auicennæ. 15
16. lib. 4. Quod sequentia Pauli verba aperte testantur: Ganglium neruorum concretio est, ex ictu aut lassitudinis ne oboriens, in pluribus quidem corporis partibus, præcipuè motui dicatis: nempe manu summa, & pedibus. Rarius cubitum & caput occupat Aëtio, ac raro eidem sponte prouenit. Et rursus idem Paulus lib. 6. c. 39. quid sit gangliū, vnde nascat, in quibus maxime partibus proueniat, quæ deniq; notæ ipsum comitentur, aperiens: id ipsum quod diximus, confirmat, inquit. Ganglium nerui est concretio, ex ictu, aut labore proficiscens, plerunque verò in manus ictura, qua cum brachio cōmittitur, talo & articulamentis absoluitur: quanquam in aliis quoque partibus proueniat. Hæ comites sunt notæ, tumor concolor, renitens, indolensq;. At si violenter præmas, stupor sensum exhibet, non in alto, sed ipsa sub cute radicatus agens, & ad latera spectans: sin autem vi adigas, tum antè, tum post, nequaquam id facit. Hactenus Paulus Aegineta de gangliis. Nunc ad reliquos pituitosos abscessus, sermonem conuertamus.

Scrofulæ

Scrofulæ à vulgò vocatæ, nihil aliud sunt, quam in Scrofulæ
durati, & intra membranulam contenti adenes, id
est glandulæ: in collo, axillis, & inguinibus præci-
puè consistentes, vbi glandulæ vasis substratæ col-
locantur. Nonnunquàm tamen, quamuis rarò ex car-
ne eorundem locorum fiunt, quæ affinitate quadam
ad strumarum naturam vertitur, & materiæ adie-
ctione adaugetur, vt visum est Leonidæ: Has Latini
strumas vocarunt; à Græcis verò choerades dicun-
tur, vel à charadibus quidem petris per marinas
aquas transparentibus, vel à suisbus multiparis anis
malibus (numerosæ enim sobolis existunt, vt sues;
& eo morbo frequenter affectis. Scrofulæ etenim id
est, sues, colla habent glandulosa, & magna ex pars
te strumosa. Struma autem Celsio tumor est, in quo Struma.
subter concreta quædam ex pure & sanguine quasi Cor. Celsi.
glandulæ oriuntur. Nascuntur eidem maximè in cer-
uice, sed etiam in alis & inguinibus, & in lateribus.
In mammis quoque foeminarum se reperisse chirur-
gus Meges autor est. De ijs etiam Paulus in eum mo-
dum: Oriuntur (inquit) strumæ in priori ceruicis par-
te, aut in altera, aut vtrinque vna, aut duæ, aut plu-
res. Omnes autem suis mēbranis includuntur, quem-
admodum steatomata, atheromata, & melicerides.
Lupia (inquit Guido) veluti lupulus, mollis, rotun-
da, in locis duris & siccis suam sedem præcipuè deli-
git, vt in palpebris, & locis nervosis: vulgus galli-
cum vocat *vne loupe*. Itaque si eius descriptio, atque
etiam curatio, quæ in sequentibus habetur, cum
ganglij Græcorum descriptione, & curatione con-
feratur, affectus tibi videbuntur non admodum in-
ter se dissimiles. Verùm magno errore tenentur, qui
eiusmodi lupiam eandem faciunt cum affectu, quem
recentiores lupum appellant. Est enim lupus malis-
gnum vlcus, partes inferiores, sed præcipuè crura in-
festans, celerrimè depascens, & quasi lupus (à quo
nomen accepisse videtur) famelicus, proximas sibi
carnes exedens: quod vitium dubio procul de genes

Choerades.
Græcorum.

Struma.
Cor. Celsi.

Lib. 6.

Lupia.

Lupus mo-
bus.

re est phagedænarum. Proinde affectus sunt longè
 inter se diuersi, quanquàm in nomine quandam affi-
 nitatem habeant. Nodus, tanquàm funis nodis, eis
 dem Guidoni dicitur, rotundus, durus, & eodem in
 loco permanens, circa loca neruosa maximè appa-
 rens. Auicennas autem nodos definit alicubi dube-
 leta frigida, facitq; hoc nomen genus ad steatoma
 quæ à nostris adiposi, & adipini nodi nominantur)
 ad meliceridas, id est, mellitios nodos, & atheroma-
 ta, quæ materia constant, pulti (quam Græci atherā
 vocant) simili. Cæterum cum hæc tria abscessuum
 genera, steatoma inquam, meliceris, & atheroma
 frequentissimè incidunt, ac locis valde multis Gales-
 nuse eorum meminerit: non abs re factum putau-
 mus, si nactus hoc loco de iis differendi occasione)
 eorum naturam, notas quibus agnoscantur: in qui-
 bus item inuicem dissideant, & conspirent, latius
 aperuimus. Atheroma igitur, tumor est concolor
 & indolens, in membrana, seu neruosa tunica humo-
 rem lentum continens, atheræ, id est, pulti similem
 quæ ex farina decocta conficitur. Interdum quos-
 que in atheromatibus simul cum humore pultaceo,
 lapidosa quædam, duræque corpora, & alia tan-
 quàm sulphuris ramenta inueniuntur, nonnun-
 quàm veluti mansa gallinarum ossicula, sæpe etiam
 tanquàm pili cōplicati tactui occurrunt. Tumor ather-
 omatis, specie & figurâ oblongus, & aliquantum
 sublatius visitur: qui digitorum appressu ob hu-
 moris lentorem & crassitudinem tardè retrocedit,
 & amotis digitis, tardè quoque regreditur. Me-
 liceris autem tumor est, simili modo dolore car-
 ens, sed rotundus, in quo neruosa etiam tunica,
 quam cystim appellant, inclusus humor reperitur
 tenuis, & mellis substantiam repræsentans: vnde &
 mellisauium Latine quibusdam dicitur. Itaque me-
 liceris ab atheromate differt figurâ, & humoris
 substantiâ. Nam & figura rotundior est, & humoris
 substantia tenuior. Proinde melleus hic tumor
 magis

magis quàm ather^{ma} extenditur, præfūq; digito-
rum celerrimè cedit, & a motis digitis pari celerita-
te ad situm pristinum redit. Steat^{ma} verò, tumor *Steatoma*:
etiam est præter naturam, concolor, & tactu lenis,
5 in principio quidem exiguus: sed temporis progreſ-
su augetur, & amplior factus: in quo humor ses-
uo per similis, membranula similiter inclusus, sub-
est. Hoc à meliceride & ather^{mate} distinguitur, du-
ritie. Nam plenum ac solidum est, tactuq; renititur
10 adeo: vt digitis præmentibus minimè cedat. Sed res-
liqua nunc apostemata persequamur, quæ ferè ad
hæc tria, de quibus modò egimus, reducuntur. Tes-
tudo ipsi Guidoni abscessus est magnus: humoras *Testudo*.
15 lis mollis, latiore forma, in modum testudinis: vnde
nomen accepit. Quæ si in capite (inquit) nascatur,
talparia vel talpa dicitur: in collo, bocium: in testicu-
lis, hernia: interdum autem cū pure, vel squammis,
vel fistulis reperitur. Caterùm testudines & tal-
pæ, apud antiquos, neque proprium nomen, neque
20 tractatum inuenerunt. Quidam autem ex recentio-
ribus testudinem definiunt tumorem mollem: vel
non valde durum, satis autem magnum, in quo pin-
guis materia, tunica quadam obrecta, continetur,
quæ caluariæ ita hæret (est enim cutis capitis affe-
25 ctus) vt ipsam plærunque vitiet. Hanc non dubium
est de numero esse abscessuum, & sub meliceride:
vel ather^{mate} contineri: videtur tamen ad meli-
ceridem magis inclinare. Talpa verò cū albam *Talpa*.
materiam contineat, ad ather^{mate} mata potius, quàm
30 ad meliceridem refertur. Guido tamen testudinis
speciem: imo verò testudinem ipsam vt modo dixi-
mus esse affirmat, quemadmodum & herniam, &
bocium, quod vocat: sed varia hæc nomina for-
titi, pro varietate locorum, in quibus reperiun-
35 tur. Caterùm quod vulgus bocium, Græci pro-
priè inuēto ab interiore parte nomine, bronchoce-
len appellant, nostri verò herniam gutturis & gut-
turosos, qui eo morbo de honestantur.

Bröchocele.

Est autē colli tumor grandis, & rotūdus inter cutē, & asperā arteriam, in quo modò caro hebes, modo humor aliquis, melli adipi pulti, aquæ uē similis, includitur. Interdū etiam: vt ait Celsus in eiusmodi tu

Nata.

more pili minutis ossibus immixti reperiuntur. Nata (vt scribit Guido) ex crescētia est magna, carnosā: vel luti caro natium: vel ancharum diuersarum quidem formarū & magnitudinum: cuiusmodi sunt melope pon & cucurbita. Itaq; diuersa sortitur nomina pro formæ, & mēbri in quo est, varietate. Porro tumor hic qui nata vel napa recētiorū turbæ appellatur, dolore caret nisi fortē adeo magnus existat: vt pres mēbri trahēdo soluta cōtinuitate, aliquē dolorē circūstātibus inferat. Est autē & de numero abscessuum, & ad situat. mata (vt suprà in enumeratione

Nata vel napa ad situat. tumata spectat. Bubo.

tumorū præter naturā diximus) ferè spectat. Bubo Galeno autore, laxarū partiū seu glandularū (quas Græci adenas vocant) est affectus: nempe simplex inflammatio. Quare vel malè hīc inter abscessus pituitosos à Guidone annumeratur: vel aliud esse putat quā Galenus. Porro bubones, q. prolapsu, aut aliis vlceribus, aut doloribus cōtrahuntur periculo vacāt. At qui in febribus pestilētiālibus incidere cōsueuerūt, deterrimi sunt siue scēmora siue alas, aut ceruicē inuaserint. Fugille (inquit interpres Auicennæ)

Fugille.

est de genere apostematū glādulosorū & quasi hoc nomine (ait) appropriatur illud quod fit post aurē. Ex qua descriptione non leuis est coniectura, fugille Auicennæ, eū tumorem esse, qui Græcis parotis dicitur, affectus quidē glandularum sub ipsis auribus.

Bubo quid apud Guidonem, & alios recentiores.

Quibusdam autem idem esse putatur fugille: quod bubo: verū tūc illis aliud erit bubo, quā Galeo & Paulo: nempe ex crescentia multum (vt dicūt) infiltrata, & radicata: vt plurimum sine cysti, id est follicullo seu membrana eam inuolvente, dura in morem scrofularum: & in eo significato (vt puto) sumitur bubo à Guidone: quando bubonem fugillinum numerat inter abscessus pituitosos. Ceterū longē

- longè adhuc plura nomina pituitosorū huiusmodi abscessuum reperiuntur. Veram de nominibus ipsis non magna cura habenda est: modo id vnum de iis cognoscamus, & intelligamus, quod propter eiusmodi nominum diuersitatem, curationem & iudicium euariari contingit. Itaque eiusmodi abscessuum, aliarū quidē peculiari quadam membrana seu tunica (quam cystin vocant) includuntur: aliarū verò in carne sunt vasis implexæ & insertæ. Quædam basim, seu radicem habent gracilem: quædam verò latiore.
- Quædam item sunt resolubiles, quædam verò minime. Quædam magne, quædam parue. Aliquæ ad suppurationem spectant, alique non. Alię etiam sunt iquammosæ fistulosæ: & cancerosæ, alię verò nihil horum prorsus resipiunt.

*Differentia
abscessuum
pituitosorum.*

De causis signis, & iudiciis prædictorum abscessuum.

- Causæ huiusmodi abscessuum sunt triplices. Causæ ab-
 20 Næpe primitiue: vt casus, percussio: vitæ lux-
 xus, siue intemperantia, ac deprauata viuendi ratio. Antecedentes: vt sunt humores non naturales, præsertim pituitosi, & vera oedemata, quæ in abscessus degenerant. Et coniunctæ, quæ sunt variæ
 25 substantiæ, & propriè cuiusque abscessus materiæ, in parte affecta contentæ. Continentur autem in huiusmodi abscessibus, quandoque quidem humores: vel serosi, cuiusmodi est vrina: vel putridi & corrupti, vel cœnosi: vel mucosi: vel milli pulti, aut adipi similes. Quandoque verò carnes phlegmaticæ, & spongiosæ, atque glandulosæ. Interdum quoque lapides, arene, ostræ, ligna, carbones: & id genus alia solida corpora. Frequentissima autem sunt (vt paulo antè diximus) horum abscessuum tria genera, quorum singula propriam appellationem Græcè sunt sortita. Ea sunt, atheroma, steatoma, & meliceris, à similitudine contentorum in his corporum dicta. Est enim aliud eorum veluti seuum, aut pingue

Causæ abscessuum que ad pituita pertinet.

Materia pituitosorum abscessuum

14. Therap

quiddam: aliud veluti mel, aliud pulticulæ tenui,
 SIGN A. quam atheram vocant, simile. Signa & iudicia
 eiusmodi abscessuum, quæ ad pituitam pertinent,
 ex eorum descriptionibus, & differentiis suprà pos-
 NOT AE fitis faciliè deprehenduntur. Indicium autem quòd
abscessus ve velamento includantur hoc est, cysti seu pellicula,
lamento in- quam & antiqui tunicam nominabant, est mobilis
clusi. tas, & cutis separatio. Quando verò fixæ sunt, id
 IUDICIA. est, eodem in loco permanentes, & carni adhaeren-
abscessuum tes, nulla eas inuolui membranula indicium est. 10
pituitosorum.

Porro recentes & tractabiles, discuti, seu resolui
 1 possunt: duræ verò & iam inueteratæ, nequaquam.
 2 Rubor autem dolor, & caloris incrementum, osten-
 dunt ipsos abscessus, vel suppurados iri, vel in fistu-
 3 las, aut cancrum degeneraturos. Numerosæ stru- 15
 mæ partes externas occupantes, & sede subinde mu-
 tata, huc atque illuc per corpus vagantes, cum ad-
 uentitia quadam caliditate, planè testantur, ac indis-
 cant, easdem germina esse ac sobolem charadum
 internarum, vt Arnaldus à villa noua quodam in 20
 loco annotauit. Proinde quæ forinsecus illis ad-
 mouentur auxilia parum, aut nihil proficiunt. Hæ
 Auicennas. autē, vt putauit Auicennas, ex casu & offensione,
 seu allusione ita in nostris corporibus multiplican-
 tur. Conducunt verò vel magnopere strumosis 25
 4 ipsis, medicamenta purgantia, potiones diureticæ
 atque electuaria (vt vocant) resiccantia, item æta-
 tis mutatio in paruulis. Cæterum pueri ipsi pro-
 pter voracitatem & gulæ intemperantiam, ac cor-
 poris raritatem, strumis frequentius corripuntur. 30
 Senes verò ob causas contrarias rarius. Ad hæc qui
 breui atque angusta sunt fronte, & compressa hæ-
 bent tempora, ac maxillas amplas, strumis sunt
 obnoxij. In talibus enim materia promptè deriuas-
 tur ad collum, vt ex recentioribus chirurgis anno- 35
 5 tauit Henricus. Strumæ verò præcipuè (vt Celsus
 6 ait) fatigare medicos solent, quoniam & febres
 mouent, nec vnquam faciliè maturescunt: & siue
 ferro

ferro, siue medicamentis curentur, plerunque iterum iuxta cicatrices ipsas resurgunt, multoq; post, medicamento est opus. Quibus quoque accedit, 7
 quod longo spatio detinent. Incisio eiusmodi abscessuum, itidem & corrosio, magnoperè verenda est, circa vètrein, collum & commissuras, propter propinquitatem venarum, arteriarum, & neruorum, ac internæ etiam capacitatis. In incisione quoque
 10 magnarum glandularum, summoperè vitare oportet venam, quæ ad radicem earum sita est, & illis alimoniam defert. Sæpe enim magnam hæmorrhagiã, id est, sanguinis profusionem, excitat: vnde non mediocriter tandem sequitur periculum. Strumæ inter se 8
 15 differunt, magnitudine, naturâ, loco, ortu, multitudine, & vasorum complicatione, vt ex Leonida annotauit Aëtius. Itaque paruæ strumæ maioribus facilius curantur, sicut mites inflammatis. Maleficæ 9
 20 sanari non possunt. Cùm enim omnes eiusmodi strumæ cancerosæ, ac vasis refertæ sint, dùm curantur, Magnitudo 10
 profusionis sanguinis periculum adferunt: præterquam quod cùm plerunque penitiores inueniantur, minimè abscindi possunt. Vasa enim nobilia, venas inquam iugulares, & arterias, quæ carotides appellan-
 25 tur, malefica struma tanquàm radices habet.

Pro loci ratione, superficialiæ quidè strumæ profundis curatu faciliores sunt, deinde quæ in collo eue-
 niunt, vbi tamen vocales neruos, diligenter vitari oportet. Multi enim strumas circa asperam cannam incidendo, vocalibus neruis simul excisis, reliquo
 30 deinceps vitæ tempore ægrum sine voce reddiderunt. Nam præter eius nerui excisionem, vocalia instrumenta denudata, & inter curandum refrigerata, vocis functionem violarunt. Pro multitudine strumarum, constat vnam pluribus facilius curari posse. Sicut, quantum ad ortus rationem attinet, 12
 35 longè citius sanescunt suspensæ, quàm quæ insertæ fuerint. Hæc de strumis ex Leonida, memoriæ prodidit Aëtius. 13

Curatio abscessuum ex materia pituitam referente creaturum, quas excrescentias phlegmaticas vocant.

Duplex abscessuum pituitosorum curandi ratio.

1. Vniuersalis.

2. Particul.

Vitæ ratio qualis esse debeat in abscessibus pituitosis.

Aque aluminosæ vis.

Vacuatio materiæ antecedentis.

Curatio eiusmodi abscessuum, qui ex pituita ferè ortum habent, gemina est recentioribus chirurgis: Vniuersalis scilicet, atque omnibus ex æquo communis: & particularis: hoc est singulis differentiis propria. Itaque vniuersalis curandi ratio erit, talem, tamq; accommodam laboranti vitæ insituere: vt materia, quæ tales abscessus cõmittit, in corpore minimè coaceruetur: & materiam: vt vocant antecedentem, & iam in ægroto corpore collectam, modis omnibus auertere, ne tandem vniatur coniunctæ, hoc est, ei quæ iam morbum creat. Porro priorem huius vniuersalis curationis intentionem assequemur, si laborantes eam viuendi rationem diligenter obseruent, quæ in præcedentibus capitibus præscripta est: hoc vno dempto, quòd paulo tenuiorem victum, & qui incidendis humoribus crassius magis sit accommodus, amplecti debent. Proinde si Auicennæ consilium sequantur, cibos omnes pachychymos, id est, crassioris succi vitabunt, frigidæ item potionem, nimiam satieta-
tem, immoderatamve repletionem, & quæ nausæa pariat. Toleranda autem illis est quàm maximè fieri poterit inedia. Bona coctio imprimis erit procuranda: vitanda habitatio humida, in vallibus sita, paludosa, & vitriatis aquis irrigata. Potus sit vinum aliquod generosum atq; optimum: vel aqua aluminosa, aut sulphurata. Aquæ enim eiusmodi minerales præsertim quæ vini fœculâ sapore representant: nō solū internos hosce strumosos, ac pituitosos abscessus: sed externos quoq; & summa corporis occupantes imminuūt, ac discutiunt: vt Arnaldus affirmavit. Cæterū alterā partē prioris processus, nempe materiā antecedentē auertere, ne tandem addatur cõiunctæ, quadruplici genere euacuationum assequimur, vt pote medicamēto per aluum pituitā expurgante

gante, & quandoque venæ sectione. Item iis, quæ
 vrinam cient, & demùm iis, quæ collectum in alto
 corpore humorem tum in halitum resoluunt, tum di
 gerant. Ad vacuationem quæ fit per aluum, lau- *Vacuantia*
 5 datur à valde multis puluis turbith, qui apud Aui- *per aluum.*
 cénam recipit, turbith, zingiberis, & sacchari, singu- *Puluis tur-*
 10 lorū pares portiones. Ex eo autē exhibet drachmas *bith.*
 duas, asseritq; præter hoc, quòd resoluit pituitam
 crassam, nequaquam calfacere, neque abradere inte-
 15 stina. Razes autem, qui audacior fuit in purgātibus *Razes.*
 medicamentis exhibendis, huiusmodi puluerem cō-
 20 ficit, capite de doloribus ventris in nono ad Alman-
 25 sorem, ex viginti partibus turbith, decem zingibe-
 ris, & triginta sacchari, offertq; ex eo vice vna dra-
 30 chmas tres. Benedicta quoque, & hiera picra: itē pil- *Hiera picra*
 lula ex agarico, & de hermodactylis maiores appel- *Quæ vrinā*
 lata, eiufmodi affectibus magnoperè cōueniunt. Ad *cieant.*
 35 ciendam vrinam, vti cōsueuerat Guido à Cauliaco *Potio Guido*
 sequenti porione, quam ex scriptis multorum se de- *nis à Cau-*
 40 cerpsisse ait. Concipit autem, scrofularię partes tres, *liaco, vrinā*
 philipendulæ partes duas, pimpinellæ, seu bipinel- *ciens in ab-*
 45 le, pilosellæ, tanaceti, caulium rubrorum, qui non *scēsis pi-*
 nullis brasicæ marucina creduntur, rubiæ maioris, *tuitosis.*
 50 singulorum partem vnā; radicis aristolochiæ, spa-
 55 thulæ foetidæ, radicis raphani, ana partem dimidiā;
 concassentur, & decoquantur in vino albo & mels-
 le, vsque ad consumptionem medietatis, & fiat co-
 60 latura, ex qua tertio quoque die, hora matutina sus-
 mat æger quadrantem, id est, uncias tres, & potio
 sit tepida. Cæterum pro omnibus his auxiliis, sicuti
 & pro venæ sectione (si aliquandò fieri debeat), cons-
 65 sulendus erit peritus aliquis medicus, qui & qualis
 tatem, & quantitatem, ac modū vsus eorum præscri-
 bat. Ad resoluendum autem per halitum, & diges- *Quæ per ha-*
 70 rendum humorem, qui in alto corpore collectus est, *litum dige-*
 & internas glandulas (quæ externarum sunt causæ) *rant.*
 excitat, Galen. libr. 14. Therap. consulit theriacen,
 athanasiam, ambrosiam, & medicamentum, quod
 ex

126 Institut. Chirurgicarum, Lib. I.

ex Cretica calaminthe est compositum: Græci diacalaminthen vocant: cuius compositio requirenda est ex lib. 4. de sanit. tuen. Multa alia auxilia ad huiusmodi affectus instituuntur: nempe potiones, electaria, & etiam olea, quæ in aures iniiciuntur. Empirica quoque permulta, à veteribus descripta & celebrata sunt, quorum usus mihi non probatur. Proinde non duxi illa nostris commentariis esse inferenda. Hoc vnum tamen confidenter adfirmo, Christianis

Galliarum reges diuino quodam munere strumas curare. simo Francorum Regi, diuinitus peculiari dono esse indultum, vt quàm plurimos strumosos seu (vt vocant) scrofularios, solo manuum attactu, integræ sanitati restituat. Rex etiam Eduardus (vt referunt historiarum) solebat diuinitus solo tactu sanare strumosos. Quod immortale munus iure veluti hæreditario ad Reges posteriores manauit. Nam Reges Angliæ etiam nunc tactu, ac quibusdam hymnis, non sine ceremoniis prius recitatis, strumosos sanant. Atque hæc quidem in omnibus supra dictis abscessibus

Quæ particularem pituitosorum abscessuum curationem emariant. communia sunt. Quæ verò sequuntur, particulari rem, ac propriam cuiusque differentiarum curandi rationem concernunt. Hanc autem curandi rationem propriam ac particularem, in hisce abscessibus diuersam efficiunt, atque immutant, tum materiarum, ex qua ortum habent, substantia: tum verò eorum quantitas, vel minutula, vel quæ in molem valde magnam excreuit. Ad hæc partis ipsius laborantis, atque etiam totius corporis natura. Temporis autem durationis licet non indicet curationem: indicat tamen nobis aliquandò, atque insinuat, qualis sit ipsa dispositio, vt Galenus annotauit lib. 4. de morbis curandis. Itaque tametsi à prædictis multæ sumi possint curandi indicationes, ac intentiones: eas tamen, quantum ad rem præsentem attinet, ad sex reduximus, quas & iis sex sequentibus veluti canonibus expressimus. Quorum primus ad hunc modum habet: Pituitosos abscessus, molles, & paruos, quæ lupæ vulgò, & Arabicæ factionis principi Auicennæ,

Tēpus quid insinuet.

1

glandu

glandulæ appellantur, si in particulis firmioribus
cōstitierint, & (quia nondum inueterauerūt) tenellā
adhuc cystam, id est membranā qua includuntur,
habuerint, comprimito, & atterito, postea desicca-
5 to. Secundus: Maiores non multum duos, neque 2
inueteratos, more tumorum œdematosorū (de quib.
bus supra egimus (emollito, discutito, consumito.

Tertius: Pituitosas eiusmodi excrementas, sanio- 3
sas, & apostematosas, hoc est, quæ in suppurationem
10 spectant, maturato, aperito, detergito. Quartus: 4
Strumas, quæ ex prædictis auxiliis curationem non
recipiunt, & mobiles sunt, blandæ, morigeræ, ac tra-
ctabiles, incidito, atque extrahito. Quintus: Im- 5
mobiles, insertas, irretitasve, seu (vt loquuntur) infil-
15 tratas, hoc est, venis, & arteriis multum implicatas,
ad radicem, & intus latas, corrodito, detergetoq.

Sextus. Tenui ac gracili radice innixas, deligato, 6
ac euellito.

Primus canon, iuxta Auicennæ sententiam absol- *Compressio,*
20 uetur, si ubi molles, ac minutos eiusmodi abscessus, *& attritio.*
quos Auicennas glandulas, & recentiores lupias ap-
pellant, contriueris, ac vehementer compresseris, las-
minam plumbeam tumori æqualem superponas, &
ne hinc inde labatur, arcuatis vinculis in medio con-
25 stringas. Hæc enim huiusmodi excrementas dis- *Lupie cura-*
gerit. Primum igitur lupia tandiu manu molliter *tio.*
perfricetur, vsque dum aliquantulum incalescat,

& seipsa mollior quodammodo fiat: postea, labo-
rans particula firmiter manibus apprehendatur,
30 & fundo scutellæ, aut re aliqua solida lignea, tot-
ties, ac tam vehementer percutiatur, vt dispareat,
& interior eius cystis, id est membrana qua inclu-
ditur, dilaceretur, disrumpaturve, atque ita ma-
teria ibi contenta dispergatur. Quo facto protis
35 nua lamina plumbea supra locum applicetur, & *Lamina plu-*
fascia duarum extremitatum, seu (vt dicunt) duo- *bea.*
rum capitum, arcuissimè deligetur, nec amoueas-
tur ante nouem aut decem dies. Lamina autem,

*Vnguentū
Rogerij.*

ea sit magnitudine (vt modò dicebatur) quæ propor-
tione respondeat lupiæ. Sunt tamen qui ante laminæ
eiusmodi plumbeæ applicationem, vnguentum ad-
mouent ex plumbo vitò, fuligine sambuci, aut ficus
arboris, oleo, & aceto. Alij prius vtuntur emplastro
composito ex aloë, acaciâ, myrrha, olibano, sarcocol-
la, adreção aceto, vel oui candido, quantum ad alia
excipienda satis esse videbitur. Henricus superpo-
nere solebat paruas (vt ipse, & alij eiusdem farinae
chirurgi loquuntur) plagellas, ex stupis confectas,
oui candido liquore, sale, & alumine zuccharino in-
spissato delibutas. Porro Philagrius ratione non
admodum dissimili, apud Aëtium ganglia (qui ner-
ui, vt suprà diximus, tumores sunt inæquales) curare

*Ganglij cu-
ratio ex Phi-
lagrio.*

solebat: inquit enim ad hunc modum: A gangliis
chirurgicum opus [id est, sectionem] arcemus, præ-
fertim si in manibus, aut pedibus euenerint: sed me-
dicamentis tantum curabimus. Ammoniacum enim
prope ignem, ad emplasiri consistentiam emollitum
illinimus: deinde laminam plumbeam tumori æqua-
lem superponimus, & ne hinc inde labatur, arctis
vinculis in medio constringimus. Iam verò diebus
aliquot transactis, vbi prius ganglium emollitum
nouerimus: nihil ægro præfati statim sublatis vin-
culis, dum adhuc locus incalescit, pollicem dextræ
manus ganglio infigimus, ac reliquis quatuor digi-
tis membro innitentibus vehementissimè compri-
mimus, & ganglium confestim dissoluitur. Hacten-
us Philagrius. Itaque ex hac curandi ratione, facile

*Lupiam &
gangliū eu-
dem esse af-
fectum.
Archigen.
Lib. 4.*

est colligere, recentiorum lupiam, Auicennæ glan-
dulam, & Græcorum ganglion, eundem omninò af-
fectum esse: quod & præcedentes etiam eorum des-
criptiones apertè satis ostendunt. Archigenes in hoc
vitio calcem, vnâ cum adipe anserino, & terebin-
thina resina, apponi iussit. Idem verò & medicamen-
tum, quod lapidem achatem recipit, sæpius utebatur,
vt refert Paulus. At Oribasius, eo frequenter vsus
est, quod recipit cerussæ, resinæ picæ, olei ves-
teris,

teris, singulorum vnciâ vnam, ammoniaci thymiamatis, galbani singulorum parem modum, ceræ vnc. ^{mollitorium} ^{ad ganglia.} quatuor. Extat idem medicamentum apud Aëtrium, sed in quibusdā pondera euariāt: habet enim cerussā, olei antiqui, & resinæ piceæ, singulorū lib. vnam, ceræ vnc. duas, ammoniaci thymiamatis, chalbana [id est, galbani] singulorum vnc. vnam. Cerussam cum oleo decoquito, quousque inquinandi finē fecerit, deinde tritum ammoniacum, postea resinam

10 piceam, & ceram, postremò galbanum præmolitū coniecit. Porro insignis ille Græcæ familiæ medicus Oribasius inquam, non laminam plumbeam, vt Philagrius, Auicennas, & recentiores chirurgi, sed ^{Verticillum} ^{plumbeum.} plumbeum orbiculū crassiorē, ad instar spōdy-

15 ^{lorum,} ^{id est, verticillorum quæ fusis mulierum ap-} ^{penduntur,} ganglio ipso ampliorem imponebat, de- ligabatq;. Siquidem (inquit) pondere suo longiori tēporis spatio, ipsum dissoluit. Itaque satius est multis eiusmodi emollientibus & discutientibus medi-

20 camentis vt in gangliis curandis, quā chirurgico opere, id est, excisione, præsertim cū in cruribus, aut brachiis, aut summis partibus oriuntur. Periculum enim est, si ea excindantur, ne particula mutila reddatur. At quæ caput aut frontem occupāt, manu

25 ^{tutò curari possunt,} ^{hoc est, præcidi, aut euelli.} Ergo summam cutem scalpello diuidito, deinde si parua sunt, vulsella cōprehensa ex basi, hoc est à radice ex-

30 ^{cindito;} ^{si maiora hamis transfixa, & sublata, circū-} ^{circa diducito,} ^{excoriatoq;, & extrahito;} postremò futuris oras cōiungito, medicamētoq; vtor, quod cruentis vulneribus adaptatur. Sed hæc ad quartum canonem pertinent.

Secundus canon completur (vt interim taceam ² medicamenta pituitosis, hoc est, œdematosi tumoribus, dicata, quæ suprà posuimus: ad hos etiam, de ^{Discussio} ^{digerentia} ^{medicamen-} ^{ta.} quibus nunc agimus, abscessus, & herniarum omne genus, apprimē, vnā cum sequentibus remediis vti-

35 lia) ad motionem cuiusdam emplastri, quod à Galeno

130 Institut. Chirurgicarum. Lib. I.

descriptum est libro sexto de compositione medicamentorum κατὰ γινῃ: hoc enim vt ipse testatur per halitum digerit, & phlegmonas propulsiat, valet ad strumas, panos, parotidas. Confert etiam pos-

Gal. hæc compositionē ac ceptā refert Here.

dagricis, & multis aliis vitiis benefacit. Recipit autem olei veteris denariūm pondo centum, argenti spumæ denariūm pondo quinquaginta, picis siccæ denariūm pondo quinquaginta, ladanī denariūm pondo vigintiquinque, æruginis rasæ denariū pondo octo, galbani denariūm pondo quatuor. Argenti spuma (quod lithargyrum vocant) ex oleo trita coquitur. Cū autem cōeunt, id est, inspissata sunt, pix & ærugo immituntur: deinde ladanū, galbanum, & atque sic in mortariū transfusa subiguntur & molliuntur, atque vsui referuantur. Quidam, vt boni coloris sit, & fuscum miscent etiam squammæ denariūm pondo octo: nam alioqui fit nigerrimum.

Aliter inuenitur descriptum in Guidonis cōmentariis: nempe sub hac forma. ℞. olei antiqui vnc. 12. viridis æris, siue æruginis. drach. 14. picis siccæ vnc. 6. ladanī vncias 3. lithargyri vnc. 12. galbani vncias tres.

Diachylon.

Ad idem bene facit diachylon commune & ireatum nominatum, quorum formulæ & compositiones libro sexto infrā describentur. In diachyli autem ireati libra vna malaxanda est vncia vna pulueris radicis ireos. Idem efficit diachylon magnum

Razes.

Stercus caprillū vetus.

Mesues, cuius descriptio etiam infrā habetur. Sunt qui cōsulant, ad digerendos eiusmodi abscessus antiquum stercus caprillū, cum melle & aceto suprā ignē in vnitatē ad formā emplastri redactū, dolenti loco esse admouendum. Item emplastrum ex fœno græco, semine lini & brassicæ, cum viscillagine radicis althææ confectum. Hoc etiam si suppurationis

Halyab.

emplastrū.

spes adfuerit, pulchrē maturat. Halyabbas quoque subsequens emplastrum ad eundem vsum plurimum commendat: ℞. farinæ fabarum, & hordei, ana drachmas decem radicis glycyrrhizæ, radicis althææ & picis singulorum; drachmas quinque ceræ albæ

albæ, adipis anserini, cuiusque drachmas decem te-
 rantur, & in vnum redigantur ex oleo veteri, &
 vrina pueri nondum venerem experti, & supra mo-
 deratum ignem fiat emplastrum. Aliud Auicennæ *Emplastrum*
 5 næ, quo Guido vititur: Recipe stercoreis bubuli *Auicennæ*
 vnc. 2. radice caulium, id est, brassicæ, radice cappas-
 rum, squillæ, ficuum pinguium, singulorum semun-
 ciam, lupinorum, bdellij, ana drachmas duas aceti,
 mellis, axungie suillæ, fecis olei antiqui, ana, quod
 10 satis est, fiat emplastrum. In omnibus duris tumoribus
 Brunus hoc sequens remedium approbavit, cuius
 sententiam secutus est & Theodoricus. Summe ammoniaci, bdellij,
 galbani, singulorum partes
 15 æquales: macerentur triduo in aceto: quibus dissolu-
 tis, & igni iam appositis, addatur furfuris subtilis,
 quantum satis esse videbitur, & fiat emplastrum.
 Rogerius hoc auxilio utebatur ad strumas, quas *Rogery em-*
 vulgò scrofulas appellant. Accipe radice filicis, *plastrum.*
 asphodeli, & si vis ebulorum, ana quantum lubet,
 20 coquantur in vino optimo, & tundantur in mortario,
 addendo sulphuris viui momentum, & fiat em-
 plastrum. Qui Guidoni contigit præceptor in Monte
 pessulano, efficacissimum sæpe expertus est em-
 25 plastrum, quod constabat ex duodecim cochleis *Emplastrum*
 (quos & limaces vocant) vino incoctis, aut lixiuio *præceptoris*
 cinerum, dictorum vulgò clauelatorum, aut ex capis-
 tello, vt dicunt. Imò (quod valentius erat) quotidie
 cochleam vnā vel siccam, vel aliter præparatā, &
 (vt loquuntur) confectam, ipsis laborantibus per os
 30 sumendam offerebat. Probè etiam strumas discutit
 Paulo calx viua, id est, aquā nō extincta, melle, vel
 gymnasiolorum sordibus, seu balneorum strigmento
 excepta, vel oleo, vel adipe suillo. Idē præstat Aëtio
 sola palæstræ sordes, à parietibus derasa, & probè
 35 subacta, super linteolo extensa, & emplastri modo
 applicata. Ad id etiā efficaciter auxiliatur, calcis, nitr-
 ricæ par modus, cardamomi, & fornugraci quadrus
 plus cū melle, malagmatis modo imponitur. Strumas

132 Institut. Chirurgicarum, Lib. I.

quoque discutit, lupinorum amarorum farina ex
oxy melite cocta & illita. Ad idem præclare facit bus-
bulum stercus aceto incoctum, & delinitur: id enim
tumores scirrhusos omnes instar cataplasmatris ap-
positum, mirifice dissipat. Grossi etiam præcipue
caprifici cum axungia appositi, omnem tumorem dis-
cunt. Hac igitur curandi ratione, strumis inchoan-
tibus, & nondum inueteratis, medeberis: tum in pue-
ris, tum in his, qui manuum opus refugunt, medica-
mentis scilicet dissoluentibus, ac per halitum discuti-
entibus. Verum primò mollire, deinde discutere
oportet, vel vtrunque simul medicamentis mixtam
facultatem habentibus, efficere. Eius autem generis
ferè sunt auxilia omnia superius descripta. Porro si
digerentia medicamina, nihil in eiusmodi abscessibus
profecerint, vel ad suppurationem ducendi erunt,
vel exedendi, vel manu curandi, ut in sequentibus
dicitur. Cæterum silentio præteriri non debet, quod
à quibusdam memoriæ proditum est, nempe strumis
laborantes, sicuti & elephantiasi, viperarum, ac ser-
pentum usu mirifice adiuuari. Item si laserem ad cis-
ceris quantitatem singulis diebus ieiuni potauerint.
Ergo serpentem extinctum in ollâ conuicito, eamq;
gypso probè oblitam ac circummunitam in fornacem
mittito, concremati cinerem æquali fenugraci pon-
dere misceto, & melle excepto utitur. Hoc enim stru-
mosis eximie subuenit. Aluum etiam facilem reddi,
tenuemq; victum adhiberi oportet strumis laboran-
tibus, vomitumq; assidue prouocare, & per os pi-
tuitam ducere, caputq; desiccare, ac cataplasmata syn-
cipiti applicare, quæ mediocres pustulas in cute ex-
citare possint, veluti capparidis radix cum polenta, ac
reliqua huiusmodi, smegmatisq; eiusdem facultatis,
& puluisculis uti.

3
Tertij cano-
nis declara-
tio.

Tertij canonis intentionem communiter etiam
assequimur, usu auxiliorum præcedentium. Om-
nia enim mollientia, & resoluentia, si locum
aut materiam inueniant resolutioni contumacem,
materiam

materiam ipsam haud dubiè maturant, & ad suppurationem perducunt: præsertim si mitis ac benigna fatis fuerit, aut sanguini permixta Haly abbas autem ad maturandos huiusmodi abscessus, admo-
 5; emplastrum compositum ex farina hordei pice, & olibano, ex pueri impuberis lotio, in vnum corpus redactis. Auicen. verò ad infrenandam caliditatis vehementiam, consulit decoctum coriandri præfactæ farinae esse remiscendum. Quòd si parum hæc proficiunt, & efficacius medicamentum desideres: acci-
 10; cipe myrrhæ partem vnam, licij partes duas, & miscecum prædicto decocto. Strumas ad suppurationem perducit, aut diffundit subscriptum medicamentum, à Paulo Aegineta lib. 4. relatum. Myrrhæ drach. de-
 15; cem ammoniaci, thymiamatis drach. septem, visci quercini drachmæ octo, galbani drachmæ quatuor propolis drachma, in pila contunduntur. Cæterum
 20; ipsis iam maturatis, & ad suppurationem perduc-
 25; tis (quod ex notis ipsius puris faciliè deprehendes) aperiri debent, & detergeri. Detergio autem optime fiet admoto vnguento Apostolorum vulgò nū-
 cupato. Hoc enim magnæ est efficaciz in strumis malignis, & vlceratis. Ad idem multum efficacia
 30; sunt, vnguentum Aegyptiacum Rafis, emplastrum de succis, diachylon nominant: & diapalma, quod
 Græcis *φαιρικίον* appellatur, quorum descriptiones ex libro. 6. sunt requirendæ. Quòd si huiusmodi abs-
 cessus locum aliquem occupauerint, in quo caries, & quædam corruptela ossium subsit, aut prauum
 35; aliquod symptoma illis accesserit, ea vlcera cum
 40; randi ratione tractentur, cum quibus affinitatem, & commercium habent.

Suppurantia seu maturantia.

Pauli medicamentum ad strumas maturandas.

Detergentia. Vnguentum Apostolorum. Vnguentum Aegyptiacum. Diachylon. Diapalma.

Quòd ad quartum canonem attinet, blandas, morigeras, superficiarias, & sanabiles strumas, sic optime, ac breuissimè tractabis. Aegrum im-
 35; primis prostratum, recumbere iubeto: sedens enim animi deliquio facillimè corriperetur. Vbi laborans sic decubuerit, curibus inter se inuicem, &
 40; Leonida,

Modus incidendi, et euellendi strumas ex Albucafi, et Leonida.

134 Institut. Chirurgicarum, Lib. I.

ad lecti fulcra innixis, caput à ministris firmiter detineri imperato. Deinde cutim tumori adiacentem, recta, vel sub obliqua sectione incidito. Quæ enim in collo per tranuersum fit sectio, prius inutilis est. In eo siquidem vasa & nerui recta porriguntur. Cæterum non affatim, neque vnico impetu, totam cutis crassitudinem secabis: nihil enim violentè in hoc opere fieri volumus. Atque in paruis quidem tumoribus, hoc est, strumis minoribus, simplicem sectionem facito, hoc est, simplicis linea cutem diuidito: in maioribus verò, cutim ad myrtei folij figuram abscidito: tum vasa, id est, venas, & arterias, paulatim, & blandè denudata seponito. Post hæc verò sectionis labra, seu oras cutis incisæ, volsellis, seu hamulis distendito, ac dilatato, ac membranas digitis, & scalpri capulo, vel spatula, excoriato, strumamq; vbi nudata & explicata membranis apparebit, paulatim eximito. Cæterum si struma vasis implexa fuerit, summa attentione opus tractandum est, ne per incuriam copiosa sanguinis profusio sequatur. Propterea in agendo, vnum duntaxat sectionis labium volsellâ protrahatur, & ita sensim à connexis corporibus scalpelli acie separetur. Cùmque ab vno latere connexio diuulsa, ac soluta fuerit, in altero idem penitus repetatur: deinde tota basis propter nervos, & subiecta vasa excidatur. In strumis verò, quæ circa alas & inguina contingunt, ob cutis reduplicationem, sectio transuersa ducitur. Porro in sectione, quæ fit in strumis collum occupantibus, summa cura adhibenda est, ne vel arteriæ, quas carotidas vocant, vel recurrentes nerui attingantur violenturque. Si autem vase aliquo inter secandum diuiso, sanguinis profusio tuum opus remoretur, ac obruret, vas ipsum funiculo excipito, vel nisi magnum admodum fuerit, penitus (vt Paulus consulit) abscidito, vel præsidia sistendo sanguini (si nō magno impetu prorūpat) dicata

cata, applicato. Deinde ad inceptū opus reuertitor,
 Itaq; vbi in artū strumæ basis venerit, dextrè ac pe-
 ritè ipsam præcidito, immissoq; indice, locū pertras-
 ctato, ac diligēter scrutato, num & aliæ sint strumæ
 5 adiectæ, quas & eodem quo suprà diximus modo, si
 quæ inuētæ fuerint, extrahito. Porro modicū sangui-
 nis fluore facilè compescēs, admotis iis, quæ facilitas
 tē habent exiccādi: vt stupis, spongia, aut linamētis
 ex xylo, id est, cotone factis in aquā frigidā, vel ace-
 10 rum, aut in miscellam ex vtroq; (quam exycraton
 vocāt) infusis, & postea expressis. Sin sectio incruē-
 ra perstiterit, thuris polline eam repleto, linamētaq;
 imposito, ac pro linamentorum custodia, lanā vino
 madētem alligato. Quòd si vena aliqua amplior, &
 15 effatu digna, cū radice seu fundo glandulæ: vel stru-
 mæ, aut cōsimilis excrescentiæ pituitosæ, connexa
 sit non ex basi ipsam excindere, sed funiculo excipe-
 re ac cōstringere cōuenit, quo particulatim citra pe-
 riculū sua sponte excidat. Quo in casu per linamēta
 20 postmodum curatio adhibenda erit. Est autem vins-
 culum ex materia aliqua non facilè putrescibili, cuius-
 iusmodi sunt fila, quæ serica nuncupantur, aut graci-
 les chordæ testudinum. Quæ enim facilè putrescūt,
 ea citò ab iis quæ exceperunt decidunt. Cæterum si
 25 peractò opere, aliquid ex folliculo, seu membrana
 materiam prædictorum abscessuum obuolvente,
 vel aliud extraneum quidpiam remanserit, iubet
 Albucasis illud absumendum esse, implendo vulnus
 primis diebus xylo, id est, cotone: vel alio cōsimili,
 30 aqua salsa imbuto. Guido autem vt reliquias illas
 absumeret, hiantem sinum implebat, primum qui-
 dem oui candido, alumine resperso, & inspissato.
 Postea verò vnguento Aegyptiaco, vel aliquo ex
 erodētibus, quæ in antidotario describātur. Por-
 35 rò in omnibus huiusmodi operationibus apponen-
 da sunt, quæ dolorem leniunt. Inter cætera autem
 communiter admovent stupas oui candido liquore
 & rosaceo imbutas,

*Si vena stru-
mæ sit an-
nexa, quid
faciendum.*

Albucasis.

Quinti canonis scopum ita assequeris: cutim cau-
 sico, id est, vrente aliquo medicamine pro ratione
 magnitudinis abscessus abrumpito. Verum dum id
 moliris, summa cura obseruandū est, ne partes alias
 circumiacentes medicamen adurens attingat. Per
 bellè autem opus hoc absolues, admoto caustico ex
 calce, aut sapone. Hæc enim effectum suum intra
 duodecim horarum spatium feciliter adimplent.
 Quod si diutius permanserint, nihil inde tamen peri-
 culi aut incommodi sequetur. Itaq; caustico iā abru-
 pta cute, & inducta eo in loco eschara, id est, crusta
 per medium ipsius crustæ, abscessum recta linea in
 longum diuidito (incides autē versus profundum,
 ferè ad viuū vsque) & in sectionem, seu hiās vul-
 nus, linamentum, aliquo exedente medicamento
 (cuius generis est puluis asphodelorum) respersum,
 imposito. Porro tamen si plærique valde multa ad-
 moueāt, quæ postea libro sexto recensentur: ar-
 senicum tamen in hac re primatum obtinet, modò
 quis nouerit eo rectè vti vsus autem ipsius certus
 modus describi non potest, vt libr. 3. Therap. Gale-
 nus annotauit. Proinde non temerè eo vtendum est.
 Quandoquidem medicamentum est supra modum
 vehemens ac violentum, febres excitans, & multa
 alia praua sympt. mata inducens. Adde quod mi-
 nima etiam quantitate adhibitum mirum, & ferè
 incredibilem effectum præstat. Communis tamen
 eius modus seu quantitas est, medietas grani vnus
 frumenti triticei, in corpore quidem robusto, & par-
 ticulis à principibus membris longè semotis: in de-
 bilibus verò naturis, & locis iuxta principes par-
 tes sitis, minor quantitas admouenda erit. Vt autem
 in vniuersum pronuncietur, melius, ac tutius est,
 parum & sæpius ex eo offerre, quàm semel & vi-
 ce vna quantitatem immodicam. Eius autem ope-
 ratio, seu effectus durat, tres dies integros. Qua-
 re toto eo tempore, laborans victu febricitantium
 vti debet. Membrum verò affectum, & partes cir-
 cumi-

Corrosio &
mundifica-
tio.

Causticum
ex calce &
sapone.

Arsenicum.

Quantitas
arsenici.

cumiacentes, ad tutelam sui, & fluxionem (quam immoderatus calor excitare posset) prohibendam, vnguento quod populeon appellatur, aquâ quoq; vel succo solani, & aceto, aliisque id genus refrigerantibus illini, ac perfundi debent. Quando autem *Quâdo crusta à viuo resoluenda.* certò tibi constabit, glandulam iam corruptam esse, & absumptam (quod ex duritie & tumore crustæ inductæ deprehendes) tunc crusta à viuo resoluenda erit, admoto scilicet butyro loto, & mento farinae triticeæ inspissato, vel aliquo alio pingui, & vinctuoso non salito, ut axungia suilla: ubi verò crusta exciderit, si quicquam adhuc ex glandula lupia, aut struma remanserit, id absumendum erit erodente medicamento: ut puluere asphodelorum, vnguento Aegyptiaco aut alio confimile. At si nihil ampliùs superfit, more aliorum vlcera ad cicatricem perducetur.

Ut sexti canonis scopum assequaris, vinculo ferico, aut crinibus equinis deligandi sunt huiusmodi abscessus, qui bases seu radices habent in angustum venientes, atq; indies magis ac magis prioribus vinctulis, aut nouis adhibitis, stringendi, donec scilicet resiccati appareant, & sponte sua (ut de insersis, ac maioribus vasis implexi dicimus) excidant. Adiuuandum autem erit vinculum aliquo excedente medicamento & deficcante. Demulcendus quoque erit dolor oui candido liquore, rosaceo, vnguento populeo, aut quouis alio doloris mitigatorio. Vbi autem sponte deciderint funiculi, modo quem *6 Ligatura cum lino.* supra explicuimus, persanentur. Arque hæc in vniuersum de abscessibus toto genere præter naturam consistentibus, à pituita præsertim ortum ducentibus, dicta sufficiant. Post quæ, non abs re factum putauimus, si propriam ac peculiarem meliceridum, *35* steatomatum, ac atheromatum curandi rationem subiecerimus, hæc enim & frequentissimè nostris corporibus incidunt, & alias quasdam sub se tumorum præter naturam species seu differentias, nouis

quibusdam, atq; apud veteres prorsus inauditis nominibus, à nœotericis appellatas, complectuntur: vt talpam, testudinem natam, & id genus alia, quæ in præcedentibus à nobis explicata sunt.

De curatione atheromatis, steatomatis & meliceridis. 5

Quot, & quibus modis curentur prædicti abscessus

IN iisce tribus abscessuum generibus, quæ frequentissime incidunt, steatoma inquam, atheroma, & meliceride, vnum commune curationis consilium est: vt quod tunica illa, quam cystrum appellant, continet, discutiatur, aut medicamentis totum vnà cū tunica ipsa exedatur, aut sectione auferatur. Quidam autem ex iis tumoribus triplici hac ratione curantur, nimirum qui liquidiores humores continent, qualis est meliceris: aliqui duplici tantum, vt atheroma, quod & sectione tollitur, & medicamentis exeditur. Steatoma verò nec discuti, nec exedi potest: sed solâ manus operâ, hoc est, sectione duntaxat, curatur. Porro medicamentorum, quæ discutiendi ac dissipandi vim habent in huiusmodi affectibus materiâ, inter hæc quæ de strumis supra edocuimus, reperies. Priuatim verò, ac propriè meliceridas dissipat Paulo, quod continet vvas passas exemptis acinis viginti, squammæ drachmas quatuor, parte fomētis prius nutrita imponitur. Aliud emplastrum ad meliceridas, quod ad Lecnidam retulit 15

Curatio per digerentia.
Lib. 4.

Lib. 15.

Aëtius: accipit passularum detractis vinaceis, libram vnâ, cumini minutissimè triti, vncias sex, nitri vncias tres: omnia simul in mortario subacta cōficito, & alligato. Aliud eiusdem discussorium ad meliceridas: concipit salis ammoniaci, spumæ argenti, cerussæ, singulorum lib. i. ceræ terebinthinæ, chalbarnæ, opopanacis, singulorum vnciam vnâ: rubricæ sinopicæ vnc. 6 aceti heminam. [hoc est, vnc. 7. & semissem,] spumam argenti, cerussam, & sal ad extractum leuiorem tritum, simul decoquito, deinde rubricam prius ex aceto tritam iniecit, & cum vniueris liquabilia, postremò omnibus simul confectis, & refri

- refrigeratis, opopanaxem & chalbanam aceto soluta admisceto, & vtere. Cæterum si medicamentis *Curatio per*
exedentibus, quæ Græci septica vocant, humorem *exedentia.*
in eiusmodi abscessibus absumere volueris, eos si
5 cuti etiam & strumas, medicamentis adurentibus
cute superposita prius denudare expedit: è quorum
numero (inquit Paulus) simplicius quidē est, quod *Lib. 4.*
constat calce viua, id est, aqua non extincta, sapone,
& cinere lixiuæ stillaticio. Aliud varium magis,
10 quodq; reconditum diu seruari potest: capit calcis
viuæ drach. quatuor, sphecles, id est, seculæ vini cō-
bustæ, nitri liquidi tostī, singulorum drach. duas,
mini, seu rubricæ sinopicæ drach. vnam cinere lixi-
uū stillaticio teruntur: vbi ad mellis liquidioris cras-
15 situdinem reducta fuerint ter feruefacito: vt medio
crem consistentiam habeat, & pixide plumbea re-
ponito, lixiuium super distillās, ne citò nimis exare-
scat. Ergo circumfusam cutem eiusmodi medicame- *Medicamen-*
tis crustam inducentibus, primū abrumpito: post *tum valide*
20 quam verò crusta deciderit, exedentia adhibeto. *exedēs absq;*
Erodit autem validē citra vellicationē & morsum, *morsu.*
quod habet squammæ æris drachmas quatuor, san-
darachæ [id est, arsenici rubri] drach. duas hellebo-
ri nigritantundem, cum rosaceo vtor. Aliud ad
25 idem valde efficax: erynaceorum combustorum, te-
stæ sepia: auripigmenti: singulorum æquale pōdus,
rosaceo miscentur. Sed quæ adiacent, atque in am- *Curatio per*
bitu sunt partes omnes, prius cerussa cum oleo *chirurgia.*
delinito. Verū enimvero si tales abscessus, ses-
30 ctione curare voluerimus, in ea quidem curandi
ratione, siue pultaceus: siue melleus siue adiposus,
siue cuiusdam alterius substantiæ humor, in eis
contentus fuerit: vna nobis intentio perpetua est,
vt scilicet tunicam qua humor concluditur, aufera
35 mus. Sed dū hoc molimur, impenso studio cauendū
est: vt de strumis suprà diximus, ne temerē mēbrana
vulneretur: aut dilaceretur: vnde humor, qui in ea
cōtinebatur effusus, operationē impediat, & portio
ipfius

140 Institut. Chirurgicarum, Lib. I.

ipſius relinquatur. Si enim diſſecta tunica, ac humor
re profuſo, tumor ſubfederit, difficulter admodum
tunica excoriari curariq; poterit. Si verò humoris
aliquid relictum ſit, periculum eſt, ne morbus renas
ſcatur, quemadmodum & ſtruma, cum portio ipſius
relicta eſt. Quòd ſi tale quid incidit, melius eſt, non
conſuere, & exedentibus medicamentis ſuprà poſi
tis, aut conſimilibus reliquias abſumere. Cæterum
ſi ſteatoma latiore ſit apice, baſi verò anguſtiſſima,
tenuiſſimaq; omiſſis reliquis aliis ſuperuacaneis au
xiliis, totum à radice ipſa amputandum eſt. Ita enim
chirurgicum opus expeditiſſimum erit, & vlcus
paruiſſimum, planumq; reddetur, & curatio breuiſ
ſimè abſoluetur.

*Ætius
lib. 15.*

De ſcirrhoſis tumoribus, ex atra bile creatis.

C A P. X I I I I.



Diximus de tumoribus ex ſanguine, fla
ua bile, & pituita excitatis, de verucis
quoq; & iis quos ſeroſus humor, aut
flatulētus ſpiritus procreauit: ad hæc,
de abſceſſibus qui ex pituitoſa ſubſtā
tia maximè ortum habent, atque aliis
toto genere præter naturam conſiſtentibus. Proin
de reliquum eſt, vt de iis tumoribus agamus, qui
bus atra bilis, ſeu melancholicus ſuccus generatio
nis materiam præſtat, cuiusmodi ſunt ſcirrhoſi, id
eſt, indurati tumores, & canceroſi, quos cancroſo
ſtemoſos vocant. Itaque ſcirrhi, ſicuti & phlegmo
nes, eryſipelatis, & œdematis, gemina eſt recentio
ribus chirurgis differentia, vno ſcirrhi nomine com
prehenſa, nempe ſcirrhus verus, & non verus. Por
rò verus ſcirrhus ſeu legitimus illis appellatur, qui
ex melancholia naturali procreatur. Eſt autem me
lancholia naturalis, boni ſanguinis fex, ac veluti li
moſa quædam ſuperfluitas, hoc eſt, craſſior quidam
ſanguis, cuius color niger eſt, ſapor verò acerbus,
vel acidus, vt vomentibus eum non rarò innotefcit:
in maſ

*Scirrhus du
plex.*

*Scirrhus le
gitimus.
Melancholia
naturalis.*

in massa quidem sanguinaria (in qua humores vniuersi continentur) existens, alendis partibus melancholicis à natura factus. Scirrhus verò non legitur *Scirrhus il-*
 5 cholia non naturali procreatur. Est autem melācho- *legitimus.*
Melācholia
 lia non naturalis, quæ à modò descripta naturali de- *nō natura-*
 generat, intra tamen limites suæ latitudinis perma- *lis.*
 nens: quos si prætergrediatur, non iam amplius (ins-
 10 quiunt) melancholia, sed alius humor dicitur. Ves-
 rum melancholia, si in vniuersum definiatur, humor
 est frigidus, & siccus, ex crassiore (vt ait Guido)
 ipsius chyli portione progenitus. Cæterum, non na- *Nō natura-*
 turalis melancholiæ quatuor differentiæ communi- *lis melācho-*
 ter statuuntur. Prima est, quando humor ipse melan- *lie quatuor*
 15 cholicus, qui naturalis dictus est, & quotidie gigni- *differentiæ.*
 tur in corpore dum animal sanitate truitur, in pro- *I. Bilis atra*
 pria sua essentia aduritur, & putrescit, fitq; bilis atra *exquisite.*
 exquisitè. Talis enim (vt ait Galenus) ex humore a- *Ex immodi-*
 tro supramodum adusto conflatur, habetq; splen- *cè affato san-*
 20 didum aliquid veluti bitumen, & pix. Hæc autem *guine melā-*
 acida est, & in terram effusa velut acetum feruet, & *cholico, fieri*
 ipsam fermenti ritu eleuat, tū omni animanti iniunc- *bile exquisi-*
 da, adeò, vt ne mures quidem ipsi, aut mulsæ eam gu- *tè nigram.*
 stauerint: non magis quidem, quam copiosum salē, *Libr. 14.*
 25 in quo nullum animans vitā peragit, vt mare quod *Therap. &*
 mortuum appellatur, indicat. Porro tūm gignitur *libr. de atra*
 huiusmodi nigra bilis, cum ille veluti sanguinis li- *bile.*
 mus, (quam melācholiā naturalem diximus) diu- *Gale. cō. 21.*
 tius moratur in corpore, & neque per aliquem sens- *Lib. 4. aph.*
 sibilem effluxum, neque occultum excernitur: ves-
 30 rum transmutatur, corrumpitur, & putrescit. Si qui- *Lib. 14.*
 dem (inquit Galenus) hic humor vbi amplius inca- *Therap.*
 luerit, aut propter putredinem, aut febrem inflam-
 mantem, nigram efficit bilem: quæ quidem frigida
 est, quia terrestris, sed tamen calor nō expers, quæ
 35 admodum & cinis, & acetum, apparetq; dum per al-
 uum (vt contingit aliquando dysentericis) excernit-
 tur, splendidior, ac nigrior ipso sanguine crassiore,
 & ni

142 Institut. Chirurgicarum, Lib. I.

& nigriore, quē humorē melācholicū appellamus. Splendet enim veluti mortui maris bitumen, quod

2. Bilis atra ex aduſtione aliorum humorum. Iudaicum vocant. Secunda species, seu differentia bilis atræ non naturalis est, quæ ex aduſtione aliorum humorum nascitur, vt illa quæ fit ex flaua bile vehementer vſta. Quæ etiamnum tantæ est malitiæ, vt &

terram radat, & eam moræ bilis exquisitè atræ, in altum attollat. Sed & muscæ ipsam, nō secūs quā vērē nigram bilem, refugiunt. Si sanguis quoq; aut pituita in corpore vehementer incaluerint, & exuratur, efficitur etiam melancholicus humor, non naturalis per aduſtionem dictus, vt voluit Auicēnas. Verūm duæ istæ postremæ species (quæ scilicet per sanguinis aut pituitæ assationem fiunt) Auicennæ mixtiores sunt. Scribit autem Galenus illā bilis atræ speciem, quæ ex flaua bile vehemēter assata generatur, deteriore esse, quā ea quæ ex crassiore sanguine generationem habet: qui subsidenti in dolio vini fesculæ aut amurcæ, hoc est, feci olei proportionē respōdet. Hæc enim mitior est, sed potissimū, quoties

Com. 29. li. 3. Prædictio dum Hipp. nondū traxit in animali moram cum aliquo calore abundanti præter naturā. Verūm priusquā in exactam atram bilem trāsmutetur, primò in vitellinā, secundò in porraceam, tertio in arguginosam transit.

3. Bilis atra per congelationē (vt vocant) & in-durationē. Tertia species melancholiæ non naturalis est, quæ originem sortitur à lapidosa quadam concretione, vt cū ab imperitis medicis vel chirurgis, erysipela ta, & inflammationes (quas Græci phlegmonas vocant) aut quicūq; alij tumores ex naturalibus humoribus procreati, admotis extrinsecus præſidiis, nimis vehementer refrigerantur, astringunturq;: vel cum iisdem tumoribus, ea quæ valenter nimis trahunt, digeruntq; medicamenta, adplicantur. Tunc enim toto, quod in eis subtilissimū erat, dissipato, id quod reliquum est (nempe crassius) plus iusto desiccatur, lapidis duritiem consequetur, atque in melancholiz cum humorem vertetur.

4. Bilis atra Quarta melancholiæ nō naturalis differentia exurgit,

- git, quando alius humor ipsi melancholiæ naturali ex admixtio
 permiscetur. Quod dum fit, dulcoratur, ac mitescit ne.
 magis, nisi dum alterutra bilis adusta, huic commi
 scetur. Siquidem tunc vel acescit, vel amarescit, &
 5 erosionis non modicæ particeps efficitur. Ex præcedentibus igitur colligere licet, quatuor tumorum
 præter naturam differentias nasci ex melancholia, seu atribilario humore. Primò nanq; ex melanco
 lia naturali (quam quotidie gigni in sanis diximus)
 10 fit verus, ac legitimus scirrhus, apud Arabes seph
 ros nominatus, Græcis verò σκίρροσ, & σκληρὸς οὐκ ἀκρι
 βής, hoc est, scirrhus non exactus, seu non exquisitus,
 25 qui tumor quidem est prædurus, & doloris expers,
 non omninò tamen insensibilis: Auicennæ impurus
 15 appellatur. Galenus tamẽ libro decimoquarto met.
 med. tumorem ex humore melancholico cõfiatum,
 tunc propriè scirrhum, his qui de nominibus conten
 dunt, condonat esse appellandum, cùm omninò sens
 20 fuse est expers. Cùm verò nondùm omninò factus est
 insensibilis, scirrhum potius tumorem, quàm scir
 rhum (si velint) nominari. Secundò ex melancholia
 non naturali dicta per admixtionem, tres aliæ tumo
 rum differentia enascuntur: nempe scirrhus phleg
 30 gmonides, œdematides, & erysipelatides, quæ pro
 vna tantùm differentia, hîc numerantur. Tertiò ex
 melancholia non naturali facta per lapidosam quan
 dam concretionem, generatur, scirrhus exquisitus,
 durus quidem, & omninò sensus, atque doloris ex
 35 pers: ab Auicena purus nominatus, qui curationem
 non admittit. Quartò ex melancholia non naturali
 per deütionem omnis cancrorum species procrean
 tur, tam vlcerati scilicet quàm non vlcerati, de quo
 rum genere est scirrhus cancrusus nominatus. Itaq;
 scirrhus propriè dictus, tumor est durus, & indolens:
 35 non tamen omninò sine sensu, ab humore melanco
 lico naturali, & minimè corrupto procreatus, vt res
 centiores definiunt chirurgi.

Quatuor tu
 morũ diffe
 rentias fieri
 1) ex melan
 cholia.
 Verus scir
 rhus nõ ex
 quisitus.

2
 Scirrhus
 phlegmono
 des.
 Oedemato
 des.
 3
 Erysipelato
 des.
 Scirrhus ex
 4) quisitus.
 Scirrhus can
 crosus.
 Scirrhus pro
 priè dictus
 quid?

CAUSAE
scirrhi legi-
timi tres.

CAUSÆ scirrhi, vt & aliorum tumorum præter naturam, triplices sunt. Primitiua scilicet, vt est praua viuendi ratio, crassum, & melanco-
 1 licum sanguinem generans, coaceruansq̃. Antece-
 2 dens, vt succus melancholicus in corpore collectus,
 à liene (cuius officium est hepar à crasso illo, & luto-
 fo sanguine expurgare) malè attractus, & extra cor-
 3 pus minimè, vt debebat, expulsus. Coniunctæ, hu-

NOTAE
scirrhi.

mor ipse melancholicus in laborante particula impa-
 ctus. Signa ipsius scirrhi præsentis, Guidoni sunt,
 tumor durus, & valenter renitens, color inter rubrū
 & nigrum medius: cuiusmodi color fuscus est. Hūc
 cū in corporis partibus sæpe incidat, plerique me-

14. meth.
med.

dicorū (vt Galenus inquit) pelidnon, hoc est, liuidū
 vocant. Adhæc, si venas euidentiores membrum las-
 borans habet, exaltatas eas à crasso, & nigriore quo-
 dammodò sanguine, cuiusmodi per aluum aliquan-
 dō non paucis hepaticorum excernitur, videre lice-

Guido notat
canceri tribuit
scirrho.

bit. Sed iam scirrhus impurus, & cancrusus erit. Hæ-
 enim notæ, quas hic ad scirrhū accommodat Guis-
 do, canceri propriè sunt notæ apud Galenum lib. de-
 cimo quarto methodi medendi. Non ineptè tamen
 scirrho adaptari possunt, hoc vno dempto, quòd ve-

IUDICIA
scirrhi.

nas tumentes, & exaltatas non habet scirrhus, vt
 cancer, nisi scirrhus fuerit (vt diximus) cancrusus.
 Quippe non rarò scirrhus in cancerū degenerat, cū
 ab eadem fiant materia, succo scilicet melancholico.
 Propriè igitur scirrhi legitimi notæ sunt, tumor dur-

rus, pertinaxq̃, ac tactui resistens, in quo & hebes-
 sensus adest. Adde, quòd & aliæ notæ apparent, quæ
 melancholicum humorem in corpore subesse testan-
 tur. Tumores verè scirrhosi ab initio, & dum adhuc
 1 prima rudimenta cōcipiunt, magna ex parte exigui
 2 apparere solent: procedente verò tempore, paulatim
 augentur, & maiores fiunt. Ex iis quidam vnū dun-
 taxat membrum occupant. Alij verò eo membro,
 quod

quod prius infestabant, relicto, ad aliud postea trāsferuntur. Quod dum fit, nominatur tunc vitium ferinos Auicennæ. Præterea huiusmodi tumores melancholici, vt plurimum si ritè tractentur, resolutione ne terminantur, nonnunquam indurata manent, & non rarò in cancrum (quod pessimum est) degenerant, ac transmutantur.

Veri ac legitimi scirrhi, non tamen exquisiti, & in tophaceam duritiem omnino insensilem concreti, curatio.

CAeterum absolutam induratorum huiusmodi tumorum præter naturam, qui veri scirrhi, non tamen exquisiti, nominantur, curationem tribus intentionibus assequemur. Prima cōuenientem viuendi normam præscribit. Secunda materiam antecedentem (id est, quæ parata est, statim morbum efficere) tollendam monet. Tertia coniunctæ (vt vocant) materiæ, & morbum iam committentis vacuationem molendam esse nobis insinuat. Itaque (vt in vniuersum dicat) virtus ratione eorū qui scirrho laborant, sobriam, & moderatam, & quæ ad calidū, & humidum declinet in rebus (vt dicunt) non naturalibus instituit. Ergo alimenta euchyma, id est, boni succi, & probum sanguinem generantia exhibeto. Panem itaque triticeum, probè subactum, & moderato igne in forno coctum, quiq; fermenti aliquid habeat, & salis quod satis est: præscribito. Vinum substantiâ tenue, & odoratū deligito: crassum verò, nigrumq; vitato. Oua forbilia, pullos, capos, gallinas, & eorum iura præbeto. Perdices, phasiani, coturnices, capreoli iuuenes, vituli lactantes, & anaticuli verueces, laboranti in delitiis sunt. Ex oleribus, id quod Arabes aspanar, nos verò nomine paulum mutato, spinacium dicimus, lactucas item, lupulum, boraginem, & buglossum, atque id genus alia, quæ sanguinem expurgant, & puriorem reddunt, ne aspernator. In summa, ea omnia, quæ sanguinem melancholicum suapte natura pariunt, fugito. Ea

Tres intentiones in curatione scirrhi legitimi obseruandæ.

3
1

Viuendi ratio.

Euchyma.
Panis optimus.
Vinum.
Oua.
Carnes.
Olera.

146 Institut. Chirurgicarum, Lib. I.

autem Galeno libro tertio de locis affectis capite sexto ferè sunt, caprina, bubulaq; caro, magisq; hircina, & taurina. Sed maximè asinorū, chamelorumq; carnes: item vulpinæ, caninæq;. Leporum quoq;, sed multò magis aprorum. Præterea limaces, si frequēs sit eorum vsus: atque omnes terrestrium animalium carnes sale conditæ. Aquatiliū quoque carnes, vt thunni, balenæ, vituli marini, delphini, canis, atque cetaceorum omnium. Ex oleribus autem, brassica ferè sola huiusmodi sanguinem gignere consuevit. Quemadmodum & arborum germina, vbi vel muria, vel oxalme condiuntur, præcipuè lentisci, terebinti, rubi, & rubi canini, qui Græci cynolbatos appellatur. Leguminum verò omnium maximè lentis, inter melancholicos cibos numerantur. Mox panis fursuraceus & qui ex typha, atque vitiatissimis fructibus factus est, quorum apud quasdam nationes vsus loco frumētī habetur. Præterea vīna crassa, nigraq; aptissima sunt, vt ex ipsis melancholicus humor fiat: præsertim, si quis abundè ipsa ingerens, oblata occasione in multo calore corpus contineat. Vetus denique caseus, vbi fortè fortunā in corpore fuerit supercalefactus, facillè huiusmodi parit humorē. Hæc ex Galeno hætenus. Cauendum insuper est, à rebus torridis, asis quoque, & frixis vehementer exiccatiss. Item salitis, acidis, & acerbis (veluti sunt allia, cepe, piper, sinapi) & alijs id genus omnibus, quæ sanguinem adurunt. Vitare etiā oportet iram, morositatem, vigiliās, sollicitudines, atque immoderatas exercitationes. Animi tranquillitas, ac lætitia maxime gnapere est experenda: summaq; ope nitendum, vt quotidie venter deiciat. Hætenus de primo scopo. Vt autem quod secundus scopus nobis proponit, consequamur, præcipit Auicennas, corpus vniuersum vacuandum esse, sum venæ sectione, si sanguis niger admodum, & crassus apparuerit: tum medicamento purgante, quod bilem atram exigat: cuiusmodi sunt Mesuæ, epithymum, senna, poly podium fumus

Carnes.

Limaces.

Pisces.

Olera.

Quædam fit ex aceto & sale.

Legumina.

Panis.

Typha exile est triticum specie filigini non dissimile.

Vinum.

Caseus.

Sanguinem adurentia.

Animi tranquillitas.

Exercitatio.

Intemperantia.

Vacuatio materia antecedentis.

De Tumorib. præter naturam. 147

fumus terræ (qui Græcis capnos vel capnios, & fumaria Latinis appellatur) lupulus, volubilis. Item cassia fistula, myrobalani Indi, lapis lazuli, qui Græcis cyaneus, Romanis ceruleus dicitur. Dialene, dial catholicon, hiera Ruphi. Hæc enim omnia humores melancholicos per aluum expurgant. Sed hæc, quæ ad pharmaceuticam & dieteticam attinent, chirurgi metas excedunt. His igitur medicæ artis professoribus relictis, ad tertium scopum properabimus, quæ sanè nos assequemur, si quod præter naturam in partícula est, totum vacuetur. Quæ communis quidem, ac prima indicatio est omnium, qui præter naturam consistunt tumorum: in quibus utique adhuc non sunt geniti pori. Modus autem vacationis eius proprius est, circa quem circumspectum, & maxime attentum esse curantem oportet. Siquidem materia eusmodi tumorum, naturæ tam malignæ est, ut in duritiem veluti lapideam abeat, si temerè resolvas-
 tur. Si verò plus quam par est, eam emollias, periculum sanè imminet, ne ipsa corrumpatur, & scirrhorus in cancrum degeneret. Sequendum igitur in hac re Galeni ac Pauli (quid e hac re ante Auicenas scripserunt) consilium est. Nempe ut scirrhoris ipsis affectibus, nullum vehementer exalfaciens siccansq; medicamentum applicetur. Nullum item quod duntaxat emolliendi, atque humectandi vim obtineat. Quod enim superfluum humorem habet, nihil omnino dissolvit: quod verò minimum, plus quam oportet, exiccat. Hinc non omnino absurde præcipiebat Auicenas, alternatis vicibus ad hos induratos tumores, modò emollientibus, modò digerentibus per halitum, utendum esse. Verùm quoniã id & tædiosum, & factu, ut oportet, perdifficile est, fortius ac tutius Galeno visum est, medicamentis mixta tam facultatem habentibus, ad horum curationem utendum esse. Eodem enim tempore, quod induratum est molliemus, & sensim per halitum digeremus.

3
*Vacuatio
 materia con-
 tinet.*

*Materia scir-
 rhoru causè
 tractanda.*

*Gale. 2. ad
 Glauco.*

*Medicamen-
 ta scirrhis
 accommodata.*

148 Institut. Chirurgicarum, Lib. I.

Rasis medicamentū ad scirrhus emolliēdos et discutiēdos.

Illis tamē ab initio, aliquid quod modicē reprimat, erit admiscendum ad hāc rem Auicennas quāplurimas remediorum formulas instituit: verū quoniā ea magis dicata sunt scirrhis ex phlegmone, aut erysipelate impendio refrigeratis (vt in sequenti capite ostendemus) procreatis, illis relictis, assūme medicamentum à Rase libro septimo ad Almanforem descriptum: facta tamen prius ab initio aliquali influētium humorum (moderatis quibusdam repellentibus admotis) repressiōe. Rasis autem medicamentum ad hunc modum habet. Accipe bdellij, ammosniaci, galbani, singulorum partes æquales, terantur in mortario, cum oleo de ben (quod Græci balanum myrepiscen, Latini glandem vnguentariā vocant) aut de lilio. Deinde fume mucaginum fœnigræci, seminis lini, & ficuum, pondus omnium prædictorū: terantur omnia simul, donec in vnum coeant. Galenus ad eam rem magnoperè commendat corticem radicis altheæ: quam, inquit, vulgus anadendromalachen, quasi dicas, arborecentem maluam vocat) anserino, vel gallinaceo adipe liquatam, & cum eo contusam, atque in cataplasmatibus forma redactam. Quod si tumor ad suppurationē spectet, summoperè cauendum est, ne particula laborans calorificis auxiliis, aut quouis alio modo irriteretur. Ita enim facile cācer accerseretur. Si verò aperiatur tumor, materia iam in pus conuersa, ab vsu vnguenti, quod diachylon nominatur, minimè tibi discedendum fuerit. At si in lapideam duritiem degenerauerit, ad ea auxilia, quæ sequenti capite describentur erit recurrendum.

Galenī cataplasmā
14. Thera.

Si scirrhus ad suppurationem spectet.

De scirrho illegitimo non exquisito, ex Vehementi refrigeratione, aut exiccatione originem sortito.

Scirrhus illegitimus quo modo generetur.

Q Vando medicorum imperitia, inflammatio-
nes (quas Græci phlegmonas appellant) aut erysipelata impendio refrigerantur, aut admotis medicamentis, vehementer trahentibus, & per halitum digerentibus, temerè resoluuntur, tunc
torum

totum id quod in eis tenue magis erat, dissoluitur: quod verò reliquum est, velut congelatur, atque impen-
situs reficcatum, lapideam duritiem assequitur, fitq; tãdem affectus, qui Græcis scirrhusis vocatur.

- 5 Cæterum contingit quandoque particulam aliquã Duritiei in
indurari propter tensionem, quam sustinet ex flatib. 1) particu-
bus, aut humore quopiam aquoso, vt suprã dictum lis cause.
est, dum de tumoribus flatuosis & aquosis agere-
tur. Nonnunquam & tophacea durities in particu- 2
10 lis quibusdam oboritur, propter priuationem hu-
miditatis, & nimiam deficcationẽ, vt in duritia iun-
cturarum, & parisi in articularis morbis, ac dolori-
bus, procreatis. Verumenimuerò hîc duntaxat age-
mus de scirrhis, seu induratis tumorib⁹, qui ex phle- 3
15 gmone, aut erysipelate, paulò antè commemorato,
ortum traxerunt, aut etiam ex œdemate impendio
refrigerato, & adstricto. Atque eos non absurdè scir-
ros excoincidentia procreatos nominauerimus.

- 20 *De signis & iudicijs scirrhi non legitimi, ac non prorsus
exquisiti ex coincidentia creati.*

- 25 **S**cirrhi illegitimi, & nō omninò exacti, notẽ sunt Scirrhi ille-
tumor durus, vix sensibilis, id est, quasi sensus, gitimi, &
& doloris expers, corporis colorem ad vnguem nō exquisiti
repræsentans, ex melancholia non naturali ortum note.
ducens. Hic nec prorsus incurabilis est, nec facilem
sanè curationem admittit. Siquidem humor, vnde IUDICIA.
30 huiusmodi vitium contrahitur, lentus seu glutinosus 1
suscraffusq; est, aut (vt Galenus ait) vtriusque ra-
tionis particeps, qui particulis induratis infartus,
solui contumaciter repugnat. Vbi præsertim resolu-
luta ex ipso subtiliori humiditate, quod reliquum
35 est, exiccatum lapidosumq; efficitur. Scirrhus 2
verò exquisitus, & qui omninò sensu vacat, curaz Scirrhus ex-
tionem non recipit. Si tamen aliquo modo iuuas quisitus
ri possit, humectandi ratione id præstari debet. curationem

non ad- (3. Durities quoque ex nimia exiccatione, & maras-
mittit. mo, hoc est, consummata prorsus siccitate, insanabi-
Scirrhi i cu lis est: satis enim est prohibere, ne ultra siccitas pro-
rabiles. cedat. Sed & scirrhi in quibus pili nascuntur, quique
magni sunt, ac vehementer duri, & corporis colo-
rem referunt: nec sanantur nec vnquam permutan-
tur: vt scriptum reliquit Auicennas.

Curatio scirrhi illegitimi, & non exquisiti.

*Summa cu-
randorum
scirrhorum.*

CVrandi verò eius communis indicatio est: vt
quod præter naturam in particula est, eorum
vacuetur. Modus tamen vacuationis eius pro-
prius est: vt libro decimoquarto meth. Galenus an-
notauit. Nā detergere (inquit) id quod cōrumaciter
inhæret, oportebit. Quòd si quis iis quæ vehemēter
trahunt, digeruntque, medicamentis vacuare tenter,
nec iis quæ excalfaciant, & humectent, molliat, ac
liquet: huic paucis primis diebus egregiè processis-
se curatio videbitur. Scirrhus enim manifestus decre-
uisse apparebit. Cæterum quod de affectu restabit,
id insanabile erit: siquidem toto, quod in eo tenuiū
partium erat: digesto dissipatōve, quod reliquum
est, veluti lapidosa concretio linquitur. Hac igitur
de causa ad scirrhosos affectus nullum vehementer
excalfaciens, siccansue medicamentum idoneum est.
Sed ea tantum, quæ cum molliendo, hoc est, præter
quod molliant, digerere etiam cōmodè possunt. Cuius-
iusmodi sunt, tum ceruina medulla, tum vitulina,
tum seuum hirsinum, taurinum, pardale, & leonis
num. Ex adipibus volucrum commendatur impris-
mis anserinus: quam proximè sequitur gallinaceus,
& phasianicus. Adhæc, ammoniacum thymiana, id
est, suffimem galbanum, & bdellium vtrunque, mas-
gisque Scythicum, quanto videlicet est humentius.
Stryax quoque qui humentior est, & pinguis. Radix
etiam altheæ, & syluestris maluæ, quæ passim nas-
citur, folia modicè antè decocta, cū anserino adipe,
aut

*Medulle.
Sena.
Adipes.*

*Gale. 14.
meth. med.
Anadendro
malache.*

- aut gallinaceo: vel si horum facultas non sit, fuillo
 contusa, ad hanc intentionem apprimè sunt idonea.
 Prohibet autem Auicennas axungias salitas: & præ
 dictis addit mastichen, ladanum, cespum humidã,
 5 srygmenta gymnasiolorum: quæ sordities balneorũ *Strygmẽta
gymnasio-
rum.*
 appellat, sterqus asininum, & feces oleorum de lilio *Oleum rici-
ninum.*
 de alchanna, quod cyprinum vocant, & de cherua, *14. meth.
medendi.*
 quod Græcis *κικινον*, Latinis verò ricinum dicitur.
 Cæterũ curatio quæ per acetũ administratur: utilis
 10 est huic vitio, hoc est, scirrho iam adulto, & cũ præ
 parata iam sub mollientibus pars fuerit: vt etiam
 Galenus annotauit. Siquidem (inquit) aceti vis,
 modo ea quis modicè & debito tempore vtatur, sa-
 lutaris eiusmodi affectibus est, seu crassos humores
 15 dissilecans ac resoluens. Sin vel immoderatus: vel in
 tempore non idoneo, tenuiores partes violenter ab-
 sumens, id quod reliquum est, lapidescere sinit. Sed
 & si quis eo diutius vtatur, substantiam ipsam ner-
 uorum delibauerit. Ob id igitur nec sæpe ac inter
 20 initia: nec longo tempore, medicamentis quæ ex ace-
 ro componuntur, ad ligamenta & tendones est vtẽ
 dum. Eam ob rem Gaienus Cercilij puerum, cui ex *Historia.
Libr. 2. ad
Glauc.*
 erysipelate nimis infrigidato, & vehemẽter adstre-
 cto, tumor durus: ac scirrhosus in toto femore relis-
 25 ctus fuerat: ita curabat. Imprimis femur perfudit
 oleo sabino, quod omnium est tenuissimum: cuius *Oleum sabi-
num.*
 loco hodie vtuntur oleo sambacino, quod vulgus
 iasminum vocat. Postquam verò partem sic fouis-
 set, ammoniacum thymiana, hoc est, suffimentum,
 30 quod pingue, & non vetustum esset, prædictis mes-
 dullis, & adipibus remixtum adhibuit. Post hæc
 ammoniaco pinguisimo, aceto acerrimo dissolu-
 to, circumleuit totum femur, iussitq; puerum al-
 tero crure salire, quo plus in id alimenti ferretur.
 35 Itaque relaxantibus, quæ molliorẽ tumorem red-
 debant, & digerentibus, seu resoluentibus ita vi-
 cissim, ac moderatè vtendo, puerum curauit. *Tendonum
& ligamen-
torum scir-
rhoform cu-*
 Verũ in tendonibus, & ligamenti scirrho

152 Institut. Chirurgicarum, Lib. I.

ratio ex Ga obductis, aceto ex Galeni consilio ad hunc modum
len. & Pau. vtendum est. Lapis igni candens aceto acerrimo ex/
Libr. 14. tingendus est: & si quidem haberi potest, pyrites:
Therap. & sin eius copia non est molaris, quem Græci mylitem
2. ad Glau. vocant. Deinde ascendente post infusum lapidi ace/
Pyrites la- tum vapore calido, in hoc pars affecta commoueri
pis. debet: vt vaporem ascendentem recipiat, à quo scir/
Lapis myli- rhus dissoluatur: atque exinde rursus medicamen
tes. quod emolliat imponendum. Oleo tamen non aqua
 quotidie ab initio omnino laborans particula per/
 fundenda est. Esto autem id oleum haudquaquam
 adstringens: sed planè tenuium partium, cuiusmodi
 fabinum est. Interdum autem incoquenda oleo est,
 althææ radix, ac sylvestris cucumeris, & si qua est
 eius generis alia. Sanè plurimi hac curationis ratio/
 ne paucò tempore perfectè sanati sunt, adeo vt mul/
2. ad Glau. tis ferè (inquit Galenus) magicum opus videretur.
 Ex his igitur constat, curationi quæ per mollientia
 fit tum in tendonibus, tum in ligamentis: cùm scir/
 rhosæ fuerint aliquid incidentium debere admisce/
Lib. 6. ri. Ex quorum numero vel imprimis acetum est. De
 medicamentis autem, quæ vim molliendi durities
 obtinent diffusius alibi tractabimus.

Capita curationis scirrhorum tumorum.

- 1 **S**cirrhum, qui resoluta, atque absumpta humidi
 tate, in tophaceam duritiem concreuit, sensuq;
 omnino caret, cuiusmodi est, quem exquisitum
 Galenus vocat tanquàm immedicabilem curare ne
 aggreditor.
- 2 Scirrho non exquisito (qui nō sine sensu quidem
 omnino est: sed ægrè admodum sentit) medicamen/
 ta, quæ tepido calore, ac mediocri humore prædita
 sunt hoc est: quæ emolliendo moderatè digerāt, ad/
 hibeto.
- 3 Vehementer digerentia, atq; immodicè exiccans
 tia partibus scirrho laborantibus, ne vnquā admo/
 ueto, iis enim subtilior humiditas resoluitur, quod
 verò

verò reliquū est, exiccatum lapidosumq; efficitur.

In duris ac densis partibus scirrhus obsecsis, cuius
modi sunt tendones, atq; aliis etiā in locis si affectus
iam inueteratus est: medicamenta quæ difficet, atq;
5 incidant, cuius generis est acetum, emollientibus, &
moderatè digerentibus miscero.

Scirrhomam quoque partem hanc, duram ac densam,
& quamlibet aliam diuturno scirrhus affectā,
super vaporem calidum quem molaris lapis, igni
10 candens acerrimo aceto perfusus emittit: collocari,
subindeq; versari iubeto.

Quotidie etiam oleo aliquo tenuium partium, in
quo cucumeris sylvestris, aut altheæ radix, aut anethum
viride, & recens: aut id genus aliud incoctum
15 fuerit affectam partem perfundito.

Eiusmodi de siccantia, incidentia ac crassos humores
resoluentia modicè, id est, non sæpe nec longo tempore,
atq; oportunè hoc est, non inter morbi initia,
& interposito remollientium vsu, prædictis scirrhus
20 sis partibus admoueto.

In summa scirrhus omnes: qui nondum callum
contraxerunt medicamentis: quæ commodè digerendo
emolliunt curato.

Scirrhusi lienis atq; etiam iecinoris curationem,
25 medicorum prudentiæ committito.

*De canceroso tumore, quem vulgò cancerum
apostematofum vocant.*

CAP. XV.



30 Ancris nomē medicis, & chirurgis æquiuocū est: eius enim significatio ad duo morborum genera extenditur: nempe ad cancerosum tumorem (quem vulgò cancerū apostematofum vocant) tam eundem, hoc est: in summa corporis parte hærentem
quàm absconditum: vt qui in penitioribus, & latentibus corporis partibus, est sede palato, aut sinu muliebri conditus; & ad cancerum vlceratum. Porro
35

Canceri nomen ad duos morborum genera extenditur. 1.) Cancer ex quo humore gignitur.

vterque affectus gignitur ex atra bile, hoc est, eius
 modi naturæ succo, cuiusmodi est fex in vino, &
 amurca in oleo: vt decimoquarto Therapeutices,
 & libello de tumoribus præter naturam, Galenus
 testatum reliquit. Vbi autem mitior fuerit succus
 huiusmodi latetrem, seu occultum cancrum, sine vi
 cere progignit. Si verò acrior maligniorq; contin
 gat, cutim erodit: & cancrum facit cum vlcere, de
 quo in sequentibus dicemus, quando scilicet de vl
 ceribus agemus. Hic autem solum sermonem fa
 ciemus de cancro in extimis partibus constituto: &
 nondum exulcerato: qui & ipse quandoque occul
 tus Galeno dicitur. Estigitur cancer quo de hic agi
 tur: tumor durus inæqualis, rotundus venosus, id
 est: venas habens in circuitu turgidas: & exaltatas,
 liuescens siue fuscus: & (vt Paulus ait) colore ma
 gis: quàm inflammationes, nigricans: calidus: sed
 nō adeo: vt inflammationes subito accrescens, ægros
 maximè fatigans: & perpetuo ferè dolore affligens,
 Græcè καρκίνος & καρκινώμα dicitur. Hanc autem ap
 pellationem huic morbo indiderunt tam Græci, quā
 Latini, à cancro aquatico animali: quoniam circa
 hunc implentur & intenduntur venæ, cancrorum
 pedibus, à glomere illo corporis descendantibus,
 persimiles. Nonnulli verò inde sic nuncuparunt,
 quod difficillimè ab his partibus, quas obsederit,
 euellatur, quemadmodum cācer aquaticus animās:
 Is enim loco: quem semel apprehenderit pertinaci
 ter hæret. Adde quod & hic tumor cancri animalis
 colorem repræsentat nempe subnigrum. Caterum
 prima cancri istiusmodi rudimenta, tam confusa
 interdum exiguaq; sunt: vt vulgus ipsum latere
 possint: vix enim dum adhuc incipit ciceris, aut fas
 bæ magnitudinem æquat. Quare nihil miri est (in
 quit Galenus) si vulgus tunc lateat, non secus pro
 fecto quā stirpes, quæ è terra iā exeunt: quando hæ
 quoque peritis tātum agricolis agnoscuntur. Post
 ea verò in tantam molem attollitur, tamq; vehes
 mentia

Cancer sine
 vlcere.
 Cācer cum
 vlcere.

Cancerosi
 tumoris de
 scriptio.

Quare can
 cri nomen
 hoc vitium
 sibi adopa
 rit.

Cancri no
 te p initia
 confuse et
 que obscu
 ra.

Lib. 14.
 Thera. me.

mentia, & magna, & cunctis euidentia adfert symptomata, vt ne puerum quidem clam sint. Itaque tunc nemo de appellatione ambigit, sed nominant vno assensu omnes eiusmodi affectum, cancerum: quoniam (vt diximus) venæ in hoc morbo ex vtraque parte intumescunt, distendunturq; ac figuram omnino similem cancro representant.

10 *Signa & iudicia canceri euidentis, & non vicerati.*

Cancrosum tumor (vt superius dictum est) duritiam habet, & inæqualitatem, quæ tactu facile deprehenditur. Colorem præter fert liuidum, siue fuscum, qui inter rubrum, & nigrum medius est, NOTAE
canceri euidentis non vicerati. Græci *πτεριδαν* vocant. Circa locum cancro affectum, quidam ictus quasi punctim illata sentiuntur: interdum etiam torpet Celso. Venas ostendit in circuitu tumentes, & exaltatas, canceri bronchiorum modo. Nonnunquam etiam in quibuidam delitescunt. Taciusque is locus, aliis dolorem adfert, in aliis eum non habet. Renixus quoque huic tumori valens est. Gale. 14. Therap. Adhæc, extraneam quandam caliditatem habet. IUDICIA Cancer, seu carcinoma à toto genere morbus est grauis, & perniciosus. Vix enim vnquam propter succi crassitiam confanescit, utpote quod nec repelli, nec discuti queat, nec totius corporis purgatione cessat. Sed & tanta eius vitij est malignitas, vt mitiora planè cōtemnat remedia, illisque (vt dici solet) mediū vnguē porrigat: vehementioribus verò, veluti crasso pro irritetur, excandescatque, atque efferetur. Id vitium in qualibet corporis parte oriri consuevit, sed maxime in partibus superioribus circa faciē, nares, aures, labra, & mammas foeminarum, atque earum præcipue, quæ à natura purgationem menstruorum non habent. Sed & viris plærunque accedunt canceri, quibus assuetæ per mariscas purgationes suppressæ sunt: per has enim turbidus, ac crassior sanguis (vnde prima vitium hoc rudimenta accipit) expurgari à natura consue

2
Celsus lib
quinto.
Gale. libr.
ad Glauc

3

156 Institut. Chirurgicarum, Lib. I.

- 4 consuevit. Porro cū humor ipse melancholicus fæ
ci vinariæ proportionē respondens, in particulam
aliquam defluit, ibiq; impactus manet: interdū va
rices facit, aliquandō verò cancrum, vtpote cū ipse
deferbuerit. Cū verò ad cutim vniuersam expel
litur, fit is morbus, quem elephantem nominant. Est
itaque cancer particularis quādam elephantiasis,
5 quam vulgus malē lepram appellat. Quāto au
tem sanguis ex quo ortum habet cancer, crassior fue
6 rit, ac nigrior, tantō deterior affectus erit. Cancer au
tem iam confirmatus (vt dicitur) atque inueteratus,
curationem non admittit, nisi radicitus extirpetur,
aut per sectionem scilicet, aut per vstionem: verū
qui in penitioribus corporis partibus cōstituti sunt
cancri, talem curationem non desyderant, vt sequen
15 te aphorismo nos edocuit senior ille, medicorum fa
cile princeps Hippocrates, inquiens: Cancros oculi
Apho. 38. lib. 6. 20
tos omnes melius est non curare: curati enim citius
pereunt: non curati verò, longius tempus perdurāt.
Experientia nanque (vt in commētario huius apho
rismi Galenus testatur) compertum est, omnes qui
huiusmodi cancros sectione, aut vstione curare ten
tarunt, illos magis irritasse, & breui homines inter
8 misisse. Soli itaque cancri illi curationem huiusmodi
admittunt, qui in summa corporis parte hærent, 25
qui exulcerati sunt, & adeò laborantes fatigant,
qui tolli debeāt, vt ipsi vltro chirurgi manum efflagitent: & simul
et qui non in talibus partibus consistant, quas refecare, & exu
Radices cancri. 30
rere vnā cum radicibus possis. Voco autem radices
cancri cum Galeno, eas, quæ plenæ sunt sanguine
melancholico, venas, & vndique versum ad loca cir
9 cūstantia extenduntur. Cæterū ex cancro non vl
cerato, non rarò fit vlceratus, putrescente scilicet spa
tio temporis humore, in vasis delitescēte, vel irri
Cancer exulceratus pessimus esse. 35
taro à medicamentis incōsultē admotis, affectu. Hūc
autem exulceratum cancrum pessimum esse, iudicāt
omnes, & veræ curationi (quæ omnia molitur, &
agit, vt laborās particula ad sanitatem perducatur)
prorsus

prorsus ineptum. Hic enim ad perfectam atque absolutam sui curationem, mordentia, aspera, ac vehementia desideraret medicamenta. Atqui (vt diximus) talibus magis irritatur, efferaturq; , tãtũ abs est, vt sub iis vel mitescat, vel consanescat. Proinde satis fuerit, si cancos nō vlceros, etiamnum summa corporis occupantes, præsertim maiores, & iam inueteratos, prohibeamus augeri, à perfectã quidem curatione manum subtrahentes. Quod & superiore aphorismo nos commonuit Hippocrates. Can- *Que note i*
 cros enim eos, qui sine exulceratione fatigant, etiam *cancro furu*
 (Galeno autore) occultos nominauit. In quibus sanè *11) r. exul-*
 exulcerationem minantur, vehemens caliditas, & *cerationem*
 pulsatio. *portendant.*

Curatio cancri non exulcerati adhuc incipientis, & nondum inueterati, summa corporis occupantiũ.

20 **C**uratio cancri: non exulcerati, & adhuc recens *Triplex cur-*
 tis, tres habet scopos præcipuos. Primus est, *1) rando can-*
 humoris melancholici generationem prohibe- *cro scopus*
 bere. Secundus est, succum melancholicum per to- *2) proponi-*
 tum corpus dispersum vacuare. Tertius, humo- *3) tur.*
 rem, qui locum affectum occupat, vel regerendum,
 25 vel digerendum omninò: adhæc, particulæ laboranti robur adferendum esse insinuat.

Primus scopus perficitur ea viuendi ratione ad *I*
 vnguem obseruata, quæ suprà in capite de scirro le- *Primus sco-*
 gitimo nominato præscripta est. Id autem inter cate- *pus.*
 ra maximè ac præcipuè obseruandum est, vt iis qui *Vicius ratio*
 hoc affectu laborant, ea alimenta offerantur, quæ res *tenuis sit,*
 30 frigerandi, atq; humectandi vim sortita sunt: quæq; *boniq; succi.*
 probum ac tenuem succum in corpus ingesta, generant. Cuiusmodi sunt, cremor hordei, pisces saxatiles, omnis generis aues, præterquàm palustres: ouo-
 35 rum, sed maximè sorbiliun (quæ Greci *σώριον* vocant) lutea, & quæ eius generis sunt alia. Quod si caliditas effatu digna, citra febrem tamen in particula laborante adfuerit, lac bubulum, à quo butyrum fuerit extracti

extractum, vel serum lactis tutò offerri potest. Sed & olera, quæ refrigerantis, atque humectantis naturæ sunt, veluti malua, atriplex, blitum, & quando tempus tulerit, cucurbita, item citrulli, & borago, illis in cibum permittuntur.

2. Secundus scopus qui est, totum corpus ab humore
Secundus sco- re melancholico, unde vitium hoc originem traxit,
pus. repurgare, completur purgantibus medicamentis va
Humoris cuandæ atræ bili accommodis, in capite de scirrho su
melancholici perius enumeratis. Inter quæ (quod ad rem præsentē
Vacuatio attinet) principatum obtinet epithymum (quod Ro
Euphymia. mani inuolucrum vocant) pōdo drachmarum quas
 tuor, in sero lactis mulsæve exhibitum, vt Galenus
 præcepit libro decimoquarto methodi medendi. Ea
Sensim ac autem quantitas epithymi, vel paulò maior, tertio
blande non quoque die offerendæ est, vt scilicet melancholicus
semel, atque humor, qui in venis collectus est, & cancro genera
affatim pur tionem dedit, sic sensim atque ex intervallo vacuez
gandum in tur. Quandoquidem vniuersum simul euacuare
cancro. vix datur. Sed nec semper prohibere possumus, ne
 deinceps eiusmodi succus in corpore generetur, &
 in venis colligatur. Itaque materiæ eiusmodi anteces
 dentis purgatio, sic per initia quidem simplicium
 aliquo, per vices molienda est. Deinde (si res ita ex
 postulet, & simplicium exhibitione parum profici
 tur) compositorum aliquo, cuiusmodi est Galeni
 medicamentum atræ bilis vacuandæ dicatum, quod
 ex duobus & triginta simplicibus est composi
 tum, vel hiera Ruffi, & Auicennæ, quæ nigrum
Hiera Ruf veratrum recipit. Nec ab iis quidem ita repetit
fi. tis purgationibus prius desistendum est, quam totus
Hiera Avi ille succus melancholicus in venis collectus eductus
cennæ. fuerit, & pars tumore huiusmodi cancroso obsessa
Sanguinis ad naturalem statum omninò sit reducta. Quod
missio. si nihil obstiterit, hoc est, si ætas, & vires permis
 serint, non inutile etiam fuerit in canceris ipsis sans
 guinem mittere, demum (vt dictum est) purgar
 re; & si fuerint mulieres menstrua euocare, sic
 quidem

quidem nondum quinquagesimum annum attigerint, vt libro secundo ad Glauconem Galenus nos admonuit. Hæc secunda indicatio omnium prima est Galeno, quæ verò primo loco posita est, secundum
 5 ordinem tibi iure vendicat. Communis nanque (in *Lib. 14. meth. med.*) indicatio curationis in cancro est, humorem, vnde vitium est natū, illico vacuare: mox verò prohibere, potissimum si fieri potest, ne de cætero eius modi succus melancholicus in venis colligatur. Sin
 10 id fieri nequit, saltem eum omnino ex interuallis vacuare, & simul particulam firmare, ne quid humorum redundantia ad eam confluat.

Tertia igitur indicatio (quæ omnibus eiusmodi affectibus ex fluxione creatis, communis est) nobis
 15 insinuat humorem, qui in particulam affectam procubuit, vel regerendum esse, vel digerendum omnis
 nõ: adhæc particulam firmandum esse, ne quid humorum redundantia, ad eam confluat.

Porrò repellendi quod influxit tempus accom
 20 modum erit, in principio quidem, tam in ipso purgationis tempore, quàm antè. Vbi verò iam totum corpus exquisitè purgaueris, tunc digerendi da
 bitur occasio. Verùm si mediocris tantum purgatio præcessit, mixtam habere facultatem quod ap
 25 plicabitur medicamentum conueniet, reprimentem scilicet, & digerentem. Sanè, vt has intentiones ritè assequaris, deligenda tibi erunt medicamenta, quæ viribus quidem sunt mediocria, qua
 litate verò minimè mordentia. Talia enim huius
 30 modi affectibus solū sunt idonea. Nam quæ imbecillas vires habent (vt Galenus ait) nullum operæpretium efficiunt, sed vincuntur. Quæ verò valentiores sunt facultate, vehementer quidem tenuiores, quæ in venis sunt, sanguinis partes, vel diges
 35 runt, vel retrudunt: crassas verò & melancholicas, quas faci prius assimilauimus, nec euocant, nec resprimunt: quin potius eas ad soluendum ac discutien
 dum contumaces reddunt. Ad sanandos igitur incipien

cipientes cancos, mediocrium virium medicamen-
 tis est opus, quæ scilicet nec propter imbecillitatem
 vincantur, nec propter effectus vehementiam, vas
 lenter sanguineum incrassare valeant. Ad hæc item
 (vt dictum est, quæ omninò haud mordeant. Quan-
 do quidem vitij malignitas ab iis quæ mordent, irris-
 tatur, ac (vt dici solet) efferatur. Caterum cum mates-
 ria ex qua ortū habent cancri, magna ex parte cras-
 sa sit, repulsiōni, ac etiam resolutioni cōtūmax (siue
 inobediens, multèq; malignitatis particeps, sat fecer-
 rimus (vbi saltem periculum ex chirurgia timueris
 mus, nec curari affectus aliter possit) si vsu præces-
 dentium medicamentorum, ex vsis elotisq; metal-
 licis (vt Galenus consulit) acceptorum, ipsos augeri
 prohibeamus, & præsertim si maiores fuerint, aut
 iuxta Auicennæ sententiam, eos ab vlceratione vni-
 dicemus. Ad quas intentiones libro secūdo ad Glau.
 succum solant, & medicamen ex pompholyge cons-
 stans, aut quod ex chalcite fit (diapalma vulgò ap-
 pellatur) magnoperè Gal. commēdauit. Proinde &
 Theodoricus ad eam rem vnguentum instituit dia-
 pompholygos nominatum, quod eidem recipit olei
 rosarum, ceræ albæ ana vncias quinque, succi gra-
 norum rubrorum, solani vncias quatuor, cerussæ lo-
 tæ, vncias duas, plumbi vsi, & loti, pompholygos
 (quæ tuthia vulgò dicitur) ana vnciam vnā, thus
 ris vnciæ semissem. Refert quoque Galenus libro
 primo de compositione pharmacorum secundum lo-
 cos, qui myamir veteri interpreti inscriptus est, vni-
 guentum quoddam ex Appollonio, ad manantia ca-
 pitis vlcera, quæ Græci achoras vocant, institutum:
 quod ad eiusmodi cancosos tumores adprimè vtile
 esse adfirmat. Recipit autem olei [vel rosacei, vel
 omphacini, id est iminaturi] heminam, quæ Græcis
 cotyle dicitur, quod in pilam plumbeam infusum
 tantisper [sub sole] cochleario etiam plumbeo agi-
 tari debet, aut pistillo plumbeo teri, donec crasse-
 nigrescatq; adeò, vt plumbi colorē referat. Deinde
 seor

Succus sola-
ni.

Diapompho-
lygos.

Diaphenici-
ne seu dia-
palma.

Vnguentum
Diapompho-
lygos Theo-
dorici.

Appollonij
medicamen-
tum.

Hemina ca-
pit vncias
7. & semis-
sem.

25 seorsum conterito, lichargyri libram vnam, cerusæ
 20 tantundem, & cum oleo commisceto, ac fiat vngue-
 rum. Porro quantum valeat facultas plūbi, præ-
 fertim cōbusti, & elori in omnibus cancrōsis dispo- *Plumbi vis*
 5 sitionibus, satis superq̃ nouerunt omnes, qui de hac *mirabilis in*
 re periculum aliquandō fecerunt, & qui attentē le- *cācrosis tu-*
 gerunt, quæ scribit Galenus de plumbo (quod mo- *moribus.*
 lybdos Græcè eidem dicitur) libro nono de simplis
 10 cium medicamentorum facultatibus. Ad eandem
 morbosam dispositionem laudarunt Paulus & Aui-
 cennas emplastrum ex cancris fluuiatilibus, præfers-
 tim si parem modum cadmiæ receperit. Cancro- *Paulus lib.*
 rum igitur fluuiatilium crematorum, & cadmiæ par- *4. ex Archi-*
 15 modus in pollinem coactus inspergitur, aut cancro- *gine.*
 rum cinis vna cum cerato inspergitur. Sed & idem
 Auicennas iubet minutos cancrōs, in quibus locis
 apprehendi possunt, radicitijs esse extirpandos, ex-
 cidēdosve: facta verò excisione, huiusmodi crassiorē
 20 sanguinē circūquaque exprimendū esse, deinde cau-
 terio locum esse adurendum. Hoc enim reliquias ma-
 teriæ dissipat, & absumit, membrū roborat, & hæ-
 morrhagiam prohibet. Galenus etiam ante Auicē-
 nam cancrōs interdum per chirurgiam extirpandos *Chirurgia*
 25 esse permisit, libro decimoquarto methodi medendi, *in cācros te-*
 ut de cancro vlcerato postea dicemus. Verū enimue- *merē nō ad-*
 rō, tametsi curationem hanc, quæ per chirurgiā fit, *hibenda.*
 Galenus & Auicennas permittunt: ad vitandum ta- *Aut cōsili-*
 30 men hæmorrhagiæ, & vlceratiōis, imò verò & vitæ *panij Et*
 ægrotantis periculum, ea omiſſa, curandi rationem *plētere*
 præscriptam, quæ solis leuibus, & quasi adblandien-
 tibus medicamentis fit, tanquam tutiorem, & mi-
 35 nus calumniæ expōsitam amplecti, atque ea sola con-
 tenti esse debemus. Quandoquidem, si eiusmodi tu-
 mor cancrōsus, qui iam in molem insignem creuit,
 qua sanis partibus coniungitur, totus circuncida-
 tur, statim immodicæ profusionis sanguinis, propter
 vasorum magnitudinem, maximeq̃ arteriarum pe-
 riculum imminet. Quas si laqueis (inquit Galenus)

Lib. 5.

intercipias, consortij iure alia partes afficientur, & ingenti dolore cruciabuntur. Adde, quod excisa carcinomata (vt Celsus ait) etiam post inductam cicatricem tamen reuenterunt, & causam mortis attulerunt. Sin eius mali radices exurere velis, neque hoc quidem sine graui factura vicinarum partium fiet, praesertim si iuxta principes partes exultio fiat. Itaque que cancri maiores, & qui iam inueterauerint, neque ferro temere adurendi sunt, neque scalpello excidendi, sed blandè potius, ac leuiter (vti diximus) tractandi. Plerique enim nullam vim adhibendo, quae tollere id malum tentent, sed imponendo tantum leuia medicamenta, quae quasi blandiantur, quod minus ad ultimam senectam perueniant, non prohibentur. Res liqua quae ad huius operis complementum, seu absolutionem de cancro tractationem attinent, ex tractatu de viceribus, capite de cancro vlcerato requirenda sunt.

Capita curationis cancri non vlcerati adhuc incipientis summa corporis occupantis.

1. **I**N cancro incipiente, & qui ex humore non admodum crassio constat, nec venas valde tumenteslexerit, humorem melancholicum, vnde hoc genus vitij nascitur, à toto corpore imprimis vacuato. Ergo, si aetas, & vires ferant, secta in cubito vena, sanguinem primum, quantum res ipsa efflagitat, mittito.
2. Deinde medicamenta bilem atram per aluum exi- gentia, initio quidem blanda, & mitiora postea verò vehementiora, paulatim vim eorum augendo, laboranti exhibeto.
3. Si mēstruæ purgationes in mulieribus antè quinquagesimū annum, aut menses tum in eis, tum in viris, ex interuallis sanguinem fundente suppressæ sint, illas modis omnibus prouocato.
4. Interim tenuem victus rationem, & quæ probum succum ac minimè melancholicū generet, insituito.

Si

De Tumorib. præter naturam. 163

Si prohibere non possis, quò minus succus crassus
& melancholicus, in venis colligatur, cum ex inter-
uallo, tum simplicibus, tum compositis medica-
mentis vacuato.

*Præcedentes aphorismi ad medicum spectant: qui verò
sequuntur, ad chirurgum pertinent.*

10 Remedia affectæ parti ante purgationem, & in
ipso purgationis tempore, repellentia: ubi verò cor-
pus integrè repurgatum est, digerentia: viribus me-
diocria, & qualitate minimè mordentia, adhibeto.

15 Ergo solani succum, vel medicamentum ex pom-
pholyge, aut quod ex calcite constat, diapalma vul-
gò appellatur, atque id genus alia dolenti loco ad-
moueto.

20 Quòd si per chirurgiam cancerum sanare audebis,
melancholico humore, prius medici consilio repur-
gato, quod vitiatum est, prorsus excindito, & sangui-
nem satis multum effluere finito, crassioresq; ex
vicinis partibus exprimito, atque affectum tandem
similiter reliquis vlceribus sanato.

25 **FINIS LIBRI PRIMI INSTI-
tutionum Chirurgicarum, De Tumoribus præter naturam, Ioan. Ta-
gautio Vimaco, Medi-
co, autore.**

GENERALIS

DIVISIO VVLNERVM,

*In librum secundum Chirurgi-
carum institutionum Io.*

Tagautij Medici.

V Nionis soluta nomina ac differentia Galeno libro
quarto metho. medendi sunt:

Trauma,
Helcos,
Catagma,
Spasma,
Apospasma,
Rhegma,
Thlasma,

id est

Solutio quaedam ex vulnerado in
carnosa parte relicta.

Vlcus etiam in carne.

Fractura, in osse.

Convulsio siue distensio in nervo.

Anusio in ligamento.

Ruptio in musculus.

Collisio, vel cotusio, in vasis pprie.

Soluunt etiam continuum.

Ecchymosis
siue ecchy-
moma.

Dicitur quasi inbumoratio, quae fit, cum san-
guis subter cutem effunditur, & coit: affectus
plurimum una cum cotusione ruptioneq; incidet.

Anastomosis;

id est, oris vasorum apertio.

Diapedesis,

Id est, transcolatio, subsultus, aut exilitio. Fit
tunica ipsa vasorum sanguinis rare facta,
aut gracilium vasorum ore adaperto, & san-
guine tenuato. Ad anastoma sui ferè reduci-
tur.

Anabrosis, seu
diabrosis.

Id est erosio: Venis aut arterijs intrinsecus ac-
cidit ex succo aliquo, cui mordens natura
insit.

Nihil refert si specie, vel
differentia
hic dixeris.

*Species solutionis, continui apud Auicennam, sen. 2. libri
primi, sunt;*

Excoriatio, & scarificatio, — In cute.

Vulnus sine plaga.

— In carne recēs & cruēta

Vlcus

- Vlcus*. ————— In carne cum pure.
Punctura. ————— In neruo.
Incifio. ————— In offe secundum latum.
Apertio. ————— In venis & arterijs.
Sciffura. ————— Secundum lógum in offe.
Contufio. ————— Numerofa còtinui folutio in offe.
Attritio. ————— In extremo mufculi.
Ruptura. ————— In panniculis, & diaphragmate.
Fractura. ————— In offibus.

Et quadam alijs.

VVLNERVM DIFFERENTIÆ.

Plagarum, seu cruentorum adhuc vulnorum, differentia Guidoni, & alijs noſtræ ætatis chirurgis, à tribus potiſſimum ſumuntur: Nempe.

1. A natura particularum, in quibus còſiſtunt.
2. Ab effentia ipſius ſolutionis còtinuitatis.
3. A proprijs differentijs ipſius ſolutionis vni-
tatis, ex vulnere excitata.

Vulnorum differentia, à natura particularum ſumpta.

Vulnus in parte ſimilari.

Vulnus in parte instrumentaria.

Vulnus in parte ſimilari.

Molli.

Dura.

Mediocris.

Vulnus in parte ſimilari molli.

Vulnus in carne.

Vulnus in pinguedine.

Vulnus in parte ſimilari dura.

Vulnus in offe.

Vulnus in iunctura.

*Vulnorum
differentia à
parte ſimila-
ri affecta.*

Vulnus in parte consimili mediocri.

Vulnus in nervo.

Vulnus in tendone.

Vulnus in ligamento.

Vulnus in arteria.

Vulnus in vena.

Vulnus in parte organica, seu instrumentaria.

Vulnus in parte principe.

Vulnus in parte principi serviente.

Vulnus in parte principinō subministrante.

*Vulnerum
differentia à
parte orga-
nica affecta*

Vulnus in parte principe.

Vulnus in corde.

Vulnus in cerebro.

Vulnus in iecinore.

Vulnus in parte, principi parti ministrante.

Vulnus in aspera arteria,

Vulnus in œsophago, siue gula.

Vulnus in vesica &c.

Vulnus in parte principi alicui membro non subserviente.

Vulnus in naso.

Vulnus in aure.

Vulnus in oculis.

Vulnus in manu.

Vulnus in pede, &c.

*2 Vulnerum differentia, sumpta ab essentia ipsius solutionis
continuitatis.*

Vulnus simplex,

*Id est, cum nullo alio affectu
(complicato).*

Vulnus compositum.

*Id est, cum alio quopiam
vno multisve affectibus
consistens.*

*Has ex se-
quētes dis-
ferētiās la-*

Vulnerum

Generalis diuifio Vulnerum.

167

- 3 *Vulnerum fimplicium differentia fumpta à propriis differentiis profe-*
rentiis ipfius folutionis vnioui, feu diuortij continui.

quemur, in-
 traclatu fe-
 quenti de
 vlceribus.

Vulnus magnum,

5 Vulnus paruum.

Vulnus breue,

Vulnus longum.

10 Vulnus latum,

Vulnus angultum.

Spatium quantitas, feu magni-
tudo diuifionis.

Vulnus in fuperficie,

Vulnus profundum.

15

Vulnus æquale,

Vulnus inæquale.

Vulnus rectum,

20 Vulnus obliquum,

Figura.

Vulnus retortum,

Vulnus vncum.

- 25 *Sunt & alia adhuc differentia vulnorum, fed extrinfece*
accedentes Galeno, fumpta

1 A generationis ratione.

2 A fitu, feu loco in eadem parte affecta.

- 30 1 *Differentia vulnorum, à generationis ratione.*

Vulnus diruptum.

Vulnus incifum,

Vulnus partim incifum, partim diruptum.

35 Punctio nerui.

Præcifio nerui.

Præcifio venæ.

Præcifio arteriæ.

168 Institut. Chirurgicarum, Lib. II.

2 *Vulnerum differentia à situ, seu loco in eadem parte affecta.*

Vulnus secundum longitudinem.

Vulnus secundum transversum.

Vulnus in principio musculi.

Vulnus in fine musculi.

Vulnus in medio musculi.

His accedunt & alia differentia, sed improprie dicta, à complexu vulneris.

1 Cum symptmate.

2 Cum morbo.

1 *Vulneris differentia à complexu cum symptmate.*

Vulnus crucians, seu dolorosum.

Vulnus dolore vacans.

Vulnus pruriens, id est, cum pruritu affligens.

Vulnus cum delirio.

Vulnus cum impotentia membri.

Vulnus cum syncope.

Vulnus cum sanguinis profusione.

2 *Vulneris differentia à complexu cum morbo.*

Vulnus cum intemperie,

Vulnus cum phlegmone,

Vulnus cum erysipellate.

Vulnus cum carne supercrescente, &c.

Reliqua ex divisione de Vlceribus sunt requirenda.

INSTITVTIO- NVM CHIRVRGI-

5 CARVM IOANNIS

TAGAVTII ME-

DICI,

LIBER SECVNDVS.

10

*In quo generatim de plagis, seu cruentis
vulneribus tractatur.*

35

*Quid vulnus, quæ sint species solutæ unitatis, quot
vulnerum differentia, & à quibus sumantur.*

CAPVT I.

20



25

Vlnus (vt recentiores definiunt *vulneris*
chirurgi) solutio est continuitatis *finis*.
recens, cruenta, sine pure seu pu-
trefactione, in particulis mollioris
bus extrinsecus incidens. Hanc
unionis, continuitatisue solutio-
nem non modo Auicenna inter-
pres, sed & omnes communiter plagā etiam appella-
lant. Caterum in hac definitione solutio continuita-
tis (quæ & unitatis diuortium, ac diuisio appella-
tur) generis locum sibi vendicat : quippe quæ com-
munis morbus sit tū simplicibus (quas & similes
vocamus) tum compositis, seu organicis particulis.

Primo tamen ac magis propriè simplicibus par-
ticulis conuenit, ac attribuitur, quàm compositis.
Reliqua quæ in diffinitione subnecuntur, differentiæ
rationem habent nempe, recens cruenta, sine pure
seu putrefactione, quæ omnia ad differentiam vlcer-
ris posita sunt: quod quidem iuxta recentiorum pla-
cita, iam antiqua est unitatis solutio cū putri quæ

*Diffini-
tis vul-
ris exam-
tio.
Genus.*

*C. alen. li.
de morb.
symp.*

*Auerr. 3. col.
Differe-*

dam humorum colliguit, seu putrefactione, & absq[ue]
sanguinis profusione. Postrema diffinitionis partu-
cula utpote, in partibus mollioribus incidens, adies-
cit est propter fracturas, quæ in duris partibus, cu-
iusmodi sunt ossa contingunt. Porro iuxta hanc ge-
neralem particularum corporis humani diffusiōem,
quidam chirurgiam binembrem fecerunt. Alia
enim est (inquiūt) quæ in carne, alia quæ in osse suas
operationes exercet. Carnis enim nomine muscu-
los nervos venas, & arterias etiam intelligunt. Quæ
omnia sub mollioribus & mediocribus particulis ali-
comprehenderunt. Diffinitionem extrinsecus, in fine
diffinitionis adiecimus, ad differentiam solutionis
unitatis, quæ fit à causa interna. Ceterum solutio-
nis continuitatis multæ sunt species, in secunda sen-
tentiæ canonis Avicennæ enumeratæ. Vulnus inquā
vltus, apertio, scissura, excisio, punctura, incisio, fra-
ctura, contusio, & id genus alia. Quorum descri-
ptiones & differentiæ suis locis addentur. Nomina
autem solutæ unitatis apud Galenum sunt, ταύρα, id
est, vltus quod in carne est: κατάγμα, id est, fractura,
in osse: σπάσμα, id est, contusio siue distentio, in
nervo, ἀποσπασμα, id est, avulsio, vel scissio, in li-
gamento: ῥήγμα, id est, ruptio, in musculis: ἐλάσμα,
id est, collisio: vel contusio in vasis propriæ. Soluūt
etiam continuum ἰσχυρῶς, siue ἰσχυράμα, id est, san-
guinis subtercutē effusio, & coitus plurimum vnā
cum contusione rptione, incidens, de qua latius
in sequentibus dicemus, ἀνὰ στόματι, id est, oris vasa-
rum apertio, quatenus facit ecchymosin, διαπύδνοσις,
id est, transcolatio subfultus, aut exilitio, quæ ad
anostomosin reducitur: ἀνέβρωσις, id est, erosio, quæ
& Διάβρωσις dicitur. Porro non adeo magna, atque
anxia cura ipsorum nominum habenda est, modo
res ipsa quæ de agitur intelligatur. Itaque sæpius
nomen vnum pro altero ponitur. Vulnus enim &
vltus apud eos, qui Græcorum libros in Latinum
sermonem conuerterunt, idem omnino significant
modo

*Solutæ uni-
tatis variæ
species apud
Avic.*

*Notæ solu-
tæ unitatis
Gale. Libr.
4. meth. me-
dendi.*

*ἐλάσμα,
ῥήγμα, κατά-
γμα, σπάσμα,
ἀνέβρωσις,
ἀνὰ στόματι,
ἀποσπασμα,
ἐλάσμα,*

*ἀνέβρωσις,
ἀνὰ στόματι,
ἀποσπασμα,
ἐλάσμα,*

*Vulnus &
vltus pro eo
dem.*

11

20

25

30

35

modoq; vnum, modò alterum pro re eadem vsurpatur. Apud eos verò, qui Arabica, Latina fecerūt, vulnus & vlcus aliquid inter se discriminis habent. Hi nanque vulnus vel plagam appellant, vbi nondum est pus: vlcus verò, vbi iam pus adest. Et sanè qui Græcos sequuti sunt, rectius quàm qui Arabes sunt imitati, cenauerunt. Vulnerum, siue vlcerum duæ sunt duntaxat primæ ac maximæ differentię Gale-
*Vulnerum
duæ diff. è-
tia prima.*
 no, in quarto libro Therapeutices. Omne namq; vl-
 cus siue vulnus, vel abiente causâ, quæ ipsum exci-
 tauit, consistit, vel efficientem ipsam causam secum
 annexam habet. Solutionis autem huiusmodi conti-
 nuitatis species, sed præsertim vulneris, potissimas
 ac præcipuas suas differentias à tribus Guidoni, ac il-
 lius ætatis chirurgis desumunt.

Primò à natura particularū, siue à locis affectis, in
 quibus consistunt. Quædam enim (vt libro tertio ar-
 tis paræ refert Galenus) fiunt in partibus consimis
 libus siue homiomeris: quædã verò in organicis, siue
 instrumentariis. Aliæ itè in mollibus particulis, aliæ
 in duris, alię verò in mediocribus, id est, in his que me-
 ter duras & molles ambigunt. Quæ in particulis
 mollibus contingunt, aliæ quidem sunt in carne, alię
 in adipe, siue pinguedine. Ex his verò, quæ in duris
 fiunt partibus, aliæ ossium substantiam occupant,
 aliæ iuncturas ipsas. Denique quæ in mediocribus
 particulis incidunt, quædam in nervis, tendonibus, &
 syndesimis, id est, nerueis ligamentis, siue copulis:
 quædã in venis, & arteriis consistunt. Quæ autem or-
 ganicas partes inuadunt, aliæ in principalibus mem-
 bris fiunt, vt in cordes, cerebro, & hepate: aliæ verò
 in his, quæ principibus ipsis particulis subministrāt,
 vt in aspera arteria, œsophago siue gula, & vesica:
 aliæ item in non subseruentibus ipsis principiis seu
 principalibus membris, vt in auriculis, pedibus, ma-
 nibus, oculis, naso, & id genus aliis. Differunt quoq;
 vulnera, siue plagæ, pro relorum ac rerum à quibus
 inferuntur varietate, vt in sequentibus dicitur.

Secundo.

2. Secundò sumuntur differentiæ solutionis cõti-
Ab essentia morbi. nuitatis, sed præsertim vulnerum, ab ipsius morbi
 essentia, vt Galenus docuit libro tertio methodi me-
 dendi. Quædam enim solutio vnitatis simplex est,
 quædam verò composita. Ac simplex quidem ap-
 pellatur, si nec morbus vllus nec symptoma simul
 adsit cum ipsa. Composita verò quando duos vel
 plures affectus secum adiunctos habet: vt à Galeno
 scriptum est, libro quarto Therapeutices: quod &
 in sequenti capite, ac rursus in tractatu de vlcerib- 10
 us dicitur. Scribit autem ad hunc modum Gale-
 nus loco nuper citato: Omne vlcus [siue: vulnus]
 aut solū est, ipsumq; per se nullo nec cum eo simul
 inuadente, nec ipsum præcedente: aut sequente alio
 affectu: aut cum alio quopiam vno multisue confu- 15
 sit. Quorum aliq non modò statim ab initio vlcus
 excitant, sed etiam nunc maius efficiunt: aliq eius
 sine quo non, vt ad curandi opus rationē obtinent.

3. Tertiò de sumuntur vulnerum differentiæ, à pro-
*Differentia sumpta à natura vul-
neris.* priis differentiis ipsius solutionis vnitatis ex vulne- 20
 re excitatæ. Cæterum propriæ eiusmodi solutionis
 vnitatis differentiæ sumuntur rursus ab ipsa vulne-
 ris natura, vt Galenus nobis indicauit libro tertio
 methodi medendi. Nempe à spacio seu quantitate
 diuisionis, vt à magnitudine & paruitate, æqualita- 25
 te & inæqualitate, profunditate, & superficie, bre-
 uitate, & longitudine. Item à figura, vt à rectitudi-
 ne, & obliquitate. Adhæc à generationis ratione: vt
 quia totum sit incisum, vel totum diruptum, vel
 pars incisa, pars dirupta. Et ab id genus aliis, quæ 30
 fusius in tractatu de vlceribus qui hunc proximè
 sequitur, explicabuntur. Porro ab huiusmodi dif-
 ferentiis, iudicia curandi indicationes auxilia quo-
 que, & modus curationis omnino desumuntur: vt
 ex sequentibus manifestum euadet. Itaque non satis 35
 est primas illas indicationes, quæ ex affectibus des-
 sumuntur nouisse. Hæc nanque principium tantum
 sunt, & (vt sic dicatur) carcer, vnde medendi ra-
 tio.

tio promouet. Nulla autem prorsus ipsius medicinæ ^{bo sumitur,}
 artis portio, aut certè nec magna, nec propria, aut ra ^{principiū tā}
 tione digna, sed quæ etiam plebeis sit communis, & ^{tum est me-}
 nota. Non ergo satis est nosse, quid ex prima indica ^{thoci, quæ}
 5 tione agendum sit, sed & particulares indicationes ^{de medendo}
 diligenter considerandæ sunt: cuiusq; scilicet parti ^{instituitur.}
 culæ substantiam æstimando, tum actionem, tum ^{Cognitio}
 vsum, situmq;. A quibus procedens, nō solūm quod ^{quæ habe-}
 sanari non potest, præuidebis: sed etiam quod reci ^{tur p ipsius}
 10 pere sanitatem potest, de inueniendis ei remediis fa ^{rei naturā}
 cilè deliberabis. Solus igitur is meritò morborum ^{quæ perpen-}
 est curator, cui facultas est illa remedia inueniendi, ex ^{dat.}
 20 quibus perfici possit, quod à prima indicatione sug ^{Morborū ve}
 geritur. Eritq; hoc ipsum primum artis opus, vt in ^{rus curator}
 30 telligas, sperarene id quod tendis debeas, an secus. ^{quis.}
 Eius autem rei duplex cognitio est, nec potest addi ^{Primiū artis}
 ratio tertia. Altera per experientiam, cui longo usu ^{opus esse, vt}
 est opus. Altera per ipsius rei naturam, quam ratio ^{cognoscas,}
 ne quadam, & methodo disquirimus, perpendendo ^{an sperari}
 40 scilicet non modò corporis vniuersi, sed etiam af ^{possit quod}
 flicte particulæ temperamentum, & reliqua quæ ^{desinas.}
 modò diximus. ^{Lib. 3. met. med. 2.}

De causis vulnerum.

C. A. P. I I.

25 **A**metū Galenus libro secūdo de mor ^{Solut. e conti}
 bis & sympt^amatibus, omnes solutæ v ^{nuitatis cau}
 nitatis (qui morbus est omnibus par ^{se vniuer-}
 30 tibus communis) causas summam ^{siles. 2.}
 in duas reuocat: (aut enim inquit, ex ^{trinsecus}
 oriuntur:) recentium tamen vulnerum, prout huius ^{modi,}
 modi, id est, quatenus recētes ac cruentæ plagæ sunt, ^{causæ}
 causæ censentur, quæcunque extrinsecus adueniens ^{tia}
 35 vulnerare, perforare, incidere, abrumpere, cons ^{tundere,}
 tondere, ac distendere possunt. Has autem vulnes ^{rum}
 40 rum causas speciatim expressit Halyabbas sermone ^{Haly.}
 45 quarto regalis dispositionis, dum ait: Vulnera fiunt,
 50 vel à corpore inanimato, vt ense, baculo, lapide, aut
 alio

*Externæ
causæ cura-
tionē nō in-
dicat, sed af-
fectum.*

*Rei præsen-
tis est cura-
tio nō absen-
tis.*

*3. met. fra-
cturā ab ini-
tū.*

alio quouis simili: aut ab animato, vt venenatoꝝ^{cc}
rum animalium punctura, aut ferarum morſu. Ex
quibus aliæ rursus ſumuntur vulnerum differenz
tiæ. Quandoquidem alia incisiones, alia contuſioꝝ
nes, alia verò morſuræ dicuntur. A quibus etiam
curandi indicationes nobis ſuggeruntur, per ac-
cidens tamen. Demonstratum nanque eſt à Ga-
leno libro quarto methodi medendi, nullam ex
ternarum, vel (vt nunc loquuntur) primitiuarum
cauſarum, curationis indicatricem eſſe, ſed huius
indicationem ab ipſo affectu initium habere. A nui-
lo enim, inquit, eorum quæ adhuc non perma-
nent, indicatio ſumi eius quod ex vſu ſit, poteſt.
Verum quoniam ad eum affectum noſcendum, qui
omniñò tum rationem, tum ſenſum lateat, ſæpe
cogimur de externa cauſa inquirere: opinatur vul-
gus hanc quoq; ſanationis rationem indicare: quod
planè ſecus eſt. Nam quod adhuc non eſt vt cau-
ſa externa) curationem non deſyderat. Quippe
rei præſentis tantum eſt curatio, vt eius quod fu-
turum eſt prouidentia. Quod ſi id, quod ampliùs
non eſt, curationem non poſtulet, neque ſanè ab
eo vlla ſumi poteſt curandi indicatio. Siquidem
abſurdum ſit (vt Galenus ait) aliud eſſe quod cu-
randi rationem præſcribat, aliud quod curetur, &
econtra. Nihil igitur ad curationis indicationem
conducit, externa cauſa cognita, ſicuti nec tem-
pus ipſum, ſed ad præſentis duntaxat affectus (qui
noſtram fugit notitiā) cognitionem. Quare di-
cere indicationem curationis ab externa cauſa, quæ
vulnus excitauit, deſumi, omni modo eſt abſur-
dum. Quod enim nec nunc lædit, nec læſurum ti-
metur, id ab vtroque artis munere, tum eo quod
curat, tum eo quod prouidet, exceſſit. Iraque (vt
breuiter dicam) vbi præſentis affectus nihil lateret,
nulla iam externæ cauſæ, ſicuti nec temporis, eſt
utilitas.



Notæ uulnerum non aliunde perendæ sunt, quàm ex iudicio sensus, sed usus & iudicia maximè. Iudicia uerò seu signa prognostica ipsorum, sicuti etiam & omnis resolutionis continuitatis, desumuntur ex substantia, uili, atque actione affectus cuiusque particulæ. Et præterea, ex propria ipsius dispositionis siue affectus essentia. Item ex symptomatis, quæ uulneribus ipsis accedunt, ut ex sequentibus patebit.

Itaque iudicat Gale, lib. 4. Therapeutices, quod magna & graua uulnera non mediocre adferunt periculum. Trifariam autem uulnera ipsa, ut & reliqua uulnera tria omnia uicia, graua magnaque redduntur. Nempe uel trifariam maiora propter afflictæ partis præstantiam siue præcellentiam, uel propter affectus magnitudinem, uel propter uia reddi.

propterea quod sunt cacoethe, id est, maligna, contumacia, ac rebellia. Hinc uulnera quæ in capite accepta sunt, aut intra thoracem, intra uel etiam peritonæum penetrauerunt, non paruum periculum aduehunt, potissimum si quid interiorum uulnerum sit.

Quinetiam cacoethe esse, quæcunque in articulis accepta uulnera sunt, id quoque (ut Galenus inquit) omnes fere sciunt: Empirici quidem ex sola ipsa experientia. Qui uerò corporis naturæ scientiam comparare studuerunt, ex ipsa uulneratarum partium natura. Vbi enim tendones, & nerui, & carne uas

cua, atque ossæ loca sunt, hic doloris, uigiliarum, conuulsionis, & delirii periculum instat. Ad hæc uulnera, quæ adeo magna sunt, ut futuris indigeant, aut si non his, certè deligatura, periculo non vacanti indigent, cuiusmodi sunt ea, quæ principales musculos per

transuersum penitus diuidunt, magnasque uenas, neruos, & arterias, atque etiam medullas ipsas discindunt, ac contundunt. Primum (nempe partis læe præstantiam) hoc aphorismo nobis expressit.

Hip

176 Institut. Chirurgicarum, Lib. II.

Hippocrates. Vesica discissa [id est] magno atque
 profundo vulnere diuisa; aut cerebro, aut corde, aut
 septo transuerso, aut aliquo ex tenuioribus intesti-
 nis, aut ventriculo, aut iecore, lethale est. Tertiū verò
 vtpote cacoëthiæ, mentionem fecit ille idē ἀρχιανδρῶς
 aliis in aphorismis: vbi tradit eos, quibus tumores
 in vlceribus apparent, non admodū conuelli, neq;
 insanire: verū in his de repente euanescentibus, quib-
 usdam conuulsiones, & distentiones fieri: quandō
 scilicet vulnera à tergo infestant: quibusdam verò
 insaniam, vel lateris dolorem acutum, vel suppura-
 tionem, cū scilicet in partibus anterioribus, quæ
 venosæ sunt, atque arteriosæ, vulnera contigerint:
 vel intestinorum difficultatem (quam sanguineam
 nominant) si tumores sunt rubicundi, id est, sanguis
 nei. Idem mox subiungit, quōd si in vlnneribus præ-
 ualidis, siue fortibus & prauis, tumor nō appareat,
 malum est ingens, hoc est, noxa est magna. Etenim
 in his suspicari licet materiam, quæ vlnneribus des-
 cumbere assolet, auerri, ac transmutari in sedem ali-
 quam principem. Vlnnera autem praua hīc appel-
 lari ab Hippocrate (vt Galenus ait in commentario)
 existimandum est, quæ sunt in capitibus, aut finibus
 musculorum, & maximè neruorum. Nam in capi-
 tibus musculorum, musculis nerui adnascuntur, ex
 finibus autem tendones oriuntur. Cæterū nomine
 periculi in præcedentibus, intelligitur mors, vel tot-
 tius corporis, vel particularis membri, quæ quidem
 vitæ est priuatio: aut (vt dicunt) maleficium, aut las-
 sæ partis impotentia perpetua, & inexpugnabilis,
 hoc est, priuatio sensus, ac motus, ac propriæ actio-
 nis ipsius: adeò, vt non ampliùs membrum aut par-
 ticula corporis propriè nuncupetur, sed denomina-
 tiuè (vt aiunt) & æquiuoce. veluti lapideus oculus,
 aut æreus: vt voluit Aristot. libro secundo de ani-
 ma, & quarto Metheo.

Utilitas ac Porro iudiciū huiusmodi vlnnerū cognitio, appri-
 necessitas. mè necessaria est cuiūque chirurgus, sed ei maximè,
 qui

De Plagis, seu cruentis uulnerib. 177

qui ex decreto magistratus, super acceptis uulnerib. *doctrina*
 bus in prohibito conflictu, ac illicita pugna, iudiciū *prognostica*
 rectum, ac æquum ferre compellitur. Itaque ante *uulnerum.*
 omnia scire debet chirurgus, quæ uulnera lethalia sint
 ac insanabilia: quæ difficilem curationem habeant,
 quæ promptiorem. Est enim prudentis hominis (ut
 rectè nos admonet Celsus) primum eum qui seruari
 non potest, nō attingere, nec subire speciem eius, ut *Lib. 5.*
 occisi, quem fors ipsius peremit. Deinde ubi grauis
 10 metus, sine certa tamen desperatione est, indicare ne-
 cessarij id est, familiaribus, & amicis periclitantis
 in difficili rē esse: ne si victa ars malo fuerit, vel igno-
 rasse, vel fefellisse, videatur. Sed ut hæc (inquit) pru-
 denti viro conueniunt: sic rursus histrionis est, par-
 15 uam rem attollere, quò plus præstitisse videatur.
 Cæterum (ut ad propositum reuertamur) scire opor-
 tet ex mente Galeni in commentario aphorismi pau-
 lō antè citati, vesica discissa, &c. uulnerum quædam
 esse valde, & ex necessitate lethalia: quædam verò
 20 non ex necessitate, sed magna ex parte talia esse: con-
 trā verò quædam omninò sanabilia, quædam ut plus-
 rimū.

Lethalia sunt ex necessitate, ac insanabilia, quæ *Vulnera ex*
 cordis substantiā penetrant. Hæc enim protinùs ho- *necessitate*
 minem è vita tollunt. Quādoquidem corde sic per- *lethalia.*
 25 cussio, totus sanguis, ita imperante natura, affatim *Cordis vul-*
 ad ipsum, veluti ad præcipuam vitæ arcem, confus- *nus cur le-*
 git, ac ex omnibus corporis partibus, ut læsæ parti *thale.*
 ferat suppetias, transmittitur: vnde maxima statim
 30 fit sanguinis profusio, quam & spirituum resolutio
 mox cōsequitur, vel in percussio viscere tumor præ-
 ter naturam, maximè autem phlegmone, excitatur:
 vel tanta fit sanguinis collectio, obstructioq; tam
 insignis, ut vitalis spiritus in corpus vniuersum, ut
 35 oportebat, amplius diffundi non possit. Quò fit
 ut venis & arteriis languescantibus, pallecente
 vultu, & frigido, maliq; odoris oborto sudore, ex-

178 Institut. Chirurgicarum, Lib. II.

2. primi. c. 5. tremisq; partibus frigidis apparentibus, matura mors sequatur. Cor enim neque solutionem contis nuidiu, neque (vt inquit Auicennas) apostema vita permanente perferre potest.

Cerebri vulnera. Sed & mortem etiam adferunt ineuitabilem magna, ac profunda vulnera substantiæ cerebri, iocinoris, diaphragmatis, stomachi seu œsophagi, ventriculi, asperæ arteriæ, pulmonis, lienis, cystis fellis: renum quoque, & tenuium intestinorum, præsertim eius quod ieiunum appellatur, atque in genus aliorum membrorum principalium, aut ipsis principalibus membris seruientium, ministerio quidem, ceu ad vitam necessario. Ideo autem vulnera eiusmodi lethalia ex necessitate dicuntur, quoniam nullus ex eis seruatur vnquam, mortemq; concinnant inexcusabilem, vt in sequentibus demonstrabitur. Seruari etiam non possunt Celso, quibus in spina, medulla percussa est, & quibus circa fauces grandes venę vel arteriæ præcisę sunt.

Vulnera magna ex parte lethalia. Vulnera verò ea non ex necessitate, sed secundum plurimum mortalia dicuntur, quæ ad regionem prædictarum partium perueniunt, vel eas leuiter, ac superficiali tenus duntaxat attingunt, non autem præaltè adiguntur, nec effatu digna sunt. Ad hæc quæ in capite musculorum accepta fuerunt. Ob id autem mortalia vt plurimum, at non ex necessitate dicuntur, quoniam vulneratis, nisi ritè tractentur, prorsus ex eis commoriendum sit. Si verò in nullo peccatum sit, illos interdum sanari contingit.

Guido.

Hinc Guido se quendam vidisse affirmat, qui in parte postica capitis vulnus acceperat, ex quo parua quædam portio substantiæ cerebri exierat (vt ex memoriæ læsione cognitum est) & tamen is à tali vulnere conualuit, restitutaq; est illi ex integro post curationem vulneris, memoria. Non tamen asserit illum superstitem permanere potuisse, si tota vna cellula, seu totus vnus ventriculus, per vulnus exiisset: vt de quodam

Cellario

De Plagis, seu cruentis uulnerib. 179

Cellario refert Theodoricus. Sed nec Galenus etiam Com. 18.
adfirmat, in illo adolescente, quem uulneratum uidit lib. 6. apho.

Smyrnæ in Ionia, uiuente adhuc præceptore suo Pe
lope, aliquid substantiæ cerebri ademptum fuisse,
sed duntaxat eum vulnus effatu dignum accepisse,

5 in altero anteriorum ventriculorum cerebri: quos
ob id geminos natura condidit, ut si alter ipsorum
læsus fuerit, reliquus adhuc subseruiat. Sed & hoc
tanquam admirabile, ac stupendum quoddam incre
dibileq; spectaculum, seu naturæ miraculum narrat

*Adolescens
ex vulnere
cerebri con
ualuit.*

10 idem Gale. libro octauo de usu partium corporis hu
mani: ipsumq; adolescentem tandem sanatum fuisse
se refert, Dei potius, ut credebatur voluntate, quam
arte. Quod si (inquit) ambo ventriculi simul

15 fuissent vulnerati, ne temporis quidem momentum,
is viuere potuisset. Vnde colligit ibidem gemitatis.

(ut sic dicam) quorundam organorum necessitas
tem. Cerebrum itaque insigniter, & ad ventriculos
vsque vulneratum sanari, rarissimum est, & pe
nè incredibile, ut in commentario aphorismi supe

20 rius citati, Galenus adseuerat: ubi verum esse scri
bit, quod magna vulnera, quæ consuevit Hippocra
tes nominare discissiones, & præcisiones, in præno

18. lib. 6.

minatis particulis mortem adferunt inuitabilem:
25 fateriq; omnes, quod vulnera, quæ vsq; ad aliquem
ventriculorum cerebri penetrant, procul dubio in
ternescant, mortemq; adferunt præproperam.

Porrò vulnera cerebri, & membranarum ipsum
obuoluentium (quas Græci *μηνιγγας* vocant) ideo

*Vulnera ce
rebri cur le
thalia.*

30 lethalia sunt, quoniam ad læsionem ipsius cere
bri, & membranarum ipsum continentium, ses
quitur læsio, & interdum abolitio actionis mus
sculorum thoracis, & aliorum membrorum res
pirationi subseruientium. Horum autem actio

35 ne deperdita, perire simul respirationem ne
cesse est. Vnde cordis quoque temperamen
tum soluitur. Quo fit tandem, ut etiam

180 Institut. Chirurgicarum, Lib. II.

animalis ipsius necessariò sequatur interitus, ut li-
bro quinto de locis affectis scribit Galenus. Cere-
bro igitur læso insigniter, aut meningibus ipsum
continentibus discisis, homini, atque omni animati
prorsus commoriendum est.

*Hepatis vul-
nera.*

Guido à Cauliaco asserit hepatis vulnera, etiam
circa fibras ipsius, non admodum tamen profunda,
nec cū ablacione alicuius portionis substantiæ ipsius,
glutinari, & prorsus sanari. Quia in re Galenum ses-
quutus est, qui in commentario decimo octauo lib. 13
sexti aphorisi. haud quaquā veritati cōsentanea eos
dixisse refert, qui non solum vulnera, quæ in summa
iecinoris parte consistunt, sanari posse adfirmabant,
sed & profunda quoque in fibris eius facta, imò &
fibras ipsas abscillas. Causa autem ob quam vulne- 15
ra iecinoris magna ex parte lethalia sunt, est, quia
propter defectum nutritionis cor languet, ac emoris-
tur, atque ita tandem deperit animans, sed nō illicò.
Quandoquidem ob virium hepatis imbecillitatem,
sine alimento permanens, diutius etiam sufficere po- 20
test: ut Galenus est autor libro quinto de locis affe-
ctis, sic inquit. Vbi iecur affectum est, tum ob ine-
diam moriuntur animalia: veram per longa tempo-
rum spacia, in huiusmodi affectibus vitam protelare
possunt. Sed de intemperie & morbis in cōpositio- 25
ne hoc loco potius agit Galenus, quàm de vulnere.
Si autem vulnera hepatis magna, ac profunda sint,
venaq; porta dicta iecinoris cauo commissa, vel con-
caua ab ipsius gibbo prodiens, dissecta fuerit, larga
sanguinis profusione moriuntur, qui ita sunt vulne- 30
rati, priusquàm vulnera agglutinentur.

*Vulnera dia-
phragma-
tis quando
insanabilia
Nervosa
substantia,*

Vulnera quoque diaphragmatis, prorsus incur-
abilia sunt, maximè si in parte eius nervosa fiant. Hac
enim parte exangue est: adhuc, in continuo est motu, 35
Quæ duo sanè prohibent, ne labra vulneris agglu-
tinentur. Nervosa nāque corpora semel diuisa, nūquā
coāunt, ea præsertim, quæ in perpetuo sunt motu,
cuius

cuiusmodi est septū trāsuerſum. Quippe tametſi di- *et motus*
ci ſolet, quòd vulnera quæ ſananda ſunt, vtiq; quies *agglutina-*
tem requirunt, non ſolus tamē motus diaphragma- *tionem im-*
tis, etiam ſi perpetuus, vulneris agglutinationem *pediunt.*
impedit, ſed & neruoia quoque cum ipſo ſubſtan- *Lib. 5. meth.*
tia. Quòd abundē teſtatur Gale. his verbis: Tranſ- *med.*

uerſi ſepti vulnera, in carnoſis quidē partibus ſub-
inde coaleſcere ſunt viſa eius motu nō obſtāte. Quæ
verò in neruoſis eius hærent, inſanabilia ſunt. Sanē
difficilis grauiſq; curatio eſt etiā eorum, quæ in car-
noſis ſunt partibus, ſi has iam phlegmone occupas-
uit. Accidit autem hæc curandi difficultas ob eam
rem, quòd in ea vulnera ſanies deſluat, quæ impedi-
mento eſt, ne labra ſolutæ vnitaris coaleſcant.

Vulnera autem, quæ pulmonibus incidunt, ideo *Pulmonis*
curatu ſunt difficillima, imo magna ex parte iniana- *vulnera.*
bilia: quoniam promptiſſimē phlegmonem exci-
tant, quæ ſi ſemel occupauerit, exigua (inquit Gas-
lenus) vulneris glutinandi ſpes eſt. Adde quòd ea
quæ ſanandis vlceribus idonea ſunt medicamenta,
contingere illa integris ſaltem viribus non poſſunt.
Accedit præterea & illis ſanandi difficultas, quod
reſpirando mouentur, & ruſſiendo lacerantur.

Cæterū vulnera trachææ, id eſt, aſperæ ar- *Trachææ*
teriæ effatu digna, & maximē quæ cartilagineam *arteriæ vul-*
eiſdem ſubſtantiam occupant, rarò etiam ad ſa- *nera.*
nitatem perducuntur. Particulam enim hæc du-
ra eſt; & exanguis, aſiduaq; per vulnuſ fit reſpi-
ratio, quæ ſanē impedimento eſt, quominus la-
bra coaleſcant.

Magna quoque œſophagi vulnera, inter exitia- *Œſophagi*
lia atque inſanabilia numerari ſolent, tum ob cibi *vulnera.*
ac potus per eum tranſitum, qui ſanē agglutinationem
prohibet: tum quod eiſmodi vulnera dūtaxat
(vt Galenus ait) cōtactu medicamentorū in tranſitu
fruuntur, ſicuti & quæ in ore, ſeu oriſicio ventriculi
conſiſtunt. Verū his quæ ori ipſius vetriculi inſi-
dent, ſenſus quoque acumen ſanationi obſtat.

Li. 6. meth.

182 Institut. Chirurgicarum, Lib. II.

*Venarū in-
gularium
vulnera.* Iugulares venæ (quas & organicas vocant) grādi
vulnere percussæ, ægrè & rarò curationi cedūt: tum
quòd larga sanguinis profusione, hominem vitali
ipiritu exhauriant: tum quòd ligaturam stringendo
ac sistendo, sanguini necessarias, propter imminens
suffocationis periculum, sustinere non possint. 5

*Ventriculi
vulnera.* Ventriculi discissiones, & tenuium quoque inte-
stinorum, sed omnium maximè ieiuni, matricis, renū
vesicæ, & folliculi fellis, modo quo suprā diximus,
ieiuni. ob id lethales sunt, quòd hæ omnes particulæ nervos
Matricis. sæ sint & exāgues, per easq; vitiosarū ac superuacas
Renum. nearum humiditatum transitus fiat. Adde quòd earū
Vesicæ. vsus perpetuò vitæ conseruandæ est necessarius, nes-
Cystis fellis. dūm utilis. Adhæc, medicamenta his locis penis-
rioribus non possunt commodè adioueri. 15

Porro per verbum discissiones, magna (vti supe-
rius diximus) ac profunda vulnera intelligimus, &
ad finem vsque interiorē longè lateq; penetrans-
tia, qualia esse cernuntur in iis, quæ penitus sunt ex-
cisa. Hac autem dictione ex industria vsi sumus, ne
quis putet vulnus quodcūque in prænominatis pars-
ribus exitiale esse atque insanabile. Ventriculus
Gale. comm. nanq; & tenuiora intestina, quia non parū partis
18. lib. 6. cipant carnosæ substantiæ, si in summa parte duntaxat
apheris. vulnerata sint, sæpenuerò agglutinantur, &
velut collato fœdere in robur substantiæ corpulentę
concordi concrezione coalescunt. Sic & vesicæ cer-
uicem siue collum quotidie sanari videmus, cum ex
ea lapis extrahitur, quoniam ex parte carnosā est.
Idem & de aliis partibus iure credi potest, si per
summa corporis seu substantiæ earum vulnus duntaxat
acceperint. 25

*Ieiuni vul-
nus cur in-
sanabile.* Verumenimuerò ieiunum intestinum vulnes-
ratur omnium maximè inter tenuia incurabile
Lib. 6. the. esse omninò à Galeno, & Paulo prædicatur, tum
Lib. sexto propter vaforum, quæ in eo sunt, magnitudinē mul-
titudinēq; : tum quòd tunica prætenuis, nervos
cap. 42. sacq; existat. Adde quòd & bilem synceram hoc
intesti

De Plagis, seu cruentis uulnerib. 183

intestinum ex cholag^a gis poris recipit vniuersam, *Gal. lib. 5. de usu par.*
& omnium maximè iecori vicinum habetur.

Lienis vulnera, cùm munus habeat tori corpori *Lienis vul-*
apprimè vtile, ac propè necessarium, sitq; (vt non *nera.*
nulli dixerunt) veluti alterum hepar, periculosa
sunt, non adeo tamen: vt aliarum modò dictarum
particularum.

Hi quoque in præcipiti sunt, in quibus vsque ad *Vulnera pe-*
cauitatem membrorum intus conditorum vulne- *netrantia.*

10 ra perueniunt. Hæc enim vt plurimū lethalia sunt,
tum quia aër externus, & nos ambiens, per ea non
alteratus ingrediens, internas partes non parum of-
fendit: tum quia per eadem internus exhalat spiri-
tus, quo sic expirante & euanescente, virtutis ros-
25 bur insigniter offenditur, & dissoluitur, multoq; im-
becillius redditur. Accedit huc, quòd huiusmodi
vulnera haud commodè detergeri possunt: quodq;
ea tandem degenerant in fistulas: & empyemata,
id est, purulentas collectiones excitant: vnde &
30 mors ipsi vulneratis demum accidit. Signa autem,
quibus prædictarum partium internarum vulnera
deprehendi possint, tædiosæ prolixitatis vitandæ
gratiâ, in hac vulnere vniuersali methodo, con-
sulto prætermisimus.

35 Cæterum vulnera, & punctura, quæ in capite *Vulnera in*
musculorum fiunt, vbi nerui, tendones, & liga- *capite mus-*
menta ferè carne nudantur: item quæ tribus digi- *culorum.*
tis à iunctura distant, & quæ prope tempora acces-
pta sunt, magna ex parte lethalia existunt. Ner-
9 ui verò, & tendonis punctura, propter sensus ve- *Nerui &*
hementiam, & quoniam hæc pars principio, id est, *tendonis pun-*
cerebro continuatur, prompta est ad nervorum *ctura.*
conuulsionem excitandam: ac tum præsertim, cùm
nihil extrorsum expirat, obcæcato cutis vulnere:
38 vt Galenus annotauit in opusculo cui titulum fe-
cit *μικροτόμια*. Proinde huiusmodi punctio mortem
accercit. Noxa enim quæ cerebro illata est, statim
communicatur organis respirationi seruientibus,

Spasmus ex ut iam supra dictum est. Quocirca quinto libro
vulnere le- aphorismorum scripsit Hippocrates, Conuulsio
thalis. i. val ex vulnere lethalis est. Non quidem (vt Galenus
de periculo- ait in comment.) ex necessitate, sed admodum cre-
sus. bro: lethalis enim nomine hîc, vt & in plerisque

Spasmi ex aliis aphorismis, vsus est Hippocrates pro periculo-
vulnere cau- sa, & ad mortem sæpius perducente. Fiunt autem
sa. ex vulneribus conuulsiones, siue spasmi, ratione
 subsequæntis ea inflammationis, vbi nervosas par-
 tes attigerit. Et primùm quidem videntur conuelli
 quæ è directo sunt partium inflammatione laboran-
 tium; deinde sic postquam & principium attigerit
 passio, ad totum extenditur corpus.

Vulnera me- Membra autem particularia ex accepto vulnere
brorum par- iudicantur emortua, quando principes ac maiores
ticularium venæ, arteriæ quoque & ossa, à quibus vitam, nu-
quædo ipsis tricationem, & fulcimentum accipiebant, penitus
mortalia. excisa sunt & destructa: incipiuntq; liuescere aut
 nigrescere, mortis habitum induere, ac cadaveris for-
 mam repræsentare, non secus quàm in gangræna
 & sphacelo, vt videre est in excisione brachiorum
 & tibiærum.

Vulnera Iudicantur itidem membra ad vsum à natura in-
quando me- stitutum fore inepta, & perpetuò impotentia, quan-
bris in potē- do nerui, tendones, & ligamēta (quos Græci iyn-
tiam adfe- desmos vocant) penitus sunt abscissa & destructa:
runt. suamq; protinus actionem perdunt, ac resiccari, &
 tabescere incipiunt.

Vulnera tu- Vulnera ea omnium tutissima sunt, & omnino
tiozem cu- (vt dicunt) sanabilia, quæ in enchymis, id est, bo-
rationē ha- ni succi corporibus, & in locis carnosiss accepta
benia. sunt, vbi & nerui pauci, & venæ, & arteriæ non
 multæ reperiuntur. Adhæc quæ diuisionis magni-
 tudinem non habent, hoc est, longitudinem, lati-
 tudinem aut profunditatem non multam. Periculū
 enim facit vulnus, quodcunque magnum est. Ratio
 autem ob quam hæc vulnera tutiorem habent cura-
 tionē, omniumq; minimè formidanda sunt est, quos
 nam

niam ea nec febris, nec praua aliqua symptomata sequi cōsueuerunt, modò saltem rectè, & vt res expositulat, tractentur. Quocirca rectè ac prudenter feceris, si in tuis renunciationibus, seu (vt dicunt) depositionibus hoc præfatus fueris, atque etiam addideris: dummodo nihil aliud superuenerit, quod nec impræsentiarum apparet, nec in talibus accideri solet.

*quod facies
in depositionibus
ne culpabis*

Vulnera autem, quæ vt plurimum sanabilia dicuntur, mediàmq; inter duo dicta extrema (nempe omnino sanabilia, & ex necessitate lethalia) naturam sortiuntur, ea sunt, quæ in capite musculorum carnosorū longè à iuncturis & temporibus: itè quæ in caluaria, quæ Græci *κρανίου* nominant, thorace & ventre incidunt. Hæc enim si ritè, atque ex arte tractentur, adhibeaturq; diligens cura, & laboras obedientem se præstiterit, in nullo propriè indulgens voluptati, exterioraq; omnia ritè adsint appa-
rationem indubiè recipere possunt. Si verò in iis peccatum sit, eorum curationem intercipi cōtingit, hominemq; tandem ad interitum deduci. Proinde cum de illis ferre iudicium volueris, huius rei mentionem (vt nomini tuo consulas) te facere oportet.

*Vulnera vt
plurimū sanabilia.*

Cæterum si coactus fueris à magistratu, super aliquo vulnere sententiam ferre, eiusq; euentum, quæsum ars permittit, prædicere, imprimis annorandū tibi est, in schedis tuo chirographo obsignandis, quod ex mandato ipsius magistratus, vulneratum inuiseris, & vulnus seu vulnera omnia, si plura fuerint, diligenter & accuratè inspexeris. Deinde vulnus aut vulnera nomine expresso ac proprio, vnà cum affecto loco exprimere debes. Postremò tuæ censuræ causam: ac iudicij per te lati, rationem te subiicere oportet. At verò interim te admonitum velim, ne iudiciū tuum in hac re præcipites, sed maturè prudenter, ac circūspectè omnia definias. Quamdoquidem (vt ait ille) omne in præcipiti vitiū stetit. Et vt à seniore illo Hippocrate bonarum artium pris

Formula ferendi iudicii de vulneratis ex scripto.

Aphe. 1.

mario autore scriptū est, iudicium est difficile. Itaque
 tametsi terminus ultimus vulnerū sit quadragesi-
 mus dies: primus verò intra septem dies consistat,
 & medius iuxta formam & naturam acutorū mor-
 borum, ad decimum quartum protendatur, in sus-
 spectis nihilominus ac dubiis vulneribus, expectan-
 dus est dies septimus, priusquam aliquid de illis des-
 cernas, aut iudices. Solent enim ut plurimum intra
 id tempus apparere accidentia, tum bona tum mala
 quæ post accepta talia vulnera superuenire consue-
 uerunt: febris inquam syncope, mentis alienatio,
 ac perturbatio, spasmus, & id genus alia. Sed & in-
 terim diligenter considerandæ sunt virtutum actio-
 nes, ex pulsu lorio, vomitionibus: & aliis id genus,
 quæ foras excernuntur. Cōtemplari etiam oportet
 laborantis appetentiam tollerantiam: vultū siue fa-
 ciem, & consimilia. Ex iis itaque, & consimilibus
 præsagiis, quæ ab Hippocrate & Galeno memo-
 riæ prodita sunt, diligenter perpensis & examina-
 tis, robur virtutis, morbi magnitudini conferes.
 Deinde tacitus apud te omnia recolliges: ut præsa-
 gire possis: ac iudicium ferre, num moriturus sit
 æger ex accepto vulnere: an tandem conualiturus.
 Qua in re cautè ac prudenter te geres. Nec est quod
 dicas, si non fuisset vulneratus nunquam interiis-
 set, quantumuis in victus ratione peccasset. Sed nec
 satis fuerit, si dixeris: vulneratum mortem nun-
 quam oppetisse, si sibi consulisset: ac omnia effe-
 cisset secundum rationem: scriptumque esse ab Hip-
 pocrate, quod non solum medicum prestare se opor-
 tet oportuna facientem: sed & ægrum, & assiden-
 tes, &c. Quandoquidem non solum famæ tuæ con-
 sulere, & te ab obloquentium calumnia vindicare
 debes: sed nihil etiam vel dicere coram magistratu,
 vel scripto annotare: aut renunciare quod cedat in
 damnum vel detrimentum laborantis, & consanguis-
 neorum: aut liberorum eius, culpam omnem sic in
 eum reiciendo. Eorum namque quæ fortuito con-
 tingunt

- tingunt, tamen si nulla sit ars præseruatrix: est tamen ars aliqua curatrix. Siquidem ut variis periculis nostra corpora exposita sunt, ita & modis plurimis: ubi in ea inciderint, seruari possunt. Itaque, ut scribit Auicennas libro quarto de extractione sagittarum, licet vulnera quædam suâ naturâ lethalia sint, non tamen ob id relinquendus est vulneratus absque auxiliis: quin omnia aggredi ac tentare debet chirurgus, quæ ex arte, & secundum rationem fieri possunt, dummodo saltem ab assidētibus amicis, & consanguineis ipsius ægrotantis obnixè rogatus fuerit, ac de futuro rei exitu coram eis antequam vulneratum attingat præsaguerit, ut se ab indoctorum & oblocutuleiorum calūnia & maledicentiâ vindicet.
- Plurimæ enim præter spem medicorum modo quodam mirabili, ac stupendo, mortem interdum euadunt, ac sanitati restituuntur. Igitur cum sæpe etiam præter expectationem quædam eueniant, curatio aggredienda est. Quod si vulneratum ipsum omni auxilio destitutum relinqueremus, & inde mors sequeretur, impij, ac inhumani merito & diceremur, & habereimur. Sed iis omisissis, reliqua vulnerum iudicia persequamur.

Auicennas,

*Vulnerati
nō sunt re-
linquēdi si-
ne auxilio.*

*Plurima in
morbis præ-
ter expecta-
tionem con-
tingunt.*

*Vnio in par-
tibus orga-
nicis semel
diuisa est
impossibilis.*

- Igitur præter hæc te nosse oportet, quod vnio in partibus instrumentariis, semel continui diuortium perpessus, est impossibilis: ut Galenus adserit libro artis medicinalis cap. nonagesimo. Cuius assertionis ratio est: quia abscissis omnino poris, seu meatibus, venis inquam nervis, & arteriis, per quos veluti per canales quosdā, alimentū sensus, & vita, in ipsum mēbrum organicū diffundebatur, promptissimè expirat, exhalantque, tum spiritus, tum virtutes, ob substantiæ scilicet quā habet tenuitatem: (quod non contingit in animalibus iis quæ imperfecta vocantur, atque etiam in plantis ipsis) non autem propter impotentiam, aut repugnantiam medicamentorum: ut rectè asseuerat Haly, in commentario loci nuper ex Galeno citati. Adhuc vnio in parte carnosa

carnosa possibilis est, etiam iuxta primam intentionem, ut dicunt. In osse verò ex secunda duntaxat intentione. Vocatur autem hîc prima intentio, quando partes diuisæ, atque inuicem distantes, rursus vniuntur, & coalescunt, ut prius vnitæ erant, id est absque medio aliquo heterogeneo, sed ratione quadam ac beneficio nutrimenti, facta scilicet modica quadam conuersione ipsius alimonij in carnem omninò vni formem, & consimilem priori. Secunda verò intentio hîc intelligitur, quando ea quæ diuisa sunt, & vniionis diuortium perpeffa, alia quapiam interueniente substantia, seu glutino quodam alligantur, atque inuicem coniunguntur. Porro huiusmodi medium, cuius interuentu partes ossis fracti, seu diuisi adalligantur, adglutinanturve, Latine callus, Græcè *καλlos* verò *παρος* sarcoides nominatur. Qui quidē ex fuce paulò crassiore fit, quàm is ex quo os concrefcit. Causa autem propter quam fractū os nequeat coalescere, prima saltem intentione, est ipsius ossis durities: cum mollium tantum corporū (ut Galenus ait) in vnum coeundi sitabilitas: ut tum in externis videre licet, nullo nec lapide cum lapide, nec testa cum testa coeunte: tum verò in nobis ipsis. Altera causa est, imbecillitas facultatis alteratricis, quæ alrix nuncupatur (ossa enim particulæ sunt ex ægues ac frigidæ) non autem inopia materiæ seminalis, seu spermaticæ, ut quidam putauerunt. Ossa nanque præfens semper habent alimentum spermaticum, quod quidem alterant, & in suam conuertunt substantiam, ac sibi assimilant. Nerui autem, venæ, & arteriæ, inquit Auicennas, Galeni autoritate fretus in quinto Therapeutices, mediam fortiuntur naturam inter carnē & ossa. Neque enim tam facillē coeunt ut caro, neque tam difficillē conglutinantur ut ossa. Si quidem eorū natura mediocritatem obtinet inter molliem & duritiem. Proinde de vnienda eorum sectione, vtrique desperandum non est, vbi tum ipsa sit parua, tum hominis corpus natura molle: si verò sectio magna fuerit,

Callus.

Parus sarcoides.

Quare os fractum non coalescat.

Nerui, venæ & arteriæ interdū diuisæ coeunt.

fuerit, & in duro corpore, nulla prorsus eius glutinandi spes est. Vnde Galenus loco nuper citato ad hunc modum ait: Videtur autem experientia quoque ipsa rationi subscribere, Cum & in pueris & in mulieribus, propter corporum humiditatem, & mollietatem, eam [arteriam intelligit] viderim glutinari, & in vno iuvene agresti, cui exiguum erat incisa. Qui autem eam inciderat, inquit ille, medicus admodum iuuenis erat, & operum artis parum peritus, venamque se incidisse putabat. Cum enim brachium hominis, venam incisurus, deligasset, contigit attolli veluti in gibbum arteriam, atque ita hanc pro vena diuisit. Hanc autem incisionem Galenus curiosè coniunxit, conglutinauit, & persanauit. Verum brevis sanè (ut dictum est) incisio erat. Quod si utique magna, atque effatu digna fuisset, nulla certè ratione persanari potuisset. Quod Hippocratis testimonio confirmatur sexto aphorismorum sic inquentis: Cum discissum fuerit os, aut cartilago, vel neruus, aut genæ particula tenuis, vel præputium, neque augetur, neque coalescit: hoc est, neque talis aliqua regignitur substantia, qualis abscissa est, neque vnquam discissi corporis labra agglutinantur. In hoc autem aphorismo, vox discissum, diuisionis magnitudinem significat. Discissa namque (ut Galenus ait in comment.) diuisionem habent vsque ad finem peruenientem. Cæterum nihil aduersus prædicta pugnat obiectio, quæ de ossibus puerorum adferri posset, quod scilicet coalescere possunt, ut libro artis medicinalis Gale. adserit: quia mollietatem habent, & virtutis robur, ob propinquitatem suæ natiuitatis. Sed nec prius asserta infirmat, quod de dentibus obici solet, quod scilicet renascantur, non solum in pueritia, sed etiam in aliis ætatibus. Quoniam non generantur, inquit Albertus ex materia ordinata, sed ex superfluitate, non quidem à virtute prima conformatrice, sed nutritoria inducente actum generatiuæ. Postremò iudicat Hippocrates sexto libro aphorismorum,

Arteriā incisam aliquid quando vni-

Aphor. 19.

*Discissa
que dicitur
Ossa puero-
rum fracta
coalescunt.*

*Albertus Bo-
noniensis.*

morum, quod, vulnera in corpore eorum, quæ aqua
 inter cutem laborant, non faciliè sanantur. Non prius
 enim curantur vulnera aut vlcerà, quàm ad cicatricem
 perducantur. Non possunt autem ad cicatricem
 perducì, nisi sufficienter exsiccentur: quod non factum
 est faciliè in iis, quos aqua inter cutem malè habet,
 ob humiditatis immoderantiam, vt docuit Hippo-
 crates in libro de vlceribus: & Auicennas his ver-
 bis: Solutio continui, & vlceratio, & id genus alia,
 faciliè ac citò curationem recipiunt, cum in particu-
 lis fiunt, quæ bona prædictæ sunt temperatura. Con-
 trà verò, si membra cacochema occupauerint, plu-
 rimùm renituntur curationi, nec nisi tempore longo
 possunt ad sanitatem perducì. Sed multò adhuc diffi-
 ciliùs curantur, quandò corporibus eorum incidunt,
 qui vel hydropè laborant, vel lepra [id est, elephan-
 tiasis] aut aliqua alia praua temperatura. Præterea in
 quinto aphorismorum Hippocrates sic ait: Vlceris-
 bus frigidum quidem mordax, cutim obdurat, do-
 lorem insuppurabilem facit, liuorem obducit, rigores
 febriles, conuulsiones, distensiones. Adhæc insig-
 nes continui solutiones malè curatæ, præsertim cir-
 ca iuncturam, maciem inducunt sequenti particulæ.
 Et hoc quidem, propter obstructionem, & virtutis
 debilitatem, vt iam semel dictum est, & infra adhuc
 dicetur. Plurima adhuc alia præter supradicta, iudici-
 a diligenti animaduersione obseruanda sunt, quæ
 in sequentibus, & in tractatu de vlceribus (quòd tã
 his quàm vulneribus sint communia) recensébun-
 tur. Itaque finem his de vulneribus iudiciis impone-
 mus, si quæ de is doctè, breuiter, atque ornate scrip-
 sit Celsus, subiecerimus. Hæc enim vice anacephas
 leuiss & compendij erunt eorum ferè omnium, quæ
 de iudiciis vulnerum hætenus dicta sunt: verba au-
 tem illius sunt hæc.

Lib. 5.

Quæ vulne-
 ra insanabi-
 lia sunt Cel-
 so.

Seruari non potest, cui basis cerebri, cui cor, cui
 stomachus, cui iecinoris portæ, cui in spina medulla
 percussa est: cuiq; aut pulmo medius, aut ieiunum,

aut

30 aut tenuius intestinum, aut ventriculus, aut renes
 30 vulnerati sunt: cuiusve circa fauces grandes venæ, vel
 30 arteriæ præcisæ sunt. Vix autem ad sanitatem perue
 30 niunt, quibus vlla parte pulmo, aut iocinoris crassum *Que vulne*
 5 [quod Græci *παριχνομα* vocant] aut membrana, quæ *ra difficiē*
 5 continet cerebrum, aut lienis, aut vtriusque, aut vesica, *curationem*
 5 aut vllum intestinum, aut septum transversum vul
 5 neratum est. Hi quoque in præcipiti sunt, in quibus
 5 vsque ad grandes, intusque conditas venas in alis, vel *Periculosa*
 10 poplitibus mucro defedit. Periculosa etiam vulnera *vulnera.*
 30 sunt, ubicunque venę maiores sunt: quoniam exhaus
 30 rire hominē profusione sanguinis possunt. Idque eue
 30 nit, non in alis tantum, atque poplitibus: sed etiam in
 30 his venis, quæ ad anum testiculosque perueniunt. Præ
 15 ter hæc malum vulnus est, quodcunque in alis, vel *Malum vul*
 30 feminibus, vel inanibus locis, vel in articulis, vel in *nus.*
 30 ter digitos est: item quodcunque muscolum, aut ner
 30 uum, aut arteriam, aut membranam, aut os, aut car
 30 tilaginem læsit. Tutissimum omnium quod in car
 20 ne est: & hæc quidem loco vel peiora, vel meliora *Que vulne*
 30 sunt. Modò verò periculum facit, quodcunque ma
 30 gnus est. Hactenus de iudiciis vulnerum. *ra tutiorem*
habeant cu
rationem.

De curatione Vulnerum in vniuersum.

25

C A P. I I I I.



30

30 Minium solutionum continuitatis, nedum *Communis*
 vulneris, communis quidem curadi in
 30 dicatio, est vnitio, vt Galenus ait libro *solutæ vni*
 30 artis medicinalis cap. nonagesimo. Et *tatis curadi*
 30 ea quidem est prima indicatio omnibus *indicatio.*
 30 nota, ab essentia ipsius affectus desumpta, quæ præci
 30 pit, atque insinuat, contrariū per suū cōtrariū propels
 30 lendum esse. Hæc autē prima ac generalis indicatio,
 35 perficitur à duobus, nempe à natura, tãquàm à præ
 30 cipuo agente, & causa effectrice, adiuta suis virtutib
 30 us, & alimento conuenienti: & à medico tãquàm
 30 ipsius naturę ministro, quatuor intenciones sibi iniicit *Intenciones*
 (quod

192 Institut. Chirurgicarum, Lib. II.

in curandis (quod aiunt) subalternatas in animo habente, dum
vulneribus opus suum exercet, vt curationis finem propositum
obseruanda tandem assequatur.

1 Prima iubet extrinsecus incidentia (si qua forsan
 labris vlceris intercidant) amouenda esse. 5

2 Secunda præcipit applicanda esse extrema distan-
 tium partium.

3 Tertia docet ea in vnum iam commissa & coacta
 ita conseruare.

4 Quarta suadet ipsam partis læsę substantiam tueri, ac salubrem seruare. 10

5 His & quinta non absurdè super addi potest, quæ
 docet accidentia vulneribus succedere cōsueta, corrigere, ac propulsare.


1 *Prima intentione* Primam intentionem assequemur dilatando vul- 15
 nus, si non satis dehiscat, aut si eius labris aliquid in-
 tercidat extraneum, vt puta vel ossis particula ali-
 qua pungens, & aspera: aut telum aliquod infixum,
 vt sagitta: vel mucro, vel aliquod aliud extrinsecus
 incidens: cuiusmodi sit spina, vel harundo. Atq; vbi 20
 satis diducta fuerint labra vulneris, digitis, aut vol-
 sella, vel forcipe, aut alio id genus instrumento à te,
 vt res expostulat, excogitato, quod infixum
 est, aut labris vlceris intercidit, appres-
 hendi debet, & leuiter, ac (si 25
 fieri possit) citra dolorem
 euelli, vt in sequen-
 tibus docet-
 bitur.

*

De Plagis, seu cruentis uulnerib. 193

De sagittis, plumbeis, glandibus, & globis ferreis, ac quibuscunque aliis telis, e corpore extrahendis.

Corpus multifariam vulneratum.



Quomodo plumbea glans, aut glo-
bus à ferentariis, & levis ar-
maturæ militibus
emissus, extra-
hatur.



De Plagis, seu cruentis uulnerib. 195

*De sagittis, & quibuscunque alijs telis
in corpore extrahendis.*

VT sagittas, aut quæuis alia tela in corpus de- ¹ *Instrumento*
fixa, secundū rationē, & ex arte possis eximes, ² *toru inuēto.*
re, inueniendum tibi primū est, quo instrumēto ³ *Modus*
mento id queas efficere. Modus autem inueniendi ^{inueniendi}
instrumenta, habetur ex contemplatione naturæ, ac ^{instrumenta.}
diuersitatis tum læsarum particularum, tum rerum ^{3. Modus}
defixarum. Itaque ex horum duorum, partis scilicet ^{extrahendi.}
læsar, & rerum infixarum, accurata consideratione
& cognitione, tertium statim se offert: nempe mo-
dus euellendi tela in corpus infixā, qui certē varius
& multiplex est, ut ex sequentibus patebit. Cæter-
¹⁵ rum tamen si discrimina, seu differentię telorum ac
rerum infixarum, propemodū sint infinitæ, nec
scriptis faciliē mandari possint (proinde & formæ
proiectorum ab hostibus, diligenter à chirurgo
perquirendæ sunt.) Auicennas tamen conatur eas
²⁰ omnes differentias ad octo reducere. Has autem *Sex telorum*
senario numero placuit nunc complecti. Itaque dif- *differentie.*
ferunt tela, quæ nostris corporibus infiguntur,
materia, figura, magnitudine, numero, habitu, vir-
ribus. Materia quidem, quatenus ea quæ imponun- ^{A materia}
tur, & hastilia vocantur, aut lignea sunt, aut arun- ^{sumptæ dif-}
²⁵ dineæ. Ipsa verò tela, aut ferrea sunt, aut ærea, ^{ferentia.}
aut frænnea, aut plumbea, vel cornea, vitrea quan-
doque, aut ossæ: quinetiam arundineæ, aut lignea
conspiciuntur. Figura autem euariant, quatenus ^{Differentie}
alia sunt rotunda, alia angulosa, nempe triangula. ^{sumptæ à fi-}
³⁰ Alia sulcata, alia insulca, hoc est, tribus ex partibus ^{gura.}
acie prædita. Nonnulla item sunt spiculata, seu spicu- ^{Spiculatorū}
lis cincta, quæ vulgò harbulata vocant: nonnulla ^{discrimina.}
spiculis carent. Atque ex spiculatis, hæc posteriora
³⁵ spectantibus seu retrò vergentibus spiculis munita
sunt, ut dum extrahuntur, contrā defigantur. Illa
in anteriora vergentia habent spicula, ut propuls-
ata idem faciant, hoc est, infigantur, & lanient.

196 Institut. Chirurgicarum, Lib. I I.

Telorum di-
scrimina
sumpta à
magnitu-
dine.
Numerus.

Habitus.

Vires.

3. instrumē-
ta telis atq;
infixis alijs
rebus extra
hendis
accōmoda.

Sunt etiam quedam quibus utroque versum, fulmī-
nis instar, spicula extant, ut & dum extrahuntur, &
dum introduuntur propelluntur ite, corpus dilanient,
& in obiecta infigantur. Sunt item quibus ferrum
quibusdam cardinibus seu verticulis ita mouetur,
ut spicula in impulsione contracta, in extrac-
tione explicentur, atque ita telum extrahi pro-
hibent. Magnitudine quoque variant tela, quatenus
alia magna sunt, ut trium digitorum longitudinem
expleant: alia parua, ut vnum digitum æquent: alia
verò medium inter hæc locum occupent. Numerus
etiam in his diuersitatem adfert, quatenus nonnulla
simplicia sunt, nonnulla composita. Tenuia siquis
dem quedam ferramenta, siue ferrea frustula ipsis
imponuntur, ac si innexa sunt, ut in teli euulsione
facile lateant, & in imo relinquantur. Habitu differ-
runt tela, quatenus alia ferrum acutum ligno seu ha-
stilibus habent infixum, alia concavum, ita ut hastis
le in ferri tubulum insertum habeat: atque hoc alia
firmiter, alia negligentius, ut dum euelluntur, relis-
cium intus remaneat. Viribus demum & facultate
differunt, quatenus veneno quedam sunt oblita,
alia verò minime. Atque hæc quidem sunt telorum
differentiæ. Nunc de instrumentis, quibus tela, &
res extraneæ nostris corporibus infixæ extrahuntur,
dicendum est. Nā de sedibus, in quas tela ipsa penetras-
runt, postea agemus, dū scilicet de modo euellendi tela,
alia infixæ, sumpta à sede affecta indicatiōe, comēta-
bimur. Itaque instrumenta, quæ à telorum aliorum
infixorum differentiis, & à particularum in quas
penetrarunt varietate, excogitantur, inveniunturque
licet valde multa sint, octo tamen apud Guidonem,
& recentiores chirurgos sunt magis communia.
Primum, sunt forcipes seu, ut vulgò loquuntur, 35
tenaculæ Auicennæ, quæ denticulatæ sunt, & capis
ta habent ad instar limæ. 4. Fen. lib. 4.
2. Secundum, sunt forcipes Albucasis, in modū ros-
stri auis, etiam denticulatæ.

Tertium

De Plagis, seu cruentis uulnerib. 197

Tertium sunt forcipes in modum cannae siue arū
dinis, aut scriptorij calami concauae, quas vulgò tes-
nacuias cannularas vocitant, ad sagittas, spiculis cin-
ctas (quas barbulatas nominant) extrahendas ac-
commodae.

Quartum est, terebellum inuersum, quod in ferri
infixi tubulum (quam doliam appellant) imponi-
tur: vbi autem sic tubulo immisum, ferrum appre-
henderit, leuiter ferro sequaci educitur.

Quintum instrumentum, est terebra in longum
porrecta, dilatandis ossibus (quibus tela firmiter in-
haerent) apprimè idonea.

Sextum, est excisorius culter, ad amplificanda car-
nis vulnera, quò facilius infixa eximantur.

Septimum est propulsorium instrumentum, quod
geminum est, nempe cauum, & solidum siue sur-
dum: illud foeminam, hoc marem appellant. Is tela
protudimus, donec ab altera parte apprehendi, &
extrahi possint.

Octauum est in modum arcus illius, quem balis-
tam vocant. Hoc autem, icum telum excutitur.
Horum autem aliquot formulas in sequentibus de-
pictas inuenies.

Ceterum extrahendorū telorum, quae illata cor-
poribus intus haerunt, modus est duplex, per attra-
ctionem vnus, alter per protrusionē, seu impulsione.
Attractio fit ab ea parte maximè qua venit telū, sed
interdū etiam & ab ea inquam retēdit. Protrusio
autem fit in partem oppositam ei, ex qua venit, infis-

xumq; est. Horum autem modorum indicationes
desumendae sunt, tum ab ipsis telorum generibus,
quae supra commemorauimus, tum ex illis sedibus,
in quas illa penetrarunt. De quibus mox dicam, si
communia quaedam praemisero in extrahendis telis

sedulo obseruanda. Si itaq; telum in cōspectu sit, sic
ut se habet prociuis extrahendum est: si occultatū
est, ita faciendum Hippocrates praecipit. Corpus
vulnerati, (si tamen ipse poterit) in ea figura consti-

Modus ex-
trahēdi tela

infixa du-
plex.

1 Attractio.

2 Propulsio.

Cōia qua-
dā in extra-
hendis telis
sedulo obser-
uanda.

tui debet in qua erat eo tempore quo vulnus accep-
 pit, atque ita quo tetenderit telum, specillo explo-
 1 randum est. Si æger id non potest, iacens saltem ita
 debet collocari: vt quam proximè fieri potest, ad eã
 2 figuram accedat. Si telum aliquod defixum primis
 conatibus commodè ac salubriter euelli non possit,
 sic eousque dimittere debes, donec circumposita ca-
 ro emarcescat, putrescatq;. Deinde intermissum
 opus aggredere, telum ipsum quod infixum est,
 modò huc, modò illuc agitando, ac manibus vel for-
 10 cipibus leuiter ipsum cōtorquendo: ita enim leuius
 multo ac facilius telū extrahes: vt rectè præceperūt
 Auicennas, Brunus, & Albucasis. Quanquam ali-
 3 ter visum sit Henrico. Hic enim voluit statim ac si-
 ne mora, tela quocunque modo fixa extrahi. Si ar-
 15 matus humo telo ictus fuerit, nec possit leuiter, ac
 faciliè telum manibus euelli, vulneratum protinus
 suis armis exui iubeto: & ritè apparatus omnibus,
 quæ ad opus eiusmodi conducere videbuntur, emis-
 20 sioq; ac præfatio (vt suprà dictum est) præfatio, for-
 cipe communi apprehensum telum (præsertim si
 sagitta est) ipsum leniter contorquendo extrahito.
 Quòd si communi hac forcipe nihil promoueris,
 4 fortiores assumito. Si telum carni infixum retrò,
 hoc est, ea parte qua venit, recipiendum sit, nec ali-
 25 ter educi possit, amplificanda scalpello, aut nouacu-
 lã plaga est, quò facilius id sequatur, quòq; minor
 oriatur inflammatio: quæ maior quidem fit, si ab
 illo ipso telo dum redit, corpus laniatur. Item si ex
 alia parte vulnus aperitur, laxius esse debet, quàm
 30 vt telo postea transeunte amplificetur. Summa au-
 tem vtraque parte ita habenda cura est, ne neruus
 ne vena maior, ne arteria incidatur. Quòd si horum
 aliquid detectum fuerit, excipiendum hamo retus-
 35 so est, abducendumq; est scalpello. Vbi autem sa-
 tis incisum est, telum eximendum est: tum quoz
 que eodem modo, & eadem cura habita, ne sub
 eo, quod eximetur, aliquid prædictorum latur.

Si autem telum ita firmiter ossi inhæsit, ut nulla vi extrahi possit, terebello (ut vocant) directo diuisionem amplificabimus, ac modo infra scripto telum liberabimus. Telo à corpore euulso, non alia est vulneris medicina, quam quæ esset, si corpore ictio nihil inhæsisset. Ergo vulnus ipsum: ut & cætera alia vulnera, tractari ac curari debet, hoc vno addito, quod qui ab infixo telo alteratus est sanguis exprimi, ac educi debet: ut vulnus ipsum à putrilagine vindicaretur. Ac perfundi quidem debet oleo calente, maxime si doloris adest iuspitio. Si inflammationem experiatur, ad eam tollendam insuccaritis lanis, fomentis cataplasmatibus, & consimilibus utemur. Si verò inflammatione vacauerit, suturis (si opus fuerit) adhibitis, impositoq; medicamento, quod cruentis statim uulneribus iniici solet, curandum est. Cæterum his communibus prælibatis, tempestiuum est, propria quædam de telorum extractione subiiciamus: & quando, ac quomodo attractione, vel propulsione, sit utendum, sumpta primum (ut propositum est) indicatio-
 25 ne ab ipsorum telorum generibus seu differentiis, dein ab ipsis sedibus affectis. Itaque tela, quæ iaci ac vibrari solent, magna ex parte sunt vel oblonga, & angusta, cuiusmodi sunt sagittæ, vel lata, vel
 30 rotunda: aut angulosa: ut plumbea glans, vel ferrea: aut lapis, aut simile aliquid, quod perrupta cute integrum intus insedit. Telum si oblongum est & angustum, cuiusmodi sagitta est, & facile in corpus conditur, & altissime insidit. Sæpius itaque
 35 alia parte: quam qua venit, sagitta educenda est, præcipueq; quia ferè spiculis cingitur, quæ magis laniant si retro: quam si contra trahuntur. Sed inde apertâ viâ, caro diduci debet, ferramentis
 40 ad similitudinem factis Græcæ literæ 4. Deinde ubi apparuerit, si mucroni arundo inhæret, pro- pellenda est sagitta, donec ex altera parte apprehendi, & extrahi possit. Si iam illa, arundo in-

Methodus
eximendi te-
la, sumpta
indicatione
ab ipsorum
differentiis.

Sagitta sæ-
pius ante-
ror sum edu-
cenda.

quam seu hastile decidit, solumq; intus ferrum est, mucro vel digitis apprehendi: vel forcipe, atque ita educi debet. Neque alia ratio extrahendi est, ubi ab ea parte qua venit, euelli magis placuit. Nam ampliato vulnere, aut arūdo si inest, euellens da est aut si ea non est ferrum ipsum. Porro eximetur ferrum vel terebra inuersa in tubulum (quā doliam vocant) immisso: vel forcipe, qua dentes atque eorum radices euelluntur: vel ferramento, quod à telo extrahendo belulcum Græci vocant: 10 aut alio quopiam instrumento ad id accommodo. Nonnunquam etiam carnem prius incidentes, si vulnus instrumentum non recipit. Quod si spicula apparuerunt, eaq; breuia & tenuia sunt, forcipe ibi comminui debent, vacuumq; ab his telum 15 educi. At si ea maiora valentioraq; sunt fixis scriptoriis calamis: vt consulit Celsus contegenda sunt, ac ne quid lacerent, sic euellenda. Alij spicula ipsa forcipibus seu tenaculis (vt vocant) cannularis apprehendunt, atque ita telum eximunt. Quod 20 si telum spiculis vtroq; versum spectantibus cinctū in neutram partem sequatur, iuxta ipsum alia incisione patefaciendus locus est, nisi vena aut tale aliqd impediāt: atq; inde ferrum vndiquaq; explicatū modestē, ac sine vlla vulsione tollendū est. Quidā etiam 25 spicula eiusmodi fixis calamis, seu exiguis arūdinibus, prius cōtegunt, ne quid lacerent deinde ita euellunt, ea scilicet parte, quæ educationi magis congrue re videbitur. Latum verò telū si conditū est, ab altera parte educi non expedit, ne ingenti vulnere, ipsi 30 quoq; ingens vulnus adiiciamus. Euellendum ergo est, genere quodam ferramenti, quod Dioctēum eraphiscum Græci vocant, quoniam autorem Dioctē habet: quem inter priscos, maximosq; medicos fuisse memoriæ proditum est: vt Cornelius Celsus an- 35

notauit libro septimo, capite quinto. Tertiū quoddam genus telorum est rotundum: vt diximus, aut angulosum: vt lapis, plumbea glans, aut simile aliū quid

*Si sagitta
spiculis cin-
cta est.*

*Latū telum
ab ea parte
qua venit,
extrahendū.*

*Rotundum
telū aut an-
gulosum.*

quid, quod ex funda aut tormentis bellicis mittitur
& perrupta cute integrum in corpus defigitur, ac
latet. Tela autem eiusmodi intus condita esse his no-
ris deprehendes. Moles aspera, atque inæqualis, (si
5 contrectetur) subesse sentitur. Plaga seu diuifio nō
omnino in rectum tendit: sed & maior etiam ac am-
plior apparet: caro item contusa liuidaq; cernitur.
Dolor præter ea cum grauitate quadam infestat. In
omnibus his, latius vulnus aperiendū, idq; quod
10 inest ea qua venit, aut vncis aduersaue scalpelli par-
te, aut vulnerario specillo recipiendū est, aut dēticiu-
lata forcipe, si fieri potest, & eam vulnus admiserit,
extrahēdū. Quōd si telū infixum sic intus lateat: vt
nullo modo reperiri possit: aut non satis commodē
15 extrahi tātis per dimittendū est, donec natura ipsum
protrudat: aut manifestet. Interdum verō tela infixa
integra intus cicatrice obducto vulnere citra noxā
aliquam diu delituerunt. Deinde longiore temporis
spacio partem eam abscessu occupante ac dirupto
20 exiliere: quo facto vulnera mox ad sanitatem perdu-
cta sunt, ea illis curatiōe adhibita, quæ aliis debetur
vulneribus. Quōd multis cōtigisse vidit Albucasis,
vt refert parte secunda suæ chirurgiæ. Hactenus de
telorum extractione, sumpta ab ipsorum differētiis
25 indicatione: nunc de re eadem dicemus, sumpta ab
ipsis affectis sedibus indicatione.

Itaque sedes in quas tela penetrarunt: vel caro
sunt, vel ossa: vel articulus. Atque in iis quidem
partibus: vel altè telum insedit: vel in summo duntaxat,
30 aut saltem non admodum altè, & citra mes-
diū infixum est. Adhæc vel membrū vnū duntaxat
telo ictū est: vel particulæ plures simul cōfixæ sunt,
ita vt particula vna telo traiecta, alteri affigatur.


Igitur si in summa carne telum impactum est: aut
35 certè magnas venas, & loca neruosa nō transit, ne
hil melius est, quàm qua venit, id euellere. Similiter
etiā quod altè inhaesit, obiectæ verò partes, id est
est, quæ ex diuerso respondent, si conuulnerentur,

*Tertium ge-
nus telorū
ea parte
qua venit,
extrahēdū.*

*Tela inter-
dum diu in
corpore de li-
tescunt per-
sanato vul-
nere.*

*Methodus
extrahendi
tela infixa,
sumpta à se-
de affecta
indicatione*

*Si telum in
summa car-
ne infixum*



202 Institut. Chirurgicarum, Lib. II.

vel ex sanguinis profusione : vel ex aliorum ment
brorum consensu, & consortij lege periculum inue
hant, euulsione qua parte infixum est, eximi debet.
Illud autem digitis: vel ipsius teli arundine, seu has
tuli (quod plarunque ligneum est) in ferri tubu

*Si telu altè
in carne in-
sedit.* lum immisso, extrahemus. In quibus verò altè telu
in carne infixum est, & plus est, hoc est: longius spa
cium, per quod telo reuertendum, quàm quod per
rumpendum est, iamq; venas neruosq; id pertrans
siuit: breuiter cum parum admodum integræ car
nis ex aduersa parte superest: neque aliquid obstat
quominus contra mucronem incisio commodè fieri
possit, melius est aperire quod superest, eaq; propul
satu telum educere. Nam & propius petitur, & tur
tius euellitur, & in maiore membro, si medium mus
cro transiit, facilius sanescit quod peruium est: quia
vtrunque medicamento fouetur. Protrudi autè de
bet: vel hastuli ipso, si inhæreat: vel si exciderit, pro
pulsorio instrumēto, cauo quidem: vel solido (quod
& surdum quidam vocant) prout res exigat. Porro
si telum acumen (quod *βυραxon* vocant) habeat, (hoc
autè specillo deprehendimus) propulsorij instrumē
ti foeminam: si verò tubulum seu concauitatem has
buerit, marem demitemus, atq; ita ferrum inserto
instrumēto protrudemus, quoad educi facillimè pos

*Si telum in
opposita pro
gesserit.* sit. At si etiam in opposita, seu vltterius telum pro
cesserit, nec ea parte ipsum possit extrahi, qua infis
xum est, diuisis iis, quæ opposita sunt, per illa ipsum
eximemus: vel euellentes: vt dictum est, vel per eā
partem in quam terendit: vt modò diximus, propel
lentes, summa cura (vti monuimus) semper habita
ne vel neruum: vel tendinem: vel maiorem venam,
aut arteriam incidamus. Turpe siquidem est,
dum telum extrahimus, maiorem noxam inferre,
quàm telum ipsum effecerit.

*Si telu offi
inhesit.* Si telum offi inhæsit, non nisi attrahendo ipsum
eximere tutum est. Eò autem vsq; mouendū est, dos
nec is locus laxetur, qui mucronem momordit, &
tum

tum vel manu, vel forcipe telum extrahendum est.

Quæ ratio in dentibus quoque eiiciendis est: & vix unquam ita telum non sequitur: sed si morabitur, excuti quoque ictum aliquo ferramento poterit.

- 5 Quidam tenaculis (vt vocant) seu forcipibus alligant arcum, quem vulgò balistam nominant, & laborante bene stabilito, intensum ipsius instrumenti neruum, seu chordā, remittūt & ita telū extrahūt.

- 10 Quod si telum altius in ossē defederit (quod *cos* si telum altius in ossē demersum sit. *gnoscimus*, si firmiter id infixum, nulla vi moueatur, aut labet) excisorio cultro, ossē quod iuxta est, exemplo, aut etiam terebra (si crassum sit) prius perforato, telum ipsum extrahemus. Sunt qui ab eo foramine terebra facta ad speciem literæ + contra res

- 15 lumos excidunt, sic vt lineæ, quæ diducuntur, ad telum spectent: quo factō, id necesse est, labet, & facile auferatur. Quod remedium vltimum est. Alij terebra in rectum ac longum porrecta, quæ illis directā vocatur, ossis percussis rimas coniuuantes, & telum
20 infixum mordicis prehendentes, diducunt, atque ita facile quod infixum est, extrahunt.

- 25 Inter duo verò ossa, si per ipsum articulum telum perruperit, circa vulnus duo membra fasciis habensive deliganda, & per has in diuersas partes diducenda sunt, vt tendones, ligamenta, & nervos distendant. Quibus extentis, laxius inter ossa spatium est, vt sine difficultate telum recipiatur. Sed illud quoque videndum est, sicut in aliis

- 30 locis seu particulis suprā monui, ne quis neruus, aut vena, aut arteria à telo lædatur, dum extrahitur, eadem scilicet ratione quæ suprā posita est.

Ac si particulæ plures confixæ fuerint, hoc est, si membrum aliquod telo traiectum, alteri affigatur, verbi causa, brachium thoraci, aut cubitus

- 35 alicui alteri corporis particulæ, aut crura inter se, hoc modo faciendum est. Si non per totum vtrumque membrum penetret sagitta aut hasta, eam

ab

204 Institut. Chirurgicarum, Lib. II.

ab exteriori parte, perindè atque in vno fieri consuevit, apprehensam extrahemus. Sin penitus ambæ partes transfixæ fuerint, dimidia ligni parte ferra resecata, eas ligni partes quàm facillimo fieri poterit modò, sigillatim euellemus.

*Si venena-
to telo quis
ictus est.* Porro si venenato quoque telo plaga facta est, iisdem omnibus, si fieri potest, etiam festinantius actis, adiicienda curatio est, quæ vel epoto veneno, vel à serpente, aut quouis alio venenato animãte ictis adhiberi solet. Cæterum quod ad chirurgiam attinet, totam carnem, quæ veneno iam mutata est, si quidem fieri potest, præcidemus. Agnosces autem eam, quod à sana carne multum diuersa sit. Pallida enim supra modum, subliuida, & veluti mortua apparet. Sin carnem totam à veneno immutatam circuncidere non possis, non alienum erit circa vulnus scalpello incidere, hoc est, scarificare, quod plus vitiatum iam sanguinis extrahatur. Dein venenum admota vulneri cucurbitula, extrahendum est. Si cucurbitula non est, tum quodlibet simile vas, quod idem posset. Si ne id quidem est, quod tamen vix incidere potest, homo vilis aliquis adhibendus est, qui vulnus exugar. Sed illud ne intereat, ante debet attendere, qui vulnus exuxerit, ne quod in gingiuis, palato, ve, aliave parte oris vlcus habeat: hoc pacto enim & ipse tutus erit, & tutum hominem vulneratum præstabit. Siquidem venena (vt Celsus ait) non gustu, sed in situ, sed in vulnere nocent. Verum priusquam hæc agrediamur, telum ipsum vti docuimus, eximendum erit. Atque hætenus tradita est methodus de telis è corpore extrahendis. Cæterum Nicodemi incantamenta, & insufurationes, quas & coniurationes vocant, quæ à Theoderico, & Gilberto referuntur, ne pili quidem facio, vt quæ meræ nugæ sint, & Christianum hominem non deceant. Medicamenta autem ea, quæ extrahendis infixis dicata sunt, subindè Guido usurpare solet in spinis, piscium ossiculis, lapidibus, vitri fragmentis, furculis, & ossium frustulis eximendi

De Plagis, seu cruentis uulnerib. 205

eximendis: aitq; frequenti experimento se edoctum
medicamentum ab Auicenna descriptum, inter cete-
ra præstantissimum esse, & efficacissimum.

Recipit autem fermenti, mellis optimi, aut aluear-
ium sordiciei (quæ Græcè propolis dicitur) singu-
lorum libram semis, visci quercini quart. vnum, am-
moniaci quart. semis, olei quart. vnum: ex quibus o-
mnibus conficitur emplastrum, quod loco cui fis-
sum intus inhæret, superponitur.

*Emplastrū
Auicenna.
infixa sta-
tim extra-
hens.*

10 Rogerius adserit multiplici experimento com-
probatum, quòd radix arundinis, contusa cum mel-
le, & apposita infixa sine dolore extrahit. Plæ-

*Hoc idē
Paul. Aeg.
testatur.*

15 raque alia sunt in antidotario descripta,
quæ vim habent attrahendi, & infixa

euellendi, cuiusmodi sunt, dis-
tamnū, thapsia, sagapenū,

ammoniacum, aristos-

lochia, ranæ com-

hustæ, & id

20 genus as-

lia.


25 **SEQUUNTUR FORMULÆ**

aliquot instrumentorum, quæ telis ex-
trahendis idonea sunt.




Forcipes denticulatæ, ad euellendum
spinas, ossicula aspera & pungen-
tia, aculeos quoque, & mucro-
nes infixos, aliâq; id ge-
nus acuta.

*Forcipes
Albucasis,
sub hac du-
plici formis-
la depictæ
reperiuntur,
in variis exe-
plaribus. hæ
autem sunt
secundum
Guidonis in-
strumentum.*



*Hoc genus for-
cipes, rostrum
coruinum qui-
busdam appel-
latur, alius ser-
pentinū instru-
mentum: quod
ad secundum
Guido. instru-
mentum perti-
nere videtur.*


*Aliud forcipis genus, ad globos educēdos, & tela-
spiculis cinēta, obuersas- ticularē, ad eosdem vsus
que cuspides habentia. utilis, & apprimēdo-
vulgares chirurgi bar- nea, ad quos et due alie
batula vocant. precedentes forcipum
differentia.*



208 Institut. Chirurgicarum, Lib. II.

Instrumentum, ad extrahendum ferrum infixum, tubulum habens arundine seu bastili vacuum. hoc uti possumus loco quarti instrumenti Guid. quod terebram inuersam appellat.

Terebra directa, quod quintum est Guidonis instrumentum, ad amplianda ossa, quibus tela inhaerent.




*Formula forficis excisoriae,
ad amplianda vulnera in
carne accepta, quo facilius
infixa eximantur. Hoc est
sextum est Guidonis in-
strumentum.*

*Formula impel-
lentis caui, quod
& propulsorium
fœmina dicitur.
Hoc septimū est
Guidonis instru-
mentum.*





*Formula impel-
lentis surdi, quod
& propulsorium
mas appellatur.
Hoc etiam ad se-
ptimum Guida-
nis instrumentum
refertur.*



*Instrumentum simile
vocatæ Ba-
lista.*

*Forcipes seu (ut
vulgò loquuntur)
tenacula quæ ca-
pita habent ad
instar Lime.*



De secunda intentione curationis Vulnerum.

Secundam intentionem in curandis uulneribus
 (quæ est commissio dissidentium, seu distantium
 partium coniunctio) assequimur per orarum ad-
 ductionem, seu labiorum uulneris inuicem distantium
 attractionem, & applicationem, membrum ipsum
 læsum quam fieri poterit lenissimè tractando, Dissi-
 dentium nanque coniunctionem seu agglutinationem
 præcedit necessariò orarum adductio. Quæ autem
 diducta sunt, in idè adducuntur, aut vinculo ex duobus
 initis circumdato, aut sutura, aut fibulis (quas
 Greci ἀγκύρας vocant) impositis, aut horum quibus-
 dam, aut omnibus. Quòd si vulnus (ut proposui-
 mus) simplex sit, hoc est, solùm continui in carne dis-
 iunctionem, cum quo neque affectus ullus, neque sym-
 ptoma ullum adsit, nec valde magnū sit, sola fascia
 orbiculatim circumdata, diductæ partes committens
 dæ sunt. Ita enim vulnus procul dubiò coibit, & ci-
 tra aliquam aliam extrinsecus adhibitam curā, coale-
 scet. Huius autem conditionis & coalescentiæ effe-
 ctrix causa, sola certè est natura. At si magnum vul-
 nus sit, adeò ut diductæ partes in totum, atque ex-
 citè prædicta deligatura committi nequeant, futuris
 ipse adducuntur: deindè ubi sic deligata, aut futuris
 adductæ fuerint, glutinatoriis presidiiis utemur, que
 collectam humorum subluuiem deliccare, & consu-
 mere queant: aliam verò ne influat, prohibere. Plas-
 ga autè ea sui potissimùm debet, quæ in molli parte
 accepta est, maximeq; si discissa auris ima est, ut Cel-
 sus ait, vel imus nasus, vel frons, vel bucca, vel pal-
 pebra, vel labrum, vel circa guttur cutis, vel venter
 vix enim iis partibus deligaturam vulnus admittit.
 Si verò in carne vulnus est, hiatq; neque in unū ora
 facile attrahuntur, futura quidem aliena est, impos-
 sendæ verò fibulæ sunt quæ oras paulùm tamen con-
 trahunt, quò minus lata postea cicatrix sit: ferè autè
 fibulæ latius vulnus esse pariuntur.

2
 Dissidentium
 coniunctio.

Lib. 3. The.
 Trifariam
 distantes o-
 ra vulneris
 in idè addu-
 cuntur.

Vulnus sim-
 plex ex sola
 partium com-
 missione ad-
 glutinari po-
 test.

1
 Deligatura

2
 Sutura.

3
 Fibulæ.

212 Institut. Chirurgicarum, Lib. II.

De tertia intentione.

³
Commissuræ
conseruatio.

Dupliciter
commissuræ ma-
nere, quæ cō-
mittuntur.

Tertius scopus, qui in curando simplici vulnere
chirurgo proponitur, est, vt diductorum oræ,
ita vt in vnum per adductionē coniunctæ sunt,
conseruentur, & maneant. Conseruabuntur autem
optimè huiusmodi extrema, quæ in vnū coacta sunt
iisdem ferè auxiliis, quibus & in idem adducta sunt:
nempe, decenti ligatione, appposito membri situ, &
futuris, si necessariæ videbuntur. Porro bifariam
simul manent, & adglutinantur quæ commissa sunt
alia enim per se, alia ope aliorum subsistunt ac ma-
nent. Per se quidem, quæcunque secum cōcrescunt,
ac coalescūt, aliorū ope, vt ea quæ colligātur, & quæ
glutino aliquo tenētur: ac quæ cōcrescāt coalescāt uē
omnino mollia naturaliter sint oportet. Talis sanē
est (inquit Galenus) tum caro ipsa, tum quæcunque
carnea, ex ipsa cōstitutioe sunt. Quæcunque verò du-
ra siccaq; sunt, eorum diuisæ partes coire simul ne-
queunt, alienum enim terminū nequaquam admit-
tunt: sed glutinū aliquod vinculumve, quo cōmissa
maneant, requirunt. Et talium quidem sanatio in se-
quentibus præcipietur. Nunc de iis quæ per se vniri
possunt, inceptum sermonem peragamus, & quorū
modò vulnus ligari conueniat, primū dicamus.

Quomodo Vulnus ligari conueniat.

Triplex ge-
nus deliga-
tura.

¹
Incarnati-
ua seu ad-
glutinato-
ria deliga-
tura.

Deligatorum modi seu differentiæ tres sunt apud
Auicē. Fen quarta lib. quarti. Nempe incar-
natiua, expulsiua, & retentiua: ita enim eius
interpretēs, & recentiores chirurgi eas nominant. In-
carnatiua, quæ magis propriè adglutinatoria diceret-
ur, recentibus tum vulneribus, tum fracturis accō-
modat. Debet autē fascia in hoc genere deligatorum
à duob; incisiis versus mediū eiusdē circūuolui et prin-
cipiū deligatorum fieri ex parte aduersa loci vulnerati
ducēdo, atq; inuiciēdo alterū fasciæ principiū versus
partem superiorem membri, alterum versus inferio-
rem. Ea verò latitudine esse debet fascia ipsa, vt ses-
mel

mel iniecta, nō vulnus tantū, sed vsque ad aliquid
 vtrinque etiam oraseius comprehendat, quantum
 videlicet videbit̃ necessariū. Si ab altera parte caro
 magis recessit, ea melius attrahit̃. Si aq̃ue ab vtraq̃
 5 transuersa comprehendere oras debet; aut si id vul-
 neris ratio non patitur, media primū iniiciēda est,
 & tum in vtranque partem ducatur. Ceterū ar-
 ctior esse debet ligatura super locum læsum, quā
 in partibus adiacentibus. Cauendum tamen semper
 10 est, ne vel nimis arcta, vel nimis laxa sit. Quando-
 quidem quæ laxior est, non continet; quod autem nō
 continetur, elabitur. At verō quod vehementiū est
 adstrictum, dolorem premendo excitat, & proinde
 fluxionem proritat, & phlegmonem accersit, quā-
 15 doque etiam gangranam. Danda igitur opera est, vt
 vitato ambarum incommodo, vtriusque fruamur
 commodo. Id fiet (vt Galenus ait) si quod nimium *Li. 6. metho.*
 est, declinabimus. Ergo nec adeo arc̃tare deligaturā
 debebis, vt iam comprimat; nec adeo remittere, vt *Sic deligan-*
 20 laxa sit. Et, vt summatim dicam, deligaturæ termi- *da est fascia*
 nus, sit bona laborantis tolerantia. Ceterū ex- *vt et conti-*
 trema facie acu assuenda sunt. Nam nodus (inquit *neat, neque*
 Celsus) vlcus lædit, nisi tamen longē est. Et si neces- *adstringat.*
 25 sitas desideret, plures fasciæ iniiciantur, & modo qui
 sup̃rà dictus est, reuoluantur. Itaque hoc deligandi
 modo vulneris labra adamussim committuntur, &
 quominus circa vulnus excitetur phlegmone, (cus-
 ius rei curam imprimis habere oportet) prohibetur
 vt lib. sexto methodi Gal. annotauit. Sunt qui pans-
 30 num lineum duplicatum adaptant vulnere, & strin-
 gendo acu desuper assuunt. Hæc de prima ligaturæ
 differentia.

Secunda deligaturæ differentia, quæ expulsoria *2*
 dicitur, antiquis vlceribus & finibus (quos cauer- *Expulsoria*
 35 nosa vlcera vocant) propriè dicata est, hoc enim cō- *deligatura.*
 modi præstat in illis, quod à fundo ad os collectā hu-
 morum colluuiem extrudit, & ne quid ampliū in
 locum affectum confluat, validè prohibet. Hæc au-

II 4 Institut. Chirurgicarum, Lib. I I.

*Deligatura
expulsoria
fit infernè
sursum.
Lib. 5. meth.
med.* tem fit fascia ab altero tantum principio reuoluta, incipitq; ab inferiore parte membri laborantis, vbi arctior esse debet. Ab hinc ad superiorem partem facta circumuolutione, eam paulatim soluendo, dispartitur: si saltè os per quod ianies emanat, ad superiorem partem porrectum sit. Interdum enim inferius spectat. Voco autem hinc partem superiorem cum Galeno, quæ versus cor, aut hepar vasorum radices spectat. Rursus radicem vasis appellamus, priorè eius partem, quæ iocinori proprior est, vel etiam cordi. Porro huiusmodi ligatura adaptari solet membris inæqualibus, id est, quæ non sunt æqualis crassitudinis, cuiusmodi sunt tibiæ, scindendo fasciam ipsam singulo quoque palmi intervallo: & eam validè acutius affluendo, ab ea parte maximè, quæ gibba est, seu, ut dicunt, arcuata: laxè verò à parte altera dorsali. Hoc autem genus ligaturæ vtilissimum, est in antiquis vlceribus, varicibus, & tibiærum inflationibus.

*3
Deligatura
retinens.* Deligatura quæ retinet medicamenta, accommodatur membris, in quibus non potest fieri arctatio, seu strictura, neque alia deligatura, ut in collo, & ventre, atque omnibus abscessibus, & dispositionibus dolorificis. Hæc autem perficitur, linteolo, seu fascia vnicum finem, seu (ut dicunt) caput habente: vel quæ sit multorum capitum seu brachiorum, prout res exigit. Atque eius deligaturæ principium, super locum affectum iniicietur, & in parte opposita, vel nodus, vel potius sutura fiet. Talis autem deligatura leniter, & citra dolorem, cum appetet tempus, solui debet. Quod si linteola nimis adhæreant, ea tantisper vino madefacito, donec facile separari possint: fascia verò ad vulnus deligandum, lintea aptissima est Galeno libro sexto Therap. quæ nec nimium mollis, nec nimium dura sit. Quod enim molle nimium est, & algæ ritu fragile, non rito continet. Quod verò durum nimis est, premendo offendit. Si igitur ex panno veteri, non tamen nimis detricto, suauiter, & leniter mundo

mundo: eaq; latitudine, & longitudine, quam natura
 partis desiderat. Vt si humerus tibi deligandus
 fit, fasciam quæ latitudinem sex digitorum habeat
 assumes: at si femur, quinque: si tibia, quatuor: si
 5 brachium, trium digitorum. Si verò digitus ligari
 debeat, vnius digiti latitudine fascia assumenda erit.
 Eius verò longitudo fit, pro ratione numeri iniectionis
 num, hoc est, pro necessitate reuolutionum. Hoc igitur
 10 ut & multa alia, quæ scriptis mandari non possunt
 sunt medici, ac chirurgi ingenio, quod (ut Damas-
 scenus ait) tum artem, tum naturam operantem magnopere
 adiuuat committitur. Sed & ad hoc non parum cōfert
 cognitio cōformationis ipsius particulæ laborantis:
 15 ut quarto Therapeutices Galenus his verbis exprei-
 sit. Deligare (inquit) commodè ægram particulam
 non possis, nisi prius vel ex figura: vel positura, vel
 vtriusq; indicationem sumpseris. Hactenus de modo
 deligandi. Nunc de qualitate, & modo suendi.

De futura in vulneribus faciendâ.

20 **T**Riplex futura communiter fieri solet in vul- ^{Sutura tri-}
 neribus, agglutinatoria, quam incarnatiua ^{plex.}
 vocant: suppressoria sanguinis, & labiorum
 in vnū adductorum, ad tempus cōseruatricem. Sutura ^{Vfus futu-}
 25 agglutinatoria omnibus his plagis seu vulneribus ^{re aggluti-}
 in molli parte acceptis, cōpetit, quorū labra sic inui- ^{natoria.}
 cē dissidēt: ut solā ligaturā in vnū adduci nō possint
 & quibus nihil iā extraneū inter ipsas oras intercipi-
 tur. Sed & recētia esse debēt vulnera, quibus hoc ge-
 30 nus futuræ accommodatur: vel saltē si vetera fuerint,
 ac dura, callosa q; labra habuerint, per scarificatio-
 nē, aut cutis ablationem, sanguine emisso renouata.
 Hæc autem fit quinque modis. Primò, filo forti, ^{Modi quin-}
 æquali, & læui, cuiusmodi est sericum in communi ^{que future}
 35 bus saltem vulneribus, primum punctum faciendo ^{aggluti-}
 in medio diuisionis vulneris, deinde alterū in medio ^{natorie.}
 spacio vtriusq; lateris, & ita deinceps procedendo
 ut inter duo quæcunque puncta, punctum interces-

dat, donec vulneris labra ritè cōmissa fuerint. Itaq; neq; nimis rara, neq; nimis crebra futura esse debet. Si enim nimis rara est, nō cōtinet: Si nimis crebra est vehementer afficit. Quia quotāpius acus corpus transiit, quoq; plura loca iniectum vinculū mor-
 Lib. 5. det, eo maiores inflammationes (inquit Celsus) oriū-
 tur. Sic igitur futura oras iūgat, vt ne ipsæ quidē in-
 ter se ex toto cōtingant. Quōd icilicet, si quid intus
 humoris cōcreuerit, sit qua emanare, ac effluere pos-
 sit. Solēt autem cōmuniter vnus digiti transuersa-
 10 lis spaciū inter iniecta vincula relinquere. Porro
 acus longa, ac læuis esto cuspide triangulari, cauda
 verò excauata, vt in ea filum recondatur, & trāsitu
 acus non remoretur. Ita enim mitius corpori insidit.

*Acus qualis
esse debeat.*

Cæterū cannula habeatur fenestrata cui incum-
 bat, ac innitatur altera pars labij vulneris, ne scilicet
 huc atque illuc euagetur, dum acus intromittitur:
 & vt per fenestellam videri possit, quādo acus per-
 transferit. Atque vbi iam acus traiecta fuerit, vnā
 cum filo trahatur: sed interim vulneris labrū, quod
 20 propè filum est, specillo huic parti applicato, velus-
 ti fulcimento, & adminiculo innitatur, ne dum fis-
 lum extrahitur, labrum etiam consequatur. Lige-
 tur autem primò duabus inuolutionibus, secundo
 vna duntaxat, deinde filum scindatur, aliquantū
 25 lum remorè à nodo.

2 Secundo modo fit sutura incarnatiua, seu aggluti-
 natoria acubus, aut pinna cum acu introducta. hac
 autem vtimur in magnis vulneribus, & profundis,
 in quibus labra plurimum inter se distant. Atq; tot
 30 numero acus imponendæ sunt, cum filo in eas intros-
 missio, quot necessariæ videbuntur. Filum autem
 circa eas reuoluendum est, eo modo quo muliercule
 facere solent, dum suas acus super manicas aut cas-
 pitia asservant: atque hoc modo relinquuntur vsq;
 35 ad vulneris consolidationem.

3 Tertio modo fit sutura hæc agglutinatoria dicta
 Tertius mo veruculis æqualibus ex stupis vehementer contors-
 tis,

De Plagis, seu cruentis uulnerib. 217

tis, & gracilibus ad modum scriptorij calami, vel *fe dus futura*
 stucæ, lōgitudine ferè mediij digiti. Quòd si velimus *icarnatiua.*
 futuram longo tēpore perdurare, pinna seu scripto

rius calamus, loco stuparum assumi debet: fit autem
 ad hunc modum. Vtraq; vulneris ora traici debet,
 5 acu filum ducente. Deinde facio per idē foramē res
 cursu, ex ea parte qua venerat recipiēda est: sic quis
 dem: vt ansa vna remaneat, ea parte qua remeauit.
 In qua alterum veruculi extremum imponendum
 10 erit. Postea fines amborum filorum, euntis inquam
 & redeuntis, confringito, & super alterum veru
 culi caput ligaturam facito, ibiq; fila rescindito, &
 veruculum hoc pacto vsque ad perfectam vulneris
 coitionem relinquito.

15 Quarto, eiusmodi futura fit, fibulis (quas Græci *ἀγκυρὰς* nominant) disiunctas, atque hiantes vul
 neris oras committendo. Sunt autem fibulæ ipsæ *Quartus*
 vel maiores, vel minores, pro ratione partis vulnera *modus futu*
 20 ræ: ab vtraq; verò parte recurvæ, figaturq; hamus *re aggluti*
 vnus in altero vulneris labro, & verius alterū duca *natoria.*
 tur, in quo & alter hamus infigatur: vt facere solēt
 qui pānos tundēdo apparāt. Hæ autē (fibulæ inquā)
 quibus hiāris plagæ oras sic cōtrahimus, nullā vim
 desiderant, sed eatenus vtilēs sunt, quatenus cutis
 25 ducentem quasi sua sponte subsequitur.

Quinto modo diductæ vulneris oræ committuntur, *5*
 pannis vtrinque admotis, qui figuram triangu *Quintus*
 larem referant, & ea sint magnitudine, quæ mem *modus futu*
 bro læso congruere videatur. Qui futuræ modus, in *re incarnati*
 30 iis maximè locis conuenit, in quibus volumus cic
 catrices, facta vulneris agglutinatione, non appar
 rere, vt in facie. Panni autem eiusmodi, viscoso
 linimento, ac pertinaciter adhærente oblimi debent
 quòd recipiat puluerem sanguinis draconis, thus
 35 ris, & mastiches, sarcocollam, picem, & pollinē,
 id est, farinam volatilem molendinariam. Quæ om
 nia cum oui candido liquore subigi debent, &
 in vnitatem redigi. Atque vbi linimenti formam

ca iam induerint, supra dictos pannos extendi debent, qui vtrinque postea ad latera vulneris, ad pollicis vnus distantiam supra vulneratam partem agglutinandi sunt. Vbi autem hæc panni frustula sic linimento oblita, deficcata fuerint, ingeniosè, & vt oportet, consui debent. Quo factò, vulneris labra coibunt, & agglutinabuntur.

² *Sutura sanguinem supprimens.* Sutura sanguinè supprimens, fit acu filum trahente, traiectis oris vulneris vtriusque, per modum resolutionis, vti pelles consui solent. Ea autem vti mur, quando alia non datur vti, propter magnum ruentis sanguinis impetum, accepto in venis vulnere. Sed & hæc vtilis est ad transuenda intestina, cum fauciata sunt: ad panniculos quoque vulneratos, & loca carne destituta. Verùm non admodum tutus est hic consuendi modus. Quandoquidem disrupto puncto vno, cætera relaxantur.

³ *Modus suturæ tertius.* Sutura quæ labiorum in vnum attractorum est conseruatrice, fit vt & reliquæ aliæ: verùm non æquè arcia esse debet. Eo enim duntaxat nomine fit: vt si mul maneant: quæ cõmissa sunt, tantisper dùm vulnus coaluerit. Competit autem huiusmodi sutura vulneribus in carne, aut molli parte acceptis, in quibus magna facta est dilaceratio, & carnis deperditio. Hac enim factio vnionis diuortio, seiunctæ partes in vnum adducentur, quo citius coalescant. His etiam vulneribus rectè accommodatur, è quibus in posterum aliquid extrahendum est. Illud autem de futuris ac fibulis in vniuersum diligenter obseruandum est, vt illis nunquam vramur, antequam vulnus intus purgatum sit, nisi cùm magna sanguinis profusio supprimenda est, ne quid ibi concreti sanguinis relinquatur, id enim & in pus vertitur, & inflammationem mouet, & glutinari vulnus prohibet. Sed ne linimentum quidem, quod supprimendi sanguinis causa inditum est, inibi relinquendum est: nam id quoque inflamat. Comprehendi vero sutura vel fibula, non cutem tantum, sed aliquid etiam

etiam ex carne (ubi suberit hec) oportebit, quò valē-
 tius inhæreat, neque cutem abrumpat. Vtraq; opti-
 ma est (vt voluit Celsus) ex acia molli, non nimis tor-
 ta, quò mitius corpori insadat. Sed neque rara nimis,
 neque nimis crebra (ob superius adductas rationes)
 futura aut fibula iniicienda est. Neutra etiam vim vl-
 lam desiderat, sed eatenus utilis est, qua cutis ducen-
 tem quasi sua sponte subsequitur. Cæterum tunc ap-
 petit tempus remouendæ futuræ, cum ea, quem desir-
 deramus effectum præstiterit. Modus autè remouen-
 di talis est: Specilli caudam, id est, angustum mucro-
 nem, filo supposito, filumq; ipsum mox abscindito.
 Postea latum ipsius specilli mucronem, labro vulne-
 ris per quod filum educitur, superposito. Ita enim pul-
 chre vitabis, ne quid filum euellendo laceretur.

Modus conficiendi puluillos, & eorum vsus.

TEmpestiuum autè est, de puluillis (qui vulgas
 tribus chirurgis plumaceoli nuncupantur) aliis
 quid obiter dicamus: hi enim ad multa utiles
 sunt. Quandoquidem dissolutas ac diductas partes
 fulciunt, & comprimunt: membri, quod suæ vnio-
 nis diuortium patitur, genuinum calorem fouet, &
 conseruant. Denique à graui molestoq; vinculo-
 rum ac fasciarum pondere, vulneratam particulam tuen-
 tur. Fieri autem quondam solebant ex pluma inter
 duos pannos candidos, & mundos confuta, vnde &
 nomen illi à veteribus inditum est. Verum quoniam
 eos subindè mutare, & innouare (quod valde tedios-
 sum erat) cogebat necessitas, magis postea placuit
 eiusmodi puluillos ex stupis canabinis conficere,
 præsertim diligenter, ac studiosè pexis, emunda-
 tisq;. Fiunt etiam interdum ex lana vel xylo, quod
 cotonem appellant. Plærique autem hodiè loco pul-
 uillorum, panniculos admouent læues, id est, non
 asperos, duplicatos, aut triplicatos: alij verò spons-
 iam adaptant. Porro duo, vel tres, plurèsvē,
 prout res expostulat, apponuntur. Quandoque
 quidem

*Tempus, &
 modus repo-
 nendæ futu-
 ræ.*

*vsus puluil-
 lorum.*

*Ratio nomi-
 nis.*

*Materia pul-
 uillorum.*

Numerus.

220 Institut. Chirurgicarum, Lib. II.

quidē sicci, ac nullo madētes liquore: nōnunquā verò imbuti oui cādido, vel vino vel posca aliquoties etiā oleo, iuxta ipsius dispositionis exigentiam. Inueniuntur autem huiusmodi puluilli ex triplici

Figura. differentia, quōd ad figuram attinet. Alij enim triāgularem, alij rotundam, alij verò quadratam habent. Qui figura constant triangulari, glutinandis

Triangulares. vulneribus (vt placuit Auicēnæ) sunt dicati. Ita autem disponi debent: vnus ex vtroque latere orarum, seu labrorum vulneris, constituatur ita: vt

Rotundi. super plagam, inter se iungantur lateribus. Qui rotundam habent figuram, sicci alijs superponuntur natiui caloris particulæ læsæ conseruandi gratia, & vt saniosam proluuiem, ac sordidos ichores in se recipiant. Sed qui quadrati sunt, ideo apponuntur, vt partem læsam à fasciarum & vinculorum iniurijs vindicent.

De penicillis siue turundis (quas tentas vulgò appellant) & linamentis formandis, deq; eorum vsu multiplici.

T Vrundas seu penicilla, & linamenta maximo esse vsui in curandis vulneribus, & præcedentia luce clarius ostendunt, & omnibus in aperto est. Proinde quando, quomodo, & ad quos fines illis sit vtendum, chirurgo haudquaquam est igno-
In quibus vulneribus vtēdū turundis, & linamentis. randum. Adhæc ex qua materia, & qua figura formari debeant. Itaque illis vtimur, in iis octo præfertim vulnerum generibus.

1 Primò, cū vulnera vel amplianda sunt, vel detergenda, vel cū aliquid ab eorum fundo vacuandum est: vt in profundis vulneribus, in quibus necessum est alibi vulnus aperire, vt ex fundo, & sinu ipsius, ichores, id est, saniosa colluuijs, inibi collecti vacuentur.

2 Secundò illis cogimur vti, in cauis vulneribus, in quibus necessaria est carnis deperditæ regeneratio.

3 Tertiò in vulneribus alteratis ab aëre, & sordidis quæ deterfione egent.

Quartò

De Plagis, seu cruentis uulnerib. 221

Quartò in uulneribus contusis.

4

Quintò prædictorum vsus utilis est, in uulneribus, quæ cum phlegmone, aut quouis alio tumore præter naturam fatigant.

5

Sextò in uulneribus, quæ per morsus fiunt. Talia nanque uulnera non sunt festinanter agglutinanda, & ad cicatricem perducenda. Quin potius longo tē-

6

pore aperta & hiantia manere debent. Quandoquidem morsus ferè omnis (vt Celsus ait) quoddam uirus habet, quod foras semper euocandum est, non intrò repellendum, nec occluso uulnere intus relinquendum. Sed de his fusiùs in sequentibus dicetur.

Lib. 5.

Omnis ferè morsus habet quoddam uirus.

7

Septimò turundis, & linamentis utimur, in uulneribus, in quibus persanandis circa ossa manus ad-

mo mouenda est.

Octauò in uulneribus, quæ iam vetustate in vlce-

8

ra defluxionibus scaturientia degenerauerunt. Porro in omnibus aliis reliquis uulneribus, inducendæ cicatrici studemus, absque eiusmodi turundis, & li-

namentis. Aduertendum autem est, in iis diuersis uulneribus, quæ non paruam esse, pro ratione finis, cuius gratia fiunt, & admoventur: fiunt autem interdum, vt diximus, ad detergendas sordes uulnerum, atque tū-

vsus, & materia turundarum & linamentorum.

ex panni non asperi, & præsertim veteris, laciniis,

vel floccis euulsis, formantur. Nonnunquam verò

ideò fiunt, & in uulnus immittuntur, vt ipsum hîas,

& apertum maneat. Ac tunc quidem ex stupis bene

pexis, & à fordibus ritè emundatis, vel ex prædicti

panni frustulis, efformantur: vel etiam ex xylo (quem

coronem vocant) vt Razes facere solebat. Sed & ex

canna ænea, vel argentea perforata fiunt penicilli ad

eundem finem: vt verbi gratiâ, in naribus, ad aëris

inspirationem, & in altis uulneribus, vt sanies, &

purulenta colluuiò, per hanc velut emissarium feratur,

& foras egrediatur, non autem intus retineatur.

Quandoque etiam hæc, linamenta inquam, & penicilli,

plagæ inferuntur, vt ipsius os magis dehiscat,

& ampliatur, fiuntque tunc aut ex spongiolis vehemen-

ter

Tenta cannula.

222 Institut. Chirurgicarum, Lib. II.

Impages,
ebenille.

menter compressis, & intortis, aut ex radice gentianæ, hæc enim dum multum humorem, quo scatet vulnus, combiberint, turgescunt, & ita magis hiantem plagam reddunt. Cæterum forma linamentorum æqualis esse debet, turundarum verò inæqualis, in modum claviculi lignei, quem Latini impagem vocant, ne scilicet intrò labantur. Hæc autem aliquoties quidem sicca, quandoque verò quopiam delibuta vnguento admoventur, prout res ipsa exigat. Reliqua quæ ad eiusmodi operationes spectant, in edendo consilio, & solertia committuntur.

De quarta intentione curandorum Vulnerum.

4
Substantie
partis cõser-
vatio.

Quarta intentio in curandis recentet acceptis vulneribus est, particulæ læsæ substantiam conservare, ac prohibere ne ipsa dolore, vel phlegmone, aut aliquo alio pravo symptomate (quod vulneribus ipsis accidere solet) infestetur. Hunc autem scopum assequimur, ad motis emplastris, & linimentis, ex oui candido, & aliis huiusmodi refrigerantibus, ut rectè docuit Razes, primis saltem diebus. Postea verò vino styptico particula perfundenda, & figura aptissima collocanda est. Apertio quoque eaq; interdum ex aduerso in vulnerata parte molienda est. Necessaria etiam est nonnunquam sanguinis missio, item & purgatio: ut mox docebitur. Sed & proba victus ratio (quam statim præscribemus) imprimis est observanda, si quartum hunc scopum cupis assequi. Porro nihil aduersus hæc, quæ commentamur, pugnat, quod plerique obiciunt, vulnera scilicet in quantum vulnera, iis tam variis, tamq; multiplicibus auxiliis nõ indigere. Hoc enim dictum solum locum habet in parvis occasionibus, & eueratis, id est, bono habitu peditis corporibus. In magnis verò occasionibus, & in plethoricis corporibus, vel vitioso succo refertis, necessum est ad pravorum symptomatum (quæ recentibus vulneribus superuenire consueverunt) præcautionem, prædictis

prædictis ut auxiliis. Quod Galenus innuere videtur *Gal. lib. 6. meib.*
 „ tur libro sexto methodi medendi, his ferè verbis: Finis
 „ gamus quempiam ad nos venire, cui tantum cutis
 „ acu sit puncta, hunc hominem, si is sit cui facile sob
 „ bonam corporis habitudinem, vlcera sanescant, etiã
 „ si citra medicamentum, nudoq; membro, ad opera
 „ consueta dimittas, nihil sentiet mali: sin ex eorum nu
 „ mero sit, qui difficulter sanetur (quia scilicet vel ple
 „ thoricus sit, vel vitiosis succis prematur, vel acris sit
 „ sensus, vel horum quibuscũ, omnibuscũ prematur)
 „ primum quidem dolebit, post etiam tum pulsu par
 „ tícula infestabitur, tum phlegmone. Porro in omni
 „ membro carnoso, quod suæ unionis solutionem pa
 „ titur, nerui, venæ, & arteriæ reperiuntur, quæ praua
 „ quædam accidentia inducere possunt. Nempe dolor
 „ rem, phlegmonem, sanguinis profusionem, conuuls
 „ sionem, & id genus alia. Quibus summa diligentia
 „ medentem occurrere oportet. Occurret autem facis
 „ le, si ea præsentierit, & præcognouerit, ut primo li
 „ bro prælagiorum testatus est Hippocrates ad hunc
 „ modum scribens, Nihil perinde medico conducibile
 „ est, quàm ut futura præsentiat: ita enim (ut Galenus
 „ locum hunc interpretans ait) de longinquo obuiam
 „ it malis.

De sanguinis detractione in vuneribus.

„ **O** Mini recens factio vulnere (nisi in vtre sit) exo
 „ pedit (inquit Galenus) ex ipso statim sanguine *Lib. 4. met. ex Hipp.*
 „ nem plus, minúsve effluere. Quippe hoc mo
 „ do phlegmone minus tentabitur, tum vlcus ipsum,
 „ tum quæ circumposita loca sunt. Itaque si medicum
 „ imitatore esse oporteat, non naturæ tantum (ut sub
 „ indenos monet Hippocrates) sed etiam eorum, quæ
 „ cum sua sponte veniant, conferunt. In recenter autè
 „ acceptis vuneribus præsertim magnis, & præualis *In vulneribus præualis*
 „ dis, expedit (ut diximus) sanguinem effluere: hic cer
 „ tè si minimè, vel minus quàm par sit, effluxit, quod *dis sanguinem mittendū esse.*
 „ deest, ipsi adiicias oportet, sanguinem scilicet ex
 „ vena

224 Institut. Chirurgicarum, Lib. II.

Vulnera tri vena detrahendo. Porro trifariam vulnera, vt & res
fariam ma- liqua omnia alia vitia magna grauias redduntur,
gna reddun vt Galenus ait libro quarto methodi medendi: nem
sur. pe vel propter afflictæ partis præstantiam, vel pro
 pter affectus vim, seu magnitudinem, vel propterea
 quod sunt cacoëthe, id est, maligna. Cuiusmodi
 quæcunque in articulis accepta vulnera sunt. Hæc
 enim doloris, vigiliarum, conuulsionis, & delirij pe
 riculum afferunt. Quod scilicet ibi tendones, & ner
 ui, & carne vacua, atque ossea loca sunt. Vulneris
 igitur magnitudo, vnà cum virium robore, mittend
 dum sanguinem indicat: quanquam qui vulneratus
 est, prorsus redundantia sanguinis sit expers. Quo
 fit, vt in artis operibus errent, qui in sola sanguinis
 abundantia, ipsius detractionem consulunt. Porro
 nos sanguinem detrahimus, in recentibus, & nus
 per acceptis vulneribus, non solum ne pars læsa, aut
 circumposita loca (vt superius dictum est) phlegmo
 ne tententur, sed vt impetum quoque ruentis san
 guinis cohibeamus, & nimium profluium impe
 diamus. Hi enim sunt præcipui scopi mittendi san
 guinis in receter illatis vulneribus. Cæterum si per
 petuum est, quod ab Hippocrate (vt Galenus ait) di
 dicimus, incipientem (inquam) fluxionem ad cõtra
 ria trahendam, & reuellendam esse: fixam verò iam
 in laborante particula, vacuandam esse, vel ab ipsa
 particula quæ affligitur, vel à maximè vicina. In prò
 ptu nobis, & de sanguinis detractione colligere nunc
 est, quod in principio hæc è longinquo, postea ab
 ipsis exulceratis partibus sit emolienda. Modum ve
 rò, seu quantitatem vacationis, tum ex redundans
 tia modo, tum ex copia sanguinis, qui è vulnere ef
 fluxit, inuenies. Adhæc ex ætate, natura, tempore
 anni, regione, & consuetudine, & ante hæc, ex ipsa
 laborantis virtute. Venæ autem secundæ electio
 ex laborante particula indicatur. Vt si vulnus in cas
 pite, collo, aut facie acceptum sit, humeralis in cubi
 to, vel manu, secunda est. Si ea non cernitur, media,
 quæ

*Que sangui
nem mitten
dū indicent
in vulneri-
bus.*

*Sanguis cur
in recenter
acceptis vul
neribus mit
tatur.*

*Lib. 4. met.
med.
Si fluxio va
lenter irruat
ad cõtraria
reuellendū.*

*Modus va-
cuationis ex
quibus indi
cetur.*

*Venæ secan-
da electio,
ex pte vul-
nerata indi-
catur.*

quæ ex ea deriuata est. Interiorem uero (quam basis
 licam uocant) incidere utile est, in his, quibus infes-
 riores collo partes usque ad renes & umbilicū vul-
 neratæ sunt. Hac non comparente, certè media, quæ
 ab ipsa diducta in iuncturæ apparet flexura, diuides-
 5 da est. Vbi enim uena (ut Galenus ait libro de phle-
 5 botomia) quæ parti affectæ propria est, obscurior
 5 fuerit, & ad mediarum aliquam aperiendam accedis
 5 omnino tibi conadum est, ut eam quæ à propria di-
 10 ducitur, potius incidas. Est uero, & quæ inferiores
sunt cubiti iunctura, eas scilicet quæ in uina existunt,
nihil lecare prohibeat, ubi nimirum quæ in cubito
sunt, non appareat. Sed eas certe, quæ in rectū sunt,
 id est, è directo sitæ, & à uenis quas in cubito si appa-
 15 ruissent, alioqui lecauimus, diductæ. Porro quem-
 admodum prædictæ omnes partes, ubi sic vulnera-
 tæ fuerit, ut sanguinis, ob causas superius adductas,
 egeant detractiōe, in cubito secta uena iuuantur,
 uti dictum est: sic quæ renibus inferiores sunt, illis
 20 quæ per poplites, & malleolos decurrūt. Ac perpetuò
 quidē in omnib⁹, dū sic reuellere studes, aut vacuare, *Vene popli-*
 & phlegmonē prohibere, uena quæ è directo est, ses- *tis & mal-*
 canda uenit. Manu tamen vulnerata (uti & eadem, *leoli, quādo*
 incipiente phlegmone, laborante sanguine ualenter *secanda.*
 25 ac nimis copiosè in eam irruente, crus quod è directo *Semper è di-*
 est, reuulsioni gratia tibi scarificandum erit. Altero *recto secāda*
 uero crurum sic ex uulnere malè habente, reliquum *vena.*
 crus scarificabis, aut in eo poplitis, aut malleoli ve- *Auersio à*
 nam secabis, vel certè potius (ut consulit Aëtius) ex *manu, et ab*
 30 brachio quod è directo est, sanguinem detrahes. Si *altero crure.*
 autem renes, vel partes illis adiacētes, recens uulnus *Si renes, aut*
 acceperint, quod sanguinis emissionē desideret, vel *partes circū*
 propter ipsius affectus magnitudinem, vel ne phleg- *posita vul-*
 35 gmone tententur, uena in cubito interior incidi de- *nus accepe-*
 bet, tamen si renes ipsi ambigant, quibus partibus, *runt.*
 superioribusne, an inferioribus adscribi debeant, ut
 Galenus annotauit, libro de curandī ratione per san-
 guinis missionē. Verisimile enim est, plus sanguinis

226 Institut. Chirurgicarum, Lib. II.

ad ipsos ex superioribus partibus, quàm ex inferioribus confluere. Non negauerim tamen, quin & ex ceteris sanguis commodè detrahi possit. Ceterum in hac re tam ardua, tamq; magni in arte medici momenti, nihil vnquam moliri debet chirurgus, citra periti alicuius medici consilium, vt iam alibi semel, atque iterum monuimus.

De purgatione in vulneribus molienda.

Aluus quando ducenda in vulneribus.
Purgatio quando in vulneribus necessaria.
Hipp. lib. de vlcibus.
Morbi magnitudine indicatricè esse purgationem.

SI vulneratus aluo fuerit adstricta, ea indita glâ¹⁰ de, aut clysteri iniecto subducenda est: vel cassia aut manna, aut aliquo eiusmodi leniente medicamento per os accepto, citanda. Porro si vitiosi succi in vulnerato corpore subsit abundantia vel vulnus præualidum sit, puro etiamnum existente corpore, & citra cacochymiam, iis lenibus modò dictis auxiliis nequaquam contentus eris, si saltem Hippocratem ducem sequutus fueris, & eius interpretem Galenum: sed fortioribus pharmacis, purgationem per aluum molieris. Scribit nanque Hippocrates,²⁰ & post eum Galenus (qui nec cassiam, nec mânâ nouerant) purgationem per aluum his vulneribus valde vtilem esse, quæ in capite sunt accepta: item quæ in ventre & articulis. Præterea in iis quæ suuntur, aut deligantur, id est, quæ adeò magna sunt, vt futuris indigeant, aut si non his, certè deligatura. Sic autem ad verbum scribit Hippocrates. Purgatio per aluum plarisque vlcernum prodest: præterea vulneribus quæ in capite sunt accepta: item quæ in ventre, tum inferiore, tum superiore (qui sub thorace est) & articulis. Adhuc iis in quibus ossi caries impendet. Præterea quæ suuntur, & exeduntur, & quæ serpunt, & reliquis quæ vlcera diuturna reddunt, etiam quæcunque deliganda sunt, per aluum purganda sunt. His itaque verbis (vt Galenus ait, locum hunc Hippo. exponens) clarè docuit Hippocra. vlcibus, omnibus & vulneribus, quoties præualida sunt, purgationem esse vtilem. Atqui purgantia

gātia medicamenta, quæ Galeno & Hippoc. in usu ^{tionis adhi-}
erant, multo sunt vehementiora (ut ex eorum scrip- ^{bēda in vul-}
tis constat) quàm vel calsia, vel manna, vel etiam ^{neribus.}
rhabarbarum, quæ priscorum seculo ignota fuerūt.

Si ergo illos imitari voluerimus, fortioribus medica-
mentis corpora nō modò in diuturnis vlceribus, sed
in recentibus quoque vulneribus repurgabimus.

Quanquàm ea non probentur recentioribus medi-
cis, ob eas causas, quas mox subiungemus. Meminit

10 autem eo loci Hippocrates seorsum, eorum omniū,
propter quæ, non modò vulnera ac vlcera, sed etiam
reliqua alia omnia vitia, grauius magnacq; reddūtur.

Nempe præstantiæ partis, cacoëthiæ, & magnitudi-
nis affectus. Purgationis igitur in vulneribus adhi-

15 bendæ, duæ potissimæ sunt, veluti & missionis san- ^{Due purga-}
guinis, indicationes. Nempe morbi magnitudo (quæ ^{tionis in vul-}
omnium primus adinuenit Hippocrates) & vitiosi ^{neribus ad-}
succum abundantiæ, quod Galenus quarto Methodi ^{hibēda, indi-}
cationes.

20 Medendi iis verbis expressit. Purgatio non in sola ^{vis morbi.}

25 vitiosi succi abundantia conuenienter suscipitur: sed ^{Succoris}

30 sicut missio sanguinis, vel propter ipsius abundan- ^{abundantiæ.}

35 tiam, vel propter morbi magnitudinem, ita purga-

40 tio, & propter abundantiam alterius cuiusquàm

45 succi, & propter vim morbi adhibetur. Igitur cū

in vulnerato corpore vincit sanguis, eius redundan-

tiam venæ sectione statim vacuabis. Cū verò

succorum vitium abundat, pharmacum adhibebis,

quod ad flauam bilem, vel atram, vel pituitam edu-

50 cendam vim habet. Sed & per vomitum quan-

doque vacationem molimur in ipsis vulneribus,

55 si saltem Galeno assentimus. Si enim (inquit) fluxio

60 valenter irruat, reuellere ad contraria studebimus,

65 vtrique si in superioribus vulnus consistat, per infer-

70 na purgantes. Sin autem in inferioribus sit superio-

75 rem ventrem vacuantes. At si iam fluxio resistit,

atque in membro inhæsit, deriuare per vicina

magis expedit. Quibus verbis nos docet Galenus,

Vomitum in
vulneribus
vtilis.

Li. 4. Ther.

228 Institut. Chirurgicarum, Lib. II.

Scopus alius purgationis in vulneribus. purgationem interdum adhiberi in recentibus vul-
neribus reuulsionis ad contrarium (quam Græci an-
tispaſin vocant) gratia. Quæ etiam conuenienter
ſuſcipitur, tametſi nulla in corpore ſubſit vitioſi-
Antispaſis. ſucci abundantia, quam vacuare intendamus.

*De Pot. onibus, quæ Vulneratis ex-
hiberi conſueuerunt.*

*Valeria me-
dicamenta
purgantia in
vulnerib. re-
centibus ſu-
ſpecta eſſe.* **Q** Vanquàm autem Gale. & Hipp. purgationē
in vulneribus, per valida etiam medicamēta, 10
quæ ſuis temporibus in vſu erant, adhibendā
eſſe præcipiant. Nos tamen eiſuſmodi valentibus me-
dicamētis, in recētibus vulneribus, nec vti cōſueui-
mus, nec cuiquāv tendū eiſe cōſulimus. Sicuti neque
aliis potionibus, quas nōnulli recēs vulneratis propi- 15
nant. Quādoquidē purgātia iſtiusmodi medicamēta
& pocula (vt ſic dicā) vulneraria, quæ cōmuniter of-
ferūtur, facultate calida ſunt, & aperientia. Proinde
& ſanguinē cōmouent, & hæmorrhagiā concitant,
vulnuſq; ad inflāmationē atq; abſceſſus diſponunt. 20
In diuturnis tamen vlceribus, fiſtuloſis, & cancroſiſ,
illis audacēter vtimur. Adhæc, cū ſanguis in in-
terraneis in grumos concreuit, & cū purulenta col-
luies in pectore collecta eſt. In glādulis quoque in-
terioribus, ſtrumis, ac herniis, ſeu (vt dicūt) crepaturis, 25
vt ſuis locis dicetur, quādoque purgationē cōce-
dimus. Qui tamē Guidonē præceſſerunt chirurgi, vt
Rogerius, & quatuor illi famati magiſtri, in omni-
bus indiscriminatim vulneribus, itidē & in fracturis
omnibus potiones offerebāt, cōfecias ex rubia, ſeu 30
erythrodano, quam vulgò rubeā maiore vocant (ex
qua plus quā ex cæteris aſſumūt) tanacero, ſeu atha-
naſia, cānabe, braſſica rubra, myrrhide (quæ ſpecies
eſt gerani), vulgò herba Roberti nūcupata) geranio 35
altero, qui noſtris herbariis pes colūbinus appellat-
tur, ſymphytō, quā aperta ſignificatione (licet non
ſatis cōcinnē) poſteriores Latini cōſolidā vocāt: plā-
tagine, cynogloſſo, hoc eſt, linguā cānis, pimpinella,
elatine,

- elatine, quę pilosella vulgò nominatur, caryophylla
 ra, & consimilibus. Ex quibus quidē succū exprime
 bant: vel ea in aqua vino, & melle decoquebant. Et
 vnoquoq; die, ex succo aut decocto ipsorum, quan
 titatem seiscuncię, id est, vncię vnus & semis manē
 5 ieiunis offerebant. Super vulnus verò manē etiam,
 & vespere folium brassicę rubentis inuersum ap
 ponebant, & facta decenti ligatura manē rursum,
 & vespere ipsum commutando: ita relinquebāt.
 10 Asserunt autē eiusmodi Empirici vnum: quod ego
 planē ridiculū iudico. Nempe quòd si portio assump
 ta, vomitione reiiciatur sinistrum quid portendī.
 Si verò eā ventriculus continuerit, & talis per plas
 gam egrediatur, qualis per os assumpra est, faustū,
 15 ac bonum quoddam omnē portendī. Sed hęc si diis
 placet, vera sunt. Ceterū in maiore adhuc errore ver
 santur, Theodoricus, & Henricus, qui recēter vulne
 ratis, præsertim in capite, & pectore, fortissima quę
 dā & calidissima pigmēta (ita enim vocāt portiones
 20 quasdā ex melle vino, & puluere res multas vehe
 mēter calidas recipiēte, cōpositas) cū quibūdā exorcis
 mis, seu adiurationibus propinabāt: aut ex iisdē res
 bus veluti pulticulā cōficiebāt, quā in modū empla
 stri super linteolū extensam, vulneri apponebant.
 25 *De ratione victus in vulneribus, & continui solutione, ob
 seruanda, a medico præscribenda.*

*Modus &
 tēpus portio
 nis exhiben
 de.*

Fabulosum.

*Error The
 odo. & Hē.*

*Vide Theo.
 libro. 2. fac
 chirurg.
 cap. 3.*

- V**ulneratis primis septē diebus (intra quos vt
 plurimū securi esse solēt febre & inflamm
 30 tione victū tenuē, & parcū, frigidū quoq; &
 humidum, præsertim si iuuenes, & plethorici fue
 rint, atque ambiens calidus instituto.
 Vinum omnibus, dum febris, dum inflammatio
 est, interdicto.
 35 A carnibus duris, & valētibus, piscibus magnis,
 & prauum succum generātibus, pane non feruens
 tato (quem azyum vocant) malē subactō, & im
 probē cocto, eos arceto.

*Victus te
 nuis.*

Vinum.

Carnes.

230 Institut. Chirurgicarum, Lib. II.

Caseus. Caseum, præsertim falsum, & veterem, frus
Fructus etc. ctus ferè omnes, allia, cepas, sinapi, salita omnia,
 & acria, nec non species omnes aromaticas, ne gus-
 tent, admoneto.

Auicula. Perdices autem, pullos, atque auiculas, quæ in s
Ptissana dumetis versari solent, aqua rosarum alteratas: ptiss
hordeacea. sanam hordeaceam, quam vulgò hordeatū, & hor-
 deum mundatum appellant: item lac amygdalinum
 & quod auenatum vocant: iura quoque, carniū
 simplicia, aut cum ouis præparata, illis in cibum 10
 permittito.

Olera. Ex oleribus, lactucam, portulacam, boraginem,
 (quæ buglossum est hortulanū) præterea olus, quod
 Arabes aspanar, nos verò nomine parū mutato,
 spinacium, & spinargium dicimus, & alia id genus, 15
 illis concedito.

Aqua pro Aqua cocta illis potus esto: sed in qua cibarius
potu. panis, qui Græcis syncomistos appellatur, vel pluris-
 mum furfuris habens, sordidus dictus, maceratus
 fuerit. Vel eius aquæ simplicis loco, cremor ptissas 20
 næ, aqua hordei, vel (si debiles, aut senes fuerint) vis-
 num aliquod stypticū, id est, austerū, quod crassæ sit
 substantiæ, plurimā aquā dilutū: aut si tenue conceda-
 tur, illud sit oligophorō, id est, parū aquæ sustinens. 25

Cæna. Breuem, ac frugalem illis cœnam imperato.

Friccio. Leuem frictionem, sed his partibus, quæ longius
 absunt à vulnere adhibeto.

Quies. Vt quiescant, iubeto. Optimū enim illis (inquit

Motus. Celsus) medicamentum quies est. Moueri autem, &
 ambulare alienum est, sed iis præsertim qui in infer- 30
 rioribus partibus vulnerati sunt.

Venus. Vt venerem summopere deuitent, submoneto.

Affectus Itē irā, cōtentionē, & oēs vehemētes animi motus.

animi. Cæterū vbi vulneratus à phlegmōe, & abscess- 35
 su fuerit assertus, pleniore victu tutò vti potest, &
 ad pristinam consuetudinē paulatim redire. Vtatur
Victus pau- igitur tūc vino aliquo generoso, & carnibus probū
lo plenior, sanguinem generantibus, ac naturam, hoc est vires
 refocil

refocillantibus. Cuiusmodi sunt carnes gallinarum *quando vul-*
 caporum, & veruecum, seu castratorum arietum, *neratis con-*
 & quæ eius generis sunt. Quod autem talis victus *cedendus.*
 ratio utilis sit, & accommoda vulneratis, ex eo com
 probatur, quoniam virtutem fulci, & corroborat,
 neque febrem commouet. Sed nec phlegmonas, nec
 hæmorrhagiã concitat, ac præter hæc, alimoniũ vri
 le & cõueniens sumministrat. Proinde hæc summo
 perè commendant, in recens acceptis uulneribus, tũ
 10 celebres medici: vt Galenus, Haly, Razes, Auicēnas
 tũ etiã recentiores chirurgi, Brunus inquã, Guliel
 mus à Salliceto, & Lanfrancus, à quorum sentētia,
 & opinione descuerunt, Theodoricus, & Henricus, *Vulnerati à*
 qui ab initio diætã vinosã, & calidissimã *vino per*
 15 vulneratis præter rationē imperabãt. Aiebant enim *initia absti*
 vulneratorũ imbecillã virtutē protinus firmãdã, *neant.*
 ac roborandã esse, idq; vini potione cõmodè præ
 stari. Quorum nimirum sententiã in totum aduersã *Vires i mor*
 20 tur Galenus libro primo Aphorismorum cõmenta *bis non esse*
 rio quarto, sic inquires, In ægrotantibus rarò acci
 dit: vt robur corporis maius reddere, quã acceperis *augendas,*
 25 mus, studeamus. Magna verò ex parte properamus *sed duntã*
 in longis quidem morbis fouere vires: in acutis ve
 30 rò parũ debilitatas cõseruare. Et subdit: Nam si eas *xat fouen*
 35 tales, quales accepimus, properemus in istis seruare *das, & ser*
 vel etiam augere, semper addemus ad morbum. *uandas.*
 Quibus verbis apertè docet Galenus non semper
 vires in ægris augendas esse: aut roborandas: sed sa
 tis esse interdum: si eas conseruemus: & fulciamus.
 30 Nisi forsan adeo imbecillæ: ac postratæ fuerint: vt
 quæ ab illis sumitur indicatio, cæteris aliis indica
 tionibus sit præferenda. Quod sanè in omnibus vul
 neribus non contingit. Adde quòd vbi contrariæ,
 & ex aduerso pugnantes inter se sunt indicationes,
 35 committendum non est: vt dum alteri nimium sis
 intentus, alterius omnino obliuiscaris: sed vtriusq;
 memor, quoad licebit, miscere eas oportet: vt libro
 septimo meth. mēden. Galenus nos edocuit. Quòd

Therap. 7.

232 Institut. Chirurgicarum, Lib. II.

Gal. 8. met. præceptum (inquit) vbiq; memoriâ teneri velim.
 Vnde & circa finē octauī prædictæ methodi sic in-
 fit. Ergo tum exercitatum in omnibus, tum naturâ
 prudentem esse medicum conueniet: quo cuiusque
 indicationis potestate diligēter cōsiderata, omnibus
 inter se collatis: vnam idonei victus summam: quæ
 laboranti sit commoda comparet. Itaque: vt semel
 dicam: vulneratis per initia: vsq; ad diē septimū (in-
 tra quod tēpus ferē solet phlegmone in locis vulne-
 re affectis exitari) vini vltus interdici debet. Nisi ta-
 men ex largo sanguinis profuuiō: viribus defuturi
 intermorientes appareant. Tunc enim ante vllam
 curationem (vt Celsus ait) vino reficiēdi sunt, quod
 alioqui inimicissimum vulnere est. Transactio verō
 diē septimo, illis (si nihil aliud prohibeat) innocuē
 vinum modicum: & aqua multa dilutum exhiberi
 potest. Nam si ad hunc vsque diem nec phlegmone
 tentetur: nec dolore afficiatur, in posterū tutus erit.
 Atque hæc de quarta intentione, quæ læsæ particu-
 læ substantiam conseruandam esse indicabat, dicta
 sufficiant.

*De quinta intentione, quæ medico chirurgico proponitur, in-
 curandis vulneribus, quæ est symptomatum correctio.*

*Symptoma-
 tu correctio.* **Q** Vintam intentionem, quæ est accidentiū sus-
 peruenientium correctio, & profligatio, asse-
 quimur, remedia cuique propria, prout res
 desiderat ad mouendo. Symptomata autem seu ac-
 cidentia, quæ consueuerunt euenire post accepta
 vulnera, & solutam vñionem, hæc ferē sunt: Dolor
 phlegmone discrasia seu intemperies febris, pruris
 tus, conuulsio: paraly sis, syncope, mentis aliena-
 tio seu delirium durities: atque impotentia membri
 vulnerati. Itaque vulnera nunquam ad integram
 curationem perducī possunt: nisi eiusmodi sym-
 ptomata prius abigantur. Symptomata enim quæ
 magnitudine superant suas causas, ordinem curæ
 peruertunt. tionis sæpē peruertunt immutant: atque interpel-
 lant

Iant: vt libro primo ad Glauconem: & duodecimo methodi medendi Galenus annotauit. Itaque operæ precium duximus, de horum singulis ordine, & continuata serie pertractare, à dolore sumētes initium.

De sedando dolore in Vulneribus.

Dolor omnis præsertim vehemens: etiā si purum ab excrementis totum corpus fuerit, fluxionis causa est. Particula namque quæ dolore affligitur succū: atq; in vulnere sanguinē maxime ad se trahit, copiosiorē: scilicet quā sit illi ex vsu: vnde & phlegmone in ea frequēter excitatur. Proinde summa cura protinus adhibenda est: vt dolor demulceatur: ac in totum, si fieri potest, sedetur. Dorem autem commodē sedamus in vulneribus: aut saltem mitigamus factō ad particulam læsam fove, vel ex rosaceo: si præsto adfuerit: vel si eius copia nō sit: ex oleo communi, quod modicē incaluerit. Quibus si ouī candidum: vel potius luteum (vbi magna non fuerit inflammatio, seu vehemens caliditas) adiciatur, præstantius adhuc auxilium efficies, neq; ita vulnus inquinabis. Quod si tam vehemens dolor extiterit: vt necessitate coactus fueris, aliquantulum vulneratam: ac dolentem particulam itupefacere, oleum papauerinum admouebis. Etsi maior cogat necessitas, opij momentum: vel mandragoræ (vt quidā rectē consuluerunt) adicies. Quatuor illi celebres magistri ad eum finem laudant radicem solani tritam, & axungia porci exceptam. Theodoriscus plurimum commendabat emplastrum ex foliis maluæ coctis, & in mortario contritis, cumq; furfuris cribratura commixtis. Quod si rosacei momentum prædictis adieceris, melius adhuc medicamentum reddideris. Medulla etiam panis triticei in aqua feruenti macerata, ad sedandos dolores (vt supra diximus) efficacissima est. Porro si dolor admodum vehemens est, neq; vllis, quantumuis generosis, auxiliis mitigetur, neruum tunc læsum esse

Dolor phlegmonas & fluxiones co-
cit.

Dolorē sedā-
tia in vul-
neribus.

Emplastrū
Theodor.

Rosaceum.

Medulla pa-
nis.

234 Institut. Chirurgicarum, Lib. II.

significatur. Proinde tunc ad ea quæ postea ad vuln-
nera nervorum scribuntur: tibi recurrendum erit.
Sed de iis, quæ dolorem leniunt, iterum ac multo fu-
sius libro sexto agemus.

Curatio aduersus vulnerum inflammationes, & abscessus.

*Inflamatio
quibus ma-
ximè vulne-
ribus acci-
dat.*

INflamatio in vulneribus tum maximè timen-
da est, cum vel os, vel nervus, vel cartilago, vel
musculus, læsionem accepit, aut vbi parum san-
guinis pro modo vulneris fluxit. Ergo quoties quid
tale erit, sanguinè maturè suppressere nō oportebit
sed pati fluere: dum tutū erit: adeo: vt si parū fluxis-
se videbitur, mitti quoq; ex brachio debeat: vtique
(inquit Celsus) si corpus iuuenile, & robustū, & ex-
ercitatum est: multoq; magis, si id vulnus ebrietas
precessit. Quodd si musculus læsus videbitur, præci-
dendus erit. Nam percussus punctū sue, præsertim
in eius capite, mortiferus est: præcisus verò per trās-
uersum, sanitatem recipit, hoc est, ab inflammatione,
& conuulsione vindicatur. Aliquis tamen ex partis
culæ motibus vitiabitur. Verū melior est (vt Gas-
lenus ait) læsio, quàm mors. Sic & nervum punctū
sæpe cogimur transuersum præcidere, quoties scilicet
vel conuulsiones: vel deliria, vel ambo magna
ægreq; sanabilia superuenire vulneratiōi cernimus.
Porro si iam inflammatiō, aut tumor aliquis præter
naturā, in vulneribus cōcitatus fuerit, curari debes
bit iuxta methodū superiore libro à nobis traditā,
in quo de tumoribus præter naturā abundè disserui-
mus. Cæterū tametsi pro locorum differentia (vt
libro primo de locis affectis Galenus ait) curatio-
nem quoque variari contingat, Auicennas tamen
omnibus indiscriminatim partibus à capite ad pes
des, emplastrum mirè ab eo commendatum admo-
uet, quod constat malo Punico dulci, incocto in vi-
no styptico, & postea in mortario subacto, atque
in emplastri formam redacto. Cæterū si enatus tus-
mor nec reprimentibus, nec per halitum digerentibus

Lib. 5.

3. meth.

*Melior est
læsio quàm
mors.*

*Emplastrū
Auicennæ,
ex malo Pu-
nico dulci.*

9

10

15

20

25

30

35

bus medicamentis cesserit: pus mouentia seu maturantia, admouenda erunt. Cuiusmodi ea sunt, quæ ad maturanda apostemata supra retulimus. Huius rei gratiâ iubet Rogerius fieri fotum ex maluis, absinthio arthemisia, & farina triticea, vino incoctis, quibus & mellis momentum addiciendum est, axū græ verò quod satis esse videbitur. Quod si pus per vulnus non vacuetur, aliud loco commodiore illi moliendum erit emissarium.

10 *De tollenda in uulneribus intemperie, quam discrasiam vocant.*

SI flammea quædam citra humorum affluxum dispositio, quam discrasiam calidam vocant, ^{si calida adsit intemperies.} vulnus occupauerit (quod ex rubore & vesicatione facile deprehendes) affectum locum infrigidare oportet, non hyoscyamo quidem, aut mandragora, quoniam plus iusto refrigerant: sed rosiss potius, & plantagine, atque vnguento albo, quæ præter id quod desiccant, moderatè etiam refrigerant. Si autem frigida intemperies locum obfederit (quam mollicies, & cutis liuidus color ostendunt) ipsum excalfacies, non resina, vel pice, aut asphalto, quod dæmonis sterCUS appellant: sed vino, & vnguento nigro: aut fusco, vel eo, quod basilicon vocat. ^{si frigida intemperies vulnus obfederit.} Quod si eiusmodi symptomata vulnus, seu plagā degenerare faciāt in vlcus, recurrendū erit ad ea quæ de vulceribus sequēte libro tradūtur. Porro si humida vel sicca adfuerit intemperies, suo quoque contrario pfligāda erit. Et ita de cōpositis intemperiebus ages, vt suo loco postea dicitur. Quod si febris vulneratū apprehēdat, victu refrigeratè, qualē in calidis præter naturā tumoribus descripsimus, laborādis vti debet. ^{si febris vulnerato acciderit.} Sed accersendus erit huius rei gratiâ peritus aliquis medicus, qui & cōgruam illi victus rationē præscribat, & reliqua ad febrē auxilia ex arte instituat, habita ratione ætatis, temperaturæ, regionis, temporis, consuetudinis, & id genus aliorum,

Cate

236 Institut. Chirurgicarum, Lib. II.

Lib. 5. Cæterum ne febris quidem ipsa terrere debet, si in magno vulnere, dum inflammatio est, permianet. Illa verò perniciofa est Celfo, quæ vel leui vulnere suo peruenit, vel vltra tempus inflammationis durat, vel delirium mouet, vel si neruorū rigor, aut diftentiō, quæ ex vulnere orta est, eam non finit.

De spasmo, id est, conuulsione vulnere accedente.

Spasmus quō fiat. Galeno.
Spasmos Græcè, conuulsio Latine est, vbi nerui, atque muscoli præter voluntatem conuelluntur, 10
 Sin eamq̃ dispositionem veniunt, quam etiam in moribus secundum arbitrium factis assumpserunt. Per hūc enim affectum, actio nequaquam ablata est, vt est in paraly si, sed solū immutata, ac vitiata, vt abundè testatur Galenus libro quinto de sympt^{as} 15
 matum causis, ad hunc modum scribēs, si Græca sal^{tem} 20
 tem Latina feceris: Cōuulsio neruos, musculosq̃ ad eundem cogit affectum, in quem ab animali faculta^{te} 25
 te cū naturalem habitū seruarent, ducebantur. Vt igitur voluntarius motus interim intentis versus principium, id est, cerebrum, musculis, interim ab ir^{ruente} 30
 ruente spiritu impletis perficitur, ita cōuulsio quo^{que} 35
 que accidere solet. Nam & spiritus inflare potens, in ipsis generatur, & complures etiam affectus, qui il^{los} 40
 los intendere queant, quemadmodū phlegmone. 45
Spasmus quid.
 Itaque spasmus siue conuulsio, motus est deprauatus, voluntariæ facultati motrici accidēs, à solo mor^{bo} 50
 bo (vt ibidem ait Galenus) seu morbosa dispositio^{ne} 55
 ne proueniēs. Proindè & neruosa est ægritudo, qua mouentur lacerti, id est, musculi, ad suum principiu^m, 60
 & extensioni sunt inobedientes: vt tertio canonum annotatur ab Auicenna. Neq̃ enim ad syndesmos, 65
 id est, copulas, seu ligamenta, conuulsio, sicuti neque paraly sis, propriè refertur: sed (vt Galenus ait tertio de locis affectis) eorum neruorum qui voluntatis im^{perio} 70
 perio obediunt, affectio est. Auerrois spasmus definiuit, cū membra sic cōtracta & rigida facta sunt, vt neque flecti, neque extendi quouis modo possint 75
 Porro.

Porro omnes cōuulsionis causæ, seu affectus omnes,
 qui conuulsionem pariunt, Galenus, & HippocraLibr. 5. de
 tes in duo capita reuocarunt: nempe in plenitudinē, symp. caus.
 & inanitionem, corporum uidelicet neruoforum, à 3. de lo-
 quibus secundum electionem motus perficiuntur. cis affect.
 Itaque phlegmone, id est, inflammationes, plenituDue in rni
 dinem pariunt: ardentissimæ, & aridissimæ febres, uersum con
 inanitionem. Sed neruosa corpora omnia, inquit Gauulsionis cau
 lenus, tendi posse, siue oppleta sint, siue inanita, dese, Gale. &
 clarant musica instrumenta. Etenim rumpuntur Hippo.
 chordæ, siuæ in humidum, vaporibusq; scatens, siue
 in aridum squalensq; cubiculum, intentis etiam
 dum chordis, instrumenta collocaueris. Proindē huius
 rei haud ignari artifices, eas priusquam reponan
 tur, laxare solent. Sed quomodò affecto aëre tenTertio de
 duntur chordæ, ut rumpantur, si vel nimis aridus, loc. affect.
 vel admodum humidus sit? Nempe humor inadefas
 cit ipsas, ut in tumorem præter naturam attollanTertia cau
 tur, qui mox eas extendit. Ac veluti sol tergora aresa cōuulsion-
 faciens ipsa contrahit, ita siccitas chordas, & trahit, nis, addua
 & extendit. Sic lora quoque cum ad ignem exiccantab Auic.
 tur, contrahi, tendiq; videntur. Tertium caput seu
 tertiam causam addit Auicennas, quæ tametsi masa cōuulsion-
 teriæ haudquaquam, saltem per initium, propornis, addua
 tione respondeat, noxam tamen (inquit) contristans
 tem cerebrum inducit. Proindē nerui, hanc ceu moab Auic.
 lestum quidpiam refugientes, contrahuntur, & ad
 suam recurrunt originem, adnitiuntq; interturbans
 tem causam ipsam expellere. Qui barbaram sesCōuulsiotrā.
 ciuntur medicinam, spasimum non proportionatum
 ad materiam nominant: quia scilicet non accidat ob
 materiam, quæ implere, aut inanire partes neruofas
 possit, sed prona potius aliqua qualitate. Tribus
 igitur modis fit conuulsio, inanitione, repletione
 seu plenitudine, & compatiendi societate, hoc est, bus modis
 cerebro lege commertij patiente, & alteratis per
 continuationem partibus, ut contingit in conuuls
 sione, quæ fit ab ictu feræ cuiusdam venenatæ.

Primus

238 Institut. Chirurgicarum, Lib. II.

1 Primus modus, qui scilicet fit propter euacuatio-
nem seu inanitionem, accidit in superfluis purgatio-
nibus, & in copiosis, atque immoderatis sanguinis
profusionibus: quem conuulsionis modum (si qui-
dem accepto vulnere acciderit) malum ac periculo-
sum esse testatur Hippocrates, hoc Aphorismo: Vbi
sanguis plurimus fluxerit, singultus, aut conuulsio
superueniens, malum. Crebrò enim mortem adfe-
runt. In magnis quoque, ac vehementissimis ardori-
bus, & adurentibus (vt dictum est) febribus, ac col-
liquante putrilagine, hic conuulsionis modus, eue-
nire consuevit, malum sanè maximum, & penè insa-
nabile, vt Galenus annotauit in commentario illius
aphorismi Hippocratis, Febrem conuulsioni super-
uenire, melius est, quàm febri conuulsionem. Secun-

2 *Secundus con-
uulsionis mo-
dus ex reple-
tione.* dus conuulsionis modus fit propter inflammatio-
nem, & alios tumores præter naturam (quos omnes
iudicata vocat Hippocrates) in vulneribus de repen-
tè disparentes seu euanescentes, vt in fine quinti
Aphorismorum hac sententia testatus est idem Hip-
pocrates: Quibus tumores in vulneribus apparent,
non conuelluntur maximè (id est, non admodum,
seu non valde spasmo corripiuntur) neque insaniunt.
Verùm his deletis, atq; euanescentibus, de repente
quibusdam à tergo, siue retrò, conuulsiones & dis-
tensiones fiunt: quoties scilicet (vt in commentario
ait Galenus) vulnera ponè, id est, à tergo infestant.

*Frigus con-
uulsionis cā.*
Apho. 17.
lib. 5. Immoderata quoque frigiditas nervosis partibus
adueniens, hoc conuulsionis genus inuehit, nervos
enim in vnum cogit, stipat, cohibet, atque implet.
Quod & hoc aphorismo expressit Hippocrates.
Frigidum, conuulsiones, distensiones, liuores, rigo-
res febriles [inducit, supple, vel adfert.] Sicuti enim
nequaquam conuenit, nervos ipsos, seu ipsorum ner-
uorum substantiam, ab immodico calore dissolui,
sic neque plus iusto, & ultra modum conueniens
tem, refrigerari, substringi, & in vnum cogi, ac stris-
3 *Tertius co-* pari. Tertius conuulsionis modus dolore excitas-
tur,

tur, cuius communis causa est, autore Platone in Timæo, pathos præter naturam, violenter, & affatim incidens. Ab his enim (inquit Hippocrates Plato ne vetustior) quæ naturam mutant, ac corrumpunt, dolores excitantur. Hac quidem uocula (corrumpunt) & celeritatem, & vehementiam transmutationis indicans. Porro vehementes eueniunt in tactu, (qui inter reliquos sensus dolore maxime afficitur) à naturali habitu transmutationes, ob violentum calidi, frigidiq; occursum, arque ob eas res, quæ contundere, secare, pungere, extendere, aut erodere possunt. Quippe res huiusmodi dolorum causæ reputantur. Nervosarum igitur partium punctura, acres quoque, & mordaces humores, aut venenosa aliqua qualitate præditi, in uulneribus motum hunc tertium conuulsionis substantiam diuelendo excitant. Quod de punctura diximus, testatur Galenus libro artis medicinalis cap. nonagesimo secundo, sic inquit: Nerui verò & chordæ punctura, propter sensus vehementiam, & quoniam hæc pars principio, hoc est, cerebro continuatur, promissa est ad neruorum conuulsionem excitandam. Ac tum præsertim, cum nihil extrorsum expirat, obcæcat cutis vulnere. Hactenus Galenus. Acres autem, æruginosos, & venenosos succos per consensum, & velut quadam partium conspiratione conuulsionem inducere, ostendit Galenus in commentario huius aphorismi Hippocratis, Conuulsio ex elleboro lethalis est. Verum conuulsionem istam, quæ accidit iis, qui ab elleboro albo (hunc enim simpliciter elleborum nominare consuevit Hippocrates) purgati sunt, non absurdè ad secundum genus conuulsionis (quod fit ex inanitione) quispiam adduxerit. Quandoquidem humores ipsi acres, & mordaces, vim habent exiccandi, atque inaniendi. Contingit autem & propter ipsam euacuationem, citra mordentes succos, iis, qui supra modum perpurgantur, conuulsione aduenire. Fit enim ob pharmaci, seu

uulsioni motus ex communi patiendi societate.

Doloris causa.

Causa conuulsionis ex consensu cerebri facta.

Conuulsio ex elleboro albopha. I. lib. 5.

*Purgas me-
purg*

dicamentum interdictum conuulsione inducit. purgantis medicamenti functionem, vim, atque efficaciam, vt ex nervis humiditates attrahantur, & ita resiccata violentius ipsorum nervorum substantia, conuulsio enascatur. Sed & per vomitiones, quas veratrum epotum concitat, accidit, morsus ratione, conuulsiones fieri, ex consensu videlicet, communicatuq; & velut quadam partium conspiratione: nempe perpehsis, ac distentis nervis, qui ventriculi hostiolo, seu orificio consentiunt. Sic quoque in vulneribus confortij lege contingit subindè conuulsionem fieri, excitato in nervosis corporibus (à quibus motus secundum electionem perficitur) dolore.

Partes motui voluntario famulantur.

Sunt autem nervosæ partes, motui voluntario, ac secundum electionem & desiderium facti, seruiens, nervi, ligamenta, muscoli, & tendones. Hæ igitur, & potissimum nervi, vbi ingenti aliquo dolore afficiuntur, cerebrum ipsum (quod est nervorum omnium cõmunis origo, vt in arbore caudex, ramorum) huius noxæ confors statim efficitur, fitq; (vt dixi) propter compatiendi societatem cõuulsio, quam non debemus existimare fuisse ab Hippocrate prætermisam. Etenim conuulsionem quæ infestet primaria ratione explicuit, dum fieri conuulsionem vacuatione seu inanitione, repletioneq; sanxit. Cæterum ex præfatis conuulsionibus, quædam sunt vniuersales, quædam verò particulares. Vniuersalis conuulsio dicitur, quando noxa cerebro communis catur, & ad ipsum peruenit. Vbi autem noxam illam senserit, tanquàm molestum aliquid, vehementi conatu eam nititur expellere. In quo quidem conatu nervos ipsos, & alia nervosa corpora contrahit, & conuellit. Particularis verò conuulsio fit, quando noxa non peruenit ad cerebrum, sed in particula affecta remanet, ipsam contrahens, atque in-

Conuulsio duplex.

Vniuersalis.

Particularis.

Vniuersales conuulsiones. Morbus comitialis.

curuans, Ideo autem conuulsiones vniuersales dicuntur, quia maiorem partem membrorum occupant. Quod quidem dictum est ad differentiam epilepsia, quam comitalem morbum vocamus. Hæc enim partes

partes omnes apprehendit, atque ideo conuulsio totius corporis, seu omnium corporis partium merito dicitur, non iugis tamen ac perpetua (ut in emprostho tono, & opisthotono, atque tetano, id est, neruorum rigore videre est) sed quæ ex temporum accidit intervallis, hoc est quæ interpellata est, atque intermissa, cum mentis ac sensuum oblatione, in quo & à iam dictis conuulsionum generibus discriminatur. Accidit namque, ut is qui comitiali morbo conciderit, neque videat, neque audiat, neque ullo sensu quicquam percipiat, ac ne consequi quidē possit, quid factum sit. Siquis dem cum memoriæ viribus, ratio quoque læditur, ut libro tertio de locis affectus Galenus annotauit. Hæc autem in spasmo de quo nunc agitur, minimè solent accidere. Cæterum accuratius atque exquisitius conuulsionis differentias, causas & generationis ipsius rationem ac modum perquirere, alterius est speculationis. Proinde ac præsens ea consultè omitemus.

Satis enim chirurgus nunc fuerit, si quæ de conuulsione diximus, probè intellexerit: si & tum communia, tum particularia differentiarum ipsius signa cognouerit, ac periculoso huic symptomati (ne accepto vulnere aliquando eueniat) prospicere atque occurrere possit, & iam præsens remediis topicis, accommodis, & ex arte institutis profligare.

De signis Spasmi.

Communes conuulsionis notæ sunt, ægra seu difficilis membrorum dimotio, colli tensio, labiorum contractio, ac si vellet ridere: maxillarum, dentium, & gutturis adstrictio siue stricture: oculorum, & totius faciei (ut dicunt) tortura seu peruersio. Si conuulsio ex inanitione apprehenderit, non repente, sed paulatim, ac post morbos corpus extenuantes, omnemque eius humiditatem absumentes, accidere solet. Ut exempli gratia, post largos sudores, aut vomitiones immoderatas, aut alui deiectiones copiosas aut immodicas sanguinis profusiones. Itè post famem,

Quo differat
spasmus
ab epilepsia.

Cætes notæ
conuulsionis.

SIGNA
conuulsionis
ex ianitrice.

242 Institut. Chirurgicarum, Lib. II.

vigilias, sollicitudines, motus tum multos, tum vehementes, aridas æstuentesq; febres. Cum enim hæc & alia (si quæ sunt) id genus, conuulsio subsequitur, causam eius esse ariditatem, ex inanitione rectè putaueris, vt Galenus annotauit libro tertio de locorum affectorum notitia. Si verò ex sanis alicui repentina superuenit conuulsio, ob repletionem eam fieri necesse est: & maximè quidem, si id vitij euenire sic repente conspexeris, temulento cuiuspiam, ac omnino pleno homini, qui videlicet in otio degit. Item si post tu mores aliquos præter naturam subito deletos, atque (vt paulò antè dictum est) euanescentes, vel post frigiditates condensantes, atque in vnum nervos cogentes, sanum aliquem sic repente conuelli contigerit: equidem nervi replentur à frigidis, & glutinosis humoribus, ex quibus etiam nutriuntur, vnde conuulsionem patiuntur. Itaque his præcognitis, ac diligenter perpensis, haud difficile inuentu fuerit, vtrum ab ariditate, quæ est humidæ essentia defectus, & vacuatione, seu inanitione: an ab humoris plenitudine, quæ egestati, seu inopia, & inanitioni aduersatur, & ab Hippocrate repletio nominata est, affectus ipse prodierit. Spasmi autem, qui propter compatiendi societatem, hoc est cerebro consortij lege, seu (vt dicitur) per consensum affecto, enascitur in vulneribus, iis notis deprehendes. A causis externis excitatur, cum dolore, morsu: & molestia affligit, ac crudeliter laborantem excruciat.

Spasmi iudicia, seu prasagia.

Prasagia.

SI conuulsionis noxa, membris spiritalibus, ac respirationi subseruientibus communicetur, tum scire licet, ægri salutem esse deploratam, ac subis tam mortem futuram.

Conuulsio ex consummata siccitate.

Spasmus absolutus, seu (vt dicunt) confirmatus, præfertim si ex inanitione est, & nervorum siccitate, prorsus incurabilis est. Absoluta enim siccitas, & prorsus consummata, insanabilis est Galeno libro. methodi

NOTAE
conuulsionis.
ex repletione.

Spasmi ex
consensu cerebri
note,

30

35

methodi medendi septimo.

Quod si ex siccitates non prorsus adhuc consummata, conuulsio enascatur, interdum (sed vix, ac non facile) ³ *Conuulsio ex* curationem admittit. Longum enim tempus (ut in siccitate non *soluta.* commentario sequentis aphorismi Galenus ait) exiit prorsus abigitur ad siccitatem remouendam. Atqui morbi acuties ac vehementia tempus non expectat, quin cito vires dissoluit, & subito exitium adfert.

Quæ verò ex repletionem fit conuulsio, sanabilis ⁴ *Conuulsio ex* est, per euacuationem. Repletionem enim contraria est *repletionem.* euacuatio. Quod & sequenti aphorismo innuebat *Aph. 26. li. 2* Hippocrates, Febrem conuulsioni superuenire melius est, quam febri conuulsionem. Febris enim conuulsioni ex repletionem superueniens, humores frigidus, & glutinosos, ex quibus orta est ipsa conuulsio, solita est magna ex parte excalfacere, attenuare, atque dissoluere.

Si verò ex febribus adurentibus totum corpus ⁵ *Conuulsio ex* exicceretur, & neruis deinde ex siccitate conuulsio accideret, hoc maximum (inquit Galenus) est malum, & *febris adu* *renibus.* penè insanabile.

Curanda conuulsionis methodus.

²⁵ **P**ostquam de differentiis, causis, signis, & iudiciis conuulsionis, abundè satis tractatū est, par est, deinceps eius curationem exequamur. Esto igitur illud primū ac cōmune præceptū in omni conuulsione obseruandū. Partes quæ cōtrahuntur, conuellanturve, valenter cōtinendę sunt, & inordinatis ³⁰ resistendū motibus. Oleo in hūc vsum eas perfricare oportet ex liliis cōfecto, vel si eius copia nō sit, oleo cōmuni, tum aquā mulsam assumere. Eos verò qui ex inanitione citra febrē cōuelluntur, hoc pacto curabis. Oleo, aut certè hydreleo calido, partes conuulsas primū foueto. Deinde, si nihil prohibet, etiā ³⁵ ad lauacrū deducito, tēperatoq; solio vtor, cū oleo, & frictione lenissima. Iuuat quoque in calidū oleum totum descendere, vel in aquā calidā dulcem, in qua

Obseruanda in omni conuulsione. Curatio conuulsionis ex inanitione. Totus. Bainex ex oleo, & hydreleo.

244 Institut. Chirurgicarum, Lib. I I.

Humectan- humectantia quædã, & leniëntia decocta sint. Vt sunt
tia & leniē capita, & extremitates agnorum, hædorum, vituloz
tia. rum, & arietum pinguium: item maluarum, ac viol
Vnctiones. larum folia, althææ radices, semen cydoniorum, & id
 genus alia adiecta olei parte tertia. Sunt qui ad eunz
 dem vsum iubent laborantes sæpius in labrum lacte
 caprillo, aut bubulo plenum descendere: atque vbi
 caldarium seu lauacrum egressi fuerint, oleis hume
 ctantibus, vt oleo violaceo, & amygdalarũ dulciũ: si
 ea non adfint, oleo communi optimo: sine id quidem
 est, adipe non vetustissima, gallinæ præsertim, hædi
 aut vituli, ceruicem, & scapulas, & spinam iunctus
 ras quoque, & muscutorum capita, perfricant. Quis
 dam autem infrà scripto linimento totam spinam,
 iuncturasq; omnes magna vtilitate illinire consueue
 runt.

Linimentũ. R. olei violarum vncias quatuor, olei amygd.
 dulcium, pinguedinis gallinæ, medullæ crurium vi
 tuli, ana drach. sex, pinguedinis vituli, & hædi ana
 drachmas decem. Bulliant omnia simul in decoctio
 ne maluarum, radicum althææ & seminis cydonio
 rum, vsque ad consumptionẽ ipsius decoctionis des
 inde colentur, & fiat linimentum. Porrò frictio cum
 omnibus in homine vertebis vtilis sit, tum iis præ
 cipuè, quæ in collo sunt, cum manus, & brachia, con
 uulsio maximè inuadit. Quòd si febris adfit, non hu
 mectantia modò, sed refrigerantia quoque in hydrez
 læo, id est, miscellanea ex aqua, & oleo, decoquenda
 erunt. Cuiusmodi sunt folia salicis, hordeum confra
 ctum, violæ, nymphaea (quod nenuphar appellant)
 aut eius farinæ quopiam aliquo. Ergo die nocteq;
 (est enim grauis, admodum importunus, acutusq;
 morbus conuulsio) interpositis tamen quibusdam
 breuibz interuallis, iis remediis, hoc est, fotibus,
 balneis, & vnctionibus, vtẽdum est. Dum ea inter
 mittuntur, imponendum malagma, aut cataplasma
 aliquod est, ex eiusmodi humectantibus, & leniens
 tibus, itidem (si res exoptulet) & refrigerantibus,
 contrà quàm in conuulsione, quæ ex plenitudine or
 rum

De Plagis, seu cruentis uulnerib. 245

rum habet. Hæc enim vacuantia, ac digerentia, calefacientia quoque, & cum ex humore procreata sit) siccantia desiderat, ut mox dicemus. Caterum qui ex siccitate (quæ inanitionis est comes) cōuelluntur, nutriendi sunt sorbitionibus ex condro, & alica: si hæc non adsunt, ex lactæ, aut hordeato, aut à pullis mollibus, vel agniculis, vel hœdis tenerioribus, iure aliquo assumpto: itemq; ovis sorbilibus. Vinū quoque tenue, & aquosum, quod faciliè per omnia corporis membra distribuitur, illis exhibebimus, aut saltem cum suis iusculis, ut ea promptius permeent, remiscebimus, nisi tamē febris accesserit. Tunc enim pituitiæ cremor magis offerendus est, somnusq; accersendus. Hic enim præterquàm quòd vires omnes reparat, plurimū etiam humectat. Vigiliæ verò cū ex iis sint, quæ maximè euacuant, & exiccant, cōuulsionem ex siccitate accersunt, & augment. Indendi etiam sunt clysteres ex lacte, & ex eodem conficienda gargarismata. Itaque (ut semel finiam) in hoc cōuulsionis genere, curandi methodus, vnicum habet scopum, nempe humectationem. Quem certè (ob superius adductam rationem) non faciliè est assequi. Aegrius nanque curantur, quæ in humido siccoq; habentur alterationes, quàm quæ ex calido & frigido consistunt. Hæ enim maximè actiuis qualitatibus corriguntur. Illarum verò curatio imbecillis, & (ut sic dicam) magis materialibus, & passiuis qualitatibus, perficitur, potissimumq; cum humectandū esse requiritur, ut libro septimo suæ methodi Galenus nos edocuit. Si tamen vlla spes curationis est, in suprā memoratis remediis consistit. Itaque tametsi malum hoc ferè sit immedicabile: cū tamen sæpe etiam præter expectationē quædam eueniant, curatio venit aggredienda.

Alimēta in cōuulsione ex siccitate facta idonea.

Somnus conciliandus.

Ex 7. methodi med.

Curatio cōuulsionis ex plenitudine.

IAm verò spasmus ex humiditate, & plenitudine ne curabis pereuacuantia. Vacuare autem oportet, & à toto corpore, & ab ea parte quæ cōuellit.

Vacuatio à toto corpore

Porro à toto corpore plenitudinem vacuamus,
 duobus potissimum auxiliis, nempe sanguinis mis-
 sione, & purgatione. Sanguinem mittemus maxis-
 me, in quibus vel multus sanguis abundat: vel phleg-
 mone cōuulsionem excitauit, etiā si laborās, prorsus
 redūdantiæ sanguinis sit expers, modò nihil ob-
 stiterit eorum, quæ sanguinē mittendum dehortan-
 tur. Venæ autē secandæ electio, ex laborante phleg-
 mone, ac conuulsione, particula: tibi indicabitur.
 Modū verò seu quātitatē vacuationis inuenies, tum
 ex redūdantiæ modo, tum ex reliquis, quæ in sectio-
 ne venæ spectanda & estimāda sunt: Nempe ex ætas-
 te, natura tempore anni, consuetudine, regione, cœ-
 li statu, & ante hæc ipsa laborantis virtute. Cæterū
 sic: vt oportet, facta per sanguinis detractionem, to-
 tius corporis vacuatione, & humorum influētium
 auersione, mox phlegmones curationem aggredies-
 ris. Cuius (vt & omnium aliorum tumorum, qui præ-
 ter naturam cōsistunt) si iam facta est, caput seu scō-
 pus præcipuus est, infestantis humoris vacuatio.
 Cum enim phlegmone duplici ratiōe (vt Gale. ait)
 à natura recedat, & quòd pars ipsa multo sanguine
 sit referta: & quòd eadē sit calor: utiq; vacuationis
 indicatio, refrigerationis indicationē vincit. Quòd
 si adhuc in generatione est, in hac prior vacuatione
 est, cōfluentis ad affectū locum sanguinis inhibitiō.
 Sed de hac alibi abundè dictum est. Vbi verò cor-
 pus vel flaua bile, vel atra, vel pituita, vel serosis hu-
 moribus, refertum fuerit (quem habitum Græci ca-
 cochy miā nominant) tum purgatione, quæ cuiq;
 superanti succo sit accommoda: vacuationem mor-
 liemur. Verū enim uerò, quoniam conuulsio ex
 humiditate seu plenitudine, qua sani etiā repentē
 capiuntur, magna ex parte, à pituitosis humoribus
 crassis, glutinosisque in ipsa neruorum partium
 substantia infarctis, procreari solet, eius potissi-
 mum, quæ ab hac causa ortum habet, curationem
 subiiciemus.

Ergo

Ergo quæ crudos crassos, & viscosos humores *Curatio co-
uulsionis à
crassis, &
viscosis hu-
moribus.*
potenter euacuant medicamenta (inter quæ primas
obtinent, hiera picra, & agaricum) hac conuulsio
ne laborantibus exhibeto.

5 Clysteribus acribus eorum aluum subducito.
Peisis, & suffitibus, in mulieribus (si occasio des-
tur) menses euocato.

Gargarismatis, apophlegmatismis, & errhinis,
seu iterutatoriiis, acrioribus, pituitam per os, &
10 nares educito.

Abundè repurgato corpore, ceruicem, axillas, &
inguina, oleo liliorum, costino, spicato, laurino,
& ex pulegio, addito castorei, & euphorbi momen-
to inungito: & lanam mollem, ac succidam facte
15 litu superimponito. Rogerius ad eiusmodi spas-
mum, sequens vnguentū instituit, quod & Theo-
doricus approbavit.

℞. olei muscellini vnc. vnam petrolei semunciā, olei *Vnguentum
Rogerij.*
cōmunis, & butyri ana vncias quatuor, ceræ vnciā
20 vnam, sty racis calamithæ, sty racis rubræ, singulo-
rū drach. duas & semis, mastiches, olibani, gummi
hederæ, ana vnciam semis: ex iis omnia quæ lique-
re possunt, igni admoueantur: alia verò trita, & in
puluerem redacta, illis remisceantur: postremò ad-
25 datur sty rax, & fiat vnguentum, ex quo moderatè
calesfacto ceruix, & collum totū: ac vniuersa spina
dorsi, inungatur. Sunt qui iubent eodem aut consi-
mili vnguento totum corpus, inter duos ignes, aut
in hypocausto, nudū hominem constitutum: vel si
30 æstas est, in sole inūgi. Porro huic vngueto visus est
alibi Theodoricus addidisse herbas, quæ ingrediun-
tur cōpositionem vnguēti, quod aragō nominatur,
& alterius, quod Agrippæ tribuitur, quorū descri-
ptiones exstant apud antidotariū Nicolai: & præter
35 hæc, addit oleum de castoreo, & pinguedinē ex lima-
cibus rubris assumptam. Vocabatq; tunc eiusmodi
vnguentum, alabastrum, quod sanè neruorum con-
tractionibus apprimè est vtile, & accommodum.

248 Institut. Chirurgicarum, Lib. II.

*Olea spaf-
mo ex pleni
tudine con-
ferentia.* Conducunt etiam magnoperè ad spasmum eiusmo-
di, oleum vulpinum, laurinum, rutaceum, ficyos-
nium chamæxlinum, de iunipero de terebinthina.
Item oleū benedictum, & oleum philosophorū. Ex
iis itaq; & consimilibus frictio omnibus in homine
vertebris vtilissima est. Iuvat etiā nonnunquam to-
rum hominem, in labrum illis calidis oleis plenum,
descendere. Sed & hypocausta siue thermæ, & stuf-
fæ (vt vocant) siccæ, quæ ex suffitu rerum desiccant-
ium fiunt, aliæq; id genus: quæ sudores euocant, &
superuacaneas corporis humiditates resoluit, atq;
absumunt cerebroq; & nervis robur adferunt, cir-
ca finem, & corpore iam vt oportet, repurgato, mis-
rum in modum conferre creduntur. Quod si & fe-
bris huic ex plenitudine conuulsioni superuenerit
(modò hæc fuerit ephemera) salubre admodum est:
frigidus enim (vt supra diximus) & glutinosos hu-
mores, quibus nervi ipsi conuulsi replentur, calfas-
cit, extenuat, atq; dissoluit: quod curationis eius spaf-
mi caput est. Itaque si sua sponte febris in hoc gene-
re conuulsionis nō enascatur, eam ex industria quas-
dam accersunt, & exuscitant: idq; per exhibitionē
confectionis anacardinæ, ad quantitatem nucis auel-
lanæ. Alij ad eundem finem offerunt castoreum, &
assam fatidam: vel oppopanaxem, addita mellis
portione dupla. Metridarum quoque, & theriace,
in hoc affectu mirè proficiunt. Nervos enim robo-
rant, & crudos succos concoquunt, absumuntq;
eo scilicet nomine, quòd excalfaciant. Cauendum
verò præcipuè frigus est: ideoq; in eo conclavi, quo
cubabit æger, ignis continuus esse debebit, maxi-
meq; tempore antelucano, quo præcipuè frigus in-
tenditur. Vinum per initia præsertim, gustandum
non est: si quidem huius vsus tum præcipuè peris-
culosus est, eo potissimum nomine, quòd fluxio-
nem proritat. Vini loco aqua mulsa exhibenda erit,
in qua decocta sit salvia, & radix acori, cum mo-
mento nucis muscatæ. Victus tenuis, primis saltem
diebus,

*Febris con-
uulsioni ex
plenitudine
superueniēs
bonum.*

*Metridarū
Theriace.*

*Frigus con-
uulsis inimi-
cum.*

*Vinū quan-
do, & qua-
re conuulsis
interdican-
dum.*

diebus, cōuulsis à plenitudine instituat, idēq; calfaciens, & exiccans. Hactenus de curatione conuulsionis ex plenitudine.

Curatio conuulsionis ex compatiendi societate.

- C**Aeterum conuulsio, quæ fit propter consensum: & velut quadam partium conspiratione seu compatiendi societate: si ex dolore excitata est: per anodyna, & dolorē sedantia curationem recipiet: vt in sequentibus dicitur, cum de vulnera-
 10 tis neruis agetur. Si verò ex morsu ictūue alicuius venenosi animantis, cōuulsio oborta sit, theriaca parti affectæ superimponēda erit, & cucurbitula defis-
 15 genda: vel cornua quædā, quibus nonnulli cucurbitularū vice vtuntur. His enim (quæ citra calefactio-
 nē, ex alto vehementius extrahūt) totam eius quod infestat, & dolorē creat, substantiam vacuabis. Sunt
 autem & qui ore suo virus extrahunt, ægræ videlicet
 20 particulæ (vt superius dictū est) admoti, ipsamq; labiis cōplexi. Si autem accidat conuulsio, ob mor-
 sum oris ventriculi (quod propriè stomachus appel-
 latur) ab acri aliquo mordaci, & erodente humore
 excitatum, vomitus statim cōcitandus est, post quē
 ventriculus roborandus erit, tum iis, quæ extrinse-
 25 cus admoventur tum iis: quæ intro assumuntur, iuxta periti alicuius medici consilium. Porro in omni
 conuulsione à quacūq; causa ortum habeat, cere-
 30 brum imprimis roborādū est. Caput igitur abrasis
 crinibus oleo liliorum fouendum erit. Iuuat & eodē
 oleo, ceruicem, totamq; dorsalem spinam, axillas
 quoq; & inguina inungere. Hoc enim spasmo, præ-
 fertim humido, est dicatissimum. Hora paroxysmi
 bonum est, laborans contineat inter dentes bacu-
 lum salicis, ne os exactē claudatur, & lingua à den-
 35 tibus dilaceretur. Vltimum est, si nihil aliud fieri
 possit, neruum: aut musculum ex quo conuulsio
 orta est, transuersum præcidere: vt Galenus & Ras-
 zes consuluerunt: præstat nanque vnius particulæ

*Curatio cō-
uulsionis, ex
compatiēdi
societate.*

Dolor.

*Morsus, vel
ictus vene-
natorum.*

*Morsus oris
ventriculi
conuulsione
excitat.*

*Cerebrū in
omni cōuul-
sione robo-
randum.*

*Musculus
aut neruus
interdū per
transuersum*

præcedens. actionem amittere: quàm totius corporis. Meliorẽ
Lesio quàm est (vt Galenus ait) læsio quàm mors. Itaque hoc
mors potius pacto conuulsionem quidem sanaueris: aliquem ta-
optanda. men ex particulæ motibus vitiaueris. Vt autem ei
 quod vrget, & vnde primum maximeq; homini
 imminet periculum, succurramus, cogimur sic nõs
 nunquam alium in sanabilem affectum relinquere.

De paralyfi ex vulnere.

Paralyfis
ex quibus
vulneribus
excitetur.
Paralyfis, id est, neruorum resolutio, latus vnũ 10
 aut alterum, vel partem quampiam, non autẽ
 corpus totum infestans: interdum etiam vul-
 nera, & contusiones insequitur: sed capitis maxis-
 mẽ, & totius spinæ dorſi vt multis exemplis Gales-
 nus aperuit libro de locis affectis tertio. Porro an 15
 paralyfis ipsa, quæ ex vulnere accidit, partes quæ è
 regione vulneris sunt: vel potius oppositas infestet,
Paralyfis ad præſens dicere omitemus. Est autem paralyfis
quid. neruorum relaxatio, seu mollificatio, cum priuatio-
 ne sensus, & motus non quidem totius (vt dictum 20
 est) sed vel lateris vnus duntaxat: vel priuatæ ali-
Paralyfis
affectus est
conuulsioni
contrarius.
 cuius particulæ. Quò fit: vt affectus sit conuulsioni
 contrarius: in hac enim durities adeſt cum motu des-
 prauato: ac permutato: durities autem mollificatio-
 ni ac relaxationi est contraria. Vnde Galenus libro 24
 tertio interiorum affectorum locorum, sic inquit, 25
Paralyfis Quum omnes pariter nerui, tũ sentiendi, tũ mouendi 26
vnivers. vim amiserint, apoplexia huiusmodi affectio nomi-
 natur. Vbi verò alteri laterũ: aut dextro aut sinistro 27
 id accidit paralyfis, id est, resolutio nominat, eius 30
Paralyfis scilicet partis, in qua consistit affectus, interdum 31
particul. dextræ: interdum sinistræ. Quòd si in aliquo mem- 32
 brorum idem euenerit: eiũdem membri resolutio 33
 esse dicitur. Nam & tota manus, & totum crure
 interdum resoluitur: atque solus in crure pes, & 34
 quæ sub genu sunt. Sic etiam de tota manu, simi-
 liter proportionẽ dicendum est. Hactenus Gales-
 nus: ex cuius verbis colligere licet, paralyfim aliam
 esse

esse vniuersalem, aliam verò particularem. Vniuersalis ea est, quæ alterum latus totum, aut dextrum, aut sinistrum occupat. Particularis verò, quæ priuatim alicui duntaxat particulæ accidit. Sic & de spasmo per analogiam dici potest: nèpe quòd alius sit vniuersalis, alius verò particularis.

De causis, & signis paralyfis.

10

CAusæ paralyfis, atque eiusmodi ablationis sensus, & motus, geminæ sunt: nempe internæ, & externæ, seu extrinsecus aduenientes. Externæ causæ resolutionis neruorum sunt, *Causæ externæ paralyfis.* *causæ ex-*
 15 fus ab alto, percussio, incisio, sectio, compressio, vel contritio, frigiditas violenta, & vehemens, vicinæ partis phlegmone, vel scirrhus, & id genus alia, quæ extrinsecus euenientia, vel contri-
 20 nuum soluunt, separantve, vel spirituum vias occludunt, & facultatis animalis delationem impediunt. Internæ autem causæ sunt, humores crassi, & viscosi, neruos cerebri, aut spinalis vocatæ medullæ (quæ ipsius cerebri vicaria est) obstru-
 25 entes. Neruorum enim corporibus ita obstruentibus, & crassioribus redditis, animalis facultatis (quæ sensum, & motum præstat) in membra delatio impeditur. Caterùm anxie disquirere, quo pacto per neruorum resolutionem, seu paralyfin, interdum sensus duntaxat, interdum motus, nonnunquam ambo simul pereant, & alia multa ad rem
 30 propositam attinentia, nequaquam præsentis sunt speculationis. Satis enim fuerit chirurgus, si præter ea, quæ iam de paralyfi dicta sunt, sedem primariò affectam, & à qua noxa orta est, simulq; dispositionem eius cognouerit. Nisi enim hæc (inquit
 35 Galenus) accuratè cognouerimus, nequaquam eas partes, quibus vel sensus, vel motus vitatus est, rectè curabimus. Porro ipsam affectam sedem ex anatome facile ipsi deprehendemus.

Nam

Nota cerebri Nam cum ex ea cognouerimus nervos, qui per faciei
primario af- partes sparsi sunt, à cerebro dimitti, si earum ali
fecti in pa- qua, simul cum toto corpore, resoluta est, haudqua
ralysi ex li- quam nos latere debet, resolutionis dispositionem
bro 3. de loc. in ipso cerebro consistere. Vbi verò partes, quæ ad
affect. faciem attinent, incolumes, ac illæ sæ permanserint:
Nota para- hæ autem, quæ sub ea sitæ sunt, vniuersæ resolutæ
lysis initio fuerint, spinæ initium tunc affici, sciendum est. Ex
spinæ affe- ipsa enim anatome didicimus, quod omnes animan
cto. tis partes sub ceruice positæ (quæ à consilio, & vo
 luntatis imperio moueri possunt) nervos habent,
 qui eas moueant, procedentes ex spinali vocata me
 dulla. Quod & iis verbis Galenus testatus est libro
 quarto de sympt. matum causis: Si spinæ princ
 ipium lædatur, solæ partes capitis, quoad vixerit ani
 mans, & sentire, & moueri possunt. Quod si cere
 bro quoque noxa acciderit, qui sic afficiuntur, ij
 mnium partium, & motum, & sensum ilicò deper
 dunt. Atque eadem quoque ratione, si toti corpori
 conuulsio acciderit, eundem spinæ locum, nempe
 initium, affectum esse declarat, faciei partibus omni
 nõ seruatis illæsis. Quod si hæ quoque afficiantur,
 cerebro noxam iam illatam esse ostendunt. Adhæc
 nouimus ex corporum dissectione, nervos qui per
 ctus mouent, ex ea spinæ parte, quæ in ceruice est,
 ortum deducere. Quocirca vox perit omnibus, qui
 bus ea spinæ pars, quæ in ceruice est, fuerit affecta.
Gal. libr. 4. Ipsa verò ex transuerso incisa, si tota fuerit dissec
de sym. cau. ta, omnes quæ sub ipsa sunt corporis partes, sensu mo
et lib. 3. de tuq; priuari necesse est, utpote suscipiente spina à ce
locis affect. rebro, vim tum sentiendi, tum mouedi pro arbitrio.
 Præterea in anatomia (inquit ille) vidimus vbi per
 transuersas spinæ incisiones, ad medium vsque dun
 taxat, secundum longitudinem, spina ipsa secaretur,
 non omnes suppositas corporis partes, sed eas dun
 taxat, quæ è regione sectionis erant, resolutas.
 Dextras quidem, dextra spinæ parte dissecata: si
 nistras verò, vbi reliqua pars esset incisa. Itaque
 (subiungit

(subiungit Galenus) manifestum est, quod circa pri-
 mum spinę processum, facta aliqua dispositione, per
 quā cerebri facultas, quominus ad ipsam perueniat,
 prohibetur, omnia inferiora membra, dempta facie,
 sensu, motuq; priuabuntur. Vbi verò media duntaxat
 eius processus pars fuerit affecta, non omnes in-
 feriores partes resoluentur, sed vel sinistra duntaxat,
 vel dextra. At verò spina in inferiori loco affecta, ne
 pe sub ea neruorum propagine, quibus thorax attol-
 litur, idq; vel ob luxatam aliquam vertebra, vel
 alio quouis modo [ut vulnere] si quidem ingens fue-
 rit affectus, partes inferiores omnes, subito & sentien-
 di, & mouendi facultate priuantur. Si verò non ita
 vehemens fuerit affectus, stuporem inducet. Atque
 si mortem effugiunt, quandoquidem spiratio in ipsis
 seruatur. At quibus quinta spinę vertebra [vulne-
 rata, aut quouis alio modo] affecta est, eorum manus
 omnino, & sensum, & motū amittit. Quibus ve-
 rò sexta, iis non in totum sentiendi mouendiq; facul-
 tas [in manibus] perit: quippe primi brachij partes il-
 læsę seruātur. Id verò multò magis, si septima spinę
 vertebra fuerit affecta. Octauę vertebrae affectus
 perquam exigua: hac verò inferiorum nullā peni-
 tūs noxam manibus inducere possunt. Maximam
 verò noxam ex læsa hac vertebra sentiunt, thorax,
 & reliquę partes inferiores. Itaq; nisi hoc pacto ex
 anatomia, neruorum ad singulas partes venientium
 principia didiceris, perquam difficile earum vel sensu
 sum, vel motum deperditū curabis, restituēve. Por-
 rò humorem peccantem, ac paralytū committens
 tem, deprehendes ex propriis cuiusque humoris no-
 tis. Causas verò externas, seu euidentes facile cogno-
 sces ex relatu, & iudicio laborantis.

35 *Iudicia, seu prasagia paralyfis.*

Prasagire, ac iudicare potes de paralyfi, à qua
 cūque occasione ortum duxeris, deq; omnibus
 neruorum affectibus, quod ægrè admodum

sanabi

*Libr. 3. de
loc. affect.*

*Ex lib. 4.
de sym. cau.*

*Si quinta
spina verie
bra affici-
tur.*

*Si sexta ver-
tebra affe-
cta est, vel
septima.*

*Paralyfis af-
fectus est
ægrè sanabi-
li.*

254 Institut. Chirurgicarum, Lib. II.

sanabiles sunt. Nervi enim ipsi paucò admodum nas-
 tiuo calore participant, qui curationis membrorum
 opifex est, & causa effectrix potissima. Proinde
 verissimum etiam est, quod vulgò dici solet, nempe
 paralyfin in senibus perquam difficile curari. hi
 enim natiuo calore (qui robur est facultatis nos gu-
 bernantis) propemodum sunt destituti. Quod Hip-
 ocrates his verbis expressit: Senibus parum calidi
 innati inest. Quam sententiam veram esse testatur
 Galenus, siue quis ad qualitatem sermonem referat,
 siue ad substantiam. Tremor & febris si paraly-
 si superuenerint, bonum: febres nanque nervorum resolu-
 tionibus (vbi & conuulsionibus ex repletione) ad-
 uenientes, partim quidem superfluam dissoluunt hu-
 miditatem, partim verò concoquunt frigiditatem, quæ
 dux sunt medicis, in curanda paralyfi (vbi & spasmus
 ex plenitudine) remediorum intentiones. Adhæc,
 paralyfis, quæ ab ictu, vel casu non vehementer ner-
 uos atterente, contudenteue, excitata est, curatio-
 nem interdum recipit, vt contigit illi Pausaniæ Sy-
 ro sophistæ, cuius meminit Galenus in fine libri ter-
 tij, de affectorum locorum notitia. Quum enim Ro-
 mam aliquandò venisset, dum per viam duceretur,
 vehiculo excidit, atque in dorso initio læsus est: vnde
 secundum duos minores sinistræ manus digitos,
 atque medij partem mediam, sensum imprimis quis-
 dem difficilem habuit, postea malè curantibus medi-
 cis, sensum omnino amisit. Huic autem remedia,
 quæ illi imperiti medici digitis frustra adaptauerat,
 læsæ parti, hoc est, initio spinæ, Galenus ipse (vbi
 malè occasionem intellexit) statim adhibere iussit,
 atque sic vir ille celeriter sanitati est restitutus. Quæ
 verò ab insigni, atque effatu digna nervorum contu-
 sione vel diuisione, oritur particularum resolutio,
 prorsus insanabilis est. Soluta enim in illis continui-
 tas nunquam (vt dictum est) perfectè curatur. Res-
 cte quidem, & conformiter ad Galeni sententiam,
 Auenzoar adstruxisse visus est, subita mortis pericu-
 culum

culum imminere, si nerui anhelitus, hoc est, respiratio ^{Paralyfis} ^{neruorū re-}
 tioni seruientes, aliquibus vulnerati, aut quouis alio ^{spiratiōi ser-}
 modo insigniter affecti fuerint: in ipsis enim statim ^{uentium.}
 perit respiratio. Quo fit, vt præfocati repente mori-
 5 riantur. Quomodo enim ablata respiratione (quæ ⁷
 actio est vitæ necessaria) diutius viuere possent? Si ^{N O T A E}
 membrum resolutum non imminuatur, nec emarces- ^{paral. cura-}
 scat, colorq; eius non immutetur, spes aliqua cura- ^{bilis, aut in-}
 tionis subest. Si verò contabescat, & gracilescat inis- ^{curabilis.}
 10 gniter, colorq; natiuus pereat, atque à seipso pluri-
 mum euariet, malum portendit.

Paralyfis ex vulnere curatio.

IN curanda neruorum resolutione (quæ paralyfis
 15 dicitur) ex accepto vulnere, vel causa alia extrin-
 secus incidente oborta, præmissa totius corporis
 vacuatione, vel per purgantia medicamenta, vel per
 sanguinis detractionem, vel per vtrunque, vti res
 20 exigit: factis item vt decet, humorum in partem res-
 solutam influentium auersionibus, præscriptaq; vis-
 citus ratione congrua (quæ omnia periri alicuius me-
 dici consilio fieri debent) topicis remediis aduersus
 illam sedulò pugnare debet chirurgus. Itaq; cum ^{In curanda}
 duabus in hoc affectu profigando Therapeutices, ^{paral. dia-}
 25 id est, curandi facultatis partibus, opus sit: nempe ea ^{tetica, &}
 quæ victu, & quæ medicamentis, tum intrò assu- ^{pharmaceu-}
 mendis, tum foris ad mouendis medetur: eam hîc for- ^{tica opus es-}
 lam curationem exequemur, quæ medicamentis for- ^{se.}
 30 rinsecus ad mouendis, perficitur: ne qui chirurgiam
 profitentur, diætetica, & pharmaceutica (quæ peris-
 tissimum, & rationalem medicum desiderant) turpiter,
 & in magnam laborantis perniciem (vt plæ-
 35 rique hodiè assolent) abutantur. Caterùm cum
 multa variaq; præsidia, forinsecus in curanda pa-
 35 ralyfi ex vulnere, aut alia quouis externa causa
 suscitata, ad moueri soleant, vt emplastra, catas-
 plasmata, vnguenta, illitus, forus, cucurbitulæ,
 & alia id genus: Guido tamen vno liquore longè
 40 gè opti

*De locali-
 bus reme-
 diis in para-
 lyfi ex vul-
 nere adhibe-
 dis.*

gè optimo, & ad affectum eiusmodi, siue symptoma profligandum, efficacissimo contentus erat: quod quidem ex Ioanne illo Mesue, viro in familia Arabum doctissimo, ac in re medica Euangelista à quibusdam nūcupato, desumpsit, eo loci, vbi de corporis passionibus agit. Eo autem liquore illinere solebat medicus ille Arabs ceruicem, totamq; spinam dorſi, atque etiam affectam ipsam particulam. Conferunt nanque hoc pacto mirificè roborandis membranis spinalem medullam obuoluentibus, substantiæ spirituali, qua viuimus, neruis quoque, & ossibus. Proinde paralyſi, omnibusq; neruorum ægritudinibus, cordis palpitatiōi, & tremori, atque etiā manifestæ lassitudinī, mirè, ac supra humanam opinio- nem, proficit. Adde, quòd nullum medicamētum eo præstantius inueniri potest, vbi cor celeri, festinave eget refectione, ac refocillatione, si saltem ipsi Mesue credimus. Cæterum est quod cum ipso Mesue hementer admiremur, priscos illos tum medicos, tū philosophos insignes, & rerum naturę peritissimos, nullam in suis scriptis, eiusmodi inunctionis spinæ, mentionem fecisse, cūm vix aliud tam præstans auxilium inueniri, aut excogitari possit, ad vitæ substantiam conseruandam. Nouisti nanque satis (opis nor) ex anatome, spinam dorſi in homine esse veluti carinam nauis, & fundamentum reliquorum ossium, imò verò & principium. Noſtri præterea, sub hac veluti solido quodam propugnaculo, & muro tutissimo, dorsalem ipsam medullam conditam esse, quæ cerebri quidem germen est, & explantatio, durorumq; corporis neruorum principium: per quos velut internuncios, corpus vniuersum transmit, primum quidem, & maximè motum, cum hoc autem etiam & sensum. Adde quòd in spondylis dorſi (qui spinam ipsam constituunt) mira naturæ prouidentia efformata sunt quædam subtilia foramina, per quæ vasa, spiritum, & sanguinem deferentia (venæ inquam, & arteriæ) intrò quidem: foras verò, nerui ipsi,

*Liquoris bal-
samitis Me-
sue dotes.*

*Spina dorſi
veluti cari-
na nauis.*

ipsi, sensum, & motum, in corpore vniuersum com-
 portantes, feruntur. Quo fit, vt spina ipsa sit veluti
 platea, seu via quædam publica, non modò neruo-
 rum, sed & venarum, & arteriarum. Proinde & spi-
 rituum, ac virtutum. Adhæc non ignoras magnam
 ipsam venam concavam dictam, itidem & arteriam
 aortā vulgò nuncupatam, iuxta spinam ipsam totā
 reptare, sed & partium spiritalium est veluti subster-
 niculum, & (vt quispiam dixerit) veluti lectus alius
 quis. Atque (vt Mesue inquit) medullam continet
 verā humiditatis. Multas ergo easdemque bonas, atque
 que effatu dignas intèriones cumulabis, ex inuic-
 ne ipsius dorsalis spinæ, quam veteres ipsi tum me-
 dici, tum philosophi, vel prorsus ignorantes, negle-
 xerunt, vel eam nobis inuiderunt, cum ne verbum
 quidem in eorum monumentis de ea scriptum inue-
 niatur, vt Mesue testatus est. Porro liquoris illius
 tam eximij, atque ad tam multa vtilis compositio,
 & conficiendi ratio apud præfatum autorem talis est:
 1. myrrhæ electæ, aloës hepaticæ, spicæ nardi, san-
 2. guinis draconis, thuris, mumix, opobalsami, bdel-
 3. li, carpobalsami, ammoniaci, sarcocollæ, croci, ma-
 4. stiches, gummi Arabici, sty racis liquidæ, ana drach.
 5. duas: ladani electi, succi castorei, ana drachmas duas
 6. semis. muschi drach. semis, terebinthinæ optimæ ad
 7. pondus omnium: puluerisanda puluerisuntur, & o-
 8. mnia misceantur cum terebenthina, reponanturque
 9. in furnibulo, seu distillatorio, quod alambicum voc-
 10. cant, & illa ingeniosè ac lento igne vt decet, distil-
 11. lentur: liquorem autem per distillationem sublimas-
 12. tum, vase vitreo forti excipe. Hic liquor proximè
 13. accedit ad verum succum balsami. Guido à Caulia-
 14. co quâdoque huic pretioso liquori addebat herbas
 15. dicatas paralyfi, & tum generosius, atque efficacius
 multò (vt ipse testatur) experiebatur auxilium.

* aliâs hu-
manitatis.

Liquor bal-
samites. 102.

Me. tõe opti-
mus, & ad
multa vtilis-
simus.

* Alia ex-
plaria ha-
bent opopa-
naci.

† Aliâs 3.
duas semis.

De Syncope ex vulnere.

*Syncope
quid.*

*Syncope in
vulneribus
vnde.*

*Syncope pxi
me instantis
nota.*

*Syncope par
ua mors.*

*Quibus re-
medijs synco-
pe occurrat-
tur.*

*Vini oibus
syncope re-
xatis succur-
rit.*

*Vini i synco-
electio.*

*si iam synco-
pe pſens ſit.*

Syncope (definitore Galeno lib. duodecimo Therapeutices) est præceptus virium lapsus, qui immo-
deratas euacuationes, ingentes dolores, vigiliæ,
principiorum intemperiem, atque animi vehemen-
tes affectus, sequi consuevit. Ea autem syncope, quæ
in vulneribus accidit, magna ex parte creatur, vel
ex immodica sanguinis profusione, vel ex vehemen-
ti dolore. Hanc proximam esse cognoscēs, tum ex ar-
teriarum pulsu elanguescente, ac deficiente, tum ex
pallido vultus colore, tum ex motu totius corporis
ignauo, ac difficili, sed præsertim palpebrarum, &
partium extremarum, tanquam illis erigendis, aut
attollendis non possit virtus motrix sufficere: sed &
frigidi, circa collum maximè, & faciem, sudores, syn-
copen iam pulsare fores testantur, symptoma iam
minimè negligendum. Quandoquidem celeriter in-
terdum hominem rapit, estq; quasi via ad mortem,
imò (vt vulgò dici solet) est veluti quadam parua
mors. Proinde summa curâ adnitendum est, ne in
hoc tam periculosum symptoma vulneratus inci-
dat. Ergo laborantem quibus poteris modis consor-
lator. Hominum turbam ne suo anhelitu conclaue
nimis excalfaciant, & laborantem sua præsentia des-
terreant, procul arceto. Sed & antequam eâ premas-
tur qui vulneratus est, panis frustulū, vino optimo,
aquæ rosaceæ momento, diluto, illi sugendum exhibe-
to: atque etiam vt ex vino ipso modicum quid bi-
bat, ipse iubeto. Vinum nanque omnibus syncope
vexatis vrile est, vt libro duodecimo Therapeutices
his verbis Galenus annotauit. Vinum tamen, quod
& calidum naturâ sit, & deductionē in corpus pro-
moueat, omnibus quos syncope malè habet, offerre
conueniet. Constat autem, ex vinis ea deligēda esse,
quæ & flauo sint colore, & substantia tenui, & atas-
te, vetēra. Talia nimirū & boni odoris continuò fue-
rint. Cæterum amara præ vetustate, vina ne sunt.
Porro si iam syncope, qui vulnus accepit, vexetur,
eius faciem aqua rosacea, vel frigida, vel vtriusque
mixture,

De Plagis, seu cruentis uulnerib. 259

mixtura, adiectio etiamnum aceti (si placet) momēto irrorabis, ac etiam ipsa validē in illam, laborantis faciem dico, proicies: aut saltem naribus aquam rosaceam, & acetum admouebis, ut scilicet suauit eorum odore, animam illorum recrees. Pilos, nasum, & aures vellito, extrema fricato, alapis illorum genas cedito, & proprio nomine alta voce illos vocato, ac cætera facito, quæ in hoc symptomate medici fieri præcipiunt.

De desipientia, seu delirio accidente in uulneribus.

OMne delirium (ut Galenus ait libro quinto de sympt^a matum causis) deprauatus est principis facultatis motus, à prauis succis, aut cerebri intemperie ortum habens. Interpreti Amicentæ alienatio dicitur. Porro tametsi eiusmodi desipientiæ, seu mentis alienationes, sympt^a mata sint. modo primogenia, id est, primario, ac proprio cerebri affectu euenientia, modo secundaria, hoc est, cerebro cōpatiendi societate: seu (ut dici solet) per consensum laborante. Hic tamen nunc, de solo eo delirio, quod consortij lege, seu per consensum accidit in uulneribus, & percussionibus articulorum, sermonem faciemus. Talia nanque vulnera (ut superius diximus) doloris, vigiliarum, conuulsionis, & delirij periculū adferunt. Cæterum eiusmodi sympt^a matis (delirij inquam in cacoëthis uulneribus euenientis) generatio persimilis est ei, quæ per suffusiones oculorum accidit, à ventriculi dispositionibus ortum trahētes, ut Galeno visum est libro tertio de locis affectis. Quemadmodum enim ventriculus, cerebro suas affectiones compatiendi quadam societate transmittit idē propter neruorum a cerebro, ad os ventriculi descendentiū magnitudinem: per quos etiam sensus huic particulæ, quàm vili reliquarum corporis partium acutior est. Ita quoque neruosis partibus inflāmati, cerebro noxa prōptissimē cōmunicatur,

Delirium quid, & unde nascatur
Causa 3.

Lib. 4. Ther.

Causa delirij in uulneribus.

Neruosus partibus inflāmati delirium accidit.

260 Institut. Chirurgicarum, Lib. II.

atque ex illis prōptius, quā ex aliis quibuscumque partibus delirium superuenire solet, idque ascendente ad caput interdum per continuas partes, solo calore: interdum verò spiritu vaporoso, vel fumoso, aut fuliginoso. Hæc autē omnia, quæ sic delirium, aut phrenitidem inducunt, siccandi pollent facultate Auicennæ: quippe, quæ multo, eodemque acri calore participant. Quo fit, ut delirantes irrequieto ferè motu agitentur. Vnde Galenus libro decimotertio Therapeutices ad hunc modum ait. Ergo cum humor qui in capite redundat, frigidus est, insensibilitas, immobilitasque hominem opprimunt. Cum calidus est, perpetuus potius motus, una cum rationis noxa. Accidit enim (veluti demonstratum in libris de his est) ex frigore, segnitia: ex calore, immodicus motus: ex huiusmodi verò vitio, dementia.

Delirij ex vulnere curatio.

SI delirium, seu mentis perturbatio, post vulnus acceptum, hominem apprehendat, huius rei gratia statim accersendus & consulendus erit peritus aliquis medicus, qui potu, frictionibus, & deligaturis partium extremarum, & maxime pedum, ac tibiarum, clysteribus quoque huic rei accommodis, fumos, ac vapores vitiosos, à capite deorsum protinus reuellere studeat, ut rectè præcepit Auicennas, itidem & cæteri, qui hac de re scripserunt. Quod autem ad chirurgum attinet, læsæ particulæ dolor ex toto (si fieri potest) sedandus est. Vtile est etiam alapis genas laborantis percutere, ut ipse ad mentem, seu ratiocinandi facultatem redeat. Galenus libro decimotertio Therapeutices caput delirantium in principio perfundendum esse oxyrhodino, pulchrè nos admonuit. Vapores enim, & humores à capite tunc repellendi sunt. Cum verò in summo incremento sunt deliria, perfusiones ex papauerum capitibus (consilio eiusdem) applicabimus. Odorem quoque ex rebus frigidis naribus obiciemus: ac nares ipsas intus

*Delirium ex
siccitate fit.*

*Vapores à
cerebro auer
tendi.*

*Dolor sedan
dus.*

*Caput deli
rantium oxy
rhodino per
fundendum.*

*Cerebrum re
frigerandum.*

intus, vel frontem ex similibus medicamentis illinimus. Quippe sopire (inquit) ac stupefacere principē facultatem oportet: cerebrum scilicet, quod supramodum incaluit, refrigerando. Sanitati magna ex parte restituntur Auicennæ, qui per dies aliquot, radicem bryoniæ, id est, vitis albæ, vel bibunt [ex Radix bryoniae] liquore aliquo refrigerante, & humectante vel cum cibo quopiam eius saporem obtundente comedunt. Cæterum de pruritu, duritie, atque impotentia lesæ particulae, quæ interdum vulneratis accidunt, suo loco alibi dicitur.

De vulnere in carne accepto, & eius differentijs.

C A P. V.

15 **V**ulnus propriè Galeno lib. tertio methodi medendi, unitatis est solutio, ex vulnerando in carnosa parte relicta, eademq; (ut recentiores addiderunt) cruenta, & citra putrefactionem: hinc autē vulnus latius accipimus: nempe
 20 pro recenti plaga non modò in carne, sed etiā in nervis, venis, arteriis, tendonibus, membranis, cartilagine, & ossibus facta. Itaque primū de eo vulnere quod in carnosa substantia acceptū est, edifferemus.
 25 Cæterum eiusmodi vulnus aut simplex est, & citra substantiæ deperditionem, aut cum aliqua substantiæ amissione. Vulnus simplex, & quod sine deperditione fit substantiæ, aliud profundum, aliud summo tenus factū, seu in summo residens est: aliud verò utriusque particeps, ut cum pars vna diuisionis per longitudinem factæ, altè descendit, altera in summo corpore hæret, quod inæquale Galeno dicitur: aliud itē magnum, aliud paruum tum dicitur, tum verò est.
 30 Quæ omnes differentiæ à quantitate, seu spacio diuisionis sumptæ sunt. Vulnus quod cum deperditione est substantiæ, aut fit cum amissione cutis solius, aut cum ablatione cutis, & carnis subiectæ simul. Porro eiusmodi vulnera, vel simplicia sunt, & sine villo, abs

*Vulnus
quid Gale.*

*Vulnus
quid apud
recentiores
chirurgos.*

*Diuisio vul
neris.*

fectu, aut symptomate: vel accidentia habet, quæ ratione causæ non obtinent; tunc enim vlcera dicerentur difficile sanabilia, de quibus in sequentibus dicitur; sed solum rationem habent sine quo non, vt superius annotauimus ex Gale. lib. 4. Therap. Cuiusmodi sunt intemperies, dolor, phlegmone, pruritus, & alia paulò antè cõmemorata. Non magnoperè autem curo, si prædictæ huiusmodi differentiæ, dispositiones aut affectus dicantur potius, quàm differentiæ, vel contrà. Quanquã Gal. lib. 3. methodi medendi anxie satis disquisiuerit, quànã sint propriæ vlcerũ, seu vulnerũ differentiæ, & quæ aliorũ affectuũ complexionibus. Hoc enim parũ nunc mihi cõferre videtur ad vulnerũ curationẽ. Commoda nanque morborũ curatio, non ex nominũ, sed rerũ recta opinione contingit: vt scribitur primo methodi medendi. Caterũ de causis, signis, & iudiciis vulnerũ, quatenus vulnera sunt, abundè satis in præcedẽtibus dictũ est, in capite scilicet vniuersali. Proinde his prætermisiss, vulnerũ in carne acceptorũ curationẽ iã aggrediemur.

*Curatio vulnerum simpl. ciuim in carne
summotenus acceptorum.*

Specialis præcipuaq; intentio curandi vulneris in carne accepti, vna est.

Vulnerũ eiusmodi curatio, p̃ter iã dictas quas tuor, aut quinque intẽtiones cõmunes, vnã specialẽ, præcipuamq; habet: nempe sanguinis profusionẽ cohibere. Quod sanè intelligendum est: nempe si nimis immoderatè, atque affatim effundatur, vt rectè interpretatus est Auicẽ. Satiũ enim est (inquit) ipsum fluentem ex vulnere sanguinem, non omnino, ac statim supprimere, sed si nimis abundè prorũpat, eius duntaxat impetũ moderatè infrenare oportet. Moderata nanque sanguinis ex recenter accepto vulnere vacuatio, nõ parũ sæpe multis profuit. Quãdoquidem & phlegmonas, & obstructiões, & febrem subinde fieri prohibuit. Quæ quidem symptomata, atque id genus alia, vulneribus (nisi diligenter prouideris) superuenire, ipsiusq; solutæ vniõnis

unionis consolidationem, & curationem magnopere impedire, consueuerunt. Atque illud fuit Hippocratis præceptum, quod & à Galeno refertur, & approbatur libro quarto methodi medendi: Fit enim
 25 (inquit Hippocrates) effluente sanguine vulnus sic Hippoc.
 25 cius: proinde & sanius. Nam siccum (vt idem ait)
 25 sano vicinius est, humidum verò non sano. Porro si
 25 tantus fuerit ruentis sanguinis impetus: vt cum iis,
 quæ sistendo sanguini in vulneribus communiter
 10 admoeri solent, cohiberi non possit, iis remediis
 suppressendus erit: quæ in capite de vulneribus venarum postea dicentur. Caterum tamen si in genere dictum sit, quomodo curandorum vulnerum intentiones perfici debeant: modus tamen specialis, quo
 15 in carne perfici debeant in sequentibus dicetur. Huius autem inuentio habetur ex differentiis vulnerum supra commemoratis, ad hunc modum. Vulnus illud simplex dicitur, Galeno Hippoc. & aliis medi
 20 cis: quod solū cōsistit, hoc est, quod sine deperditione est substantiæ: nec vllum aliū affectum, aut symptomata adiunctum habet. Vulnus igitur simplex nō
 erit: si quæ vulnerata est particula fluxione vexetur, si malo succo vitiosa sit, si omnino extra naturalem
 25 temperiem fuerit: si vlla cavitās adsit, si aliqua cutis amissio facta fuerit. Itaque vbi simplex vulnus
 quodq; solū consistit in carnosa particula, non adeo saltem magnū incidit, dissidentium labiorum cōmisionem, seu cōiunctionē, quæ sola decēti fit ligatura,
 30 vinculo scilicet ex duobus initis circumdato exposita Galeno libro tertio. Therapeutices. Quæ
 25 enim (inquit de simplici vlcere loquens) dissident,
 25 atque inuicem distant, si in idem adamussim componas, citra omnem reliquam extrinsecus molitionem coalescunt. Nempe sicuti in cauis vlceribus:
 25 vt caro producat, ita in simplici vlcere: vt ora
 35 ipsæ secum coalescant: atq; agglutinentur, sola certè natura causa est. Diductorum igitur labiorum cōiunctionem, seu agglutinationem præcedit necessariò,

*Quid vul.
simplex, &
quæ sit eius
curandi ra-
tio.
Vulnus non
simplex.
Vul. simp.
positum tū
in aggluti-
nationem.*

Gal.

Oui candi-
dum, quare
vulnerib. ad
moueatur.

Lib. 3. The.

ipforum coniunctio: atque in idem adductio. Idem omnino de hac re sentit Razes, quod & Galenus: vsus tamen cōmunis obtinuit: vt recentibus huiusmodi vulneribus oui candidum (quod albumen vocant) aliquandiu agitatum, & leuis stupa exceptū admoueatur. Nec abs re profecto, cum & sanguinis profluium supprimat, dolorem sedet refrigeret, & phlegmonas fieri prohibeat, nō solum in oculis: sed & in omnibus locis exulceratis: vt Galenus est auctor libro vndecimo de simpliciū medicamentorū facultatibus. Ante omnia verò cauendum est, ne dolor incidat. Quādoquidē dolor (vt iam sæpe dictum est) & fluxionem proritat, & phlegmonē excitat. Quos modo autē dolorem sedare oporteat, in præcedentibus satis est explicatū. Porro eiusmodi oui candidus liquor, ante tertium diem amoueri non debet. Nam vt Galenus ait parua vulnera eiusmodi nature sunt vt post orarū adductionē, & cōmissionem, seu coniunctionem: vnius diei: aut duorū dierum spacium adhuc requirant, quo proba fiat vnio, & agglutinatio. Quod si vulnus hoc pacto nō adglutinetur curā dum erit: vt in sequentibus paulo post dicitur.

De vulnere magno, percussim diuiso, in summo residente, hoc est, superficiali, & minime profundo, in quo non sola sufficit deligatura ad oras ipsius applicandas, & coniungendas.

SI vulnus in superficie corporis acceptum, ad tantam magnitudinē percussim, casimve diuisum est: vt sola deligatura oræ ipsius nec adduci, nec committi possint: futura aut fibulis (quas Græcè ἀγκυραῖς vocant) eas ipsas disiunctas oras adducendas, & coniungendas esse, præcepit Gale. libro tertio methodi medendi. Atque hac sola partium disfidantium coniunctione vulnus glutinatur. Apud recentiores tamen chirurgos ferē omnes inualuit cōsuetudo: vt his vulneribus apponatur puluis rubur, quem

De Plagis, seu cruentis uulnerib. 265

quem incarnatiuum, & cōseruatiuum vocant. *Res Medicamen-*
cipit autem partes duas thuris, & sanguinis draco *tum cruen-*
nis partem vnam. Albucasis addit tres partes cal *is apuū vl-*
cis viua. Cuius sententiæ suffragatur & Lanfran *ceribus.*

- 5 cus. Guido autem loco calcis viua bolum Armeniā
adiicit. Haly abbas verò santalos apposuit. Sunt qui
puluerem hunc rubrum appellatum, labiorum vul
neris agglutinatiuum, & futuræ cōseruatiuum, hoc
modo cōponunt. R. boli Armenij terræ sigillatæ,
10 singulorum drach. sex, thuris, mastiches, sarcocollæ
singulorum drac. duas semis, myrrhæ, aloës, singu
lorum drachmam vnam semis, tragacathi pisti, san
guinis draconis, singulorum drachmam vnam faris
næ hordei, farinæ fabarum, singulorum drachmam
15 semis. Sed interim summopere cauendum est, ne vel
pilus: vel oleū: vel quidpiam aliud in medio addu
ctorum labrorū vulneris interuenerit. Nā tunc eius
modi vulnus sola dissidētium partium cōiunctione
glutinari non potest. Hæc enim quæ sic interiacēt, iā
20 vnionē dispescunt: & earū quæ copulandæ sunt par
tium, coalitum impediunt. Ex prædictis autem sin
gula, cū oui candido liquore agitari possunt, donec
in corpus vnū cōeant: quòd glutinis instar lenteſcat.
Postea verò stupis leuibus excipiendū erit medicamē
25 rum: & ita vulneri admouendū: supra quod & aliæ
stupæ solo oui albo imbutæ, & intra pannum lineū
eodem madefactum liquore, inuolutæ apponendæ
sunt. Sed & supra vulnus nulla alia intercedente
materia, pannus aliquis tenuis prædicto imbutus li
30 quore, admoueri debet, ne scilicet dum remouentur
stupæ futuræ iam factæ puncta abrumpant, aut di
lacerent. Quòd si loca circum vulnus adiacentia,
rosaceo inungerentur, factum bene existimauerim.
Hoc pacto enim læsam particulam à dolore, & in
35 flammatione vindicabis. Qualis autem futura: aut
deligatura, quales item puluilli ex eiusmodi stupis
facti, hisce vulneribus percussim cas: mue in super
ficie acceptis: atque in conspectu apparentibus, con

*Cauendum
ne quid la-
bris vulne-
ris interci-
dat.*

ueniant, & quo pacto fieri debeant, in præcedentibus abundè latis dictū est. Cæterū primus eiusmodi apparatus: vsq; in diem quartum mutari nō debet, nisi fortè dolor aliquis vehemens superueniret: aut symptoma aliquod molestū incideret. Porro si post quartum diem transactum vulnus non coaluerit, vi-
Que cruen- to vulnere no aliquo styptico calente abluendum erit. Deinde
primū ap- stuppe prædicto vino imbutæ, & expressæ supra vul-
posita sunt, nus ipsum apponendæ, & alligandæ erunt: quas &
ante diē ter- quotidie mutare oportebit. Intra enim dies paucos
tium, remo- hoc modò vulnus agglutinabimus, & perianabis
ueri nō de- mus, Galeno etiamnū attestante, libro quarto The-
bent. rapeutices: vbi Thessalum arguit, qui vulnera in
 multos menses, & interdum in annum: aut etiam
 longius tempus protrahebat, & incurrere sinebat:
 quæ alioqui paucissimis diebus: vt sex, aut plurimum
 septem, curari potuerant.

Primus ap- Itaq; primus apparatus rectè decenterq; fit, cum
paratus. ouorum candido liquore, & puluere illo rubro,
 cuius paulo antè meminimus. Hic enim & sanguis
 nis profuuium infrenat, atque inhibet, dolorem se-
 dat, & phlegmonem creari vetat.

Secundus ap- Secundus verò apparatus, optimè fit, cum vino,
paratus. vt suprà dictum est. Vinum nanque (vt Galenus
Vinum o- ait libro tertio methodi medendi) omnis vlceris,
primū vlce- qua vlcus est [id est, quod citra aliam cum ea imple-
ri medica- xam dispositionem reluctantem cōsistit] optimum
mentum. est medicamentum. Quòd hac sequenti ratione cō-
 uincitur. Vulnus omnes, qua vulnus est, siccari, atq;
 adstringi desiderat, præsertim si magnum extiterit.
 atqui vinum, quale suprà est memoratum, nempe
 subausterū, hæc duo commoda præstat vulnere. Vi-
 num igitur omnis vulneris, qua vulnus est, optimū
 est medicamētum. Maior est Galeni, libro nuper ci-
 tato, vbi ait: quòd eo tempore, quo diuisæ vlceris,
 seu vulneris partes, ritè sunt coniunctæ, medicamen-
 to opus est, quod particulam siccet [& modicè ad-
 stringat] vt & si qua sanies iā subsit, hanc cōsumat,
 & si

268 Institut. Chirurgicarum, Lib. II.

initia cruentorum vulnerum admovent, atq; in diē quartum relinquunt. Hæc enim oras vulneris coire facit, & futuram eo nomine conseruat. Sed horum omnium, atque aliorum multorum ad hanc rē pertinentium formulæ, & compositiones in antidotario describentur.

*De vulnere profundo, & occulto, sine amissione
substantiæ, in carne accepto.*

VVLNUS in profundum penetrans, & reconditum subinde futura, & decenti ligatura curationem recipit. Si autem hoc modo curari nō possit: vel scilicet quia partes, quæ disiunctæ sunt, exactè ad imū vsq; (ob nimiam diuisionis profunditatem) sibi cōiungi nō possint: vel potius quia in fundo collecta sit sanies: aut pus, cui nullus patet effluxus, ipsum per effluxionē, Galeni cōsiliū sequuti, curabimus. Ipsam verò effluxionē, tū ex eiusdē, tum ex

Vulnus quādo per effluxiones curā dum. cōtrarij loci diuisione, & situ seu figura partis accōmoda amolietur. Porro sitū partis vulneratæ accōmodū, seu cōgruam positionis figurā intelligimus,

quādo plagæ hiatus: quē orificiū vocāt, semp deorsum spectat, fundum verò sursum, ita vt sanies ex ipso vulnere prona, & liberè effluat. Itaq; si vulneris figura nō ad superiora extēditur: sed ad ima vergit, nec futura, nec fibulis, nec deligatura partes disiunctæ, omni ex parte adhaesim committi: ac sibi applicari possint: atq; in pfundo sistatur sanies: nisi prius ad effluxū ipsius vitiatī hūioris, feceris sectionem, nihil vnquā proficies siue carnem generare, siue agglutinare volueris. Vbi verò cōuenientē positionis figurā vulnus in pte laborāte seruauerit, siue id ex natura vulneris: siue ex industria cōtingat, sectione noua opus nō est: vt libro secūdo ad Glaucom

Sinus in sectione cura- tus, citra vl- lā ex aduerso sectionē. nē Galenus nos edocuit. Itaq; refert eo loci se sinum in coxa enatū, figura ad ima vergēte: sine vlla ex aduerso diuisione curasse. Cum enim sinus ipse versus genu quidē terminaretur, os verò altius circa mediā scilicet

scilicet femoris regionem confisteret: iussit molle cer-
 uical popliti laborantis subiici, ut inferiorem situm
 haberet inguen, quam genu. Hac igitur conueniens
 te positionis figura in læsa parte seruata, facile per
 os, ichores, & purulenta colluuires, elabebantur, &
 effluebant. Idem quoque & in brachio fieri potest.
 Quandoquidem si os uulneris ad partem superiore
 vergat, ita brachium collocandum erit, ut ipsum oris
 ficiū deorsum spectet. Atque tum sine alia facta
 10 ex aduerso sectione, vulnus poterit ad sanitatē per-
 duci. Non secus quidem ac si os propè cubitum es-
 set, vulnere in superiora tendente. Quod si hac con-
 uenienti situs figura, particula læsa collocari non pos-
 sit, nec ex vulnere ipso sanies elabi: ex aduerso sectio
 15 molienda erit. Quod & hac sententiā iterum Galez-
 nus confirmauit circa finem libri tertij methodi me-
 dendi. Si vulnus (inquit) cauitatem altè reconditam,
 sub cute habet, considerare oportet, utrum ea in su-
 20 periore parte sit, ita ut sanies ex ea prona effluat: an
 in inferiore, sic ut illic sistatur. Eius igitur cui efflu-
 xus patet, eadem quæ aliorum curatio est. Cui verò
 non est, huic ipsi moliamur effluxum oportet. Eius
 autem [effluxus moliendi] duplex ratio est, [vbi ex-
 25 primente deligatura nihil promouemus] aliàs tota
 cauitate disecta, aliàs in fundo tantum aperta. Quas-
 dò verò harum alterutra sit meunda, docebit tum
 locorum ipsorum natura, tum verò vlceris magni-
 tudo. Si namque ea loca ipsa dubiam [seu fallacem,
 ac periculosam] sectionem faciant, & vlcus ma-
 30 gnum fuerit, in fundo aperire magis expedit. Sin
 contra se habeant, præscindere, seu diuidere præ-
 stat. Deligatio verò eius incipiat quidem (ut dictum
 est) supernè, finiatur infrà, vbi scilicet patet efflu-
 xus. Hactenus Galenus. Cæterum in tali diuisione
 35 quæ ex aduerso fit, Brunus siphunculos, hoc est, *Brunus.*
 bos, siue turundas concauas (quas cannulatas voc-
 cant) ex vtraque parte imponit. Guido verò dum *Guido.*
 hanc moliebatur sectionem, solebat uti setone (ut
 vocant)

vocant) quia melius (inquit) sordes deterget, & totum pertransit spatium, minoremq; infert dolorem. Ipsum autem intromissorio ad formam acus facto immittebat, vel hastulam ligneam in cauum vulneris imponebat, & super eam tutius sectionem faciebat. Deinde sectione facta, mundificatium aliquod medicamentum leui stupa, aut panno exceptum, superponebat, quod bis in die mutabat.

*De cauo vulnere, cum amissione substantia cutis vtriusq; 10
& carnis subiectæ tantum, non etiam ossis.*

CAPUT VI.

Vera Hippocratica; methodus sanandi caui ulceris.

Due indicationes universales proponitur, in curando cauo vulnere.



IN cauo vulnere non ipsa modò perit cuticula (quam Græci epidermida vocant) verum etiam reliquæ cutis suppositæ, natura vniuersa, & subiectæ carnis portio aliquando non exigua. Quo fit vt geminus in eo curandi finis sit propositus, vnitio scilicet & repletio: quoniam & affectus geminus est: nempe vlcus siue vulnus, quod est vnitatis solutio, & cauitas, quæ ex amissa aliqua animalis propria substantia est contracta. Itaque continui diuortium vnitionem, cauitas repletionem desiderat. Verum enimverò quoniam in proposito vulnere vnire non possumus, quæ dissident, nisi prius cauitatem impleuerimus, ordinem curationis, à cauitatis impletionem ordiri, necesse est. Omnis namque quæ præternaturam est cauitas, impleri postulat: quare & quæ in carnosâ etiam accidit parte. Ipsa verò impletio inueniendorum remediorum finis, quo tenditur, est, quem vel idiota, vel priuatus quisque etiam novit. At verò vt quæ impleant, inuenias, & multa ratione opus est, & multiplici particularim indicatio- ne, & methodo rationali exacta. Longè itaque à scopo aberrant, qui vnum id sibi ad cauum vlcus sanandum satisfacere putant, si sciant quòd carne esse im- plendum.

Libr. 3. ther.

plendum. Non enim in hoc curandi ratio consistit, *Quatuor in*
imò in eo inueniendo quod carne sit impleturum. *indicationes*

Cæterum particulares indicationes, ex quibus *particula-*
inuenire licet, quæ cavitatem uulneris impleant, *res, in cura-*
sunt quatuor. *do caui vul-*

Prima ex ipsius uulneris substantia sumitur. *1 uere pro-*

Secunda ex ipsius ægri temperamento, non corpo *2 ponuntur.*
ris modò vniuersi, sed etiam afflictæ particulæ.

Tertia ab iis, quæ coniugata, & annexa dicuntur, *3*
cuiusmodi sunt particule laborantis intemperies, &
circundantis nos æris temperies.

Quarta ex contrarietate indicationum, ut cum *4*
læsæ particula contrario est temperamento, cum co-
to, hoc est, cum corpore vniuerso. Talis siquidem or-
do indicationum statuitur à Galeno libro tertio
methodi medendi, in curandis uulneribus omnibus,
ne dum in cauo. Porro nomine indicationis substan-
tiæ uulneris, hoc loco inaudiuntur indicationes dif-
ferentiarum, maxime propriarum ipsius uulneris: de
quibus abundè suprà differuimus, & in sequenti tra-
ctatu, qui de viceribus inscribitur, locupletius ad-
huc differemus.

Itaque prima sanandi caui uulneris indicatio, nos *1*
his insinuat, carnem eadem specie cum ea que perit, *Prima indi-*
regignendâ esse. Impleri enim nō poterit, quod caui *catio.*
est (ut prima curandi indicatio vniuersalis postulat)
nisi substantia omninò similis ei quæ perit, regignas-
tur. Atqui carnis gignendæ materia sanguis est: opif-
ex verò, seu effectrix causa, ipsa natura. Verum *sanguis lo-*
non satis est sanguinem dixisse, nisi etiam & bonum *uus, mate-*
(inquit Galenus) addiderimus. Erit autem sanguis *ria est gi-*
qui infuit, & ex quo regignenda caro primordium *gnenda car-*
habet, bonus, si nec qualitate, nec quantitate vitio- *uus.*
sus fuerit. Sed nec satis etiam hoc loco fuerit naturâ
dixisse, nisi etiam quorum natura, sit adiectum, &
ubi. Constat autem, quod subiectorum corporum,
quibus superinduci caro debet, natura ipsa gignen-
dæ carnis opifex est. Porro rationem opificis *Natura sub*
habere

iectariū par- habere non poterit natura subiectarum particulas
 ticulariū opi- rum, quibus deficiens caro restituenda est, nisi iustū,
 sex est car- & minimè vitiatum calidi, frigidi, humidi, ac sicci
 nis regimē- temperamentum obtineat. Siquidem ex horum tem
 de. peratura, cuiusque corporis natura consistit. In o
 In omni ca- mni igitur cauo vulnere, duo illa primū confide
 ro vulnere- randa sunt: nempe quod subiectum est, iustāne tem
 duo spectan- perie sit, id est, an secundum naturam se habeat. Et
 da. prætereā sanguis qui influit, bonūne, an modicus
 Hypothesis. sit. Fingamus igitur & sanam esse partem subie- 10
 ctam, atque afflictam, & sanguinis (qui gignendæ
 carnis materia est) confluxum citra vllum vel in
 quantitate, vel qualitate vitium. Iis sanè ita se ha-
 bentibus, nihil est prætereā quod obftet, quominus
 prima carnis generatio prosperè contingat, idēq; nul- 15
 lius externi medicamenti ope. Quippe causis ambas
 bus vnde nascitur præsentibus, nulloq; extrinsecus
 quod impediāt, obstante, non potest prohiberi car-
 nis generatio. Verū in ipsa primæ carnis gene- 20
 ratione duplex (vt Galenus ait) prouenire excre-
 mentum necesse est: alterum quidem crassius, alte-
 rum verò tenuius. Quod & in omni qualitatis ali-
 menti mutatione cōtingere solet. Hoc autē (tenuius
 inquam) in vlceribus recentibus, quæ hīc vulnera 25
 appellamus, Latinis sanies, Græcis ichor nomina-
 tur. Illud verò quod crassum est (scilicet) nobis sor-
 des dicitur. Ac ex tenui quidem excremento vulnus
 humidum redditur, ex crasso sordidum. Eoq; dupli- 30
 cibus medicamenti eget: vtrique vt humidum est,
 ficcantibus: vt sordidum, expurgantibus. Ergo cum
 nullo vnquā tempore natura cesset, certè nec tem-
 pus vllum erit, in quo non ambo hæc in cauo vlcere
 colligantur. Quare nec tempus vllū erit, in quo non
 vtrunque medicamenti genus desyderetur. Vtrique 35
 & quod ficiet, & quod expurget. Verū non satis
 adhuc fuerit, cuiusmodi quidem genere esse medica-
 mentum debeat, inuenisse: vt iam Hippocratica ve-
 raq; methodo, inuentum est. Sed & species aliqua
 inuenien

In carnis ge-
 neratiōe, du-
 plex proue-
 nire solet ex-
 crementum.

Sanies.
 Sordes.

De Plagis, seu cruentis uulnerib. 273

- inuenienda est, quæ eiusmodi vulnere sit accommodata,
 & statuto ordine graduve circumscripta ut carnem
 producere possit. Non omne namque medicamentum *Medicamen*
 quod siccandi, & detergendi pollet facultate, carni *tū carni pro*
 producendæ est aptum, sed quod modicè: nempe pri *ducēda ido-*
 5 mo ordine tum siccare, tum detergere possit. Quip *neum.*
 pe quod super hunc fuerit, ita, ut non modo humo-
 ris qui influit, redundantia consumat: sed etiā afflue-
 tem sanguinem populetur, id refici carnem (ut Gale-
 nus inquit) ceu materiem eius absumēs prohibebit.
- 10 Itaque præsentī negotio aptissima sunt, thuris las-
 chryma, & hordeacea, & fabacea, & erui farina, &
 iris, & aristolochia, & cadmia, & panax, & pōphos-
 lyx, quæ vulgò tutia dicitur. Omnia verò hæc tum
 maioris, minorisq; discrimine inter se dissident: tum
- 15 alia eorum simplices qualitates vincentes habent,
 20 alia compositas. Siquidem aristolochia, & panax, tū *Ex 3. meth.*
 25 cæteris plus siccant, tum natura magis calent: hor-
 30 deacea fabarumq; farina, mulro his minùs siccant,
 35 nec ullum calorem obtinent. Thus modicè calet, mi-
 40 nùs tamen illis siccet: adeò ut quasdam corporum
 45 naturas, omninò non siccet. Erui farina, & iris, horū
 50 atque aristolochiæ, & panacis, medium locū tenent.
- Secunda indicatio curandi vulneris caui, quæ (ut *Secūda indi-*
 55 suprà dictū est) tum ex corporis totius, tum ex parti *catio curādi*
 60 culæ laborantis temperamento sumitur, insinuat no- *caui vulne-*
 65 bis medicamēta, vel calidiora, vel frigidiora, vel hu- *ria.*
 midiora, vel sicciora, ipsi vulnere esse admoenda:
 nepe pro natura, ac tēperamento, & totius, & afflic-
 70 tæ particulæ. Scire nanque licet (ut Galenus ait) *Duas esse*
 75 duas esse primarū indicationum differētiās, quas *primarū in-*
 80 rum vna ab eo, quod secundū naturam se habet: *dicationum*
 altera verò ab eo, quod præter naturam est, sumitur. *differētiās.*
 Porro quod secundū naturam se habet, sui custodiā
 85 indicat, & propterea quæ similia sui sint, postulat.
 90 Quod verò præter naturā est, sui ablationem deside-
 rat: proinde & contraria requirit. Perit enim quidq;
 in contrarium, & à contrario. Igitur vulnus quidem

(quia præter naturam est) quo est humidius, eo sanè medicamento, quod magis siccet, indiget. Corporis verò natura (propterea quod secundam naturam est) quanto est humidior, tanto, quod minus siccet, medicamentum postulat. Proinde, si qua sunt in diversis corporibus vulnera ulcerave, quibus par adfit humiditas: quod in sicciore corporis temperamento consistit, utique magis siccari postulat: quod in humidior, hoc sanè minus, quo natura. (inquit Galenus) naturæ interest. Siquidem productam carnem, ei quæ præfuit, similem esse oportet. Vbi igitur pristina sicciior fuit, novellâ quoque sicciorem fieri conveniet. Quare vberius hæc siccari postulat: quantoque magis sicca fuerit, tanto quod admoveatur medicamentum, magis siccam facultatē habere debet. At in humidior natura, tanto rursus in iis quæ minus siccet, medicamenti est opus; quanto caro ipsa minus est sicca. Quò fit, ut thus (quod cum temperatis, & mediis naturis consentit) in quibusdam, tum ulceribus, tum naturis, pus quidem movet, carnem non producit: in quibusdam etiam carnem producit. In humidior namque natura siccare, & producere carnem potest, in sicciore nō potest, imò humectat, ac superatur à natura, proinde & putrefacit. Præterea in modicè humidis ulceribus, tum recentibus quæ hîc vulnera & plagas appellamus, tum diuturnis, & iam inueteratis, carnem efficere potest, quippe quòd moderatè deficcet. In iis verò, quæ præhumida sunt (quòd non satis deficcet) prorsus non potest.

3 Tertia indicatio nobis insinuat inveniendum esse remedium, quod proportionem, & statum quodam ordine gradatue, ipsis affectibus qui simul cum ipso vulnere incidunt, respondeat: illosque ipsos affectus prius summouendos esse, quàm ipsum vulnus carne implere tentemus. Itaque si intemperies vulnere accesserit, atque exulcerata vulneratave caro, vel prius etiam ex quavis occasione, vel ipso vulnerationis tempore

Lib. 3. meth.
med.

Thus in quibus, tum naturis, tum ulceribus carnis producatur.

Tertia indicatio caradi vulnere carnis.

tempore, iusto calidior, frigidiorque sit effecta: utique
 medelam exigit, quæ non modò moderatè siccet, sed
 etiam intantum calfaciat, refrigerève, in quantum
 subiecta caro à naturali suo habitu recessit. Fieri
 enim non potest, (inquit Galenus) ut in vlcere, vel
 5 carnis productio, vel sinus impletio, vel agglutina-
 tio, vel cicatricis inductio (quæ omnia naturæ sunt
 opera) rectè vnquam cedat, nisi subiecta caro pro
 naturali modo se habeat. Quocirca legitimi vlcera-
 10 tarum, seu vulneratarum partium tēperamenti ma-
 ior tibi sollicitudo erit, quoties eas, vel carne imple-
 re, vel glutinare, vel cicatrice inducere studeas. Itaque
 congruis, atque opportunis auxiliis, aduersus illos,
 15 qui cum vulnere incidunt affectus, pugnare oportet,
 priusquam vulneris ipsius curationem aggre-
 diamur. Veluti igitur si phlegmone vnà cum vul-
 nere esset, nemo vulnus ipsum, vel carne implere, vel
 glutinare, vel cicatrice inducere, attentare debet,
 priusquam illa discussa sit. Ad eundem arbitror
 20 modum etiam, si sine phlegmone sola subsit intem-
 peries, nullum horum fore prius sperabimus, quàm
 illa sit sanata. Quòd si hæc ita, ut dictum est, se ha-
 bent, inspicere etiam conueniet circundantis nos aeris
 25 temperiem. Si quidem (ut tertio methodi Gale-
 nus ait) veluti medicamentum quoddam, is quo-
 que corporibus nostris forinsecus incidens, vbi im-
 30 modicus calore, vel frigore est, sanationem re-
 moratur. Danda igitur opera est, ut medica-
 menta excessui [ipsius ambientis] occurrant.
 Ideoque Hippocrates. In calidioribus anni tem-
 35 poribus, iis, quibus frigidior facultas sit, medica-
 mentis utitur, calidioribus per frigidiora. Adeo-
 (inquit) perpetuò verum est illud theorema. Quæ
 secundum naturam sunt, similia sibi, indicantur.
 40 Quæ præter naturam, contrariorum, si
 modò saltem illa seruari, hæc summoueri deside-
 rant. Porro ambientis nomine hoc loco, & præ-
 sentes status, seu anni tempora, & etiam regiones,

*Circundantis
 nos aeris tē-
 perie in cu-
 randis vul-
 maxime spe-
 ctanda esse.*

*Que noie
 ambientis in-
 telligantur.*

4 cum Gal. intelligimus.

Quarta indicatio curæ di vulnere cau. Quarta indicatio particularis in sanando cauo vulnere obseruanda, sumitur (vt superius dictum est) à contrarietate indicationum: nō quidem earum, quæ in diuersis temporibus perficiuntur, sed earum, quæ in vno, eodemq; tempore ipsius curationis subinde offeruntur. Vt exempli gratiā, si ægri temperamentum iusto sit humidius: particula verò ipsa quæ laborat, sicciior: aut contrā, quòd hæc sit humidior, & totius temperamentum siccius. Pari modo in calore, & frigore; quòd contrario temperamento sit pars cum toto. Diuersa sanè in his est ea, quæ à patiente particula accipitur indicatio, ab ea, quæ ex ægri sumitur natura. Itaque hæc particularis indicatio, quæ quartā in ordine posuim⁹, insinuat nobis medicamentā, vel humidiora, vel sicciiora, vel calidiora, vel frigidiora, aut put res postulabit, media, ac tēperata, deligēda esse, q̄ ipsi vulnere admoueātur. Statuam⁹ igitur clarioris doctrinæ gratiā totum corporis laborantis temperamentum humidius esse, eoq; medicamenta desiderare, quæ min⁹ siccant: ipsam verò ægrā particulam ex earum numero esse, quæ sicciiores sint, qualia sunt ea, quæ min⁹ carnosā conspiciuntur. Cuius generis sunt, quæ circa digitos, & articulos habentur: præterea, quæ circa aures, & nasum, & oculos, & dentes sunt: ac vt semel dicam, vbi crebræ cartilagine, & membranulæ, & ligamenta, & nervi sunt: adeps verò, & caro, vel omninò nulla est, vel perquam exigua. In hac siquidem hypothesi, si quāto ægri temperamentum iusto est humidius, tanto particula iusto sit sicciior, nec adiiciendum, nec detrahendum pharmaco quicquam est, sed tale adhibendum, quale si vlcus, vuln⁹ sive, in medi⁹ temperamenti particula consisteret. Sin sicciior debito particula fuerit, quā corporis tēperamentū iusto est humidius, vtique in tantum intendi siccitatem medicamenti conueniet, quantum particulæ temperamentum, totius temperamentum excedit. Veluti si quatuor

Hypothesis ex lib. 3. the.

quatuor numeris sit pars exulcerata medio temperamento siccior: ægri verò natura gradibus tribus humidior: manifestum est particulam, quæ nunc vulnerata exulcerataue est, siccius vno gradu desiderare medicamentum, quàm pars quæ sit temperata cæteris partibus. Sed vt hæc omnia coniectura sola cognosci possunt: ita longam in hominum naturis: & medicamentorum facultatibus contemplandis, exercitationem postulant: nec est præterea, quòd
 10 de indicationibus, quæ à calido, & frigido sumuntur dicatur. Quandoquidem ad portionem dictorum intelligi possunt. Vides ne igitur clarissime, quot huic theorematibus sit opus, qui probè ac certa methodo curare vulnus cauum voluerit.

25 Nam postquàm inuentum est, humorè omnino huic vitio inesse: vtiq; siccans medicamentum parandum indicauit. At quoniam ipsorum siccantium quædã magis siccant, quædam minus partim ex vulnerum diuersitate, partim ex ægri natura, quod expedit, est
 30 desumptum. Itaq; non modò de corporis natura meditata sit oportet, quisquis commodè, & ex arte sanare vulnus eiusmodi studet: verum etiam diligenter speculatione omnem de medicamentis didicisse, tum siccis humidisq; corporum temperamenti notas
 35 callere. Adhæc tum ambientis temperies, quæ vtiq; tum ad præsentis status, seu anni tempora, tum verò regiones extenditur, tum partium naturæ, tum indicationum inter se pugnantium contrarietas, eidem confideranda sunt. Verum enimverò Theffalus, & plerique
 40 alij medici, qui etiam illum hodiè imitatur, ista quidem nec inquirunt, nec norunt. Sed iuxta prouerbiū mali futoris modo: vno calopodio omnes calceant, nullo naturarum, aut partium: aut id genus aliorum factò discrimine. Cæterum apud recetiores chirurgos
 45 in curando hoc vulnere, communis hic modus obseruari solet. Stata iam sanguinis profusione, & parte affecta, ab inflammatione, & dolore vindicata, vino calente vulnus abluitur: mox ipso perluto,

*Epilogus
præcedentium.*

Praxis communis.

ac deficcato, paluis aliquis carnem regenerans, aut
 vnguentum aliquod sarcoticum, admouetur. Itaque
 linamenta his sarcoticis (quorum libro sexto abundè
 meminimus) imbuta, aut conspersa, in sinum vulne-
 ris demittuntur. Post hæc suprà aridæ, vel quæ vino
 maduerint, superponuntur. Ac demùm, quæ medica-
 menta approbè continere possit, deligatura adhibe-
 tur: atque ætate bis, hyeme semel duntaxat, auxi-
 lia eiusmodi permutantur. Porro eiusmodi medica-
 mina, quæ vulnerum, atque vlcærum cavitates im-
 plent, medioeriter, citràque morsum abstergentia
 sunt, vt libro quinto simplicium medicamentorum
 Galenus annotauit.

De Vulnere implerò siue equali. C. A. P. VII. 15

Methodus
 inducenda
 cicatricis.



Cutis eadè
 specie cū ea q̃
 perijt, regi-
 gni non pōt.

Aeterùm vbi vulnus purgatum, im-
 pletumq; carne fuerit, æquale tunc,
 siue æquabile, latum, planum, atque
 impletum nominatur. Hoc autem ci-
 catrice tantùm induci postulat. Por-
 rò vt ad cicatricem perducatur, amif-
 sam cutilam, quam epidermidæ Græci vocauimus,
 desiderat. Hanc igitur, tum regignere, tum sibi vn-
 ire oportet. Verùm cū ex semine ortū habeat cutis, ta-
 lis omnino, qualis erat, quæ perijt, prius regigni nō
 pōt: simile quiddā tamē cuti, & qd̃ eius officiū sup-
 pleat restitui pōt: nō tamē planè cutis. Quādo igitur
 vt cutis regeneretur, fieri omnino nequit, qd̃ superest,
 efficere est cōtādū: nepe instaurare aliquid, quod cuti
 deperdite simile sit, & carni sit veluti naturale aliqd̃
 tegumētū. Id enim est vulnus iam repletū, planumq;
 redditū, ad cicatricē ducere. Qui finis est, quem nunc
 hic præcedimus. Huius itaque efficiēdi ratio hæc est.
 Portio quæpiā subieciæ carnis nuper genitæ, & resti-
 tutæ: ea scilicet, quæ summo tenus euidenter appa-
 ret: sic alteranda est, vt non amplius caro permaneat
 sed veluti cutis euadat. At quo pacto inquires ita alte-
 rabitur? profectò alicuius alteratiū qualitātū ope.
 Ergo

20

25

30

35

De Plagis, seu cruentis uulnerib. 279

Ergo (vt Galenus ait) quoniam cutis carne ipsa tū sic- Lib. 3. meth.
 20 cior est, tū etiā densior, si carnem siccabimus, & ad med.
 25 stringemus, cuti etiā perfimilē reddemus. Et hæc
 30 quidem est medicamenti: quod cicatricem inducit,
 35 summa. Verū ea non satisfacit: nam & glutinato-
 ria, tum siccabant: tum etiā adstringebant, sicuti
 & epulotica, id est, cicatricem inducentia. Adicien-
 dum ergo est, quo ordine graduue siccare debeant
 medicamēta: quæ cicatricē inducunt, quemadmodū
 10 & de sarcoticis, & glutinatoriis fecimus. Id autem
 ex ipsa rerum substantia facile inuenies. Epuloti- Epuloticoꝝ
 15 cum, ranque, id est, cicatricem inducēs medicamen- facult. as.
 tum, non modò qui influit, humorem (vt glutinato-
 rium) sed eum quoq; , qui in ipsa carne subiecta cō-
 20 tinetur, cōsumere debet. Quò fit vt multo profecū
 siccus, quod cicatricem inducat, quàm quod agglu-
 tinet medicamentum esse conueniat.
 Itaq; tres gradus desiccantiū medicamentorū, Tres gradus
 in curatione vulnerū necessariò statuendi sunt. Nē desiccantium
 25 pe sarcoticorum, id est, carnem regnentiū, quos medicamen-
 rum facultas ex primo ordine est desiccantium. Ag- torū, in cu-
 glutinatoriorum: quæ secundo gradu: vel etiā ter, rasice vul-
 tio resiccant. Et epuloticorum hoc est, cicatricem nerū statuē-
 inducentium, quæ siccandi facultate prædicta ad- dos esse.
 30 huc superant. Hæc enim non accidentalem modò, Sarcotica.
 & confluentem (quæ præter naturam est) humo- Agglutina-
 rum redundantiam desiccare, ac cōsumere debet: tor. 2.
 sed eum quoque humorem, qui secundum naturam Epulotica.
 35 est, & in ipsa (vt dictum est) subiecta carne contine-
 tur: Quò & sequentibus verbis Galenus restatis-
 40 est, Glutinato (inquit) vnum id propositum est,
 vt eius: quod præter naturam est, redundantiam cō-
 45 sumat. Qui cicatricem inducet, non hoc modò, ve-
 rum etiā vt ei, quod secundum naturam se ha-
 50 bet, aliquid deradat. Priusquam igitur vulnus ci-
 catrice possimus obducere, eo vsque resiccanda
 caro est, donec calli similitudinem induerit, & cuti
 similis euaserit. Quòd sane p se primariò, ac propriè Epulotica.

280 Institut. Chirurgicarum, Lib. II.

proprie di- hoc est, peculiari facultate medicamenta effecerint,
cta quā fa- quæ adstringendi modicè facultatē habent: & eiul-
cultatē ha- modi quidem: vt plurimum frigida sunt, & sicca.
beant. Cuius generis reputantur: galla immatura, malicos-
 rium, id est, mali Punici seu Granati cortex, balau-
 strum, qui flos est syluestris Punicæ fructus spinæ
 Aegyptiæ vel eius loco acacia, rhus, seu sumach, &
 eius generis vniuersa: quæ modicè adstringunt, atq;
 deficcant. Per accidens verò, & secundariò carnem
 alterando: & calli instar indurando cicatricem etiā
 inducunt calida medicamina, quæ carnem detrahe-
 re: ac colliquare sunt nata, Galeno libro quinto
 simplicium cathæretica, id est, detractoria dicuntur
 vulgò autem consumptiua. Cuius generis sunt
 chalcitis, & æs vstum non lotum: quod enim lotum
 est: verè est epuloticū: & æris squamma, & misy, &
 fissum alumen, & quod vulgò vitreolū appellatur.
 Quæ prædictis verè epuloticis: id est, primario, &
 ex sua facultate cicatricem inducētibus, multò sunt
 valentiora. Misy quidem, & chalcitis præcipuè. Mi-
 tior autem æris squāma: atq; etiam hoc mitius æs
 vstum quod etiam si lauabis: vtiq; (inquit Galenus)
 minus mordeus medicamentū habebis. Itaq; si quā-
 do iis vti ad cicatricem inducendam in aliorum pe-
 nuria, cogimur, parcissimè ipsis vtemur: largius
 enim admota, mordicant colliquantq; carnem, &
 vlcus cauum efficiunt. Summum igitur tantum spe-
 cillum, hoc est, specilli cuspidem, in ea ad excus-
 sum læuorem tusa dimittemus, ac post velut tes-
 nuissimum quendam pollinem partibus: quæ cic-
 trice induci postulant, leuiter eas contingentes im-
 ponemus. Quòd si illa etiam aduras, vt minus acria
 sic ad cicatricem inducendam, reddes magis apta.
 si verò etiam laues, adhuc fient mitiora. Sed de
 his locupletius, atque accuratius dicemus in anti-
 dotario, & in tractatu de vlceribus.

De cicatricibus reparandis in vlncribus.

Defor

DEformes, atq; indecorę cicatrices, tenerę qui-
dem adhuc, & recentes instaurantur Razi,
admoto diachylo: aut lithargyro (vt vocāt)
nutrita. Cicatrices nigras tollunt, oleum in quo ra-
dix bryonię tum candida, tum nigra incocta sit,
dum succum reddat impositum: calamintha ex vis-
no cocta, argenti quoque spuma cum rosaceo albo
lota. Craisiores verò, & iam inueteratę reparantur
oleo balsamite appposito: vel radice cucumeris sylue-
stris (quem asininū vocant) trita, & apposita. Quòd
si his, aut similibus non tollantur, id totum quod su-
pereminet: atque excrescit cultro rasorio rescinden-
dum est, vel cauterio amouendum. Crustam verò
resolues admoto gallinę, aut anatis adipe: vel etiam
mastiche. Hęc quidem in iis agenda censent recen-
tiores chirurgi. Verùm Cornelius Celsus stultum
esse existimat, si vel excreuit cicatrix, vel cōcaua est
decoris causa rursus & dolorem, & medicinam sus-
stinere. Alioqui (ait) res vtrique succurri paritur. Si
quidem vtraque cicatrix exulcerari scapello potest.
Si medicamentum aliquis mauult, idem efficiunt cō-
positiones hęc, quę corpus exedunt. Cute exulceras-
ta, super eminentem carnem, exedentia medicamen-
ta conicienda sunt: super concauam, implentia, dos-
nec vtrunque vlcus sanę cuti æquetur, tum cicat-
rix inducatur.

De vulnere supercrescentem carnem habente, quam

Graci hypersarcosin vocant.

30 *C. A. P. V. III.*



Vlnus quod hypersarcosin, id est, super-
crescentem carnem habet, morbus est
ex eo genere, quod in quātitate magni-
tudineve partium spectatur, quemad-
modum & cavitās erat, de qua paulò
ante egimus: ergo veluti vulnus cauum, non vnum
est vitium: sed pariter cavitās, & vulnus. Ita vulnus
aut vlcus, quod supercrescentem carnem habet, nō
est vitium, sed pariter cavitās, & vulnus. Ita vulnus
aut vlcus, quod supercrescentem carnem habet, nō

carne ha- *virus* est morbus: sed simul caro supercrescens, &
bens, nō v- *vinus* vlcusue. Prior morbus, qui instrumētarius
us est mor est (nempe magnitudo, quæ præter naturā est) pri-
bus. mā indicationē (quæ veluti meta est inueniendorum
 remediorum) nobis insinuat: ipsius scilicet exuber-
 rantis, & præter naturā modum excrescentis, abla-
 tionē. Alter verò morbus qui cōmunis est (nempe so-
 luta vnitio) cōiunctionem indicat. Porro ipsa agglu-
 tinatio, seu dissidentium coniunctio, vti & carnis
 generatio naturæ quidem operā (vt prius diximus) 10
 perficitur. At supercrescentis carnis detractio, nul-
 lum quidē inquit Galenus naturæ opus est: sed scilicet
 is medicamentis, seu medicamētōrū ope perficitur,
 quæ vehemēter exiecent, & naturā acria lint: cuius
 modi sunt, atramētū sutoriū, quod Græcis chalcas 15
 rum dicitur: chalcitis seu vitreolum spongia, radix
 asphodelorum, hermodactyli stupæ minutim incis-
 sa, linamēta ē panniculo carpta muria acriori imbu-
 ta, & resiccata: vnguentū viride, & id genus alia tū
 simplicia, tū cōposita, quæ ex libro sexto sunt requi- 20
 rendæ. Caterum id vñi semper fideli memoria ob-
 seruandū moneo: nempe pro diuersis corporum, &
 partū rēperamentis, varianda esse remedia. Eadem
 enim medicamenta quibusdā naturis carnem excre-
 scentem insumunt, aliis verò cicatricem inducunt, 25
 aliis solum glutinatorio minus præstant. Eiusmodi
 namque medicamenta quæ carnē minuunt (septica
 Græcis impropria quidem appellatione, dicuntur)
 proxima sunt, tum iis quæ valenter detergent, tum
 iis quæ cicatricem inducunt. Sic vt non pauci inter 30
 rim inquit Galenus libro tertio methodi medendi
 per errorem medicamētū, quod carnem minuit: vel
 pro eo quod sordem deterget: vel pro eo, quod cicat-
 tricem inducit accipiant. Exempli gratiā misy, &
 chalcitis quæ inter cicatricem inducentia annume- 35
 rauimus) si naturæ humidæ applicabis, potius car-
 nem demere, quàm cicatricem inducere deprehē-
 des. Adde quod inter eiusmodi septica, quæ carnem
 tenel

Carnis de-
 tractionem
 medicamen-
 tis per-
 naturæ lib.
 3. metho.

Septica, id
 est, carnem
 minuentia.

tenellam uulneribus, atque vlceribus supercrescens
rem colliquant, & absumunt: quædam valentiora
sunt, quædam imbecilliora, & mediocria. Quocirca
nonnulla mediocres carni supercrescentias exedunt.

5 Alia vero maximas hyperfarcies, id est, carnis im-
modicas excrescentias minuunt, & ad vsque peni-
tiora crustis obducunt. Cuius generis est, quod reci-
pit calcis viua, squamma æris, & manna thuris pa-
res modos. Sed de iis quidē adhuc locupletius libro
40 sexto dicitur: quare ad reliquas uulnerum differen-
tias properandum est.

De uulnere contuso, ab aëre alterato, dura, callosa, labi-
habente, cruciante, & phlegmone, aut alio præter natu-
ram tumore, impl. cito. C. & P. IX.



Vlneris (vt in præcedentibus demōstra-
uimus) qua vulnus est, sanatio, medior-
cris siccatio est. At vulneris, quod cum
20 alio affectu coniunctum est cuius vides
licet præcedere curationē oportet) eius
curatio, vt vulneris solius non est, sed prior illius af-
fectus, qui cū vulnere consistit, secunda, verò ipsius
vulneris: nā siue phlegmone quæpiam, siue nigrizia
25 siue ecchymosis, siue erysipelas, siue tumoris, qui
cedema dicitur, vlceratam, vulneratamve carnem
obsident, primum eius molienda curatio est. At
verò quod vulnus interim nō solum non commodē
curatur, sed multo etiam maius redditur, id neminē
30 (inquit Galenus) latere puto. Itaque siue contusa fue-
rint circumposita vulnere loca, seu phlegmone, a-
lii siue tumor præter naturam in his consistit, pro-
pria eius affectus sanatio inuenienda nobis est: illud
pro certo habentibus, fieri nō posse, vt vulnus sanetur,
35 nisi locus, in quo consistit, prius sit sanatus. In
eiusmodi igitur uulneribus, supposito cōmuni regi-
mine phlebotomie, purgationis, & diæte (quandocū-
quidē hi affectus præterquam quod vulnere ipsa ad
caco

284 Institut. Chirurgicarum, Lib. II.

cacoethiam præparant, fluxionem etiam in vnum locum dolentem excitant, auocantq; tametsi etiã corpus nec sanguine, nec vlllo succorum vitio redundet) topica, seu localis curatio communis est, agglutinationem prohibere, & fluxionem arcere. Quocirca rectè mihi fecisse videberis, si in contuso, cruciante, & phlegmonoso vulnere, statim per initia, loca circumiacentia illiueris, vel rosaceo, vel myrrino oleo, vel vnguento, quod constat bolo armenia, oleo, & aceto. Suprà verò dolentem partem oleum aliquod admoueris, quod vel leniendi, vel molliendi, vel maturandi (vt res exigit) vim habeat. Ponamus igitur carnosam aliquam particulam telo tum cæsam, tum contusam esse: huic sanè ita ex Hippocratis sententia medendum est, vt quàm celerrimè suppuret. Necesse enim est, carnes sic contusas, putrescere, & in pus verti. Postquàm verò sic per quandam putrescentiam in pus versæ fuerint, liquari, & tandem nouam carnem nasci. Adde, quòd hac curandi via, & ratione obseruata, minùs (eodem Hippocrate autore) phlegmone vrgebitur caro ipsa sic cæsa, contusaq;.

Dux igitur intentiones in curando vulnere contuso, nobis proponuntur: nempe suppuratio, & nouæ carnis generatio. Porro cùm suppuratio cum quadà fiat putrescentia, & omnia quæ putrescunt (Galeno autore) ex calido, & humido sic afficiantur, nimis rùm quæ calfaciant, humectentq; hisce contusis vulneribus, atque adeò omnibus iis affectibus, quibus moueri pus expedit, admouebimus. Cuiusmodi sunt, maluæ coctæ, radix althææ, tetrapharmacum, panis triticeus, hordei farina ex aqua, & oleo: itemq; panis ex aqua & oleo. Præterea fomentum multæ calidæ aquæ: hæc enim, & similia omnia quæ sic cal faciunt, & humectant, celerrimè pus mouent. Horum autem materiam copiosam habes libro præcedente de tumoribus præter naturam: & in antidotario: item libro quinto de simplicibus. Verùm enim uerò non fuerit alienum, hîc vnum, atque alterum

*Vuln. contu-
si recta cu-
randi ratio.*

Hypothesis.

*Gemina in-
tentio, in cu-
rândo vulne-
re contuso
proponitur.
Lib. 4. The.*

De Plagis, seu cruentis uulnerib. 285

compositum medicamentum subiicere, quod ad sup-
 25 purationem in proposito vulnere benefaciat. *R. ras Ex Auic.*
 25 dicis althææ, cucumeris agrestis, singulorum vñ *fen. 3. quar.*
 25 ciam semis, origani agrestis, hyssopi ana manipu- *ti*
 25 lum semis, florum chamæmeli, seminis lini, ana pu-
 25 gillum vnum, ficus pingues sex, vuas passas pari nu-
 25 mero: vnâ bulliant, ac tandem iis pressis, ac diligens-
 25 ter tuis, adde galbani, myrrhæ, sty racis liquidæ, œs-
 25 sippi, ana drachmam vnâ semis, sanguinis draconis
 10 adipis porci, ana vñciam semis, componatur malas-
 gma. Conducit plurimum ad eandem intentionem
 assequendam, & infra scriptum medicamentum, in
 formam emplastri redactum. Accipe foliorum mal- *Emplastru.*
 25 uarum, & violarum ana manipulum vnum, radicis
 25 althææ libram semis: decoquantur in iure carniū
 absque sale, postea subigantur in mortario, & cri-
 bro incernantur, ex cribratura cum prædicta deco-
 ctione, & farina hordei, ac tritici, ana quantum fas-
 10 tis esse videbitur; fiat emplastrum solidum, siue
 10 malagma, addendo butyri & olei communis singu-
 lorum vñcias tres, vitellos duorum ouorum, & cro-
 ci momentum. Hoc autem, vt & præcedens malas-
 gma super vulnus, & contusam carnem, dandum
 est. In ipso verò vulnere imponi debet digestiuum
 25 (vt vocant) ex terebinthina resina, & ouorum lu-
 teis. Caterum perducto ad suppurationem vulne-
 re, his, quæ pus mouent, relictis, ad purgantia, &
 detergentia transeundum erit, vt sunt, tincta in mel- *Digestiuu
vulnere im-
ponendum.
Detergentia
quando ad-
mouenda.*
 30 le linamenta, mundificatiuum ex apio, & id genus
 alia, quæ in antidotario descripta inuenies. In omni-
 bus autem eiusmodi vulneribus, recte inditur turun-
 da melle rosaceo, aut vnguento Apostolorum nunc-
 cupato, imbuta. Suprà verò id purgans, detergentive
 35 medicamentum, stupæ aridæ dandæ sunt: adaptan- *Stupe arida*
 35 daq; est deligatura, quæ admota medicamenta pro-
 be retineat, donec perfecte expurgatum vulnus
 25 fuerit. Tum demum autem purum vlcus est (in *Cor. Cel.*
 25 quit Celsus) cum rubet, ac nimium neq; siccum, neq; *lib. 4.*
 humid

286 Institut:Chirurgicarum, Lib. II.

humidum est. Ac quodcunque sensu caret, quod nō naturaliter sentit, quod nimium aut aridum, aut humidum est, quod aut pallidum, aut albidum, aut lividum, aut nigrum est, id purum non est. Purgato, vt decet, vulnere, carne ipsum implere oportet, & quæ secunda erat in curando hoc contuso vulnere, intentio. Carnem igitur modo, quo supra diximus, generare oportet, & iam impletum vlcus ad cicatricem perducere. Quem scopum facile assequeris, si turundam indies paulatim imminueris. Ita enim fortius naturæ operâ, ac citra vllum medicamentum, vlcus carne implebitur, & cicatrice obducetur. Quod si caro multum esset dilacerata, & futura utilis videretur, consuatur laxa quadam futura, labia retinente. At si labra vulneris ab ambiente alterata fuerint, ac dura, callosa & appareant, scalpello illa rint dura, (modò nulla alia obstitit dispositio) corium amovendo, renouare oportebit: deindè consuere. Porro si cæsa contusa & caro enumeratis modò auxiliis, ad suppurationem perducere non possit, videatur & in gangrænam, ac partis corruptelam degenerare (quod ex tarda, difficili & maturatione, & fusco, liuido, aut nigro loci affecti colore, deprehendes) vnguentum Aegyptiacum nominatum, capite de curatione gangrænae descriptum, aut aliquod aliud simile medicamentum, quod ad eiusmodi corruptionem, & mortificationem sit idoneum, protinus erit admouendum. Quod si alia quædam symptomata, vel affectus, huic contuso vulnere supervenerit, vt dolor, phlegmone, aut quivis alius tumor præter naturam, aduersus illa congruis (quæ suo loco dicta sunt) res mediis erit pugnandum.

De ecchymosi seu ecchymomate, id est sanguinis subtercutem effusione, & contu quod vna cum contusione, rptione &, cute integra manente, hoc est, non vulnerata, incidit.

C. A. P.

X.

Ecchym



Ecchymoma, id est, sanguinis subter cutē effusio & coitus, soluta cōtinuitatis ge-
Ecchymosis quid.

nus quoddam est, quod plurimum (vt li-
 bro quarto methodi ait Galenus) vnā

cū contusione, ruptioneque incidit. Quo-
 circa non fuerit à proposito alienum, si propter affi-

nitatem, quam habet cum prædicto vulnere, pauca
 nunc obiter de eo dicamus. Itaque incidit interdum

hoc vitium, cum sola contusione, citra carnis muscu-
 losæ, in profundo hærentis corpore, ruptionē, quod
 Græci rhegma appellāt: vt ex violēto ictu, vel graui
 casu. Aliquādō verò cū sola ruptione, absque etiā cō-
 tusione carnis (quod Græcis sarcothlasma & thlasma
 dicitur) consistit: vt cū motu quopiā valente, & con-

fertim factō, citra graue aliquod extrinsecus incidēs,
 caro dirumpitur. Nonnunquā etiam cum utroque,
 vt cum graui, ac duro quopiā corpore, quod extrins-

secus superinciderit, vel casu ab alto, non modò car-
 nosæ musculorum partes, sine cutis diuortio contun-

duntur, sed etiam ex distentione violenta, & confers-
 tim facta, abrumpuntur. Tunc enim venis exiguis,
 in ea sic contusa ac rupta carne, diuortium expertis,
 sanguis exilit, vndē ipsum ecchymoma sub cute col-

lectum nascitur. Cuius apparentes notæ sunt, tumor
 mollis, & tactui cedens, liuidus, & magna ex parte
 indolens. Fit autem etiam aliquandō ecchymosis,

& ex oris vasorum apertione, quam anastomosis
 vocant, & ex ea, quæ à nonnullis diapedesis dicitur:

id est, transcolatio, exilitio, vel transmissio, aut sub-
 sultus. Porro accidit anastomosis propter tum va-

sis imbecillitatem, tum sanguinis, qui ad os eius im-
 petu ruat, copiam. Adhæc, ob acrem quampiam, quæ
 illi extrinsecus incidat, qualitatem. Diapedesis ex

tunica quidem ipsa rarefacta, sanguine verò tenuato
 oritur. Accidere præterea interim potest, & ex gra-
 cūm vasorum ore adaperto. Verūm de ecchymosi
 tantū ecchymosi nunc agitur, quæ contusionem, vel
 ruptionem consequitur. Hanc igitur ecchymosim
 propt

Ecchymosis quid.

Ecchymoma à quibus occasio- nibus excite- tur.

Ecchymosis notæ.

Anastomosis unde ex- citetur.

Lib. 5. de Diapedesis unde ori- tur.

288 Institut. Chirurgicarum, Lib. II.

propter solutam vnitatem affatim factam, dolores, & ob sanguinis in profundo concursus, abscessus nonnunquam insequuntur, qui magna ex parte per *species ec-* halitum digeruntur. *chymoma-* Species autem ecchymomati sunt hyp^a pia, quæ Romani suggillata vocant, & *sis.* liuores ex ictu proueniētes, Græcis hyposphagmata nuncupata, quæ & interpreti Auicennæ vestigia percussioneis, Latinis verò propriè vibices, dicuntur.

IUDICIA Ecchymoma quod cum magna, ac violenta con-
de ecchymo- tusione incidit, periculo non vacat. Solet enim fre- *mate.* quenter (si negligatur) non modò afflictæ particule, sed & corporis totius corruptionem adferre. At si forsā in contusione, quæ cum ecchymosi consistit, cutis à carne seiuncta, maneat pendula, rarò vel nunquam agglutinatur. Proinde satius est, eam præscin- dere, & exiccantia medicamēta admouere, vel absq; deligatura, locum sic excoriatum relinquere. Aer nanque ambiens cutis ipsius instaurationem non mediocriter adiuuat.

*Curatio ecchymomatis, quod vel contusio,
vel ruptio excitauit.*

Libr. 4. met. Ceterum, quoniam ecchymosis seu ecchymoma, plurimum (vt Galenus ait) vna cū contusione, ruptione q; incidit, idcirco in ipso curando, plures erunt indicationes obseruandæ. Semper enim pro affectuum numero, etiam medendi indicationes respondent.

1 Indica- Prima indicatio est, fluentem ad locum affectum
tio in curan- materiam vacuare, & auertere. Quod optimè quidem fit, autore Auicenna, venæ sectione, quam omnes etiam artis periti, in hoc affectu imperant, quanuis corpus mundum, hoc est, purum ab excrementis, fuerit.

2 Intentio. Secunda intentio est, dolorem sedare, & partem læsam, ne fluxionem excipiat, robur adferre, rebus frigidis, & stypticis eam perfundendo, atque illinendo. Vnde Razes, & Lanfrancus partem eo vitio laborantem,

De Plagis, seu cruentis uulnerib. 289

rantem, inungebant rosaceo, & post vnctionem, puluere myrtillorum respergebant, ac mediocri des-
ligatura stringebant. Verum enimuero in communi
vfu obseruatum est, vt per initia oui candidum rola
5 ceo permixtū, loco dolēti, ac sic effecto, admoueat.

Tertiō, curationis consilium eò dirigere debes ^{3 intentis.}
mus, vt sanguinem ipsum totum, qui subter cutem
effusus est, dissipemus, ac resoluamus, idque confes-
sum, priusquam nigruerit, & in grumos iam coēs-
10 rit, Quod factu quidem haud difficile erit, si & sang-
guis effusus tenuis, & propē summam cutē: non aus-
tem in profundo situs, fuerit. Quòd si discuti non
possit, tum infra scriptis digerentibus medicamen-
tis, tum scarificationibus educendus erit, & si nihil
15 hæc promouerint, affectus eiusmodi more abscessuū
curandus erit. Itaque sanguinis sic per contusio-
nem ruptionēque, subter cutem dispersi, dissipatio, & vacuatio, ecchyma-
maris, quā ecchyma-
ma est, <sup>Propria ec-
chyma-
curatio.</sup> propria est curatio, vt libro quarto methodi meden-
20 di tuis verbis Gale. testatus est. Sanē (inquit) ecchyma-
sis omnis vacuationem pro remedio curationis indi-
cat. Quare calfacientibus huic, & modicē siccanti-
bus medicamentis est opus [quale est ex nigris popu-
lis acopon]. Quippe quæ vehementer siccant, diges-
runt illa quidem in principio euidentius quā quæ
25 sunt imbecillia, cæterum nonnihil ipsius vitis scir-
rhosum, difficileque curatu relinquunt. Curandum
verò est, vt ruptis, quæ in profundo hærent corpo-
re, hæc tum vires habeant magis intentas, tum ipsa
magis acria, magis que dissipantia sint tum (vt semel
30 dicam) tantò efficaciora, quantò magis à cute ad pro-
funda ecchyma-
sis recessit. In talibus sanē nec cucur-
bitæ vsus sit inutilis: id enim instrumentum, ad vio-
lentum attractum, à medicis est excogitatum. Ves-
tibus enimuero, quoniam tunicæ venularum, ex quibus
35 sanguis exiit, contusæ sunt, per initia sanē (vt
Galeno, & Paulo visum est) nonnihil ex adstringen-
tibus, iis quæ digerunt, admiscere oportet. Contuse

*Propria ec-
chyma-
curatio.*

*Omnem ec-
chyma-
sin
vacuationē
indicare.*

*Cucurbitu-
le vsus, in
quibus ec-
chyma-
tis utilis.*

Ecchyma- enim illæ venularum tunicæ, aliquam densationem
matris pini- requirunt, vt ad naturalem suum statum reducatur,
tia, non nihil & ne noua materia ob dolorem attracta, ad locū con-
adstringen- tusum delabatur. Quandoquidem si solam digerens
riū discutiē- tem viū haberet medicamentum in principio appli-
tibus admi- catum, non modò id quod effusum est digereret, sed
scendum. & per contusionem aliquid sanguinis, qui contusis
 venulis cōtinetur, extraheret, vt testis est Gal. lib. 5.
 de compositis medicamentis secundum locos. Quā-
 dō autem in naturalem statum venulæ redierint, cis
 tra adstrictionem ad sola digerentia medicamenta
 venire tempestiuum est. Porro in quibus sic mo-
 dicè adstringentium quiddam, nec non per halitum
 digerentium miscere conuenit, perspicuum est, im-
 becilliora primū debere assumi: validiora autē in-

Ad inuetera- ueteratis, & iis quæ nigrescunt, admo-
ta ecchyma- uerata igitur ecchyma-mata, Paulo etiam autore, ras-
mata. dicula illitu prodest: quippe discutit ea, vbi erodere
 Lib. 4. inceperit: vel ipsius radiculæ succus, cum micis pa-
 nis inductus. Ceterū ex moderatè digerētibus, quæ
 vulgò resolutiua domestica vocant, hæc sequentia
 sex auxilia in communem vsum veniunt.

- 1 Primum constat vino, melle, & sale.
- 2 Secūdū ex farina hordei, calaminthe, & vino cōficiūt.
- 3 Tertium recipit ceram, & cuminum.
- 4 Quartum fit ex floribus chamæmeli, meliloto,
 stœchade, & cumino, omnibus in vino decoctis.
- 5 Quintum ex maluis, fursure, absinthio, cumino,
 aut anetho, aqua, vel vino incoctis.
- 6 Sextum fit, ex farina hordei, & fornigræci, cro-
 co, & momento auripigmenti, omnibus quidem
 aqua calaminthæ incoctis.

Potiones quæ Solent & portiones quædam institui, quæ si assus-
in ecchyma- mantur, sanguinem concretum, & extra vasa effus-
si à recētiori sum (vulgò mortuum vocant) dissipare, ac resolue-
bus propinā re creduntur: cuius generis est ea, quæ constat bdely-
tiur. lio, costo, centaurio, & syropo acetoso, atque huic
 aliæ quædam confimiles, quæ in casu ab alto, offens-
 sicne,

De Plagis, seu cruentis uulnerib. 291

fione, & violento membrorum tractu, ac distentione, offerri consueuerunt. Cum autem totum ecchyma, digestum per halitum est, siccare iam uehementius ruptum ipsum permittitur, ac deligatura coniungere, omniaq; in summa facere, quæ ut vlcus coalescant, efficiant. Ergo si euocatum ce-
 5 riter totum ecchyma sit, facile coalescet rupta ipsa caro. Sin longiore spatio, sordes multa subnascens medium inter vlceris labra spacium occupabit, ita, ut iam coire ruptio non possit. Atque inde adeo fit,
 10 ut qualibet leui de causa, nos hæc sui admoneant: nam siue quis obrigit, siue parum concoxit, siue fe-
 bri laborauit, siue se vehementius fatigauit, eiusmo-
 di illico particulis dolet. Non enim (ut modò dictum
 est) in idem coire rptionis labra, sed tantum propè
 15 sunt admota. Quò fit, ut leui momento ea facile sepa-
 rentur, & medius inter ipsa locus superuacuo humo-
 re repleatur. Et quid quæso aliud, quàm assidue nos-
 uum ecchyma creatur: & primò illi (cùm videlicet
 20 primò caro est rupta) persimile: nisi quòd ex tes-
 nui magis sanie nunc constat: cùm in principio è sangui-
 ne ecchyma esset. Ideoq; facili⁹ etiã nunc quã pri⁹,
 seu per initia, digeritur. Cæterum quomodo curari
 debeant sugillata, liuores, aliaq; id genus accidètia.
 25 quæ contusiones, graues casus & offensiones conse-
 quuntur, aliquandò forsàn alibi dicetur. Hactenus
 de vulneribus, quæ in carne maximè per tela inferun-
 tur. Sequitur, ut de his dicamus, quæ morfu fiunt.

*De vulnere ex morfu, vel ictu animalium, tum venena-
 30 torum, tum aliorum non ita noxiorum illato, & præsertim
 de morfu canis rabiosi.* C A P. X I.



35 **D**E vulneribus, quæ ex morfu punctus
 ue animalis inferuntur, & præsertim
 canis rabiosi, aut alicuius venenatæ
 feræ, aut bestię, quidã memoriæ pau-
 ca tradiderunt. Quippè quæ nõ adeo
 frequenter accidâr, & si aliqñ incidet

292 Institut. Chirurgicarum, Lib. I I.

runt, soleant rustici, ac plebei homines neglectis chirurgis, ac medicis, medicamentum præfens ad hæc ipsa conficere, ex aliis, capis, & oleo, quod cataplasmatris modo vulnere imponunt. Adde, quod exquisitè de iis tractare, magis ad medicum (quem physicum appellant) quàm chirurgicum, nisi quòd ad vulnus spectat, pertinet. Itaque qui absolutam eorum cognitionem habere desiderat, ex Arabicæ familiæ scriptoribus, Avicennam, Razem, & Rabi Moysen & ex recentioribus Barbaris: Henricum legat, oportet, qui de omnibus ferè venenis, fusiisimè tractauerunt. Sed multò his doctius, atque accuratius de eiusmodi morfib, & ictibus venenatorum animalium scripserunt, Aëtius Antiochenus, Paulus Aegineta, Cornelius Celsus, Actuarius, Oribasius, & ante hos omnes adhuc Dioscorides. Quos omnes, si velis, hac in re poteris consulere, aut vnum saltè ex illis, quem placebit, deligere. Tantum enim hoc loco vniuersalem, vulnere ex morfu punctusue illatorum, curationem referemus, atq; eam duntaxat adhuc: quam maximè chirurgia molitur. Itaque morfus animalium punctusue, duplici constant differetia: alij enim sunt venenati, alij vero minimè: venenati dicuntur, qui à virulentis bestiis inferuntur: cuiusmodi sunt rabiosus canis, serpentes, peregrinæ angues, scorpio, basiliscus, draco, vipera, coluber, mus araneus, phalangium, aspis, & id genus aliæ virus eiaculantes feræ. Cōtra verò nō venenati morfus dicuntur, qui ab animalibus non ita virulentis imprimuntur, insignitæque: cuiusmodi sunt, canes domestici, simia, homo, equus, sues tam domesticæ, quàm sylvestres, felis in domibus oberrans (quem nominant elurum) & similia. Ictu quoque hominum copora lædunt, vesperæ, apes, muscæ, culices, pulices, & cimices. Sed qui à vesperis, & apibus punctus insignuntur, plus noxæ, ac doloris inferunt, interdumque chirurgi operam desiderant. Omnis autem ferè morfus (si Cornelio Celso credimus) habet quoddam virus. Paulus non addubi

Qui præsertim autores recentiores, de venenatis vulnibus scripserunt.

Morsus ac punctus animalium duplices.
Virulenti.
Morsus non venenati.

addubitat ipsius etiam hominis morsus, cum viru^{Morsus o-}
 lentis bestius conscribere. Siquidē (inquit) malignio^{nis quod-}
 res multò, cæteris aliis vlceribus apparent, præser^{dā virus ha-}
 tim si qui morsum intulit, ieiunus fuerit? Idemq; bis^{bet.}
 siofo temperamēto, atque antea legumina, pro cibo
 sumpserit, atq; imprimis lenticulā. Eapropter quæ
 cunque communiter in aliis virulētis morfibz vel
 ictibz cōmemorātur ac, p̄sunt eadē quoq; in his mor
 sibz extrinsecz per initia adhibere cōueniet, exceptis
 10 nimium acribus, & causticis, id est, adurentibus.
 Cæterum morsus ipsi, ac pūctus, tam venenatorum
 & lethalium, quàm non virulentorum, in quibus
 dam, quod ad rationem curandi attinet, conspirant,
 & in quibusdam euariant. Conueniunt quidem in
 15 eo, quod neque desiccantia, neque repellētia, neque
 cicatricem inducentia (quorum natura adstrictoria
 est, & desiccatoria) desiderant, quin potius attrahen
 tia, dilatantia, relaxantia, atque emollientia statim
 20 ab initio expostulant. Tam hi etiam, quàm illi, se
 dulò repurgari appetunt: ac demum postquam vl
 cera probè fuerint repurgata, cicatrice obduci. In
 hoc autē differunt, quòd morsui non venenato abun
 dè satisfaciunt, domestica (vt vocant) attrahentia,
 25 & maturantia. Cuius generis sunt: cæpæ, & allia,
 tam agrestia, quàm satiuā, cocta, trita, & cum fer
 mento, oleo, & sale mixta. Si verò vulnus mor
 su, aut ictu virulentum aliquod animans homi
 ni intulit, quæ vehementer etiam trahunt, ne
 30 virus interna subeat, & ad cor serpat (cuius des
 tructionem ex suapte natura semper appetit) sta
 tim erunt admouenda, vt cucurbitula, loco pri
 us scalpello inciso, & emplastra quædam va
 lidè virus extrahentia, quæ statim subiunges
 35 mus. Deindè candenti ferro (si patitur locus)
 vulnus adurendum est, aut caustico saltem ali
 quo medicamento, ac vehementer exedente vtē
 dum. Eiusmodi enim vulnera omnia lethalia sunt,
 & præsentem sæpe perniciem (si protinus non

*In quibus
 conspirēt &
 inuicem dis
 sident vir
 rulentis mor
 sus, & non
 venenati.*

*Venenū sem
 per cor pe
 tit.*

succurritur) adferūt. Proinde & extrema illis (iuxta Hippocratis consilium) adhibenda sunt remedia. Adeoq; vt membrū, quod sic à lethali: ac virulenta fera: vel morsum: vel ictum est, interdū præcidere, seu amputare cōueniat. Quemadmodum Galenus; Vinitormor sus à vipera sibi digitum amputauit. Morsuū, ac punctuū venenatorum nota. memoriæ prodidit, vinitorē quendā à vipera morsum: vbi ferā agnosceret, cōfestum læsum digitū false abscidisse, atq; in totum sic periculo liberatum. Porro venenatos mortuos: aut ictus punctūsve iis sequentibus notis, deprehēdes. Vulnus infixū validè dolet pūctionis: & mordicationis sensus vehemens in afflicta parte persentitur: Vulneris, atq; affecti loci color perit: ac mutatur: aut enim rubet, atq; inflātur: aut liuet vel nigricat. Laborās grauib; angitur molestiis, ac totus ardet: corpus totum eius ipsius, qui vel demorsus, vel ictus est ita nōnunquā obstupefcit, ac talem (vt sic dicam) obdormitionem sentit: vt tāgentē non sentiat. Verū nihil ferè in iis perpetuum est. Neq; enim dolor semper adest vehemens, aut atrociter molestans in omnibus eiusmodi ferarum, ac bestiarū venenosarum: ictibus, aut morsibus: sed in quibusdam satis remissus est: vt in morsu canis rabiosi. Nec enim protinus infestum quicquam, vbi momorderit: vt inquit Dioscorides) infligit, nisi vt vulnus dolorem, hoc est, statim quidem vbi morsu excandescens rabie canis, in partem aliam quam vulnus intulit nihilo plus doloris, aut molestiæ ab initio adferre videtur, quā non rabiosus. Sed & qui à scorpionis ictu dolor accidit, modò descrefcit, modò intenditur: ac nūc feruor, nunc frigus. tum percussū locum, tum corpus totum vicissim inuadit: vt Paulus annotauit: & vt breuiter dicam, sua cuiusque animantis morsibus, & ictibus propria, ac peculiaria signa sunt vt videre est apud Dioscoridem, Paulum, Aëtium, Cornelium Celsum, & alios, qui de venenatis hisce bestiis fusiū, atq; accuratius scripserunt. Cæterū aliis venenatis bestiis (quod apud nos rarissimè sunt) prætermisissis, oportet

raprecium non abs re duximus, si vnus rabiosi ca-
 nis particulatim meminerimus. Siquidem hoc ani-
 mal & fœcundum prouentu, id est, frequens: & con-
 tubernale homini, ac domesticū esse consuevit. Ad
 5 de quod & rabie sæpius corripitur: ac perit, ab eoq; *Canis sæ-*
 difficilè cauere possit. Inde periculum inuitabile *pius rabie*
 hominem manet, nisi multis & cōuenientibus vsus *corripitur.*
 fuerit præfidiis. Plærunque autem flagrantissimis
 æstibus canis in rabiem effertur. Interdum etiam
 10 per frigora maxima vt Lycus memoriæ mandauit.
 lam verò rabiosus potum, & escam auersatur, siti
 premitur, neque tamen bibit: anhelat præterea non
 parum, idq; exerta lingua aures inclinat largā, spu-
 mantemq; pituitam naribus, & ore proicit: mutus
 15 in totū est, & veluti insanus: vt ne domesticos qui-
 dem agnoscat: toruē: & solito tristius intuetur, in-
 omnes passim sine larratu irruit, & nullo discrimi-
 ne beluas: & homines notos iuxta ignotosq; moriū
 adoritur. Vbi autem momorderit statim quidē ni-
 20 hil molestiæ (vt prius diximus) adfert præterquā ex
 vulnere dolorem. Exinde autem (nempe temporis
 progressu) morbus ille, qui ab aquæ metu hydro- *Hydropho-*
 phobia Graia est voce appellatus exoritur. Miser- *bis.*
 rimum sanē (inquit Celsus) genus morbi, in quo si-
 25 mul æger: & siti, & aquæ metu cruciatur: quo op-
 pressis in angusto spes est. Porro magna ex parte
 circa quadragesimum ferè à morfu diem, solet hic *Horrorem*
 morbus hydrophobicus ingruere: quibusdam & *aut metum*
 post sex menses: aliis proditum etiam est, post septē *aquæ, nullū*
 30 obuēisse. Sunt & qui post annum vnum, vel etiā *prescriptū*
 duos interdum, à morfu impresso, morbum hunc *cōstitutūq;*
 contrahi testentur. Narrant & aliquos post septem *tempus ha-*
 nium hoc aquæ metu fuisse tentatos: Quo fit, vt *bere.*
 qui à cane rabido morsi sunt, non valde tuti mihi
 35 esse videantur. Non enim statō, definitoq; tempo-
 re post morsum: aquæ pavor exoritur. Itaq; quos
 niam non confestim à morfu, huiusmodi aquæ me-
 tus, homines inuadit, quidam decepti, canem qui

momorderat, non fuisse rabie percitū arbitrati sunt
 & proinde vulnere cicatricem inducere properarūt.
 Atque hoc pacto ipsimet huius mali autores, sibi
 perniciem attulerunt, dum scilicet huic affectioni
 causam dederunt. Hac autem vsus probatione atq; s
 experientia, facile deprehendes rabiosus sit canis,
 nec ne: qui momordit: Iuglandibus nucibus conc
 sis: & accuratē tritis vulnus diligenter obstruitur
 & postea circumligatur, sequenti die ablata galli
 naceo: aut gallinæ in cibo apponentur: ac primū 10
 sanē non attingent: fame autem vrgente, si eas vora
 uerint, rē attentius considerato. Nam canis qui mo
 mordit, si nō fuerit rabiosus sospites, ac superstites
 aues: quæ nuces illas comederint permanebunt: sin
 contra rabie correptus fuerit postera die peribunt: 15
 atque tunc ad vulnere dilatationem properans
 dum erit. Iterumq; post paucos dies eadem experiē
 tia vtendum: Et si non perierint gallinacei, tunc vul
 nus ad cicatricem perduces nullum iam veritus pe
 riculum. Huiusmodi indicationis, seu experimenti 20
 autor quondam fuisse putatur Oribasius, vt refert
 Paulus. Cæterū hydrophobiam, id est, aquæ me
 tum Græcorum aliqui, ex immodica fieri siccitate
 dixerunt: quasi in contrarium habitum, inurata pe
 nitus humida eorum substantia, veruntamen Rus
 fus antiquæ medicinæ grauis autor, insanix ex attra
 bile speciem eam esse testatus est: magna scilicet ves
 neni eius cum humore illo similitudine. Itaque
 non secus quàm reliquos melancholicos, & attra
 bile insanientes scimus alios alia timere: idq; etiam 30
 sentire videntur: qui dicunt: canis ipsius qui mor
 morderit imaginem in aquis opinari eos se videre,
 eoq; metu territos aquam fugere & auersari. At
 ex iis qui hoc vitio sunt occupati, nullum (inquit
 Paulus) præterquam vnum, aut alterum seruatum 35
 fuisse ex historia didicimus. Eosq; non à rabioso
 cane morsos: sed ab homine quodam morso ras
 bienteq;, & aquam iam timente, vitium adeptos.
 Siqui

Rabiosi ca
 nis morsus
 probatio ex
 Oribasio.

Hydropho
 bia vnde.

Pauci ex iis
 qui aqua
 metu labo
 rant, seruā
 tur.

- Siquidem Eudemus (vt refert Dioscorides) superas
 se, ac superuixisse quendā affirmat. Et Themionem
 (inquit) aliqui demorsum in idem vitū incidisse, &
 euasisse fatentur. Molestissimum itaq; & dum iam
 occupauit insanabile est hoc morbi genus. Ante ra-
 men huius occupationem, multi etiam quos canis
 momordit seruati sunt. Euenit autē hic morbus hy-
 drophobicus, cum neruorū distentione, vel conuul-
 sione, totiusq; corporis rubore, præsertim faciei, cū
 sudore, & languore quodam, iucq; fastidio, & do-
 mesticorum ignorantia. Aliqui auræ splendorem, &
 aquam fugiunt: & dum vident, & dū admouentur.
 Nonnulli etiam omnem humorē auersantur, & hor-
 rent: alij sine vlla doloris intercapedine vexantur.
 Sunt etiam, qui cānū more latratus edant, & obuiū
 quemque dentibus impetunt morsuq; suo alios si-
 mili vitio labefactant. Miserrimum sanē (vt iam di-
 ximus) & molestissimum morbi genus. Cæterum
 vnicū eo oppressis remedium esse scribit Cornelius
 Celsus libro quinto suæ medicinæ: nempe non opi-
 nantem in piscinam non antē ei prouisam proficere.
 Et si natandi scientiam non habet, modòmersum bi-
 bere pati, modò attollere. Si habet interdum depri-
 mere: vt inuitus quoque aqua satietur. Sic enim (in-
 quit) simul & fitis, & aquæ metus tollitur. Sed aliud
 periculum excipit, ne infirmum corpus in aqua fri-
 gida vexatum, neruorum distentio absumat. Id ne
 incidat à piscina protinus in oleum calidum dimit-
 tendus est. Sed iam tempestiuum est, communem
 virulentorum omnium vulnere (vt fumus pol-
 liciti) curationem aggrediamur.

*Communis, aduersus omnes morsus, &
ictus virulentos, curatio.*

- 35 **V**irulentorū omnium animantiū morsus, aut
 ictus nō nimiū distantē curationē desiderāt,
 quamuis in ea multum antiqui variarunt: vt
 in singula genera bestiarum, siue animantium, sine

gula medendi genera præciperent, atque aliis alia. Sed in omnibus eadem valdè multa, maxime proficiunt. Itaque quæ ad hanc communem medendi rationem attinēt, primum exponemus: deinde cursim perstringemus, quæ ad peculiarem, priuatamq; eorum curationem pertinent, quos rabiosi canes, quod frequentiores apud nos sint; quàm aliæ virulentæ bestia) momorderint.

Geminā esse curandi rationē, in omni morfu aut ictu venenato. 1. Igitur in omni morfu: vel ictu animalis, quod venenū vibrat, gemina est Galeno libro decimoterrio methodi medēdi curandi indicatio: nempe virulenti ipsius liquoris vacuatio, & eius quod dolorē creat alteratio. Sanè (inquit) virus ei aculatū vacuāt, tū ex calfactoria medicamēta omnia: tū quæ citra calefactionē vehemēter trahunt: veluti & cucurbitulæ, & cornua quædā quibus nonnulli cucurbitularū vice vtuntur. Sunt autē & qui ore suo virus extrahunt, ægiæ videlicet particulæ admoti, ipsumq; vulnus labiis cōplexi. Huc sanè pertinet & cauteriū, & medicamenta: quæ cauteriis similiter escharam efficiunt Atq; hæc omnia totā eius quod infestat, substantiam exinaniunt. Alterum auxiliorū genus est eorum, quæ qualitatem per contrariam qualitatem alterant. Scilicet exhibentibus nobis, si vehementē calorem æger vel in ipso demorso loco: vel in toto corpore sentiat, auxilia refrigerantia. Sin frigus sentiat calfacientia. Hactenus Galenus. Eius autem cōspendiosam dictionem, & vniuersalem methodum sic interpretamur. Inter ea: quæ virus è profundo euocant, primò medicamēta enumerat, quæ calfaciendi facultate prædita sunt: deinde cucurbitulas, & cornua, postea verò oris suctionē, & postremo vitionē quæ vel ferro, vel medicamētis fiat. Itaq; de his singulatim nobis dicendum est, quò res per uia magis cuiq; euadat, ac modus vsus eorum neminem lateat.

Aduerte.

Id vnum autem imprimis omnes scire volo, ea, quæ modò ex Gal. retulimus auxilia, & id genus alia, quæ mox subiungemus, si primis diebus prætermissa

De Plagis, seu cruentis uulnerib. 299

termiffa fuerint, fruſtrâ poſtmodum adhiberi. Non enim virulentam illam materiam, quæ iam ad intima, neglecta curatione, pertransiit, latis euocare poſſent. Quare nulla vtique adiectionis eorû foret vtis, ſed incaſſum corpora doloribus ſternerentur. Inter ergo principia morſus, aut ictuſ illati, hæc, & ſimilia adferenda erunt. Sed & priuſquàm hæc, quæ *Membru de-* ſic venenum extrahunt, atque eliciunt, admoveantur, ſuprà vulnus membrû id, quod vel demorſum, *morſum ſu-* vel ictuſ eſt, deligandum erit, non tamen nimium *pra vulnus* vehementer, ne torpeat, Hac enim deligatura impe- *deligandũ.* dies, ne tam ſubitò virus interna ſubeat.

Itaq; ſi leuior morſus, aut ictuſ eſt, oris ſuctio ap- *Oris ſuctio.* primè conuenit. Homo igitur aliquis ſtatim adhibe- *15* dus eſt, qui vulnus exugat. Sugentem verò oportet ieiunum non eſſe, ſed & cibum ſumpſiſſe, & vino os colluiſſe, poſtea exiguum olei in ore continens, ictuſ exugat, & expuat venenum. Cauere etiam oportet, ne qui vulnus ſic exucturus eſt, internam aliquam *20* oris partem exulceratam habeat. Siquidem vene- *Venena nem* na (vt ſuprà ex Celſo retulimus) nõ guſtu, ſed in vul- *guſtu, ſed i* nere nocent. Sed & locus ipſe priuſquàm exugatur, *vulnere no-* ſpongiâ in poſcam calidam inmeſſâ, fouendus, ac *cent.* proluendus erit. Alij vulnus abluendum aquâ cen- *25* ſent, in qua decoctum ſit chamæmelû, & ſylueſtris lapathi radix. Sunt, qui gallinarum, aut aliarû quas rundam auium podicem vulneri admouet, ad virus exugendum. Quod ſi quæ applicatæ fuerint volucres, moriantur, venenum extractum eſſe ſuſpican- *30* tur: poſt hæc verò cinis aceto ſubactuſ, pro cataplaſmate imponatur. Maximè autem ad hanc rem conducit, cinis ſarmentaceus, id eſt, ex lignis vitis: vel ficulneus, aut laurinus. Qui ſi non adſit, eo, qui haberi po- teſt, vtendum eſt, diligentia (inquit Aëtius) ad hoc *35* potiſſimum adhibita, vt inflammatio in loco excite- *Sal morſus* tur, & materiæ ad morſum prouocetur. *canis rabidi* Sal quoq; *optimũ me-* his vulneribus, præcipueq; ei (ſi Celſo credimus) *dicamentũ.* quod canis fecit, medicamentũ eſt, ſi manus vulneri

300 Institut. Chirurgicarum, Lib. II.


Vnguentum
Dim. imponitur, superq; id duobus digitis verberatur. Exsaniat enim, ac falsamentū quoque rectē super id vulnus deligatur. Porro in omni morfu tam venenato, quā non venenato, Dinus hoc vnguento vtebatur. R. ceræ, picis nigræ, axungię veruecinæ, olei antiqui ana quart. vnum, galbani vnciam vnam: fiat vnguentum.

Auxilia ad-
uersus ma-
gnos, & ve-
hemētes mor-
fus, & ictus
venenatos. Mortibus verò, aut ictibus venenatis magnis, ac vehementioribus commodè illinuntur, cæpæ cū iasle, & ruta, sinapi quoque, & stercora. Itē iuglādes nunc cum allio, sale, & melle. Emplastra quoq; & cataplasmata ex Dictanno, & aliis medicamentis calfactoriis, quæ vehementem trahendi vim habent, apparata. Plurima enim ex iis non modò virus ipsum potenter eliciunt, sed & vulneris oras (præsertim in rabidi canis morfu) latas, ac hiantes seruant. Neque enim permittendum, vt hæ citò coeant, aut committantur. Præter opinionem autē facit Aërio, ex viperis theriace Andromachi, emplastri modo imposita, & compositum hoc sequens medicamentū: quod recipit spumæ argenti, cerusæ, resinæ pinus, singulorum libram vnā, olei veteris libras tres, ceræ vncias septem ammoniaci thymiamatis trientem, id est, vncias quatuor, galbani etiā trientem: cerusam, argenti spumam, & oleum coquito, donec non inquinēt manus, deindè liquefacta aduicito, vnito, & vititor repofito ad omnem morfum, & ad abscessus, & tubercula mammillarum, panos, sinus, fistulas, parotidas: ad miraculum enim (inquit) discutit ipsas. Vititor & ad carbunculos. Arcet vehementer inflammationē, & rarò citra magnam commoditatem, & efficaciam adhibetur. Porro in magnis quoq; ac vehementioribus, tum ictibus, tum morfibus potens est hoc subsequens emplastrum, quod acrioris est potentia. R. galbani, sagapeni, opopanacis, assæ fætida, myrrhæ, piperis, sulphuris, singulorum semunciam, stercoris columbini, & anatis ana vncias duas, calaminthæ, mentastri ana vnciam vnam: dissoluantur gummi ex vino, & in

Guid. empl.
acrioris po-
tentia.

& in vnū misceatur omnia cū melle, & oleo anti-
 quo, & fiat emplastrū. Plēraq; alia tū ex veteribus
 tū ex recētioribus adduci possent, quæ vel commor-
 sam, vel ictā partē vehemēter calfacere, & vellicare
 possunt: proindē & venenum euocare. Verū quos-
 niam iterū de hac re dicemus libro sexto, hæc abū-
 dē ad præsens sufficere putamus. Interim tamen mo-
 nemus cum Erasistrato, vt incognita, peregrina, &
 inusitata vitentur. Cuiusmodi sunt fel elephanti,
 10 oua crocodili, & consimilia, quæ difficile, nisi regia
 facultate peruestigari possunt. Adde, quod neque fre-
 quenti obseruatione (vt Dioscorides ait) hæc iussis
 ciens experimentum præstiterunt, quo nostra fides
 is obstringatur. Iam verò tempestiuum est, vt de cu-
 15 curbitulis, & cauteriis dicamus: vtrisque enim etiā
 virtus ē profundo euocamus.

Ergo si vehementior morsus est, cucurbitulā cū *Cucurbitu-*
 largiori flamma ad vulnus adfigito. Sed antē circum- *la.*
 stantia loca altioribus vlcusculis (si id membrum pa-
 20 titur) scarificato, quod plus vitiati iam sanguinis ex-
 trahatur, & vt sanguinis illius corrupti vacuatio
 obsistat, ne venenū mēbratim insinuetur. Attrahe-
 tur enim pluribus quasi canalibus, & forās euocas-
 bitur, vnā cum sanguine, & spiritu, ipsius virulens
 25 tæ bestię venenum. Si cucurbitula non est, quod tas-
 men vix incidere potest, tum quodlibet simile vas,
 quod idem possit, vt caliculus, vel pultarius (vt in-
 quit Celsus) oris compressioris. Optimē autem aus-
 xiliantur, si statim in principio post amotas cucurbi-
 30 tulas, super vulnus imponantur, & conuoluantur
 animalia parua discerpta, hoc est, per medium diuis-
 fa, intūs adhuc calentia, veluti sunt gallinaceus pul-
 lus, sed mas, præsertim, hœdus, agnus, & porcellus.
 Sic verò calidā eorum caro statim percussio loco im-
 35 ponenda est, vt pars interior corpori iungatur: yene-
 num enim exugūt, & dolores leniūt. Ferē autē inter
 cetera animantia magis placēt, gallinarū pulli, quip- *Animalia*
 pe qui calidiore natura præditi sunt, argumento, *parua discer-*
 quod *pta, & vi-*
ruento mor-
bi admoda.
Gallinam
pulli.



quod deuoratum insigne virus eliquent, & aridissima quæque semina consumant. Item nonnunquam harenas, lapilosq; quos faucibus insinuarint, dissoluunt. itaque animantis calore, spiritus istæ partis impetum capeffens, venenum exigit. Porro à maioribus canis rabiosi morfib; abscedentes carnes, hinc auferre, & labia acie scalpelli circūscribere, ac prehensam hamo carnem amputare oportet: si modò tamen locus neque neruosus, neque musculosus est. Hæc itaque carnis circinatio, seu circumscription, & sectio, scarificatione longè potentiùs opitulantur. Quòd si locus carnis circumscriptionem, & sectionem non admittat, cucurbitulæ (vtri diximus) cū largiori flamma adfigendæ sunt. Nec verò maiora hæc vulnera in demorsis à rabioso animante, ita vereri oportet, vti minora, & vlcerulis cutis similia: maiori nanque vulnere copiosus sanguis emanans, potest nonnihil virulenti liquoris exhaurire: quod in minoribus non accidit.

Maiora vulnera in demorsis à rabioso cane, minus verèda, quam minora.

Vtlio expeditissimum est auxiliū.

At verò & vltio, contra ipsos virulentos morsus, aut ictus, cū locus neruosus non est, & tutò inuri potest, expeditissimum censetur auxiliū, vtpotè cū ignis cætera viribus præstet: simul quòd virus domet, ipsiusq; vires hebetet, & penitus ferri, hoc est, ad intima illabi, non patiatur: simul quòd pars ignem experta, deinceps non vilem, nec indecoram loci instaurationem efficiat, manente diutius exulceratione. Si verò vri non potest, Cornelio Celfo autore, sanguinem homini mitti, non alienum est: tū vltio quidem vulneri superimponenda, quæ cæteris vltis sunt. Ei verò, quod expertum ignem non est, ea medicamenta, quæ vehementer exedunt, & si laborans patitur, quæ adurunt, & crustas vlceribus inducunt. Cæterum animaduertendum, ex eo tempore, cū crustæ (seu igne, seu adurentibus medicamentis inductæ fuerint) decident, ne vlceris oræ coalescant, & cicatrice obducantur. Sed si fieri potest, ad longū præfinitum tempus vlcerationes, & sordidas adhuc, & inflamma

Sanguinis missio.

Vlcerationes ex mor-

inflammationem minantes, prorogari cōuenit, quò ^{su virulētia} virosa materies semper effluat: non autem intūs con ^{in longū tē-} tineatur, & ad intima se insinuet. Id autem optime ^{pus prorogā} præstabit, inditum iis (vlcerationibus inquam) sal ^{das esse.}
 5 samentum, & syluestre allium detritum: item cæ-
 pæ, & id genus alia. Si verò (quod persæpe accidit)
 ante dies præfinitos, cicatrices cōirent, comitteren-
 turq; manum postulabunt. Nanque eas diducere,
 carnemq; scalpello circinare, aut iterū inurere ex-
 10 pediet. Vbi verò propositum tempus præterit, vl-
 cus ad cicatricem perducendum erit. Quandoque
 etiam (vt suprà diximus) haud importunum fuerit, ^{Membrī de-}
 partem ictā, si commodè sectionem non respuat, ^{morfi, aut}
 vt sunt extrema, amputare: præsertim si fera quæ ^{icti ampu-}
 15 momordit, aut ictu vulnus impressit, lethalis sit, &
 ineuitabile periculum adferat, cuiusmodi sunt ser-
 pentes omnes, vt aspis, cerasites, vipera, & cōsimiles.

De vulnere, cum profusione sanguinis, ex venis, &

arteriis.

C A P. X I I.



Ostea quàm de vulneribus, quæ car-
 nosis partibus incidunt, abundè satis
 determinatum est, nunc tempestiuum
 25 videtur Galeni doctrinam, atque insti-
 tutum sequentes, de iis vulneribus di-
 camus, quæ in arteriis, & venis fiunt.

30 Ergo si cui arteria venæve magna vulnerata est, &
 copiosum sanguinis profluuiū cōtinuò superuenit, ^{Galen. lib. 5.}
 & glutinari id vulnus, difficile quidem etiam in ve- ^{method: me.}
 35 na est, in arteria verò non solum difficile, sed etiam,
 quod fieri sicut nonnullis medicorum est visum) os-
 40 minò fortasse non possit. Dicendum ergo de vtriusq;
 est, vulnere inquam, in arteria, aut vena accepto, &
 45 hæmorrhagia, ac prius quidē de sanguinis profluuiio ^{Profusionis}
 quippe quod magis vrgeat: secūdo verò loco de ipsius ^{ex vena, vel}
 vulneris agglutinatione, ac curatione. Sanè pro ^{arteria can-}
 50 fluit ex vena, vel arteria, sanguis, aut tunica earum se-
 diuisa,

- diuisa, aut reſerato earum ore (Græci *ἀνασίσματα* vocant) aut (vt ſic quis dicat) tranſcolatus, ſiue tranſmiſſus, vt in diapedeſi. Verùm quoniam in duabus poſterioribus cauſis ſolent magis medici, quos phyſicos appellant, accerſiri: hîc duntaxat agemus de ſanguinis effuſione, quæ ex prima cauſa ortum habet, & vulnera conſequitur, hæc nanque ad chirurgum magis videtur pertinere. Cæterùm ſanguis profunditur interdum ex arteria, interdum ex vena, atque ex earum quidem aliquandò vna duntaxat: nonnunquam verò ex pluribus, iisdemq; vel maioribus, vel minoribus. Sed & ſanguinis eruptio, accidit ex eo interdum vulnere, quod cum amiſſione fit ſubſtantiæ: aliquandò verò ex eo, in quo nihil ſubſtantiæ deperditum eſt. Interdum etiam cū eroſione: interdum verò citra eroſionem, quæ Græcis *διὰ βρωχίς* dicitur. Item quandoque iam profluuit ſanguis, & quandoq; poſteâ fluxurus eſt. Interdum quoque cauſa huius profluuij ſanguinis apparens eſt, quæ in vena, aut arteria diuortium facit, cuiuſmodi eſt ſagitta, telumue aliquod, aut eroſio præſens, & non ex vulnere exciſata. Hæ itaque ſunt differentiæ præcipuę, profuſionis ſanguinis in vulneribus, à quibus curandi indicationes deſumuntur.
- CAVSÆ.** Porro cauſæ fluoris ſanguinis, ex diuiſione tunice venarum, aut arteriarum, ſunt, vulneratio, cōuſio, ruptio, eroſio. Quæ autem vulnerant, ea ſunt acuta, atque ad ſecandum habilia: cuiuſmodi ſunt ſagittæ, & gladij. Quæ contundendo ſoluunt, ea grauia, duratq; ſunt, vt ſunt lapides, aut quæpiam grauis molles. Quæ rumpunt omnia, id tenſionis interuentu faciunt. Tenſionem autem efficiunt, intentior actio nis vehementia, ſucci abundantia, non vtique viriū reſpectu, ſed quæ cū à vaſe ſuo non cōtinetur: etiā caſus ab alto, & graue quippiam, durumq; incidēs.
- Eroſionis cauſæ inter n. 1** Eroſio autem venis, & arteriis intrinſecus ſaltē accidit, ex ſucco aliquo, cui mordens natura inſit, vt eſt bilis flaua, vel atra ſuperaſſata. Ex iis itaque manifeſtum

festum euadit, quòd venæ, vel arteriæ vulnerari non possunt, quin cutis, & caro vulnerentur. Proinde suppresso iam sanguine, glutinandi, seu (vt dicunt) incarnandi indicationes, ab ipsis (carne inquam & s. cute) sumendæ sunt, vt in sequentibus dicitur.

Signum venæ, atque arteriæ incisæ, est sanguinis profusio. Quòd si sanguis cum impetu, ac saliendo profluat, & tenuis, ac flauus feruensq; appareat, arteriam diuisam esse significatur. Si verò crassior, & nigrior cõspiciatur, ac quietè, sine pulsu, & citra saltum effundatur, iudicium est ipsum à vena effluere. Hæmorrhagia, id est, sanguinis profluuium, omnium calculo, ac iudicio periculosa est. Nisi enim cõstituerit ac supprimatur, mortem adfert ineuitabilè. Quippe quòd sanguis (vt dici solet) naturæ sit thesaurus. Ad hoc syncope, conuulsio, delirium, singultus, in hæmorrhagiis malum portendunt, vt Auicennas post Hippocratem anotauit. Porro subit admirari, quod Arnaldus scriptis prodidit. Nempe quod arteria per transuersum dilecta, promptius coalescit, & agglutinatur, quàm si secundum longitudinè esset diuisa.

Discretio,
quando san-
guis ab arte-
ria, & quàn-
do à vena
reuenit.
Prognostica

17
Apho. 3. li. 5.

*Curatio profusionis sanguinis
ex vulnere.*

Capita methodi, qua sanguinis profluvia, quæ ad manū sunt, curantur, duo traduntur à Gale no, quibus Auicennas tertium addidit. Vt igitur omnium fiat mentio, hæmorrhagia trifariam sistitur.

Modi tres si
stènt hæmor-
rhagia.

Primò iis, quæ fluxionem auertunt, tum deriuando, tum reuellendo: secundò infrenantibus, atque interceptientibus fluxionem, & tertio topicis, id est, locis auxiliis.

Auertentia.

Porro ex iis, quæ sanguinis profluuium auertunt, tam à venis, quàm arteriis sanguinem fundentibus (huic enim hæmorrhagiæ propriæ debentur auertentia eiusmodi auxilia) quædam id efficiunt citra vllā extra corpus vacuationē; alia verò cum euacuatione.

306 Institut. Chirurgicarum, Lib. II.

Citra vacuationem, fluentem è vasis sanguinē aper-
runt, & aliò trahunt, cucurbitulæ siccæ, seu leues, &
cum flamma admotæ, frictiones, & ligaturæ, primū
in propinquiore partibus factæ: deindè in remoz
tioribus. Auertitur autem sanguis cum euacuatio-
ne, atque ad alia membra conuertitur, tum ad proxi-
ma deriuatus, tum ad contraria reuulsus, venâ in ea
parte incisa, quæ profusioni è directo respōdet, quæ
quæ ipsis membris sanguinem fundentibus coniun-
cta est. Itaque hæc (inquit Galenus) Hippocratis
inuenta sunt. Omnis scilicet immodicæ vacuationis,
communia remedia. Deriuatio ad latus, & ad vicina
fit, reuulsio ad cōtraria, non tamen semper ad remoz
tissima, vt falsò quidam putauerunt. Illam paroches-
teusin, hanc antispasin Græci vocant. Antispasis
igitur, id est, reuulsio, in iis quæ suprà sunt, omnibus
deorsum semper agitur: sursum, in iis, quæ sunt in-
frà. Præterea à dextris ad sinistra, sicut ab iis rursus
ad illa: similiter ab iis, quæ intus habentur, ad ea, quæ
foris sunt: contraq; ab his, ad illa. Itaque si resolutus
adhuc æger non sit, vena (vti diximus) in eo loco se-
canda erit, quæ profusioni sanguinis è directo respō-
det, & vulneratæ parti coniuncta est, siue deriuare,
siue reuellere studueris. Vbi autem paululū detra-
xeris, mox vnā horam intermittens, rursus modicū
cum quid detrahes: pōst iterū, atque iterū, pro la-
borantis viribus, vt Galenus consulit libro quinto
Therapeutices methodi. Sed de hac sanguinis in vul-
neribus detractione, latius alibi superius diximus.

Causæ sanguinem infrenantes, atque eius fluxum
intercipientes, quædam sunt incrassantes, ac inspiz-
santes, vt lentes, oriza, iuiubæ, coronea mala, quæ
Græci *κροταλία* vocant, & in vniuersum fructus om-
nes styptici, hoc est, austeri, in hunc vsum offerri so-
lent in omnibus sanguinis profusionibus. Aliæ
verò sunt stupefacientes, veluti aqua frigida, tum
epota, tum circa locum, ex quo profluit sanguis
proiecta. Non autem suprà vulnus ipsum: vlceriz-
bus

Lib. 5. meth.
med.

Parochetesu-
sis.
Antispasis.

2
Quæ san-
guinē sistūt
incrassando.
Quæ suppri-
mant san-
guinē stupe-
faciendo.

3

bus enim frigidum mordax. Item res omnes, quæ *Quæ refrige*
 insigniter refrigerant, sicuti & syncope, seu animi *rado sangui*
 deliquium, in quo propter sanguinis ad interiora re- *nem fluere*
 uocationem, totus corporis habitus refrigeratur, & *inhibeant.*
 sanguis sistitur, ut loco nuper citato Galenus anno-
 tauit, ad hunc modum scribens.

Porro confluere prohibetur [sanguis] & propter
 animi deliquium, & cum ad contraria reuellitur, &
 cum ad vicina deriuatur: & per refrigerationē, tum
 corporis totius, tum verò præcipuè ipsius partis af-
 flicte. Hac enim ratione, etiam frigida pora, sæpe
 hæmorrhagias suppressit: idem facit & frigida for-
 ris infusa. Sed & quinto Aphorismorum in iis frigi-
 do utendum esse præcipit Hippocrates, unde fluit
 sanguis, aut fluxurus est, non ad ipsa (inquit) sed
 circa ipsa, unde influit.

Topica, hoc est, localia, remedia, quibus sanguis
 cohibetur, tamen numero octo ponantur ab Aui- *Topica auxi*
 cenna, ea tamen nunc ad quinque reduximus. *lia.*

Primum genus auxilij fit per futuram: secun- *Quique au-*
 dum: per linamenta, quos *xiolorū gene*
 per penicillum siue turundam, quod aiunt: tertium *ra localia*
 remedium est, totius vasis sanguinem fundētis præ- *quibus hæ-*
 cisio: quartum deligatura, & vinculum: quintum *merthagie*
 est adustio per candentia ferramenta, vel per caustica *supprimun-*
 ca medicamenta. *tur, in vul-*
neribus.

Primus modus coercendi sanguinem, qui per fu-
 turam fit, his maximè vulneribus competit, in quibus nulla facta est substantiæ deperditio. Tunc
 autem commodè fit futura, cum vulnus ipsum à
 sanguine concreto, qui thrombos Græcè dicitur,
 integrè est repurgatum. Itaque hoc peracto ipsius
 vulneris labra in idem adducenda sunt, nostrarum
 manuum operâ: ubi sic ad manum vlnus se exhibet,
 postea consuuntur, futura quidem communi, vel ea
 quam pelliones facere solent, præsertim si magno
 impetu sanguis prorumpat. Dum autem ita suis-
 tur vulnus, satis altè acus in carnem demittenda est.

308 Institut. Chirurgicarum, Lib. II.

*Sitū partu
ad hæmor-
rhagiā plu-
rimū con-
ducere.*

Post hæc, puluis astringentius superponendus erit. Deinde stupæ oui candido liquore, & pulvere illo astringente, cuius in sequentibus fiet mētio, imbutæ, superimponendæ erunt. His ritè peractis, membrum affectum deligandum erit, & situ appposito collocā- dum. Appositus enim vulneratæ partis sit⁹, inter hæc morrhagias remedia Gale. censetur. Quod autē mo- dus is supprimendi sanguinem, utilis sit, ex eo mani- festum euadit, quod labra vulneris prius hiantia, & adinuicem distantia, in vnum adducūtur, & inter se cōmittuntur, locus affectus refrigeratur, & adstrin- gitur. Quæ omnia in hoc affectu Gal. desiderat, lib. 5. suæ methodi medēdi. Sed & multoties adserit Auicē- nas in quarto, necessarium esse, vt carnis vulnera cō- suantur. In quo etiam Theodoricus, & Henricus cō- sentiunt. Dicunt tamen plurimi Galenum non præ- cipere venarum, arteriarum, & intestinorū vulnera suenda esse, quippe quod dura nimis, & exanguia sint, atque idè agglutinari, & in pristinam vnionē

*An venarū
& arteria-
rum vulne-
ra suēda. li.
5. meth. med.*

coire non possint. Verū pace illorum (inquit Guiz²¹ do) dixerim, non inhiuit Galenus, suēda esse venarum, & arteriarum vulnera: quod si id tacuit, certè adfirmasse videtur. Quinimò & litera ipsius Galeni quod dicimus planè innuere videtur, quæ sic habet. Neq; enim suere fas est, arteriæ venæue vuln⁹: veluti dixerint, qui nullā à vulneratæ partis substantia, naturaq; sumi indicationem aiunt. Sed tu (subaudi) per regulam oppositorum, nos qui sumimus indicatio- nem à substantia, & natura partis vulneratæ, suer- mus eas. Quod si non seorsum, ac separatim, coniun- ctim saltem cum carne, ad modum peritonæi, id est, vt peritonæum suere consueuimus. Atque ita si non iuxta primam intentionem coeant, atque adglutinē- tur, saltem iuxta secundam (vti superius in sermone communi diximus coibunt.

² Secundus modus supprimēdi sanguinem, qui fit per linamenta, & vulneribus, in quibus aliqua est substantiæ perditio, potissimum accommodatur, ita

ita perficitur. Imprimis vulnus ipsum puluere alio ^{mendi san-}
 quo, qui adstringendi facultatem habeat, respergit ^{guinem.}
 to: deinde linamentis, vel stupis hiantem plagam op-
 pleto: siccis quidem primum: deinde si hæc parum
 proficiunt, aceto, vel iis medicamentis, quæ sangui-
 nis supprimendi facultatem habent, madefactus: ius
 præq; spongiam ex aqua frigida expressam imponis-
 to, ac manu superposita, eam comprimito, vel alliga-
 to: & post hæc membrum appositum (vt superius di-
 10 ctum est) collocato, Qui sanè modus sistendi sangui-
 nem apprimè utilis est, vt loco paulò antè citato tes-
 tatur Galenus, sic inquit. Obstruetur vasis [san- ^{Quomodo}
 20 guinem fundentis] oculus, & sanguine ipso con- ^{obstruatur}
 creto, qui thrombos Græcè dicitur, & iis, quæ foris ^{os vasis.}
 15 illi imponuntur: cuiusmodi sunt linamenta, quos ^{μὲν}
 20 ^{τοὺς} Græcè vocant, & medicamenta, ea quæ idcirco,
 22 quòd ex lenta, crassaq; substantia còsistant, meatus
 24 obstruunt, Græci emplastica vocant. Horum autem
 optima sunt eidem, quæ ex frixa resina, & farinæ tris-
 26 ticeæ tenuissimo polline, & gypso, alijsq; id genus:
 28 sunt confecta, oui candido macerata, & cum leporis
 nis pilis imposita.

Tertius modus sistendi sanguinem, qui fit, totum ³
 22 vas sanguinem fundens, per transuersum præciden- ^{Tertius mo-}
 24 do, competit maximè venis, & arteriis, quæ in pro- ^{duo sistendi}
 26 fundo sitæ sunt, vt idem Galenus est autor. Cogi- ^{sanguinem.}
 28 mur, inquit, non modò arterias, sed etiam interdum ^{Lib. 5. abe.}
 30 venas totas præcidere, vtique transuersas. Incidet
 32 autem huius necessitas in iis, quæ ex profundo loco
 34 rectè assurgunt, præsertimq; per angustas, vel princi-
 36 pes particulas. Quippe ita retrahitur ex vtraq; par-
 te, pars vtraque, celaturq; ac integitur, superiacen-
 tibus corporibus vulnus. Post hæc, pulvis aliquis
 sanguinem cohibens, super vulnus imponendus, &
 38 stupæ, vel spongia medicamentis facultatem suppri-
 mendi sanguinem habentibus, imbuta, superallis-
 ganda erit, & figura particulæ vulneratæ accom-
 moda, adhibenda.

310 Institut. Chirurgicarum, Lib. II.

4 *Quartus*
modus sup-
primendæ he-
morrhagiæ. Quartus modus suppressendæ profusionis sangui-
nis, qui fit funiculo vasi sanguinem fundenti circum-
posito, competit præsertim arteriis, quæ in penitior
ribus delitecunt. Itaque si alia auxilia profluuii vin-
cuntur, arteriæ nudandæ sunt, vt Auicēna præcepit,
& hamo apprehensæ, mox vinculo aliquo gracili, vt
filo serico, excipiendæ, ac fortiter stringendæ sunt.
Post hæc medicamentum adglutinans, siue incarna-
tium, vulneri apponendum erit, & membrum fas-
ciis vt oportet, deligandum, situq; appposito collo-
candum. Porro vinculum ipsum radici vasis erit
iniiciendum, vt libro quinto methodi Galenus nos
admonuit. Turtius autem est iuxta eiusdem Galeni
sententiam, vtrumque facere, funem quidem radici
vasis circundare, & quod deinceps habetur, id est,
inde procedit, præcidere. Radicem vasis vocat hic
Galenus, priorem eius partē, quæ vel iocinori pro-
pior est, vel etiam cordi. Hæc inquit, in collo, ab in-
feriore est parte: in brachiis, & cruribus, à superiore.
In singulisq; reliquarum partiū, prout ex dissec-
tione intelligere licet. His sic peractis, implendū carne
vulnus quāprimū est, priusquā funiculus à vase
decidat. Nisi enim producta caro prius locum, qui
circa præcisam arteriam est, impleuerit, si locus ali-
quis vacuus superfuerit, vtique quod Græci aneu-
ryзма dicunt, sequitur.

5 *Quintus*
modus siste-
di sanguine
Lib. 5. the. Quintus modus, excretionis sanguinis sistendæ,
qui per aduersionem fit, qua crusta (quæ Græci eschar-
am vocant) inducitur, maximè competit venis, suæ
unionis diuortium ab erosione perpessis. Gale. ipso
autore sic ad verbum inquiriente. Maximam aus-
tem necessitatem, vel crustificis, id est, crustam indu-
centibus medicamentis, vel ignitis ferramentis vtē-
di animaduerti, vbi ex erosione putrescentis alicu-
ius, profluuium sanguinis concitatur. Hic itaque
modus sistendi sanguinem perficitur, tum candentis
ferramentis, tum medicaminibus crustam indu-
centibus, quibus cum calore adstringēdi facultas sit
coniun

coniuncta. Cuius generis sunt chalcantos, id est, atramentum sutorium misy, & chalcitis, seu quod vis treolum vulgò appellatur, uisque tam vstis, quàm nō vstis. Quæ autem ex calce viua, id est, non extincta
 5 conficiuntur, valentiora quidem his sunt: cæterum quia adstringendī vim non habent, crustæ, quæ ab ipsis fiunt, citiùs excidunt. Hærent autem diutius, quæ ab adstringentibus: quod vtrique longè est vtilius. Quippe ita prius in basi, seu in imo earum, caro
 10 supernascitur, efficiturq; vasis profluentibus veluti operculum, donec venæ agglutinatio facta sit. Vnde nec noīmet, inquit Galenus) præcipites esse, veluti nōnulli sunt, ad crustas detrahēdas oportet, vbi hæmorrhagias periculum imminet. Si enim properes
 15 illas reuoluere, ac deicere, tantum inde accidit interdum sanguinis profluuium, vt vix cohiberi possit. Quocirca præcipiebat Auicennas, adustionem faciendam esse, ferramenti vehemēter ignitis, & valenter in profundum adactis, quo crassæ, ac profundæ escharæ fiant, quæ nec facilè separentur, atque
 20 excidunt. Hinc Theodoricus crustificis, seu causticis omnibus medicamentis præferebat arsenicum, quod vocant sublimatum: nec sanè immeritò. Nam
 & protinus omnem sanguinis profusionē sistit, & altam, ac diutius hærentem crustam inducit. Horum
 25 autem medicamentorum crustam inducentium, materia suo loco (nempe lib. sexto) explicabitur. Porro ipsa ferramenta igne flagrantia, ex aceto, aut vino (vt rectè quidam consulunt) restinguere oportet. Cæterum
 30 alius quidam ab iis modus est peculiaris resprimendi sanguinem, qui tamen nondum adhuc profluat, mox tamen fluxurus est: vt cum sagitta, telumve aliquod corpori infixum, extrahēdum est. Itaque cum hæc occasio nobis occurrit, puluilli
 35 tres, aut quatuor apparandi sunt: rotundi quidem, & circa medium vt sic dicatur) fenestrati perforatius, medicamine aliquo sanguinem coercente delibuti. His ergo ritè sic apparatus, ipsius teli infixi sitis

Arsenicum sublimatū optimū ad hæmorrhagias præsidium.

Modus alius resprimendi sanguinē, qui statim fluxurus est.

pitem seu hastile, per foramen immittito, ipsosq; puluillos circa hastile stringendo minister aliquis, supra vulnus comprimat. Medicus verò ipse vulnerarius sagittam: vel aliud quoduis telum infixum extrahat. Exempto telo puluilli sunt adæquandi, ita vt nullum ampliùs foramen in illis pateat, & ius pra vulnus comprimendi: dein alij non pertusi ius pra illos sunt apponendi.

*Præcepta
quædam, de
supprimendo
sanguine ob
seruanda. I.
Digitus cõ-
primens.*

Hi igitur sunt modi, quibus sanguis à venis, & arteriis vulneratis profluens cohibetur: qui vt arte, 10 & ratione fiant, sequentia præcepta obseruanda sunt.

Primum est Galeni libro quinto Therapeutices methodi, qui in omni fluore sanguinis ex vulnere, iubet vt is, qui vulnerato astitit, ilicò digitum suum 15 per os vulneris vasis imponat, blandè innitens: ac sine dolore comprimēs. Quippe simul (inquit) tum sanguinem sistet, tum eum concreescere in vulnere faciet. Thrombos enim, id est, sanguis concretus 20 ex iis est auxiliis: quæ hæmorrhagiam sistunt, sicuti & linamenta, quos *μοτὸς* Græci appellant, & me- dicamenta ea: quæ iisdem emplastica dicuntur. Ideo autem thrombus sanguinem supprimit: quia vasis sanguinem fundentis osculum obstruit: vt paulò antè diximus.

² Secundum documentū est: quòd in omni sanguine 25 *Puluilli.* nis ex vulnere profusione, post admotionem pulueris adstrictorij tres aut plures: vt videbitur, panni linei: aut ex stupis puluilli, oxycrato primùm madafacti, & postea expressi medicamento sanguinem supprimente imbuantur: vulnere agglutinentur, 30 & supra ipsum ad alligentur.

³ Tertius canon est eiusdem Galeni: qui per deligaturam docet suppressere sanguinem, sic inquit: 35 *Deligatura.* Alligandum autem id forinsecus fascia est, ex tenui linteo cuius fasciæ primi quatuor quinqueve amplexus ipsi profluenti vasi iniiciuntur. Ab hinc vasis 40 radicem versus ducentur, in quibus videlicet parribus radicem versus ducere licet. Licet autem ferè in

in omnibus, præterquam cerebri membranis. Hac quidem deligatura (vt inquit Auicennas) quod cōfluit reprimitur, & vena sanguinem fundens, confringitur.

Quartus canon in supprimēdo sanguine obseruā 4
 5 dus est: vt mēbrū à quo sanguis profluit, situ apposi- *Appositus*
 to collocetur. Vnde Galenus libro quinto methodi *vulnerate*
 medendi ad hunc modum ait, Præter omnia iam di- *partis situs.*
 20 cta, inter hemorrhagias, id est, profusionis sanguinis
 25 remedia censeatur, & appositus vulneratę partis si-
 30 tus. Porro appositus fuerit eidem Galeno vulnera-
 35 tę particulę litus si ad geminum hunc finem sit di-
 rectus. Nempe: vt & dolore pars careat, & sursum
 spectet custodito tamē in hac situs figura modo, ne
 15 dolor incidat. Si verò vel prona spectet: vel doleat,
 non solum profluuium non sistetur: sed etiam si non
 sit prouocabitur, & inflammatio augebitur, præser-
 tim si pars dolore infestetur: cum nihil quidem
 æquē sanguinis profluuium excitet, inflammatio
 20 nesq; augeat, ac dolor.

Quintum documentū ab eodem Galeno præscri- 5
 ptum est, quo cauetur: ne ante diem tertium deligatur *Deligatura*
 ra soluatur: vbi autem illam tertio solueris die, si tu- *ante diē ter-*
 10 tō adhuc medicamentum emplasticū, & sistens san- *tium mini-*
 25 guinem vlceri adhæreat: aliud rursus super ipsum *mē solueda.*
 accōmodabis, ac veluti linamentū id, quod ex pilis
 factum inhæsit madefaciens, deligabis: ita vt initio
 deligasti. Sin prius sua sponte reiecerit linamentum
 radicē vasis, digito blandē comprimēs, ne videlicet
 30 quippiam confluat, hoc quidem suspensā manu, ac
 sensim adimes: atque alterum impones. Quòd etiā
 eodem, quo & primum (si necessitas exigat) imbues
 medicamento: vel oui candido liquore cum rosaceo
 subacto, vel vino crassiore, & styptico. Ad hūc mo-
 35 dum, quoad carne obducetur, ac muniatur vas, cura
 re debebis: vtiq; à principio ad finem vsque (vt su-
 prædictum est) particulam supinam seruans.

Sextum præceptū in larga sanguinis profusione 6

Laborans obseruandum est, vt laborans oculos clausos con-
oculos clau- neat, aut loco obfcuriore reponatur: ne vel propriū
dat, aut lo- sanguinem: vel rubrum quidpiam videre poſit.
co obfcurio- Atq; illi aſſeueratione aſſimetur, quod ſanguinis
re continet profluuium conſtitit: & ſi adhuc ſanguis fluat, ma-
tur. gno ipſius commodo id fieri: atq; ita contraria ima-
 ginatione, virtus naturalis ipſus roboratur.

Avicen. Hinc dicebat Auicennas, quod grauiffimum ac-
 cidentium animalium, mouentium imaginationē,
 eſt motus ſanguinis, & conſecutio eius, qui paratus
 eſt ad eum, cum multum intentus fuerit, ad conſi-
 derandum res rubras.

Medicamen-
ta ſanguine
ſupprimen-
tia. Cæterum tempeſtiuum eſt ſubiiciamus medica-
 menta, quæ fiſtendi ſanguinem vim habent: ſtatutū
 enim erat nobis poſtremo loco de iis dicere. Itaque
 primum, atque omnium optimum eſt: quod à Gales-
 no deſcribitur libro quinto methodi medendi. Quo
 etiam ad cerebri membranarum hæmorrhagias vti
 ſecuriſſimum eſt. Item ad colli vulnera, ipſarumq;
 venarum iugularium, quas ſphagitidas vocant,
 etenim & harum ſanguinem citra vinculum pro-
 hibet. Verba autem Galeni hæc ſunt.

Gal. medica-
mentū ſan-
guine ſup-
primens. ^I Thuris pars vna, aloës partis vnius ſemiſſi, miſce-
 tur. Mox cū vtendi tempus inſtat, tantū huius pul-
 ueris cum oui candido ſubigitur, quantū mellis red-
 dat craſſitudinē. Hoc dehinc leporis molliſſimo pi-
 lo excipitur, deinde tū vaſi ipſi, tum vlceri toti libe-
 raliter imponitur. Alligandum autem id forinſecus
 fascia, ex tenui linteo, modo quo in tertio canone ſu-
 præ dictum eſt. Hoc autem medicamento (inquit
 paulò poſt Galenus) muſſariam vtor, aliàs vt di-
 ſcum eſt) duplum thuris aloë admiſcens: aliàs pari
 modo ambobus vtens: aliàs paulò ſuperante aloë
 thure, aut etiam pluſculo: ſed nondum duplo: etiam
 mannam pro thure aliquando inueniens. Porro con-
 ſtat in duris corporibus, plus aloës eſſe immiſcens
 dum, in mollibus plus thuris.

² Secundū medicamētū ſumitur ex dictis Auicēnæ,
 quod

De Plagis, seu cruentis uulnerib. 315

quod & ab omnibus chirurgis approbatur: habet autem ad hunc modum, & boli Armeniæ, sanguinis *Auicenna* draconis, thuris, aloës succotrini, pares portiones, *pulvis.* rantur in puluerem, qui apponatur, ut dictum est.

5 Tercium medicamenti genus est Bruni, qui ipsum desumpsit ex lib. diuisionum Rasis, & ex Albucase. *Bruni medi* 3
 Recipit autem calcis viuæ (quæ sola, ut supra dixi, *camentum.*
 mus, sanguinem cohibet, & sistit) sanguinis draco-
 nis, gypsi, aloës, thuris, vitreoli, singulorum aquas
 10 portiones, rediguntur in puluerem, & cum oui can-
 dido liquore, & tela araneorum miscentur, donec in
 corpus vnum coeant, & superponuntur. Est qui plu-
 rimùm commendat gallam combustam, maceratam *Galla com-*
 in vino, & aceto, tritamq; & super arteriam admo- *busia.*
 15 tam. Alij in huiusmodi pulueribus symphyton ad- *Symphiton.*
 dunt, quod posteriores consolidam vocant.

Curatio vuleris in vena.

20 **S**Uppressio sanguine, qui ex vulnere profluebat,
 ad propriam ipsius vuleris curationem mox acce-
 25 dendum est, ut superius est annotatum. Porro ta- *Lib. 5. meth.*
 25 meri (ut Galenus ait) sanatu difficilior sit arteria,
 25 quàm vena, non tamen est medicamentorum admo-
 25 dum diuersus in vtraque vsus: imò specie planè idè,
 25 maioris minorisq; ratione euarians. Quippe tanto
 25 siccioribus medicamentis eget arteria, quàm vena,
 quanto ipsa est suapte natura siccioris temperamen-
 ti, quàm vena. Ergo quod venæ insedit vulnus, vbi *Curatio vl-*
 ad manum est, & citra substantiæ deperditionem, *ceris in ve-*
 30 dem desiderat curationem iis, quæ in carne accidunt. *na.*
 Nam siue ex recenti ictu factum est, id agendum
 est, ut medicamentis iis, quæ enhæma vocant, coeat:
 siue ex erosione, quæcunque dicta de rebellium
 35 vlcerum curatione sunt, ea prius ratione discer-
 enda, mox ut opere perficiantur, tentanda. Quin-
 etiam vbi vinculo vas sis complexus, aut medis-
 camentis sanguinem supprimentibus, aut ferras-
 mentis ignitis vsus, ita, ut facta fuerit substantiæ
 deperdi

316 Institut. Chirurgicarum, Lib. II.

deperditio : illudq; tibi curationis propositū refert, vt quæ circa vulneris, vlcerisve labra sunt carne impleas: iisdem omnino medicamentis vtendum erit quæ in methodo sinuosorum ac cauorum vlcerum sunt descripta.

De vulneribus nervorum, tendonum, & syndesmorum, id est, ligamentorum. CAP. XIII.

*Differentie
vulnerum,
partium ner-
uosarum.*



Vulnera nervosarum partium Avicēnæ libro quarto suæ medicinæ, & Galeno 10 libro iexto methodi medendi, quādoq; punctim, quādoq; cæsim fiunt. Eadem interdum line cōtusione, interdum verò cum contusione accepta sunt. Ex puncturis autē, quædam hiant, atque apertæ sunt, quædam cæcæ, 15 atque occlusæ manent, adeo vt earum ora sic connisueant, ac inter se cōciant: vt conspectū effugiāt. Porro ex dissectionibus, hoc est, iis quæ in nervosis partibus cæsim fiunt vulneribus, aliæ per transuersum aliæ per longitudinem inflicte sunt. Atq; ex harum 20 vtriusq; quædam fiunt sine amissione substantiæ carnosæ, quædam verò cum deperditione ipsius substantiæ carneæ, cute etiā, quæ interueniebat, diuisa, adeo vt nervus nudus appareat. Ad hæc nervi transuersim vulnerati, quandoque non ex toto: sed duntaxat ex parte dissecti, quandoque verò toti præcisi 25 sunt. Atque in omnibus iis vulnerationibus, quandoque dolor ingens, & inflammatio, & conuulsio accidunt quandoque verò non. Itaque ab iis nuper commemoratis vulnerū differentiis, curationis indicationes sumuntur. 30

CAUSAE.

Omnium eiusmodi vulnerationum causæ sunt ea, quæ incidunt pungunt ac penetrant, & contundunt: vt in superioribus (vbi scilicet de causis vulnerum in vniuersum disseruimus) ostensum est. 35

SIGNA & iudicia.

Cæterum ex præcedētibus cōspiciū euadit, quòd nervus vulnerari non potest, quin cutis, & caro solutionem cōtinui: & vulnerationem etiā patiantur. Nervum

Neruum conuulneratum esse testantur, dolor ingens, lesio sensus, & motus, & si in loco neruoso uulnus acceptum est. Sed ab hoc postremo, coniecturalis solum nota desumitur.

5 Neruis vulneratis, aut punctis, ex sentiendi, quod obtinent, acumine, inflammatio, & dolor immodicus accidit. Quare & febres, & conuulsiones his oboriuntur, quibusdam & delirium, ob neruorum cum cerebro commercium. Interim uero, in aliis quoque
 10 particulae affectu locis, inflammationes, & abscessus super ipsum neruum conuulneratum, quod cohaereat, solent accidere. Ita quidem iudicatur Galeno libro tertio artis medicinalis, ut in superioribus annotauimus.

15 Si in uulneribus neruorum tumor apparuerit, & postea disparuerit, conuulsionis, ac delirii periculum imminet. Hinc de tumoribus, qui uulneribus superueniunt, loquens Hippocrates libro quinto Aphorismorum, in uniuersum omnes illos tumores dat, qui de repente detumescunt. Sed & ingens malum portendi ibidem adserit, cum uulneribus prauis (quas
 20 lia sunt, quae in capitibus, aut finibus musculorum, & maxime neruorum fiunt) tumores omnino non adueniunt. Si in uulneribus (inquit) foribus, & prauis tumor non appareat, ingens malum. Sequenti quoque aphorismo, qui pars est antecedentis, docet Hippocrates, tumores omnes, prauis maxime uulneribus, cuiusmodi sunt ea, quae neruosis partibus illata sunt, superuenientes, quicunque molles sunt, optimos esse, contrarios uero prauos. Molles (inquit) boni, crudi uero mali. Vbi crudum tumorem vocat,
 25 durum, atque renitentem, qui opponitur molli. Ad haec, neruo per transversum uulnerato, sed non omnino dissecto, maior conuulsionis metus impendet, quam si totus praecisus esset: phlegmone scilicet a dissectis fibris, ad non sectas, comunicata: ceterum conuulsione, ab ipsis non sectis excitata. At si totus quidem neruus praecisus sit, metus praeterea nullus insit,
 30

Quae Symptomata. quicquid affectus ex neruorum uulneribus oboriantur.

Tumor in neruorum uulnere.

Crudus tumor, qui dicitur Hipp.

Gale. lib. 6. Therap.

stat, nec periculum vllum inde sequetur: debilis tamen particula manebit, vt prius dictum est, cum de spasmō ageremus.

Meminiſſe prætereà oportet, quòd frigidum, partium neruoſarum vulneribus, magis est mordax, quàm iis, quæ carnes occupant.

Ligamenta vulnerata, valentiſſima tolerant remedia. Neruea ligamenta, ſiue copulæ, quos ſyndefmos vocant, cum ſimillimam habeant tendonibus ſpecie, valentiſſimorum remediorū Gale. ſexto Therapeu. vim tolerant: quippe quòd nec ad cerebrum pertinent, & ſenſu careant. Nam nerui omnes, alij quidē ex ipſo planè cerebro ortum habent, alij ſpinali interueniente medulla. Tendones quoque, quoniam compoſitam ex neruo ligamentoq; ſubſtantiam habent, quatenus nerui participes ſunt, eatenus ex cerebro oriuntur. Cæterum minus ſaltem, quàm ipſi nerui conuulſionem accerſunt.

Syndefmus verò vulneratus, ſi iſe eſt, qui ab offe ad os permeat, ac duorum oſſium coniunctio eſt, & maxime ſine periculo eſt, & ipſum quibuſlibet ſiccans medicamentis, nihil hominem offendet. Si iſ qui in muſculum ſe inſerit, quāto eſt neruo & tendone minus periculo oportunus, tanto vtique, niſi rirè, hoc eſt cautè, & diligenter curetur, reliquis ſyndefmīs, magis terrere debet.

Curatio vulnerum, partium neruoſarum.

Curatio vulnerum eiufmodi partium neruoſarum, communis eſt, cum ea, quæ & vulneribus partium carnoſarum accommodatur: hoc vno tamen excepto, quòd ſymptomata illis ſuperueniens, nēpe dolor, primò medici ſollicitudinem (cum nimis contriſtat) ad ſe conuertit. Ita tamen, vt vniuerſales, ac communes illæ intentiones ſuprà memoratæ, haud prorſus interim negligantur. Hæ autem numero erant quatuor. Prima quidem, extranea, quæ vulneris labris intercidunt, remouere. Secunda, vulneris labra diſſidētia committere. Tertia commiſſa, atque

Ingenti dolori primò ſuccurrendū.

arque in vnum coniuncta, seruire. Quarta, particule
lesę substantiam conseruare. Ceterum quomodò has
intentiones assequamur, ex differētiis iam suprà enu
meratis planè cognoscemus. Ergo à simpliciore exor
diū sumentes, de nerui punctura primū dicemus.

In nerui puncti curatione, neque vnitionem molis *Puncti nerui*
ri statim oportet, neque coacta, seu in vnum coniun *cursio.*
cta conseruare: Quin potius cutis quidē vulnus aper *In nerui pu*
tum, inglutinarumq; custodire. Itaque infixa duntax *ctura vul*
10 xat (si quæ neruis inhererint) extrahenda, & particu *nus diu ap*
læ oblaxę substantia seruāda. Porro, qua ratione des *tum seruand*
fixa euellenda sint, abundè in præcedentibus ostens *um est.*
dimus. Reliquum est igitur, vt quomodò læsę par
ticulæ substantia seruanda sit, & ab ingruentibus
15 iniuriis vindicanda, aperiāmus. Ceterum partis
ipsius laborantis, hoc est, puncti nerui substantiam
optimè seruabis, si, & dolori (qui ob exactum, atq;
excellentem partis affectę senium vehementissimus
excitari solet) sedulò, ac maturè occurreris: & phle
20 gmonem fieri prohibueris. Quæ duo ex necessitate *Symptoma*
(nisi obfiteris) nerui puncturam consequuntur, & *ta nerui pu*
conuulsionem subindè accersunt, vt in præcedentis *cturam u*
bus iam annotauimus. Vt autem geminum hūc scos *mitantia.*
pum assequaris, hoc est, dolorem, ac inflammatio
25 nem prohibere possis, quatuor intentiones rursus ti
bi erunt diligenter obseruandæ. Prima, erit recta *Quatuor in*
vitæ institutio. Secunda, materiæ antecedentis sub *tentiones in*
tractio: ne scilicet ratione doloris, confertim ad lō *cursada ner*
cum affectum confluat. Tertia, corpus à conuul *ui punctura,*
30 sionis noxa vindicare. Quarta, dolorem sedare, *obseruanda.*
& æruginosam saniem, educere. Et hæc quidem
puncturæ nerui propria est, & maximè peculiaris.
Aliæ verò tres, omnibus neruorum vulneribus sunt
communes.

35 Quod ad primam intentionem attinet, præcipit
Auiennas, vt cui neruus punctus est, victū in extre *i*
mo tenuissimum seruet, iuxta eā formā, quam super *Viuenti rati*
rius expressimus, dum in vniuersum de vulneribus *tio.*
tractare

tractaremus. Locus in quo cubabit aeger, tepidus esse debebit, vt Celsus nos admonuit. Lectulus verò mollis, vt Galeno, & Auicennæ placuit. Sed & collari locari quoq; membrum, quod ictum est, ratione certa debet. Optimum etiam medicamentum laboranti quies est: moueri enim, & ambulare, nisi sanis alienum est. In quiete igitur, ac lectulo molli hominem continere oportet.

2 Vt autem secundam intentionem assequi possis, *Materia an* sequendum omninò tibi est Galeni consilium, qui *recedentis* ¹⁰bro sexto methodi medendi, iubet in nerui punctura, corpus totum sanguinis missione inaniendum esse, vtique si virtus robusta fuerit, & nihil aliud obstituerit: etsi nulla etiam adsit in corpore laborante sanguinis redundantia. Morbi enim magnitudo, ac doloris vehementia, corpore etiam plethorico non exis-
Subtractio. ¹¹stente, hoc genus auxilij (vt antea diximus) plerumque desiderat. Cæterum in hac per sanguinis missionem, vacuatione, seruanda semper erit locorum affinitas, vt frequenter admonuimus. Si verò vitiosis succis ²repletum corpus sit, protinùs congruo medicamento illud purgabis. *Purgatio.* ²Leuis quoque frictio rectè adhibetur, sed his partibus, quæ longius absunt à vulnere. *Frictio.*

3 De tertia indicatione abundè satis dictum est in ²præcedentibus, vbi de conuulsione vulneribus superueniente tractauimus. Itaque si puncto neruo, vel quouis modo vulnerato, aut etiam cōtuso, spasmus acciderit, aut eius metus ingruat, protinùs caput, collum, atque vniuersam dorsi spinam, oleo liliorum, vel ³communi, calente fouebis. Porro si in partibus superioribus, vt manu, vel brachio, id genus vulneris neruus acceperit, præter iam commemoratas partes, axillas quoque vbertim oleo calenti delinies. Si verò pū-
Conuulsionis ³ctus, aut quouis modo vulneratus neruus ex iis sit, ³qui in crure habentur, bubones, siue inguina, pubes, & loca vicina, largo oleo statim erunt imbuenda. Tum per totam spinam, ad collum, & caput vsque ³ascen

De Plagis, seu cruentis uulnerib. 321

ascendendum. Sed & tendones, & ligamēta, ac loca ipsa vulnere vbius illato propinqua eodem modo fouenda sunt, vt sexto libro methodi medendi Galenus facere nos edocuit.

Cæterum, neruorum vulneribus, sed maximè pū
 5 ctim inflētis, perperam à principio curatis, maxima
 omninò inflammatio, & putredo superuenit. Ergo
 cum nerui vulnerati sic iam inflammatione tentan-
 tur, & putrefiunt, farinam hordeaceam, aut fabaceā
 aut potiùs eruinam, in aqua lixiua aut oxy melite,
 10 vel syropo acetoso decoctam, loco phlegmone occu-
 pato, & putrescenti statim illinire oportet. Non au-
 tem triticeam farinam, aut eius generis cataplasma-
 ta, quæ particulam putrem efficiūt: imò verò neque
 aquam calidam adhibebis. Hæc enim tamen si reli-
 15 quis inflammationibus, quas phlegmonas appella-
 mus, sit accommodatissima (vt quæ eas valde miri-
 get) vulneratis tamen neruis est infestissima. Ab hu-
 mectantibus nanque, & calefacientibus medicinis, festi-
 20 putredo huiusmodi affectibus comparatur. Quod si
 vehemens inflammatio cum maximo dolore infesta
 uerit, eruinam farinam, aut fabaceam, cum optima
 sapa, aditò paucissimo aceto, decoctā, illinito: prius
 tamen parte affecta, oleo calido affatim perfusa.
 25 Tāta verò interdum ex eiusmodi puncturis, & ner-
 uorum vulneribus oboritur putrefactio, vt ferro
 candenti, vel caustico aliquo medicamento (cuius-
 modi est Aegyptiacum) eam adurere cogamur.

Halyab. & Auicenna ad eiusmodi phlegmonas,
 30 & gangrænas, seu putredines, emplastro ex metalli-
 cis, & aceto præparato utebantur, cuius compositio
 libro tertio de compositione medicamentorum
 35 vñ, à Galeno sub hac verborum seriē descripta est.
 Cerae pondo vnc. sex, olei vnc. nouem, my fiosi pon-
 do vnc. sex, chalcitidis denarij pondo vnius, squamæ
 æris pondo vnc. duas, & semis, thuris pondo,
 vnc. semis, galbani pondo vncia. Quæ liquari possunt,
 hoc est, cera, & galbanum: liquefacta, metallis

*Si nerui vul-
nerati phle-
gmone occupa-
tur, aut pu-
trescant.*

*Aqua calēs
vulneratis
neruis est in-
festissima.*

*Emplast. ex
metallicis
ad gangre-
nas, & pu-
tredines.*

322 Institut. Chirurgicarum, Lib. II.

cis in aceto acri prius accuratè tritis, superfunduntur. Hoc pharmacum ignorauit Galenus, quis composuerit, neque apud vllum hoc modo citatum vnquā (vt ipse testatur) comperit. Eadem tamen præstare, quæ & alia quædam odorata simul, & sumptuosa, quæ paulò antè recenset, adfirmat. Recentiores autem eo medicamento vti non consueuerunt, sed illo potius, quod constat farina hordei, fabarum, & orobi, in lixiuio stillaticio (vt prius diximus) decoctis. Quippè quod à Galeno, & Auicenna maximè sit celebratum, & frequenti experientia, optimum ad hanc rem à multis comprobatum. Addit autem in decoctione Auicennas, mel, & acetum.

4
Doloris sedatio, et sanieieductio.
Quod verò ad quartam intentionem consequendam attinet, quæ neruorum quidem puncturæ magis propria est, Galenus libro sexto methodi medendi, valde multa pharmaca recenset, ab ipso excogitata, & deorum quadam prouidentia (vt alibi testatur) inuenta. Quæ vulnere imposita, ad vtrumque miserè sunt comparata, tum vt dolorem mitigent, tum vt exitum saniei patefaciant. Tutius verò fuerit in neruis acu, aut paxillo, aut quopiam tali punctis, præsertim si in altum recessum vulnus, hoc est, punctura descenderit, & cōspectum effugiat, cutim etiam in vulneris orificio aperire, ac latius incidere, quò melius sanies effluat, & cōmodius ad profunditatem loci, medicamentorū vires perueniāt. Perro aliis cultro rasorio, aliis verò cauterio cutem ipsam apeririendam esse magis placet. Galenus in id genus puncturis, orificium duabus in cutem sectionibus rectis diuidere iubet libro tertio de compositione medicamentorum secundum genera. Itaque nisi oræ angustiorum eiusmodi punctuum aperiatur, cōuulsionis periculum magis imminet. Quippe quòd obcæcator ita cutis vulnere, nihil à profundo extrorsum exiret. Facta autem cutis apertione, exiccandum mox vulnus est, substantia aliqua tenui, quæ vsq; ad ima nerui offensi possit penetrare, vt lib. artis medicinalis

- 5
 10
 15
 20
 25
 30
 35
 40
 45
 50
 55
 60
 65
 70
 75
 80
 85
 90
 95
 100
- lis Gale. nos admonuit. Cuius generis est oleum Sabinum, præsertim vetus, quod tanquam vtilissimum ad præsentem curationem, libro sexto methodi mendendi, & tertio de compo. med. *κατὰ γένος*, idem autor deligit. Vitandum autem (consilio eiusdem) omnino est, oleum crudum, quod *ἀμόρπιβες* vel *ἀμφοτέρων* duplici nomine Græcè dicitur: & quod denique vim habet adstringendi, cuiusmodi est oleum myrtinum, tribus saltem primis diebus. Hoc enim per halitum non digerit, sed obstruit, & perspiratum prohibet. Præstat igitur nervos punctim ictos oleo tenui, adstrictione prorsus carente, perfundere, quale dulcissimum est, quod longè melius erit, si duo aut tres annos transegerit. Sed neque Sabinum etiam ipsum oleum, quamvis sit tenuissimum, aut aliud quodvis simile, ut est lasminum (quod vocant) frigidum adsmouendum est, sed calens: frigidum nanque præterquam quod nervis aduersatur (ut quinto Apho. expressit Hippoc.) tenues quoque meatus obstruit, & ipsos angustiores efficit: calidum verò digerit, ac dilatat, doloresque magis demulcet. Si vehemens dolor laborantem discruciat, oleum ex vitellis ouorum commode administratur. Ad eandem quoque intentionem in nervis punctim vulneratis, Galenus sæpe usus est terebinthina resina, medicamento sanè apprimè idoneo. per se quidem in pueris, & mulieribus, & generaliter iis, qui molli essent carne: cū euphorbio verò emollita, in duris corporibus. Non secus autem propoli, non per se modò, verum etiam cum euphorbio molliens, usus est: & si nonnunquam duriora contigerint. cum oleo quodam tenuiore. Quin (subiungit) & sagapeno in duris corporibus sum usus, utique cum oleo, & terebinthina id miscens. Sed & opopanace ad eundem modum, quo & sagapeno. Mihi verò & lachryma Cyrenaica non inutilis fore videtur, si quis emplastrum ex ea faciat: cuiusmodi est, quod nos ex euphorbio composuimus. Verum (inquit) nondum id experientia, quemadmodum
- Oleum Sabinum.*
Olea adstringentia.
Frigidum punctim nervis aduersatur.
Si dolor vehemens adest.
Medicamentum quibus usus est Galenus in nervis punctim vulneratis.
Lib. 6. meth. med.

Remediorū p methodū inuentionem pcedere debere deinde hāc experientia cōfirmata re. reliqua omnia: comprobauimus. Quippe præcedere oportet eam, quæ à vera methodo proficiscitur, remediorum inuentionem: huic verò experientiam ad certiore[m] etiā fidem subscribere. Si quidē ex tali methodo etiam sulphur, quod neque ignem experitum, neque lapidosum sit, sed omnino tenuium partium, ei cui nervus vulneratus esset, conducturum sperauimus. Tantum eius [sulphuris inquam] tenui oleo miscentes: dum quod ex vtrisque mixtum erat, sordium haberet crassitudinem. In valentioribus verò durioribusq[ue] corporibus etiam si ad melius crassitudinem redigas, sic quoque iuueris. Nam id quoque comprobatur experientiā est. Hactenus

Auenzoar.

Galenus. Cuius sententiam approbat Auenzoar, huiusq[ue] rei periculum se aliquandò fecisse testatur. Quæ autem de lota calce subdit Galenus, nervis denudatis magis conuenire videntur. Quare in sequentia, ea reseruamus.

Emplastrū Galeni.

Cæterum paucis quibusdā interiectis refert Galenus, se composuisse emplastrum ex cera, resina terebenthina, pice, & euphorbio, ad hanc intentionem longè optimum, quo & plurimi sua ætate, felici successu vterentur. Recipiebat autem ex cera partem vnā, ex terebenthina, & pice, vtriusque partis vnus dimidium (sic vt quod ex vtrisque conflaretur, ceræ par esset) ex euphorbio verò, ceræ partem duodecimam, etiam plus aliquandò, vbi scilicet valentius efficere est in animo. Licet quoque interim & plus sit, quod ex terebenthina, & pice confit, quàm cera. Licet rursus & alterum eorum tantum ceræ admiscere. Quin etiam in penuria terebenthinæ resinæ (quæ vix apud nos reperitur) abietinam, Galenus etiam autore, cōmodè admiscebis. Emplastro verò aliquo ex prius memoratis appposito, lanam mollem oleo calente madefactam suprà decenter alligabis. Ig[itur] vt summatim, atque vniuersim dicamus, quæ in puncti nerui curatione obseruanda sunt, Galenū ita sexto libro Therapeutices scribentem audiamus.

Vuln

Vulnerati nerui curatio, medicamēta postulat, quæ *Gal. lib. 6.*
 & tepidum calorem excitent, & valenter [sine mole *methodi me*
 sita tamen] desiccant. Tum quæ ex substantiæ suæ *den.*
 tura, & trahendi vim habeant: & tenuium sint pars
 tum. Et rursus ibidem. In pharmacis autem huc o/
 mne consilium direxi: vt esset eorum facultas, tum
 tenuis, tum modicè exalfaciens, & quæ admodum
 siccare citra dolorem posset. Cùm sola hæc trahere
 ex profundo saniem, neq; contracta, neq; demorsa
 particula possit. Porro cùm permagna humanorū *Li. 3. xxiij*
 corporum (vt alibi Galenus ait) sit differentia, tum *viu.*
 in temperamentis, tum ætatum mutationibus, in/
 super vitæ studiis nulla ratione quodq; medicamen
 tum omnibus conuenire potest. Quãobrem duo in
 promptu habeto, alterum valentius ex similibus ge
 nere confectum alterum mitius: quæ inuicem multa *Vide reli-*
 dum vsus postulat permulta inter hæc iuxta mistur *qua apud*
 ræ quantitatem constitues. *Galen.*

De nerui casim Vulneratis.

20 **S**I autem neruus non punctim: sed planè casim
 vulneratus fuerit diligenter considerandum est,
 quo pacto facta vulneratio sit: utrū ne per trās/
 uersum neruum: an secundū longitudinem eius. Tū
 25 verò quantum interuenientis seu præiacentis cutis
 diuisum sit. Ad hæc spectandum etiam est: num tot/
 tus neruus dissectus sit: an nō ex toto præcisus. Eius/
 modi nanq; vulnerum differentie, curandi rationem
 non parum euariant: vt ex sequentibus euadet ma/
 30 nifestum. Itaq; si cutis, quæ interueniebat sectio: nō
 satis pateat ampliori diuisione aperienda est: vt iam
 in præcedentibus admonuimus. Proponatur igitur *Hypothesis.*
 primum satis esse cutis adapertū: non ita tamen hie
 re vulnus: vt neruus ipse incisus sensui nudus adhuc
 35 appareat. Sanè huiusmodi nerui scissura siue per di/
 rectum: siue per transversum facta diuisio sit: ultra
 communes tres iam intentiones dictas in punctura *3. Intētiōes*
 obseruandas, tres adhuc alios scopos, siue intētiōes *particul.*

- 1 habet. Prima est, vt in loco vulneris magis decliui, turunda aliqua mollis, & suavis blandè imponatur.
- 2 Secunda, vt aliquod medicamentū anodynum, seu mitigatorium, & vt vocant incarnatiuum, neruis dictum, vulnere superponatur. Tertia, vt lana mollis & succida, vel oleo calente delibuta, de super blandè aligetur. Ergo non ita exactè vulneris oræ committendæ sunt, & glutinandæ, quin emissarium aliquod relinquatur, quo collecta sanies effluere possit. Hæc enim si in profundò retineatur, neruis putrefactione ac corruptionem inducet, atque ita conuulsionem etiam inueniet. Eam ob rem profuerit (primis saltem diebus) turundam aliquam mollem, digestiuo ex terebinthina, oui luteo, & croci momento illitam, loco vulneris, vt dictū est, decliuiori molliter immittere, donec nullum ampliùs phlegmones, aut conuulsionis periculum timeatur. Medicamentum autē his neruorum, ac etiam tendinum vulneribus, casim non punctim acceptis, expeditissimum, apprimeq; idoneum esse creditur, quod vnguentum ex vermibus vulgò nuncupatur. Recipit autem centaureæ minoris, linguæ canis, lanceolæ, quæ plantago est minor, pilosellæ, consolidæ maioris & minoris, ana. M. vnum, vermium terrestrium, quos lumbricos appellamus, lib. semis, olei communis, lib. vnam, vini lib. vnam, & semis: subigatur simul, & ita septē diebus nutriatur, seu (vt loquuntur) fermentetur. Deindē illis addantur sepiarietis à pelliculis emundati, lib. vna, picis nigræ, resinæ, ana quart. vnum gummi ammoniaci, galbani, opopanacis in aceto dissolutorū ana drac. quinq; : simul omnia moderato igne decoquantur vsq; ad vini & aceti consumptionē, & colentur. Vbi verò hæc penè refrixerint, adde terebinthinæ quar. semis. thuris, mastiches, sarcocollæ ana dra. tres croci drach. duas: spathulâ agentur in mortario, & fiat vnguentū. Porro longè alia multa medicamēta, paratu etiā faciliora, hisce neruorū diuisionibus, valde accommodata referuntur à Gale. libro tertio de compositione

Turunda.

Vnguentū ex vermibus.

positione medicamentorum secundum genera, &
 sexto methodi medendi. Cuiusmodi est: quod ex *Cataplas-*
 oxymelite, & fabarū farina: vel eruorū: vel lilij: vel *ma.*
 ciceris: vel lupinorum amarorum: vel hordeacea fa-
 rina cataplasma conficitur. Item pix liquida *Pix liqda.* fermen-
 to temperata, atq; vulneri imposita. Eruorū quoq;
 aut alia ex prædictis farina, fermento permixta. Imo
 & interim fermentum ipsum solū. Quinetiam *Oxelæum.* oxe-
 læum solū quod caleat, modò acetum abundè acre,
 & vetustū sit. Propolis quoq; recēs liquida, & pin- *Propolis.*
 guis vulneri imposita, sæpe præsidio fuit: interim
 quidem per se, interim fermento commixta. His
 itaque præsidis ad neruorum vulnera, tam in agris,
 quàm in vrbibus felici admodū successu, Galenus
 sæpe vsus est, nō solum in his, quos iam phlegmone
 prehenderat: sed etiā: vt refert protinus ab initio. In
 summa oportet medicamēta omnia: quæ neruorum
 vulneribus tā cæsim, quàm pūctim inflicta, ex vsu *Qualia in*
 futura sunt ea pollere facultate: quæ & modicè cal- *vniversum*
 20 facere (id est, tepidū calorem, & veluti ex sole suas *medicamen-*
 uem excitare) & valenter, citra dolorem tamen sic- *ta esse debe-*
 care possit. Tum ea quoq; esse substantiæ natura, *ant, neruo-*
 quæ ex alto saniem, atq; humores educere: ac dige- *bus, accogn-*
 25 rere valeant. Atq; ex iis minus molesta esse consue- *moda.*
 uerunt: quæ liquida sunt: vt Galenus etiā annos
 30 rauit, libr. 3. de compo. medic. secundum genera. Su-
 per eiusmodi verò medicamenta lana mollis succi-
 da: vel oleo calente respersa apponēda est, & leniter
 obstringēda. Cæterum quoniam frigus cum omni-
 bus: tum verò maximè neruorum vulneribus infes-
 tissimum est plurimum conferet lanam ipsam su-
 perpositam permanere calidam: siue oleo tantum
 siue oxelæo quoque imbuta fuerit, fiet hoc si aliæ
 35 lanæ siccæ vellera: aut panni calidi subinde mu-
 tati, extrinsecus circumponantur, & æger intra
 tectum, si modò hyems fuerit, ad quintum vsque
 vel septimum morbi diem sese contineat. Nam
 si eo vsq; phlegmone non tentetur: vacetq; prorsus

Lib. 3. κατὰ γένν. dolore: & nullam sentiat tēfionem: in posterum (inquit Galenus) tutus erit. Atq; hæc de neruo cāsim vulnerato in vniuersum, ac generaliter dicta sunt siue per transuersum siue per directū, seu lōgitudinē neruus diuisus sit. Quæ verò sequuntur peculiariter de neruo per trāsuerfum vulnerato dicuntur.

De neruo pertransuersum caso.

AT si neruus per transuersum vulneratus sit, non tamen ex toto præcisus, maior conuulsio 10 nis metus impēdet, inflammatione scilicet (vt supra diximus) à dulcētis fibrīs ad integras, & non sectas succedente: cāterū conuulsione ab ipsis nō sectis excitata: Huic itaque memoratis prius auxiliis: quā citissimē occurrendum est. Ergo in quies 15 te omnino, & strato mollissimo continendus æger est, plurimōq; oleo affatus, & assiduē inguina spina axillæ collum, & caput perfundendum Cāterū in hoc vulnere largiūs sanguis mittendus est: & vīctus tenuior adhibēdus: quā in neruo per directū 20 incisio. Quod si conuulsio iam superuenerit: & nulla conuenientū medicamentorū vi remittatur reliquæ fibræ quæ integræ remanserant: præcidi debent. Si 25 enim totus neruus præcisus sit nullū quidem prætereā (vt Galenus inquit) conuulsionis periculum 30 sequetur debilis tamen particula manebit. Verūm 35 lauo: quā mors potius optanda. Hoc pacto quis busdam in priore infernaq; femoris parte, per trāsuerfum percussis reliquum tēdinis amputauit Gal-
Lib. 3. κατὰ γένν. le. vt tuta illi esset curatio. Porro si transuersa hæc 39 diuisio, tam insigniter alta in musculo facta sit: vt deligatura nihil prodesse possit: non dubitabis musculi distantes inuicem partes (præsertim si vulnus recens fuerit) futuris altioribus contrahere: curā tamen semper adhibita: ne ab acu neruus, vel tendo 45 compungatur. Carnosa nanque ipsa musculorum pars, dum acu sinitur: periculo vacat. Nerui verò, aut tendines: non mediocri periculo consuuntur.

Horum

Horum quidem omnium Galenus nobis autor fuit
 lib. tertio de compo. medi. secundum genera, ad hūc
 modum scribens: Contemplatus (inquit) gladiatorem quendam ex his quos equites nominant, transuersam diuisionem in priore: ac inferiore femoris parte habentem eamque satis altam: cum vulneris labrum intuitus sursum alterum reuulsum, infra alterum quasi ad patellam detractum, non dubitauimus stantes inuicem musculorum partes futuris contrahere: curatio illa: quæ Græcè à latitudine κατὰ πλάτος dicitur neglecta. Itaque veritus tendines ipsis cōsuere denudatis prius illis, sic altioribus futuris vsus sum, haud ignarus carnosam ipsam musculorū partem periculo vacare: tendines verò non item, quam hoc nullum ex præceptoribus facientem viderim. Has autem futuras in eiusmodi vulnere, ideo non superficie tenus: sed altius moliri conuenit, ne quæ in uno sunt, inconglutinata dehiscant. Reliqua verò, quæ ad vulneris curationē attinent, hic quoque sunt eadem etiam si totus nervus præcisus sit. In solo itaque per transuersum accepto vulnere, eodemque insigniter alto cum deligatura nihil prodesse potest ex sola futura curatio absoluitur. Etenim in vulneribus: iuxta membri longitudinem factis, deligatura vulnerati musculi partibus inuicem contrahendis sufficit Galeno. Cæterum futura decenter facta, biduo confutum vulnus fouendum erit rosaceo, in quo lumbrici terrestres prius decocti fuerint, ac super puluis aliquis qui futuram contineat, aspergendus erit, cui parem ipsorum lumbricorum desiccatorum, & contritorum portionem, si lubet, adicies. Quidam enim memoriæ prodiderunt, eiusmodi terræ intestina contrita, nervisque diuisis imposita, protinus mirum in modum prodesse: ut libro simplicium vndecimo Galenus refert. Sunt qui & centaurium arefactum, & contritum etiam inspergunt. Medicamen enim est admodum desiccatorium, mordacitatis expers, quodque, si glutina-

Historia de gladiatore in femore vulnerato.

Cur future altæ esse debent.

Lumbrici in rosaceo decocti.

Centaurium.

*Radix cen-
taurij mino-
ris.*

toris, & deficcatoriis miscetur vlcera maligna, & cacoëthe sanare creditur. Quin & ipsius herbæ res cētis illitu magna vlcera glutinātur: vetusta quoq; & quæ ad cicatricem agrè perducuntur, eodē modo vtentibus cicatrice obducitur Galeno libro se-
ptimo de simplicium medicamentorū facultatibus. Refert Dioscorides, & quodam in loco Auicennas, quod carnes minutim incisæ coalescunt: si cū cētaurio maiori decoquātur. Eidem quoq; centaurij minoris radix recens: aut arida antè madefacta: vulnera conglutinat, & coniungit. Sed iam tempestiuum est vt de nudato neruo dicamus.

Nervi casum vulnerati, & nudati curatio.

*Nudatus
neruus ve-
hementē me-
dicamento-
rū vim fer-
re nō potest.*

*Lib. 6. met.
& 9. simp.
Calx elora
eū rosaceo.*

*Medicamen-
tum ex pom-
pholyge.*

NVdato neruo omnis curationis consiliū huc tibi dirigendum est, vt minima cum rosione fices. Proinde si nervus non punctim: sed planè casum vulneratus fuerit, cute etiā quæ interueniebat diuisa, adeo vt nudus appareat, nullum iā suprà commemoratorum medicamentorū, quæ ex euphorbio, ac similiter acribus, emplastri specie fiūt applicabis. Nudatus nāque vehementē ipsorū vim ferre nequit: ita vt cū interposita cutis erat, tulit. Optimè igitur eo casu feceris, si & calcem, & pompholygem, ac metallica omnia resinas quoq; olea, mel, & ceram quæ eiusmodi medicamentis, nudato neruo, ac diuiso apprimē idoneis, miscēda sunt, elue ris: quo scilicet citra rosionem vllam sint ficcatura. Quippe medicamentis omnibus (vt Galenus inquit) quæ laueris acris, mordensq; humor eluendo detrahatur. Tunc igitur præstantissimum erit, calcem æstatis tempore in diebus canicularibus sub sole, aqua salubri, & dulcissima sapius eloram, & exiccatam, plurimo optimoq; rosaceo admixtam apponere. Congruit & hoc casu medicamentum, quod è pompholyge (vt dictum est) elora fit: larsgiore itidem, ac probatissimo rosaceo salis omnino experte, solutum liquatūve. Salubre quoque medi

medicamentum est, & quod ex melle optimo sub
 emplastri specie componitur. Solui verò & id rosa
 ceo oportet, quod tū reliquis conditionibus sit opti-
 mum, tum salis omnino expers: ut scilicet minima
 cum rosione sicces. Nihil enim acre (ut diximus) *Nervo de-*
 nudato neruo (quæ pars est suapte natura sensu ve- *nudato ni-*
 getissima) vnquam admouendum est. Si verò robu- *hil acre ad-*
 itus sit, qui vulnus accepit, & cui corpus sit à super- *mouendum.*
 uacuis humoribus mundum, in hoc fas est, etiam
 10 valentioribus remediis nonnullis uti: ut pastillis,
 seu trochiscis ex Polyida autore, sapa calida solu-
 tis, & in linamentum illitis.

Id autē vel imprimis (inquit Galenus) semper ha- *Lib. 6. met.*
 bendū curæ est, ne quid ex iis, quæ vulnus cōtingit *Nihil frigi-*
 20 frigidum sit. Quandoquidem ipsa laborans particu- *dū nudato*
 la, & sensilis maximè est, & principium corporis pars *neruo admo-*
 30 tium primati (nēpe cerebro) cōtinua, & tēperamēto *uendum.*
 suo frigida. Quorum omnium occasione, & ex facie
 30 li à frigido offenditur, & suā offensam cerebro im-
 30 pertit. Ad iam dicti verò pastilli vsum propè etiam
 accedit & medicamēti vsum: quod *αἰκ χαλκίνας* Gale-
 no nominatur, vulgò autē diapalma. Hoc ergo me- *Diapalma*
 dicamine, si trochiscos Polyidæ ad manum nō habes-
 mus: uti tuto poterimus. Pastilli autem Polyidæ ex *Pastilli*
 25 quinto libro de cōpositorū pharmacorum miscella
 sunt requirendi, quorū si copia nō est, Andronis vel
 Pasionis, vel etiā Galeni pastillus erit sumēdus, quo-
 rū compositiones libro superiore cap. de carbuncu-
 lo descripsimus. Cæterū vulnus eiusmodi oleo per-
 30 fundendum non est, præsertim cū nunc memora-
 tis pastillis curatio suscipitur. Nam oleum illorum
 viribus aduersatur, & sordidum vlcus reddit. Ne-
 que enim parum interest (inquit Galenus) nudo ne
 neruo oleum: an per interpositam cutem adinoveas.
 35 Abluenda igitur à vulnere sanies est, molli lana spes *Sanies qui-*
 cillo circumuoluta, in sapa tepida intincta, & mox *bus abluen-*
 expressa. Quòd si omnia benè atque ex animi sen- *da.*
 tentia succedant, etiam vino dulci non acri, & mors
 daci,

daci, vulnus commodè poteris madefacere. Eo autem iam penè ad cicatricem ducto, etiam vtile fuerit album, tenue, & quod Græci oligophoron vocant.

*Aqua nuda
so. nervo ad-
uersatur.*

*Deterforiũ
medicamen-
tum.*

*Cadens fer-
rum.*

Aquæ verò vsum, ob causam superius adductam, si cuti & relaxans cataplasma semper in nervo nudato deuitabis. Blandè etiam, ac suauiter vulnus (si necessitas vrget) detergebis, vnguento ex vermibus factò, vel aliquo alio deterforio medicamento, quod recipiat mel probatissimum terebinthinam, & farinam hordei, aut fabarum: vel alio ex iis, quæ in antidotario habentur. Nōnulli pro comperto habent, quòd si dissecti nerui capita, seu extremitates candenti ferro, carne vitata, leuiter attingantur, optimè postea conglutinari. Postquam autem nervum denu datum contexeris, linamenta extrinsecus circumducere oportet, ex medicamento (inquit Paulus) quod angustis vulneribus faciat: nempe eo, quod ex euphorbio præparatur, aut fimo columbarum, sed ita, vt etiam sanas partes ampliter comprehendat.

De nervorum contusione.

*Nervorũ cõ-
tusio promi-
scuã habet,
cũ ecchyma-
si, tum gene-
rationis, tũ
curatiõis ra-
tionem.*

*Si cũ nervo
cutis contu-
sa sit.*

Nervorum contusionem promiscuam cum ecchyma si, seu carniū contusione habere generationem, facile nobis insinuat similis vtriusque affectus curatio. Itaque illic & digerentibus, & adstringentibus medicamentis utebatur, hīc verò etiam siccantibus, & astringentibus nobis utendum est, præsertim dūm cutis vnā cum nervo contusa exulcerataq; est. Si verò absque cutis simili affectu nervus quidem cõtus est, huic auxilia, quibus 3 euocandi, ac digerendi facultas insit, adferenda sunt. Contuso igitur nervo, si cutis simul cõrundatur, & vlceretur, fabarum lomentum oxy melite dilutum, aut si magis siccare voles eruina farinam cum sapa, & modico aceto illines. Quòd si ampliùs adhuc sic- 3 care desideras, irim quoq; illyricam, vel eam quam vulgò florentinam vocant, immites. Recentiores in hoc affectu per initia rosaceum cum oui candido li-
quore

quore admovent, & mitigato dolore laborante par-
 ticulari fouent vino tepéfatio, quod crassæ sit sub-
 stantiæ, & astrictiōis particeps. At si vnâ cum ^{Si dolor vnâ}
 contusione dolor infestet, picem liquidam cataplas- ^{cū contusio-}
 mati è farina fabarum adiciēs, & vbi simul bene de- ^{ne infestet.}
 coxeris, calens medicamentum applicabis. Vniuersi
 autem corporis curatio, eadem est cum ea, quā pau-
 lō antè docuimus. Verū si neruus quidem contu- ^{Si neruus cō-}
 sus sit, cutis verò nihil quod sensui appareat, à natu- ^{tus est, cu-}
 ra recesserit, oleo calente discussorio, quale anethinū ^{tis verò ne-}
 est, & rutaceum, irinum quoq; & amaracinum, con- ^{quaquam.}
 tinuè locum irrigabis, perfundēsve, & lana oleo ma-
 defacta fouebis, ac totius corporis curam prædictis
 similem adhibebis. Porro si neruus totus sit præci- ^{Si neruus 10}
 sus, metus prætereà nullus (vt paulō antè diximus) ^{tus sit præci-}
 instat, nullum enim inde periculum sequi potest. ^{sus.}
 Membrum tamen ea parte debile efficietur, præser-
 tim si dissecus neruus insignis magnitudinis fuerit.
 Curatio verò eius communis est, cum ea quæ alio-
 rum est vlcerum.

De vlnneribus ossium.

CAP. XIIII.



Radita vulnerum carnosæ substantiæ,
 venarum, arteriarum, & neruolarum
 partium curandi ratione, nunc de vultu-
 neribus ossium nobis agendum supers-
 est. Cæterum tametsi omnis continuus
 tatis seu vnitionis solutio in osse Gale-
 no sexto methodi medendi & passim alibi, Græcè
 proprio nomine catagma, (quod Latinis est fractus ^{Fractura}
 ra) dicatur, recentiores tamen tum medici tū chirur- ^{quid.}
 gi, fracturam vocare consueuerunt, solam eam ossis
 diuisionem, quæ sine incisione, à violentia quadam,
 vt ruptura extrinsecus accidente, fit, de qua in sequē-
 tibus latius dicetur. Vlnnus verò ossis appellare ^{Vlnnus os-}
 solent, præcisionem ense, aut quopiam alio simili in- ^{sis.}
 cidente, vel in profundum penetrâte factam, de qua
 in præsentiarum dicere statuiamus. Huiusmodi autē
 præ-

334 Institut. Chirurgicarum, Lib. II.

*Ex ossium vulnere praesentia oboriuntur symptoma-
mata.* præcisio quandoque (vt nunc loquuntur) est totalis, quandoque partialis. Cæterum cum os ipsum vulnere-
rari non possit, quin caro & vena, & alia superiacen-
tes particulae etiam vulnerentur, sæpenumero ex os-
sium vulnere, pessima quædam symptoma-
ta excitantur. Nempe profusio sanguinis, dolor vehemens, cõ-
uulsio, & syncope: à quibus & agendorum etiam
indicationes sumendæ sunt. Porro cum notæ vulne-
rum ossium, sensu sint satis cõspiciuæ, his prætermis-
sis iudicia seu præfagia subiiciemus, quæ tã ab ipsis
veteribus quàm recentioribus, scriptis madata sunt. 19

IVDICIA. Itaque iudicat Galenus libro artis medicinalis, &
I rursum tertio & sexto methodi medendi, quod ossis
soluta semel partium continuitas nunquam postea
eà adamussim & per se instaurari potest: præsertim
verò in iuuenibus, & adolescentibus, & viris, mul-
*Puerorū ossa diuisa, p-
se coalescunt.* toꝝ minus adhuc in senibus. Potest namq; os illud
tantum vnitionem per se & sine alterius ope recipere,
atque in idē adamussim coalescere, quod abunde
molle est, cuiusmodi cõspicitur in puerilis. Alterius
tamen ope, vt substantiæ cuiusdam interuentu, ceu
glutino quodam, ossa ipsa quantumuis etiam dura
ficcãq; sint, concrescunt glutinanturq; ve. Vocant au-
tem glutinum hoc, seu substantiam illam interueniē-
tem, cuius beneficio separatæ ossis particulae secum
agglutinantur colliganturq;, Græco vocabulo πα-
ρον sarcoidem, id est, callum carnosum. Huius pro-
gnostici ratio superius adducta est, vbi de iudiciis
vulnorum in vniuersum agebatur. 20

2 Hippocratis oraculum est libro septimo Aphorif-
*Erysipelas in ossis nu-
datione ma-
lum.* morum, casum prauum esse, osse nudato, carnem cir-
cumsistentem videri ab Erysipelate apprehensam. In
ossis (inquit) exutione, hoc est, nudatione, erysipe-
las, malum. Sed hic casus (vt Galenus ait in commen-
tario) ossibus ita patientibus rarò superuenit. 30

3 Adhæc, frigidum nudatis ossibus, eiusdem Hippo-
Nudata ossa, à frigido cratis testimonio, est infestissimum: partes enim sunt
exangues, ac natura sua frigidiores. Quæcunque
autem

autem tales in animalibus partes sunt, citius, ac magis à frigido offenduntur, vt libro quinto Aphorismarum Galenus annotauit, cōmētario decimo octauo. *magnopere offenduntur.*

Si magna ossa, veluti est os, quod propriè brachium, & humerus dicitur, vulgò autem os adiutorij, & vtrunque focile, siue os tibiæ, maius inquam, & minus (illud cneime, hoc perone Græcis dicitur) tota præcisa sint, adeò vt medulla egrediatur, vulnus tale periculofum admodum est, & magna ex parte membrum, quod ita præcisum est, emoritur. In tam insigni namq; incisione, nerui, veng, & arteriæ maiores, quæ vitam, sensum, atque alimentum particulæ iam sic affectæ prius ministrabant, omnino præcinduntur. *Magnorū ossium præcisio, cū exitu medullæ, periculosa admodum est.*

Quamquàm non defuerint aliqui, qui Auicennam perperam intelligentes, ausi sint oppositum planè asserere. Inquit autem ad hunc modum Auicennas, Et quod dicitur de incisione medullæ, quod interficit, est intentio, in qua nulla est vtilitas. Habet enim medulla lenitatem, & viscositatem, & non inciditur. Quod dictum sic accipiendum est: quod nullus vnquam interiit ob præcisionem medullæ ossium, quam membrum sic percussum tandem contabescat, & emoriatur: ob eam scilicet, quam nuper adduximus causam. Cùm verò dicit, medullam non incidit, hoc intelligendum, cùm os frangitur, non autem cùm totum excinditur. Quis enim addubitat, cùm os totum præcinditur, & medullam quoque simul excindi posse? *Lib. 4.*

Cæterum summopere cauendum est, ne aliquid ossis vulnerati subito, ac magna vi extrahatur. Nam si ita fit, vix à fistula, conuulsione, delirio, & febre, laborans tutus erit, vt Auicennas nos commonuit libro quarto suæ medicinæ. Proinde satius est, extrahenda ad tempus relinquere, & medicamēto aliquo attractoriam facultatem habente, naturam adiuuare, quam sic ea subito, & magna violentia eximere, vt suprà etiam monuimus, cùm de relictis è corpore extrahendis ageremus. *Ossis vulnerati frustula, nec subito, nec magna vi euellenda.*

IN curâdis ossium vulneribus, sicuti & in fracturis, atq; aliarum partium soluta continuitate, finis, seu scopus saltem primus, ac generalis, vnus est: nempe vnio. Quod si is per affectarum partium ficitatem (vt paulò antè diximus) perfici nō possit, restat alter, vt alterius scilicet cuiusdam interuentu dissidentes ossis vulnerati partes glutinentur. Vt autem finem hunc secundum possis assequi, quatuor alij scopi tibi proponuntur obseruandi, suo ordine exequendi.

Quatuor scopi in curatione vulneris ossium obseruandi.

- 1 Primus est, vt iis, quæ infixæ sunt, & ossium frustulis (si quæ sint) exemptis, partes inuicem distantes, in vnum adducantur, & vt commissæ iam seu coniunctæ maneant, vulnus in carne acceptum, futuris altioribus, ac validioribus contrahendum est.
- 2 Secundus est, vt præsidia, quibus huic affectui rite mederi possis, prudenter deligas.
- 3 Tertius, vt deligaturæ modus decens adhibeatur. Nempe talis, vt commodè vulnus tractari, ac curari possit, citra omnimodam eius ipsius deligaturæ remissionem, & ademptionem.
- 4 Quartus, vt postquàm à phlegmone iam tuta esse videbitur laborans particula, victus perorogignendo aptissimus, instituat.

Primus scopus.

Cæterum, quomodò primus scopus attingi possit, iam in sermone vniuersali de vulneribus superius dictum est. Quod autem eiusmodi futuræ in carnis partibus factæ, in proposito affectu sint ex vossu, hinc manifestum euadit, quoniam dissociatas vulneris partes, in vnum adducunt, adductas verò, coniunctasq; haud ampliùs dissidere patiuntur, ac præter hæc, partis substantiam tuentur. Vices enim deligaturæ, & ferularum tenent, prohibentq; ne circumfluus aer plagam temerè subintret, & os ipsum alteret, ipsiq; noxam inferat, quod magnoperè vitandum est. Atque hæc omnia in proposito casu sunt vtilissim

utilissima. Permittendū igitur, vt vulnus mox carne impleatur, atque caro ipsa medicamentis exiccatoria facultate præditis, ita obdurāda est vt tandem calosa fiat, & poros gignatur. Itaque si aliquid ex ipsius ossis substantia deperierit, eiusmodi cauitas ad vnguem impleri non potest, sed insanabilis remanebit, vt libro tertio metho. med. Gale. nobis est autor.

Secundum autem scopum hoc modo assequeris. *Secundus scopus.*

Sutura decenter facta, turundam in locum vulneris

10 decliuorē imponito, vt per hoc emissariū ossis frustula (si adsint) vel sanies, aut purulenta colluies, educi & expurgari possint. Sed & puluerē futurarū (vt vocant) conseruatium, superponito, quem primis diebus cum oui candido liquore remiscebis.

15 Postea verò agglutinatorium commune ex puluere illo, quo omnes passim vtuntur, terebinthinæ permixtum ita vt in vnum corpus coeant, superaccommodato, vel aliquod aliud simile, ex iis quæ incarnatiua vocant, prout res ex postulat. Ergo turundus

20 lam melle rosaceo, quod puluerem glutinatoriū ex myrrha exceperit, illitam, indito. Myrrha enim *Myrrha.*

Auicēne, carne nudata ossa vestit, & operit. Itaque si os exutū nudatūue appareat, prædicto puluere, & linamētis ex optimis pānorū laciniis cōfectis, ipsum

25 operito munitōue. Deinde emplastrū, vel stupas, aut pānos lineos vino calēte delibutos, super applicato.

Cæterū, tertius scopus in curando ossium vulnere propositus, ita absoluetur. Cum os totum præ-

30 cisum est, facta imprimis (vt dictum est) futura, totum membrum, vt Razes præcepit, excepto vulnere, duplici pāno, obuoluito. Pannos autem eiusmodi, primis quidem diebus oui albore, sequentibus verò, vino calido, tum austero, tum nigro, imbuito.

35 Et fascia longa ac lata iuxta membri magnitudinem & figuram deligato. Ea enim longitudine & latitudine fascia ipsa esse debet, quā vulneratæ partis conformatio desiderat. Vt autem cōueniens sit eiusmodi deligatura, eius principium iuxta finem lateris

*Deligatura
modus i vul
nerato esse.*

particulæ incipiat. Ab hinc facta ad superiorem partem circumuolutione, vbi propè vulnus vêtum erit, fasciam ex aduerso plagæ circumducito, atque eam versus corpus non comprehenso vulnere, quouique satis erit, dispensato. Mox fasciam vertendo, eam superne deorsum ducito. Atque vbi iam ad locum vulneris eam deduxeris, in partem vulneri oppositam, supra priorem aliam circumuolutionem, circumductus iniciato, eosque ita dispensato, ut ibi unde initium accepit deligatura terminetur, & vulnus minimè coopertum remaneat. Porro, fasciæ sic reuolutæ extrema acui ibidem erunt assuêda. Deinde ferulæ duæ vel tres (si vulnus in artubus acceptum est) leues ac politæ, membri læsi figuræ, ac magnitudini accommodæ iniicientur, quæ læsam partem ita fulcient, ut vulnus minimè contegant. Has autem fascias deligabis, nec prius solues, quam vulnus percuratum fuerit: nisi ramen dolor, vel eo loci excitatus pruritus, aut inflàmatio nos ad id compellat. Quibus quidem sympt^{at}maris modo, quo in sermone vniuersali diximus, succurrendum erit. Vulnus verò extrinsecus stupis contegendum est, & fasciâ deligandum, quæ singulis curationibus solui debebunt, quâ alia supradictæ fasciæ maneant: deinde vulnus detergeri, exiccari, & more aliorum vicerum curari debebit. Quod autem (inquit Galenus) neotericis inuentum est glossocomion, quo maxime tempore gignendi calli utimur, laudandum id quidem, quâ tum aliud quiduis eiusmodi machinarum, ducimus.

Quartus scopus.

Porro quod ad quartam intentionem attinet, quo tempore callus gignitur, nutriendum corpus est, cibus boni succi, & qui multum nutriant, ex quibus provenire succus soleat, non solum bonus, sed etiam tenax, ex quali fieri callum maxime expedit: de quo plura in sermone de fracturis. De duritie autem, quæ diuortium continui sequitur in fractura, quam Græci catagma vocant, fusiùs etiam alibi dicetur.

Lib. 6.

GENERALIS

DIVISIO VLCERVM,

5 *In librum Tertium Chirurgi-
carum institutionum Io.
Tagautij Medici.*

10 **V**LCUS.

1 Simplex, { Id est, cui nec ullus affectus alius, nec
symptoma ullum coniungitur.

2 Compositum, { Seu cū alio affectu, aut symptomate
complexum.

15 1 *Vlceris simplicis, ac solum consistentis differentia.*

Veræ, ac propriæ,
Extrinsècū accen-
dentes,

{ Hoc est, à natura vlcis
acceptæ.
Et non à substantia rei de-
sumptæ.

20 *Vlceris differentia veræ, ac maximè propriæ, atque à sub-
stantia rei acceptæ, sumuntur.*

A figura ipsius vlcis.

25 Ab ipsis dimensioibus, { Hoc est à diuisionis ma-
gnitudine, spatio, seu
quantitate, &c.

Vlceris differentia à figura.

Vlcus rectum.

30 Vlcus obliquum.

Vlcus pampini modo retortum.

Vlcus hami ritu vncum.

*Vlceris differentia à magnitudine & spatio ipsius diui-
sionis.*

35 Vlcus magnum, } Longitudo, & latitudo.

Vlcus paruum.

Vlcus in summo residens, } Altitudo.

Vlcus profundum.

340 Generalis diuifio ulcerum, In Lib. III.

Vlcus æquale.

Vlcus inæquale. } Differentiæ sunt etiam in alto.

Vlcus magnum, & profundum. { Longitudo,
& altitudo.

Sub magno comprehenditur longum, & latum: sub paruo, 5
breue, & angustum. Quæ differentiæ sunt a
dimensionibus sumptæ.

Vlceris simplicis differentiæ extrinsecus accedentes, & non
à substantia rei, hoc est, à natura ipsius vlceris, acceptæ, 10
sumuntur.

A tempore.

A parte affecta.

A situ, seu loco in parte affecta.

Quæ à gene vlceris differentiæ à tempore. 15

rationis mo-

Vlcus recens.

do, & ratio-

Vlcus inueteratum.

ne sumuntur

differentiæ

Vlceris differentiæ à parte affecta.

magis ad

Similari.

vulnus pti-

Organica. 20

nent, quàm

Vlceris differentiæ à parte similari affecta.

ad vlcus.

Vlcus in cute.

Vlcus in carne.

Vlcus in arteria, 25

Vlcus in vena, &c.

Vlceris differentiæ à parte organica affecta.

Vlcus auris.

Vlcus narium.

Vlcus oculorum. 30

Vlcus oris.

Vlcus faucium.

Vlcus pulmonum &c.

Vlceris differentiæ à situ in parte affecta. 35

Vlcus in conspectu.

Vlcus sub cute conditum, & non apparens.

Vlcus in principio, in fine, vel medio musculi.

Vlcus in supernis partibus.

Vlcus

Generalis diuifio ulcerum. In Lib. III. 341

Vlcus in infernis partibus.
Vlcus secundum longitudinem.
Vlcus secundum latitudinem.
Vlcus secundum transfuerfum.

5 2 *Vlceris compofiti differētia ſumuntur à cōplexu ipſius.*

Cum ſymptōmate.

Cum morbo.

Cum ſua cauſa.

Cum ſua cauſa & morbo.

10 Cum ſua cauſa, morbo, & parte affecta.

Vlceris differentia à complexu cum ſymptōmate.

Vlcus crucians.

Vlcus dolore vacans.

15 Vlcus purum.

Vlcus fordidum.

Vlcus ſanioſum.

Vlcus cruentum.

Vlceris differentia à complexu cum morbo.

20 Vlcus dyſcratum, id eſt, cum intemperie.

Vlcus phlegmonofum.

Vlcus eryſipelatoſum.

Vlcus gangrænoſum.

Vlcus cancroſum.

25 Vlcus putridum.

Vlcus cauum.

Vlcus ſupercreſcens.

Vlcus phagedænicum.

30 *Vlceris complexus cum ſua cauſa.*

Vlcus ſpontaneum.

Vlcus ab animali venenoſo.

Vlcus à ſimiae morſu.

Vlcus ab hominis morſu, &c.

35 *Vlceris complexus cum ſua cauſa, & morbo.*

Vlcus cacoſchymum, id eſt, vitioſo ſucco obſeſſum.

Vlcus cacoētes, id eſt malignum.

Nō ſunt proprie differētia, ſed verius cōplicati affectus.

342 Institut. Chirurgicarum, Lib. III.

Vlcus rheumaticum, id est, fluxione vexatum,

Vlcus arrosum.

Vlcus sinuosum.

Vlcus ab atra bile.

*Vlceris differentia à complexu cum sua causa,
morbo, & parte affecta.*

Erosio.

Caries.

Esthiomenus.

Sphacelus.

Dysenteria.

INSTITVTIO- NVM CHIRVRGI-

5 CARVM IOANNIS

TAGAVTII ME-

DICI,

10 LIBER TERTIVS.

De vlceribus in vniuersum.

15 *Quid sit vlcus vulgò apud chirurgos, & eius
diffinitionis interpretatio.*

CAPVT I.



20 Iximus libro superiore, de cruē-
tis vulneribus, seu de ea cōtinui
solutione, quæ in carnosā parte
ex vulnerando recens facta est,
ac relicta. Nunc trāseundum ad
25 id vnionis etiamnum in carnosā
ac molli substātia factum diuor-
tium, quod nec recens est, nec
cruentum: sed iam inueteratum, & in quo vna, vel
plures consistunt dispositiones, quæ vnionem: vel
consolidationem remorantur, atque impediunt: ex
30 quibus saniosa, & purulenta quædam colluies,
putredoq; excitatur. Vocant autem vulgares me-
dici, & chirurgi tale vnionis diuortium seu contis-
nui solutionem, communiter vlcus. Quanquam
vulnus, & vlcus ferè passim apud probatos auto-
35 res pro re eadem sumantur: nempe pro dissolutione
vnionis in parte carnosā. Quæ siue recens sit, siue
antiqua (quatenus saltem solutio tantum vnitatis
est) eandem sanationem (vt Galenus ait) semper

*vlcus qui
vocetur ch-
rurgis vul-
garibus.*

344 Institut. Chirurgicarum, Lib. III.

Vulneris, seu vlcis finis. desiderat. Cuius vtrique propositus finis vnus est, nempe vnio, vel agglutinatio: vel coctio: vel continuatio: quæ eadem iunt. Itaque discrimen quod à tempore sumitur, nihil planè proprium indicat Galeno. Nam recens (inquit) vetusve vlcus nihil indicat. Quanquam indicare videtur nonnullis: sed hi seipso fallunt. Non abs re tamen factum putauimus, si recentium: ac vulgare medicæ, ac chirurgicæ familiæ scriptorum morem iam ab omnibus receptum sequuti, discrimen inter vulnus (quam & plagam vocant) & vlcus posuerimus.

Vlceris definitio. Vlcus quidem cum ipsis appellantes continui solutionem in substantia carnea & molli, in qua vna vel plures consistunt dispositiones, vnionem seu agglutinationem fieri impediētes, ex quibus sanies, & purulenta quædam colluies, ac putrilago exci-

Vlcus quid Auicenna. tatur. Apud interpretem autem Auicennæ vlcus ita breuiter definitur: Solutio continuitatis in carne, quando iam continet saniem & pus nominatur vlcus. Cæterum in hac vlcis definitione, solutio continuitatis, locum generis obtinet, cuius species libro superiore de vulneribus abundè recensuimus.

Definitionis vlcis examinatio. Reliquæ verò definitionis particule pro differentia appositæ sunt. In substantia quidem carnea, siue in carnosis, & mollibus particulis, ad discrimen corruptionis ossium, quæ propriè vlcus non est: sed caries, & corruptela: quæ terebratio Græcè dicitur. Quæ autem subnectuntur, ad differentiam vulnerum addita sunt. Vulnus enim recens, & cruentum quatenus saltem vulnus est, & quantum nominis ratio indicat solutio est continui simplex, ac per se consistens, hoc est nulli alteri affectui aut præcedenti: aut sequenti coniuncta: qui eius curationem, nempe agglutinationem (quam solum desiderat) remoretur, & impediat. Vlcis verò nomine, communiter in chirurgia eam vnionis, seu continui dissolutionem statim inaudimus, quæ non simplex sit: vt vulnus: sed quæ aliis dispositionibus, eius curationem impedi-

dien

dientibus seorsumq; , ac per se nonnunquam consistere valentibus, complexa semper atque annexa reperiatur: vt in differentiarum enumeratione clarius innotescet. Quò fit: vt vulnus generaliter, si
5 ad vlcus conferatur simplicis: ac minimè compositi affectus rationem obtineat: vlcus verò (quo de *vlcus quo hîc agimus*) compositus semper affectus intelligatur. *à vulnere differat.* Non imus tamen inficias quin & vulnera propriis quibusdam dispositionibus, quæ necessariò illis
10 accidunt complicari possint: vt verbi gratia magnitudini & paruitati, rectitudini & obliquitati, æqualitati & inæqualitati, profunditati & residens
15 tix in summo, & ita de aliis, quæ vulnerum discrimina siue differentias constituunt: generalem tamè
vulnerum quatenus vulnera sunt, curationem parum aut nihil euariant, vt suprà in tractatu de vlc
ribus diximus. Itaque vulnus magnum & paruum *vulneris atque vlcis*
rectum & obliquum æquale & inæquale, in summo *que vlcis proprie diff*
20 residens & in profundo penetrans, longum item & *ferentia.*
breue, recens & inueteratum, veræ ac propriæ sunt
simplicis soliusq; vulneris, & cui nullus alius adiunctus sit affectus, differentia: sicuti etiam & vlc
25 ceris, quod solum consistit: vt in sequenti capite dicemus. Porro in diffinitione vlcis ex Auicenna su
periùs adducta per sanies, & putredinem sordities squammæ, & crustæ (quas Græci escharas vocant)
etiam inaudiuntur: quæ in ipsis vlceribus contin
gere possunt. Itaque Auicennas, & qui eum sequuti sunt, vulnus & plagam vocant: vbi nondum est
30 pus: vlcus verò vbi iam pus adest. In qua sententia fuisse quoq; videtur Cor. Celsus, Latinus ferè Hippocrates, libro quinto suæ medicinæ: vbi recentem,
& cruentam adhuc plagam: vulnus appellat: vlcus verò, cùm iam vetustas occupauit, siue extrin
35 secus quidem per vulnera inciderit, siue intrinsecus corrupta aliqua corporum parte nascatur.
Quid autem sit sanies, quid pus, quid fordes, postea dicetur.

Vlcerū dif-
ferentia vn
de sumatur



Vlcerum differentia sumuntur quibus-
dam à tribus potissimum: nempe à cau-
sis ea excitantibus membris, & acciden-
tibus, seu dispositionibus cum eis com-
plicatis. Alij verò breuitati studētes, eas
à duobus dūtaxat desumūt, vtpotē à causis, & sym-
ptomatis, atq; etiā affectibus ipsis, quibus cōplicas-
tur: ea quidē: quę à mēbris siue laborantibus particu-
lis sumuntur discrimina omnino praterētes: quip-
pe quę ad particularē, non autē ad vniuersalē de vl-
ceribus tractationē pertineant. Adde quod & in tra-
ctatu de fistula, id est, sinu, qui occalluit, de iis obiter
agetur. Dicemus tamē hic & de iis nonnihil. Differē-
tia, quę à causis sumuntur saltem cōmuniores, &
magis proprię, hęc cōmuniter solēt à chirurgis assig-
nari: vlcus virulentū, & corrosiuum, siue comedēs
vlcus sordidum, rhy paron Græci vocant: & putris
dū, siue putrefactū, quod Græci serpedona appellāt
vlcus cauernosum, & profundū vlcus fistulosum,
vlcus cācerosum. Differentia autē, quę ab acciden-
tibus, siue symptomatis, & affectibus, quibus ipsa
vlcera cōplicantur, ferē communes, atq; æquiuocę
sunt, & ipsis vulneribus. Primo tamē, & magis pro-
priē (vt recētibus placet chirurgis) de vlceribus, quā
de vulneribus dicūtur. Hęc autē sunt: vlcus cū intē-
perie, quod Græcē discratum vocant: vlcus cruciās
siue dolorosum: vlcus cū tumore aliquo prater na-
turam, quod apostematosum nominant: vlcus cons-
tusum, vlcus super crescens, cū carne molli, & su-
perflua, *ὕπερσπερ* Græci appellant, Auicennæ inters-
pres carnē additam super vulnera: vlcus durū simul
& tenebrosū: vlcus cācerosum, & gangrænosum,
vlcus cauū, vlcus cariosum, id est, cū ossē corrupto:
vlcus cū varicibus, vlcus cacoēthes, id est, malignū,
& egrē sanabile, atq; id genus alia. Cæterum multæ

Vlcerū dif-
ferentia à
causis.

Differentia
vulcerum ab
affectibus
quibus com-
plicantur.

ex suprà commemoratis differentiis, veræ vlcerum
 differentiæ non censentur Galeno, sed aliorum affectus *Affectus cum*
 ctuum cum vlcere complexionibus, cuiusmodi sunt vl *vlcere com-*
 cus cancerosum, gangranosum, supercrescens, pu *plicati.*
 5 trefactum, cauum, & cum tumore aliquo, vt vlcus
 phlegmonodes, erysipelatodes. Putredo nanque,
 gangrena, phlegmone, erysipelas, cancer, & reliqua
 id genus, ex morborum sunt genere: nempe affectus
 præter naturam, actionem vitiantes, qui seorsum ac
 10 per se consistere possunt. Quod enim consistere seor
 sum, & per se potest, id nullius vnquam (inquit Ga
 lenus) alterius fuerit differentia. Eito igitur hoc tibi
 veluti præceptio, ac regula, qua discernere liceat,
 differentiæ alicuius affectus aliquid sit, an alterius
 15 affectus complexum. Sed & alio rursus modo vlcus *vlceris com*
 crucians siue dolorosum, & vlcus sordidum, ceu *plexus cum*
 quædam vlceris differentiæ dicuntur, cum tamen ve *symptoma-*
 ræ aut propriæ differentiæ non sint, sed complexus *te.*
 potius symptomatis cum vlcere. Dolor nanque &
 20 sordes ex symptomatum sunt genere. Pari modo *vlceris com*
 & cum dicitur cacochymon vlcus, id est, vitioso suc *plexus cum*
 co obsessum, aut fluxione vexatum, quod rheuma *sua causa*
 ticum Græcè Galeno dicitur, aut arrosum, id est, *& morbo.*
 quod exeditur, causa cum affectu copulatur. Talia
 25 igitur multa pro differentiis vlcerum chirurgis &
 medicis vulgariis vsurpantur, quæ reuerà differen
 tiæ non sunt, saltè apud Galenum, sed alterius dis
 positionis complicationes seu affectus compositi.
 Simplicis igitur soliusq; vlceris differentiæ veræ ac *Veræ ac p-*
 30 propriæ, ab ipsa vlceris natura sumuntur. Vlcus au *priæ vlc-*
 tem simplex hîc cum Galeno appellamus, quod so *differenti-*
 lum consistit, id est, cui nec vllus affectus alius, nec *rude sum*
 symptoma vllum coniungitur. Simplex igitur non *tur.*
 35 erit, si quæ exulcerata est particula, vel fluxione vex
 xetur, vel malo succo vitiosa sit, vel omninò extra
 naturalem temperiè fuerit, vel vlla cautitas adiit, vel
 si aliqua cutis amissio contigerit. Itaq; differentiæ,
 quæ ab ipsa vlceris natura sumuntur, vel maxime
 propr

348 Institut. Chirurgicarum, Lib. III.

propriae sunt, & à substantia rei acceptæ, vel extrin-
secus accedentes. A substantia rei capiuntur, quæ
à figura, & à diuisionis magnitudine seu quantita-
te, ac dimensione, siue spatio ducuntur. A figura, vt
vlcus rectum, vlcus obliquum, vlcus circulare siue
rotundum, vlcus retortum, vlcus vncum. A diuisi-
onis magnitudine, siue quantitate, vt vlcus ma-
gnum, vlcus paruum. Ex dimensioibus siue spatiis,
vt vlcus longum, vlcus breue, vlcus latum, vlcus
angustum, vlcus sublime, siue superficiale, id est, in
summo residens: vlcus profundum, vlcus æquale, vl-
cus inæquale. Extrinsecus verò accedentes vlcerū
differentiæ sumuntur à tempore, & à generationis
ratione: item ex eo quod totum vlcus, parsve vlce-
ris conspectum fugit, vel conspiciendum se præbet, is
hoc est, à situ in parte affecta. A tempore quidem,
vt vlcus recens, vlcus inueteratum. Ex generationis
ratione, vt vlcus incisum, vlcus diruptum, vlcus
partim incisum, partim diruptum. A situ in parte
affecta, vt vlcus in conspectu siue euidenter apparēs,
vlcus intus conditum, siue non apparens, idq; in to-
to, vel in parte: item vlcus in principio musculi, vl-
cus in fine musculi, vlcus in medio musculi.
Cæterum quæ ex loco affecto sumuntur vlcerum
differentiæ (si tamen differentiæ censendæ sunt) non
vtique, vt Galenus inquit, à propria ipsorum natu-
ra, vt præcedentes, desumuntur. Loci autem in quib-
us consistunt, vlcera sunt partes similes, & orga-
nica. Igitur si à locis in quibus est vlcus, differentiæ
censeas, hoc modo fiet diuisio vlceris à loco affecto:
vlcus in parte similari, vlcus in parte organica, siue
instrumentaria. Rursus vlceris differentiæ à parte
similari affecta, hoc pacto diuides: vlcus in vena, vl-
cus in arteria, vlcus in cute, vlcus in musculo. Cense-
tur enim musculus, & pars similis, saltem ad sen-
sus. Differentiæ verò à parte organica affecta eius-
modi sunt, vlcus auris, vlcus in faucibus, vlcus in
aspera arteria, vlcus pulmonis, vlcus pectoris, vlcus
in pen

in pene, vlcus in sede, & sic discurrendo per singulas corporis partes, quas instrumētarias vocamus. Atq; hæc completa, & absoluta est simplicis soliusq; vlcis, & cui nullus alius adiunctus sit affectus, in suas differētias diuisio, quæ à propria ipsius natura sumitur. Quòd si affectus aliquis, seu dispositio, quæ seorsum (vt diximus) & per se consistere possit, vt phlegmone, gangræna, putredo, vlceri adiungatur, ab eo (vt suprà diximus) sumi non possunt vlcis differētiæ, saltem verè & propriè dictæ. Verumenimverò quoniam ab ipso etiam Galeno locis sexcentis dictū est, non oportere de nominibus cōtendere, si quis putrescens vlcus, & quod exeditur, & quod gāgrænā, & quod erysipelate affligitur, & cancerosum, & sinuosum, & cariosum, & cacoēthes, & dolens, & indolens, atque id genus alia, vlcum differentias nominauerit, non erit cum eo contendendum, modò res etiam illis curationem adhibeat. Vocabunturq; vlcum differentia, sumptæ ab eo cum quo complicantur. Nempe differentia à complexu cum morbo, differentia à complexu, cum symptōmate, differentia à complexu cum sua causa, & si quæ sint aliæ.

*Non esse de
nominibus
cōtendendū.*

De causis Vlcum.

C A P. 111.

Vlcum causas in vniuersum geminas tantum chirurgorum posteritas statuit, nēpē antecedentes seu præcedentes, quæ Græcis προηγούμενα dicuntur; & continētes siue coniunctas, quæ συνεχόμενα græcè appellantur. Procatarticas nanque, hoc est prægressas & euidentes seu primitiuas illis minimè tribuūt. Quippè quæ dum carnem incidunt, dirumpūt, aut laniant, aut quouis alio modo continui solutionem in ea efficiunt, nequaquam primo statim occursum aut pus, aut sorditiem (quæ necessariò vlcera commitari arbitrantur) creare, aut excitare possunt. Quæ quàm consequio quodam id præstare valeant, nēpē corporeas, atq; antecedentes causas commouendo.

Itaque

350 Institut. Chirurgicarum, Lib. III.

*Vlcerū cau-
sa antecede-
tes.* Itaque vlcerum antecedentes causæ sunt, cacochy-
mia, id est, succorum vitium, cum scilicet sola qualis
tate peccant humores, non etiam quantitate, atque
eorundem prauorum succorum, siue humorum in
corpore existentium nimis exuperās copia, qui cor-
poris ipsius particulas arrodere, & tandem corrup-
pere possint. Porro eiusmodi succorum prauitas,
aut ex deprauata victus ratione generatur, aut to-
tius corporis, vel alicuius notæ membri, vt hepatis,
aut lienis, vitio contingit, vti plerisque locis Gale- 10

*CAVSÆ
vlcerum co-
tinentes.* nus nobis testatum reliquit. Causæ verò continen-
tes, siue coniunctæ vlcerum dicuntur intemperies il-
læ, quas malitias complexionum vocant, in vulne-
ratis particulas ex causis *προνουμίναις* siue anteces-
dentibus modò dictis, vel etiam ex ipsis vulneribus, 15
aut abscessibus, aliisve præter naturam tumoribus
(sed malignis præsertim) ruptis & apertis, excita-
tæ. Quemadmodum enim ex herpete, tum miliari,
qui Græcis cenchrias dicitur: tum etiam esthiome-
no, id est, exedente, qui ex bile fit crassiore, & acrior- 20
re, vlcus corrosiuum, siue erodens, generatur: ita ex
anthrace, seu carbunculo præsertim venenoso (quod
vlcus est escharosum) rhyparum, id est, sordidum, &

*Tres modi
egre sanabi-
liū vlcerū.* ex abscessibus profundum, & concauum, siue cauer-
nosum procreatur. Itaque tres hi ægrè sanabilium, 25
rebelliumq; vlcerum modi videntur.

- 1 Primus, qui ex intemperie subiectæ carnis pro-
- 2 uenit. Secundus, qui ex vitio confluentis fit san-
- 3 guinis. Et tertius, qui ex mensura, seu copia, vel
quantitate confluentis nascitur, vt libro quarto me- 30
thodi medendi Gal. annotauit. Qui & aliter ibidem
diuisionem posse fieri tradit: nempe ægrè sanabiliū,
rebelliumq; vlcerum, alia propter vlceratæ carnis
intemperiem, alia ob confluentem humorem, talia 35
fieri. Tum intemperiem rursus ipsam bifariam di-
duci, cum aliàs in qualitate sola naturæ modum
egressa, subdita caro sit, aliàs etiam cum accessorio
quopiam tumore, iam ipsum confluxum bipartitò
etiam

etiam scindi: nempe in confluentis succi, tum qualis
tatem, tum quantitatem. Quatuor igitur erunt in
vniuersum contumacium, & ægrè sanabilium vlces
rum modi: nempe sola subiectæ carnis intemperies,
5 quam & dyscrasiam vocant: intemperies cum acces
sorio tumore, humor influens, aut vitiosus, aut mul
tus. Humor nanque qui copiosior in partem vlcere
laborantem influit (tamen si vitiosus non sit) sanatio
nem vlceris (quòd in eo excrementa creet) moratur,
10 atq; in lōgum tempus protrahit. Cæterum quantum
modum adieciſſe videtur Gale. in cōmentario huius
aphorismi Hippocratis: Vlcera quæcunque annua *Hippocr.*
sunt, &c. nempe passionem ossis corrupti in loco vl
cerato. Vbi enim caro, quæ ossi superiacet patienti,
15 adhibitis (vt oportebat) idoneis medicamentis exic
cata, contraxerit cicatricē, statim quidem integra san
nitas restituta videtur. Rursus verò paulatim alis
qua influente sanie ex osse corrupto, in parte penitior
re iterum aduenit inflammatio, & puris generatio
20 consequitur, à quo cicatrix eroditur, caro verò exul
ceratur. Subdit autem Galenus loco nuper ex quar
to libro Therapeutices methodi citato, interim dis
cutorum affectuū siue dispositionum, aut aliquos, aut
etiā pariter omnes misceri, atq; ita multas, ac diuers
25 sas vlcerum differentias iam suprà commemoratas
enasci. Porro tradenda est medendi methodus, nō os
mnium simul, sed cuiusque seorsum, quod in sequen
tibus faciemus, à simplicioribus quidem exordiū su
mentes, vt eorum curatione tradita, compositorum
30 sanationis methodus facilius, ac melius intelligatur.
Cæterum quoniam passim cum de vlceribus tracta
mus, voces hæ, sanies, pus, virus, sordes, & id genus
alia, nobis occurrūt, non abs re factum putabimus,
si hoc loco quid apud chirurgos, & medicos signific
35 cent, quoq; inter se conueniant, & dissideant, paucis
aperiamus. Sanies propriè Latinis is tenuis humor *sanies quid*
est, qui Græcis *ix. α* dicitur, qualis exit ex vulnere
nec recēti, nec iam sanescēte, sed inter vtrunq; tēpus.
Quibusd

Quibusdam ichor sanguinis sanies interpretatur.

Saniei spēs Saniei duæ sunt species apud Celsum, Græcis di-
duæ Celfo. stinctæ nominibus, quarum vna $\iota\chi\omega\rho$, altera $\mu\epsilon\lambda\iota\kappa\epsilon\rho\rho\iota\alpha$
In aliqui- nominatur. Ichor tenuis, subalbidus ex malo vlcere
bus exēpla- exit, maximeq; vbi neruo læso inflammatio secuta
ribus non i- est. Meliceria crassior, & glutinosior, subalbida,
xωρ, legi- melliq; albo subsimilis fertur. Hæc quoque ex malis
ur, sed v- vlceribus, vbi nerui circa articulos læsi sunt, & inter
spat. hæc loca maximè ex genibus profluit. Apud recens
Meliceria. tiores autem, & plebeios istos medicos, ac chirurgos
Sanies vul- (quibus nusquam ferè vilius vocis proprietas, &
go, pro pure quæ rei naturæ conueniens sit, seruatur) sanies com-
male vsur- muniter pro eo quod Latini appositè pus vocant,
patur. vsurpatur. Genus tamen interdum saniem etiam faci-
 unt, ad sordem, virus, seu virulentiam, & purulen-
 tam colluuiem, quam Græci $\pi\upsilon\varsigma$, Romani pus vo-
 cant. Nomine enim saniei, latius sumpto vocabulo,
 omnem humiditatem præter naturam alteratam in-
 telligunt. Itaq; si tenuis sit humor, qui exit ab vl-
 cere, virus, seu virulentia: si crassior, sordes: si verò
 mediocris, generis appellatione, illis sanies nuncupa-
 tur. Et hæc quidem in vlceribus (vt aiunt) copiosa,
 in cauis vulneribus pauca, reperitur. Est igitur sa-
 nies propriè vulgaribus medicis, & chirurgis, idem
 quod pus Latinis, & $\pi\upsilon\varsigma$ Græcis: Celso verò genus
 est, duas sub se (vt modò diximus) species continens,
 Græcis distinctas nominibus, quarum vna $\iota\chi\omega\rho$, alte-
 ra $\mu\epsilon\lambda\iota\kappa\epsilon\rho\rho\iota\alpha$ dicitur. At Latinis Galeni interpretibus,
 vbi passim Græcè $\iota\chi\omega\rho$ scribitur, sanies vertitur. Cæ-
 terum, quod $\pi\upsilon\varsigma$ Græcis, & Latinis pus propriè no-
 minatur, ex sanguine, vel carne contusa ortum ha-
 bet. In eius autem generatione, seminalia quædam,
 vt quisquam dixerit, fit transmutatio, siue alteratio.
 Etenim cum tres in animalium corpore fiant alteratio-
 nes, vt libro quinto simpliciū Galenus docuit, vnà
 planè secundum naturam est, cum videlicet cibus in
 ventre coquitur, aut in visceribus, & vasis, qui inibi
 generatur succus, vnde rursum pars vnaqueque nus-
 tria

triatur. Altera contrā planē præter naturam, nempe in putrescentibus omnibus. Atque hæc quodāmodō inuicem sibi contrariæ sunt. Tertia ex vtraque mista & media est, partim secundum naturā existens, pars
 5 tim præter naturam.

Itaque trāsmutatio, seu alteratio, quæ pus generat, medium inter optimam (quæ nutritio est partiū animalis) & simpliciter malam (quæ cum putrefactione fit olida) locum obtinet. Neque enim à solo
 10 calore præter naturam, neque à solo calore ingenito, & secundum naturam, planē vincente, fit suppuratio, seu puris generatio: sed mixtus quodāmodō ex vtriusque est calor inflammationis, quæ dum ad suppurationem cōnectitur, dolores, extenta simul, ac cales
 15 facta præter naturam inflāmata particula; & febres principio, id est, corde concalescēdo, excitantur. Atq; hæc duo quidē cōtingunt ex quadā veluti ebullitione, atque exustione sanguinis, qui vbi ex toto exustus fuerit, residuum eius fit pus, quemadmodū ex
 20 lignorum exustione cinis, vt Gale. testatum reliquit in cōmentario huius aphorismi Hippocr. Dum pus conficitur, &c. Ex iis igitur manifestū euadit, quid sit pus, quomodo generetur, quæ sit eius causa efficiens, & materia. Nunc quid sit virus, seu virulētia,
 25 & sordes, apud chirurgos, paucis aperiāmus. *Virus* *Virus.* ergo illis, seu virulentia est superfluitas subtilis, ex abūddātia humorū aquosorū generata. Quæ (inquit Guido) duplex est, calida, & frigida, serosa, & rubicunda. *Sordes.* Sordes autem eidem, est superfluitas quædam
 30 crassior, ex humoribus crassiorem substantiam habentibus procreata, quæ quidē est triplex: quædam enim (inquit) est spissa, inæqualis coagulata, & alba: quædam verō nigra, & alia velut fex, cinericea.
 35 Porro quod illi virus appellant, Gale. Græcè *ixōpe*, *Sanies siue virus quid.* Latinis sanies dicitur. Est autem sanies, siue virus (vt verbo vno dicatur) tenuius illud excremētum in vlc
 ceribus, quod ea humida reddit: sicuti sordes crassum, quod vlcus rhyparon, id est, sordidum efficit.

354 Institut. Chirurgicarum, Lib. III.

Lib. 3. met. Quemadmodum enim (vt Gale. inquit) omnē qualitatis alimentī mutationem, alterum craſſius, alterū tenuius excrementum ſequitur, ita & in vlceribus, præſertim cauiſ, duplex excrementū prouenire ſolet nempe tenuius, quod Latine ſanies, Græcè *ixwp* appellatur, & craſſius, quod ſordes dicitur. Ac ex tenui quidem excremento vlcus humidū redditur, ex craſſo ſordidū. Quò fit, vt vlcus ipſum duplicibus egeat medicamentis, vtiq; vt humidū eſt, ſiccantibus: vt ſordidum, iis quæ expurgant. Sed hæc alterius ſunt contemplationis. Cæterum mediam quodammodò ſubſtantiam fortitur pus, inter tenuē, & craſſam, ſi ſaltē laudabile atq; optimū eſt. Optimū autē eſt (vt ſcribit Hippoc.) ſi album, leue, æquale, ac quā minime fœtidū ſit. At illud malū eſt Celſo, quod multū tenue, dilutumq; apparet, magisq; ſi ab initio tale eſt: itemq; ſi colore ſero ſimile, ſi pallidum, ſi liuidum, ſi ſeculentum eſt. Præter hæc, ſi malè olet. Porro genus quoddam puris eſt apud eundem Cornelium Celſum, Græca dictione *λαιωδες* appellatum, quod in magnis (inquit) vlceribus ſaneſcentibus apparet, tenue ſubalbidum, quaſi vnctū, colore, atque pinguitudine oleo albo non diſſimile. Sanies autem mala eſt, multa, nimis tenuis, liuida, aut pallida, aut nigra, aut glutinoſa, aut mali odoris, aut quæ & ipſum vlcus, & iunctā ei cutem erodit. Melior nō multa, modicè craſſa, ſubrubicunda, aut ſubalbida. Itaq; ſpes ſanationis in hiſ vlceribus maior eſt, ex quibus melioris generis quæq; prædictorum proueniunt. Sicuti & eius vulneris expedita magis curatio eſt, ex quo ſanguis bonus fluxit. Eam ob rem, bonitatis atq; malitiæ notæ, in horum ſingulis diligenter à chirurgo perpendendæ ſunt, vt & deprehendere, & pronuntiare poſſit, quæ vlcera inſanabilia ſint, quæ facilem, aut difficilem curationem habeant. Quæ res non parui ſanè eſt momenti, vt chirurgus ipſe, & ſe aliis admirabilem præſtet, & calumniam deuitet. Atque hæc de pure, & ſanie, ac ſorde dicta ſufficiant

ciant. Nunc autem dicendorum ordo postulat, vt vlcera signa, ac etiam iudicia subiiciamus.

Nota sine signa, quibus vlcera differentia dignoscuntur, ex eorum definitionibus petita. CAP. IIII.



Vlcus cuiusque suæ sunt propriæ notæ, quibus vnū ab altero distinguitur. Hæ autem ex singulorum definitionibus petendæ sunt. Quocirca præcipuarum supra memoratarum differentiarum breuissimas definitiones hîc obiter recensere operæpretium esse duximus. Quod dum facimus, non tã verba, quàm rem ipsam lectori spectare volumus. Maluimus enim cõmunibus, & ab omnibus chirurgiæ professoribus iamdudum receptis vt definitionibus licet aliquadò rudibus, plebeis, & non ita elegantibus, quàm rei per se satis obscuræ, verborum lenociniis, & tersiore stilo tenebras offundere: crassam tamen illam, & supinam barbariem, quantum nobis licuit, vbique deuitauimus. Ergo vt semel dicamus, vlcus virulentum est, in quo virus, hoc est, tenuius quoddam, ac liquidum excrementum, quod sanie proprie Latinis appellari diximus, citra erosionem abundat. Alio nomine saniosum dicitur. Vlcus, quod sua malignitate siue malitia, parti quã iam occupauit, erodendo, atque interdum escharam (quam acris mordaxque succus ad ipsum confluens excitat) gignendo, maius atque amplius indies efficitur, corrosiuum, siue arrodens nominatur. Quod si eius malitia adeo crescat, vt non modò vlceras atque corruptas carnes, sed etiam sanas absumat, depopuleturque, vlcus iam depascens appellabitur. Græci omnes medici vniuersim hunc affectum, Galeno etiam teste, nominant, propterea quod pergere pascendo id vitium ab ægris particulis ad eas, quæ integræ sint, soleat, atque harum semper

Vlcus virulentum.

Vlcus corrosiuum, siue arrodens.

Vlcus depascens.

Nomen.

- Phagedæna.* aliquid ægris adicere. Cuius species est phagedæna, ambulatorium vlcus appellât, quod huc, atque illuc serpendo, curim, ac subiectam carnem, sed extimam tantum ac superficialē, depascitur, ac rodit. Nunquā enim eiusmodi vlcus in penitiora penetrat: quò fit, vt vlcus in summo residens, minimè autem profundum, dici meritò debeat. Vlcus sordidum est Galeno quod crassiore illo, ac viscoso scatet recremento, quod sordem appellauimus, Græci rhy paron vocât. Recentiores verò aliter definiunt, nempe quod crustas aliquas habet crassas, seu (vt loquuntur) grossas aut carnem aliquam mollem, crassam, & superfluā. 10
- Lanfrancus sic diffinit.* Vlcus putre siue putridū dicitur, ex quo vapor alius quis graueolens, seu (vt aiunt) fumus quidam foetidus, & cadauerosus expirat, atque attollitur, per se milis illi qui à putrescentibus ac corruptis iam carnis 15
- Vlcus putridum.* nibus effertur: habetq; semper annexam sibi sorditiam, atque extraneam caliditatem cum humiditate superflua, & plerunque febrem. Hoc à sordido differre volunt solā malitiæ, ac fraudulentia intentione. 20
- Vlcus cuniculosum.* ne. Cauernosum vlcus appellant, cuius orificiū strictum est, atque angustum: profunditas verò latior, & sensum effugiens, siue occulta, multosq; anfractus habet, & cuniculos, siue vias hinc inde discurrentes, citra tamen callositatem & duritiem. Sunt qui & appposito nomine cuniculosum ipsum appellant. 2
- Vlcus fistulosum.* Fistulosum vlcus à nuper descripto cuniculoso seu cauernoso vlcere non differt, nisi quòd meatus illos anfractuosos & sinuosos, callosos habet, & duros. 3
- Vlcus cancrosum.* Vlcus cancerosum, est visu horrendum, foetidū, labra habens dura, crassa, tumida, atque inuersa: colore inter rubrum, & nigrum medio, vtpotè fusco, aut liuido: adhæc circa locum vlceratum venæ quædam liuidæ apparent, exaltatæ, & turgidæ, crasso, & nigriore sanguine plenæ. Vlcus dyscraton, siue vt vulgò dicunt, dyscrasiatum, est in quo quædam duo
- Vlcus dyscrasiatum.* κράσια, id est, intemperies, seu mala quædam qualitas præter naturam dominatur, vt caliditas immoderata, ta,

- ta, vel frigiditas, aut humiditas, vel siccitas, aut plus
res ex illis simul. Nominatur autem propriè nobis
vltus cum intemperie. Vltus crucians siue dolorosus
appellatur, quod laboratētem atrociter molestat, *Vltus cru-*
seu (vt ait Guido à Cauliaco) in quo sensibilitas rei *ciens.*
contrariæ reperitur, Græcè *ἰλκῶ δυνάμει* dici potest. *ἰλκῶ δυνά-*
Vltus rheumaticum Galeno dicitur, quod aliundè *μει.*
fluentes humores verant sanescere. Verminosum *Vltus rheu-*
vltus appellatur, quod vermibus scatet, scolecòdes *maticum.*
à Græcis dicitur: horum autem vermium opifex est *Vltus ver-*
putredo. Vlcera cacoëthe Galeno, & Græcis omni- *minosum.*
bus medicis dicuntur, quæ omnibus ritè decenterq; *Vltus cacoë-*
factis, sanari tamen nō possunt, quòd scilicet in par- *thes.*
ticula laborante siue vlcerata, malignitas quædam
adfit cæca, & nobis occulta, ea sanari prohibēs. Nos
eiusmodi vlcera, maligna, contumacia, rebellianæ,
atque ægrè sanabilia dicimus. Varicosum vltus no- *Varicosum*
minatur, quandò in partibus eo superioribus venæ *vltus.*
quædam eminentes, ac turgidæ, crasso sanguine, aut
vitioso aliquo succo oppletæ apparent (varices vo-
cant) quæ ipsi vlceri fluxionē suppeditant, atque ita
sanescere ipsum verant. Apostematofum vltus num- *Vltus aposte-*
cupant, in quo tumor aliquis præter naturam est, ab *matofum.*
humore quopiam procreatus, vt phlegmone, aut
erysipelas. Cætera satis ex præcedētibz innoscūt.

Vlcerum prognostica siue iudicia.

C A P. V.



- Vlcera (inquit Hippocrates) quæcūque *Aph. 45. li. 6*
annua sunt, aut etiam diuturniora, os *Vlcera an-*
abscedere est necessarium, & cicatri- *nua & diu-*
ces cauas fieri. Quæcūque vlcera (vt *turna.*
Galenus ait in commentario huius
aphorismi) longo tempore manent,
vel cicatrice nullo modo adueniente, vel si facta sit,
rursus resoluta (nihil videlicet medicis in curatione
delinquentibus) cacoëthiam, hoc est, malignitatem
quandam ostendunt, difficulterq; ad sanitatem per-

358 Institut. Chirurgicarum, Lib. III.

ducuntur. Id autem accidit, vel propter influxum vis
 riosorum humorum, vel propter dispositionem in
 membro ex humoribus in id confluentibus, proces-
 su temporis contractam, vel ob aliquem vitiatum ac
 corruptum inibi ossis affectum. Vlcus omne (vt scri-
 bit Auicennas) quod, posteaquam carne impletum
 est, & cicatrix illi inducit debet, subito renouatur,
 periculum est, ne in fistulam degeneret. Eidem mala
 vlcera iudicantur dura, & quæ ad virorem aut nigri-
 tiem vergunt. Eiusmodi enim color natiui particu-
 læ vlcera caloris extinctione insinuat. Vlcera (vt
 idem Arabs ait) frigida, albedine & mollitie digno-
 scuntur, & præsertim si calidis iuuentur. Calida
 verò ad ruborẽ declinant, & frigidis gaudent, sed &
 tactu etiam discernuntur. Itaque horum vtraque agnos-
 ces, partim colore, partim tactu, partim (vt Galen.
 inquit) laborantis sensu. Quippe alias vitionem sens-
 tire se fatentur, alias manifestum frigus, in particula
 gaudent, vel frigidis medicamentis, vel calidis, &
 aliis quidem rubor levis insidet, aliis color magis al-
 bicat. Siccis quoque atque humidis vlcerebus suæ
 sunt propriæ notæ, quæ tactu maximè deprehendun-
 tur. Hic nanque sensus sicca atque humida, & quæ
 eas qualitates consequuntur, duritiem scilicet &
 mollitiem, asperitatem & lenitatem, experitur. Ad-
 hæc si maligna vlcera totius corporis colorẽ repræ-
 sentent, vt verbi causa, candidum, purpureũ, aut fus-
 scum, vel citrinum, vitium aliquod effatu dignum
 hepatis, atque insignẽ sanguini, ab ipso iocinore pro-
 creato, corruptelam inesse significatur.

Aliud. Vlcera, quæ aliis morbis succedunt, ægrè
 sanabilia sunt.

Aliud. Vlcera circumglabra praua sunt, hoc est,
 cum videris pilos à circumiacentibus vlcere locis des-
 fluere, vel cutem squammulas è summa parte dimit-
 tere, scito, ac iudicato tale vlcus prauum esse. Pra-
 uos nanque humores, seu malignos succos ad par-
 tem vlcera tam tunc confluere simile veri est, qui
 vehem

Fen. 4. ca. 1.
 Vlcus se re-
 nouans.

Vlcera dura
 viridia, aut
 nigra.

Vlcera frigi-
 da.

Calida vlc-
 ra.

Li. 4. the.

Vlcera to-
 tius corporis
 colorẽ repræ-
 sentantia.

Aph. 4. li. 6.
 Vlcera circum-
 glabra.

vehementer vlcus erodunt. Itaq; eiusmodi maligni succi, neq; radículas pilorum omnes abolere queunt, neq; exulceratum locum ad cicatricem perducere, ac solidescere patiuntur. Cùm autem pili qui prius desciderant, in his quæ circiter vlcus sunt sedibus renascuntur, bono indicio esse solent.

Aliud. Vlcus (vt primo libro prædictionum scribit Hippocrat.) siue antè extitit, siue in ipso morbo natum est diligenter obseruari debet. Nam si moriturus æger est, aridum & liuens, aut pallidum ante mortem apparet. *Vlcus ante morbum, vel in ipso morbo nascens.*

Aliud. Vlcera, in quibus post longam sanietem, seu virulentiam emissionem pus laudabile apparere incipit, bonum nobis portendunt. Siquidem & naturæ robur, & materia obediens notatur. Quæ autem sint puris optimi ac laudabilis notæ, in præcedentibus dictum est.

Aliud. Vlcera, quæ in extremitatibus musculorum dorsi, vel tiliarum, aut brachiorum sunt periculo non vacant Apicennæ. Valde etiam periculosa eadem censentur: quæ interna membra occupant, aut ad ea usque perueniunt. *Vlcera in quibus partibus periculum.*

Aliud. Quibus vlcerebus ante absolutam detersionem sarcinica, id est, carnem producentia medica menta administrantur mala, ac superflua caro in illis generatur. Quæcunque verò probe & opportunè expurgata semper ad ficius promouentur, his caro (inquit Hippocrates) magna ex parte non supercrefcit, nisi si contusa sunt. *Vide Hipp. apud Gale. lib. 4. liber.*

Aliud. Vlcera in orbem circumducta, hoc est, rotunda pessima (vt de vulneribus dictum est) esse solent, ac tardè magnoq; negotio ad cicatricem perducuntur. Proinde pueros subinde in perniciem trahunt. Itaque in eis consilium chirurgorum est, vt cauterio figura illa orbicularis aboleatur, & lineæ modo (quantum saltem fieri poterit) in rectum deducantur. *Vlcera rotunda.*

Aliud. Artuum siue extremarum partium vlcera: vt Artuum pedum, aut manuum sæpenumero phlegmonas, aut cera.

alios eiusmodi præter naturam tumores in adenosie partibus, seu glandulis (quas Græci adenas vocant) accerfunt: atq; excitant præsertim verò ubi corpus plethora laborat. Hæ enim partes, quoniã imbecillæ sunt, & raræ faciliè tentantur fluxionibus. Sic igitur fit, vt & propter vlcus, quod in manus, aut pedis digito sit, eiusmodi glandulæ in inguinibus, & aliis, tum intumescant tum phlegmone occupentur cum defluentem ad vltimos artus sanguinem, aut alios quosuis humores, priores acceperint, & excoptos, ob eam quam habent laxitatem, & raritatem retinuerint. Quinetiam in collo, & secus aures sæpenumero glandulæ his quibus in collo, capite: vel aliqua vicinâ parte vlcus est natum intumescunt. Nominant autem (inquit Galenus) ipsos adenas, cum sic intumuerint bubones.

*Colli & capitis
ulcera.*

*Bubones.
Si auxilia
profuerint,
aut nocuerint.*

*Si vlcus ar
rodatur.*

Nota.

Aliud. Cum medicamēta vlceribus adhibita cōferunt, aut saltē nihil nocent, argumentū est ea ritè ac decenter administrata esse. Cum verò noxæ aliquid adferunt, & vlcus humidius reddunt aut siccius, calidius aut frigidius indicium est, ea non esse præsentis morbo idonea. Eruntq; magis desiccantia, aut humectantia, calidiora aut frigidiora, prout res posuit, deinceps admoenda. Quod si ex admotis vlcus etiã mollius redditur, adstrictoria statim erūt adiicienda. Cæterum si vlcus eroditur, & profundius efficitur, sedulo aduertendū est, num id ex acriū succorum vitio, & vlcis malignitate accidat, an ex facultate medicamentorum (quæ admoventur) plusquam oportet detergentium. Hæc enim vlcera tam particulā arrodendo, multam sanie procreant, & vlcus humidius reddūt. Quo fit, vt imperitos chirurgos atque improvidos sæpenumero falli contingat, qui dum putāt vlcis cacoethia, id est, malignitate, eiusmodi saniosam colluuiem, seu (vt ipsi loquuntur) virulentiam, atque superfluam humiditatem provenire: quæ adhuc efficacius detergūt, properant admoovere, atque ita profundius, & magis cauum

caum vlcus, imo verò & calidius, ac etiam interdū
 phlegmonòdes efficiunt. Hinc erosionis, ac mordica
 tionis sensum laborantes persentiscunt. Sed hæc nō
 minus ad curandi rationem pertinere videntur, quā
 5 ad signa prognostica, de quibus nunc agimus. Por
 rō inter cætera quæ magis officiunt vlceribus, ven
 tus est (vt Guido à Cauliaco annotauit) meridiona
 lis, arque aëris ambientis humiditas caliditati adiun
 cta. Hæc enim vlceribus putredinem inuehunt: si
 10 quidem quæ putrefiunt omnia, ex calido & humido
 sic afficiuntur. Hinc fit (inquit) vt tibiarum vlcera
 Auinione ægrius ac difficilius multo curentur, quā
 Parisiis. Contra verò accidit in capitis vulneribus.
 Cæterum quemadmodum plurima vulnerum iudic
 15 cia vlceribus etiam communia sunt, ita & vlcerum
 de quibus modò differimus, iudicia permulta vulne
 ribus adaptari possunt. Quocirca quæ in iudiciis
 vulnerum dicta sunt, vlceribus conuenientia, huc
 reuocanda erunt.

*Ventus me
 ridionalis
 officit vlc
 eribus.*

20 *De curatione Vlcerum in vniuersum. CAP. VI.*

IN curatione vlcerum duo nobis spectā
 da proponuntur, nempe ipsius vlceris, *Duo spectā
 da in cura
 tione vlc
 erum.*
 25 qua vlcus est contemplatio, & vlceris
 cum sua causa, aut symptōmate aliquo
 aut alia quauis dispositione complicati,
 aut etiam hanc vel illam particulam occupantis cō
 sideratio. Omne enim vlcus (vt suprà diximus) aut
 solum est, ipsumq; per se (hoc est, nullo alio affe
 30 ctu, vel cum eo simul inuadente, vel ipsum præces
 dente, aut sequente) aut cū alio quopiam vno, mul
 tisve consistit. Quorum alij non modò statim ab ini
 tio vlcus excitantur: sed etiam nunc maius efficiūt,
 alij eius sine quo non: vt ad curandi opus, rationem
 35 obtinēt. Cæterum vlcus omne, qua vlcus est, vnā vlcusis sa
 communem habet curandi indicationem. Siquidem *natio, me
 diocris sicca*
 (vt Galenus ait) vlceris, qua vlcus est, sanatio me
 diocris ficcatio est. Hæc autem indicatio communis *tio est.*

etiam est vulneribus curandis, qua saltem vulnera sunt, id est, plagæ vulnerando acceptæ. Sed hoc discrimen habent, quod hæc minori, illa (quod humidiora sint) maiori desiccatione indigent. Verum enimverò vlceris, quod cum alio affectu coniunctum est, cuius videlicet præcedere curationem oportet, eius curatio: vt vlceris solius non est: sed prior illius affectus, secunda vlceris. Nam siue phlegmone quæpiam, siue erysipelas siue tumoris, qui œdema dicitur, siue nigritia siue ecchyma siue vlceratam carnem obsederit, primum molienda eius curatio est. Quod si valentior aliqua intemperies (quæ imbecillitatis affectæ partis causa esse solet) exulceratæ carni adsit, huic nimirum primo medendum erit. Vbi autem intemperiei affectum iam sanaueris, exulcerationis postea affectum sanabis. Ita quoque & varices, qui sæpe supra exulceratum locum sunt, prius sanabimus, vt deinde mox vlcus sanemus. Cæterum nulla harum curationum (inquit Galenus) ipsius est vlceris: sed alterius cuiusquam affectus, qui vlcus vel gignit, vel certè fouet. Porro duplex in eiusmodi cum vlcere complicatis dispositionibus consiliū est ipsi Galeno libro quarto methodi medendi: nempe vt vel eiusmodi affectus è corpore prorsus eximas, vel incommodum quod inferunt: vincas. Verum hoc (inquit) vbi exiguus planè affectus est, fieri licet: vbi magnus est, duci ad cicatricem vlcus prius non poterit, quàm illi affectui remedium attuleris. Talium igitur vlcerum quæ sic cum aliis affectibus complexa sunt, quatuor sunt particulares curandi intentiones.

In tollendis dispositionibus cum vlcere complicatis, duplex consiliū esse.

Particul. in curandis vlceribus scopi.

- 1 Prima vitæ rationem, sanandis eiusmodi vlceribus accommodam, præscribit.
- 2 Secunda materiam antecedentem, auerit & interceptit.
- 3 Tertia sympt. mata, & dispositiones, quæ cum vlceribus complicantur corrigit, & summouet.
- 4 Quarta correctus, & profligatis iis dispositionibus,

bus, quibus vlcera complicantur, ea more vulnerum concauorum sanare præcipit.

Cæterum primam, & secundam intentionem assequimur, humores copia, aut praua qualitate noxios, quibus laborantis corpus scatet, qui in partem vlceratam influunt, tum corrigendo, tum vacuando, & auertendo, fluxionemque ipsam intercipiendo. Porro auxilia quibus commodè succorum abundantiam, & vitium tollimus, corrigimus, atque auertimus, sunt, venæ sectio, purgatio, proba victus ratio, cauterium, vomitio, & id genus alia. Fluxiones verò intercipimus ligaturis, perfusionibus, & epithematis: item vnguentis ex bolo Armenia, atque aliis refrigerantibus, & adstringentibus, de quibus in sermone de tumoribus præter naturam, abundè dictum est. De iis autem sic Galenus libro quarto methodi medendi, vbi maligni succi, & exulcerantis curatio nem pertractat, ad verbum scribit: Aequè verò & mali succi, qui ad exulceratam partem confluit, vlcerans quidem est, sanatio eius hæc dicetur. Vt maligenus succus est aut copia redundans, in propriis ipsorum locis tractabitur. Cum ergo qui exulceratis partibus influit succus, nec multo plus iusto, nec multo deterior sit, auerti hunc reuerteremur conueniet, adstrictis scilicet, refrigeratisque iis particulis, quæ ante exulceratam sunt. Inchoanda quoque deligatio est, à laborante ipsa particula, deducendaque verius sananda, veluti in fracturis ossium præcepit Hippocrates. Talis enim deligatura meatus adstringit, per quos materia ad particulas vlceratas influit. Sed & quæ vlceribus ipsis admoventur pharmaca, siccent vaiens tius oportet, quàm ea, quæ simplici admoventur vlceri. Quod si fisti compescique medicamentis influxus nequeat, causa eius inuestiganda est, atque hæc prius adimenda. Ac si quidem ob partis, quæ fluxum recipit, imbecillitatem id fiat, huic nimirum remediandum est: fuerit autem vlcerate quoque partis propria quædam curatio. Sin propter sanguinis copiam, vicio

De primo, et

secundo sco-

po.

*Si succus
qui influit,
nec copiosus
sit, nec ma-
lignus.*

*Si fluxio fit
at ob partis
imbecillita-*

tem.

364 Institut. Chirurgicarum, Lib. III.

viciosumve succū: vel corporis totius, vel alicuius suprapositarū partiū illa scilicet prius sunt corrigenda. At imbecillitas quidem partis propter quā plus iusto succorum illi influit, omnino ab intemperie prouenit, nō tamen ab omni. Eoq; fit: vt exulcerata caro nonnūquam intemperata tantū sit, non autē imbecilla nonnūquam vtrunq; & intemperata, & imbecilla. Quippe imbecillitatis affectū partis: valē

*Valentior
intemperies
causa est in
becillitatis
partis.*

tior intēperies causa est. Quomodo autē curari debeat illa dyscrasia siue intemperies, mox in sequentibus dicemus. Caterū qua ratione, quibū siue morbis fluxiones quæ vel à toto corpore: vel à membro quopiam in particulam vlcere laborantem irruunt: intercipere: atq; auertere oporteat, suprà in tractatu de tumoribus præter naturā abundē dictum est. Quare ne eadem identidem vbique repetamus, ex eo loco, quæ ad rem præsentem attinent requirenda erunt.

Tertius scopus. Tertia intentio, quæ symptomatica, & dispositiōnes quæ cū vlcere cōplicantur corrigit: ac summouet: perficitur prout cuiusq; symptomaticis, & affectus cū vlcere cōplicati natura requirit ac desiderat. Porro (si Galenum sequimur) tradenda est medendi methodus non omnium simul: sed cuiusq; seorsum. Itaque Galenum ipsum imitantes, exordium sumamus ab intemperie: quæ cum vlcere complicatur, corrigenda: de qua ad hunc modum scribit libro de morbis methodo curandis quarto.

*Lib. 4. met.
med.*

Vlceris dyscrati, id est, cum intemperie iuncti, curatio.

C A P.

V I I.

30

*Squalentis
ac sicca
intēperiei
curatio.*



Curatio. Arnis intemperies, si squalens siccaq; videtur aqua temperata touens humectansq; corriges. Quoties autem eo remedio vteris, esto tibi perfusionis humectationisq; meta: vt cum primū rubescit, attolliturq; particulæ moles tum desinas. Quippe si vltra perfundas, quod attraxisti, id euocabis

20 cabis. Itaque nihil profeceris. Quinetiam medica-
 25 mentorum humectandi facultas plenior esto, quam
 25 vt in sana carne præceptum est. Si verò humidior, *Humidioris*
 25 quam pro naturali habitu caro fuerit, contraria ra- *intemperies*
 30 tio ineunda est: ac medicamentorum facultas ad cis- *cursatio.*
 25 tius transferenda: aqua verò nullatenus admouens
 25 da. Imò si lauandum vlcus videtur, vinum, aut pos-
 25 sca, aut decoctum austeræ cuiusdam herbæ præpa-
 25 randum. Eodem modo & calidiorem quam par est
 10 carnis habitum refrigerabis, & frigidiorē calefas-
 25 cies. Agnosces verò (inquit) horum vtrunq; pars *Caloris* &
 25 tim colore, partim tactu, partim laborantis sensu. *frigoris no-*
 25 Quippe aliàs vñtionem sentire se fatentur, aliàs maz *te.*
 15 nifestum frigus in particula: gaudentq; vel frigidis
 25 medicamentis, vel calidis. Et aliis quidem rubor les-
 25 uis insidet, aliis color magis albicat. Breuiter que *Curatio fit*
 25 cunque partes vlcerae per intemperiem aliquam à *per contra-*
 25 naturali habitu recesserunt, eorum sanationem per *ria.*
 25 ea, quæ contraria viribus sunt, fieri omninò est ne-
 20 cesse, calidam vtrique intemperiem (vt dictum est)
 25 refrigerando, siccam humectando, frigidam calfas-
 25 ciendo, humidam siccando. Quòd si frigidior humi-
 25 diorq; locus sit, calfaciendo pariter ac siccando, &
 25 in aliis ad eundem modum, vincentem videlicet
 25 qualitatem, contraria semper oppugnans. Atque
 25 vbi intemperiei affectum iam sanaueris, deinde etià
 25 exulcerationis affectum sanabis. Non aliter planè
 25 nunc curata intemperie, quam si citra vlcus incidis-
 30 set. Quo manifestum fit, non esse vlcus, sed intem-
 25 periei propriam omnem eiusmodi curationem, quæ
 25 tamen vlcus ipsius sanationem omninò præcedes-
 25 re debet. Siquidem fieri non potest, vt in vlcere vel
 25 carnis productio, vel sinus impletio, vel agglutina-
 35 tio, vel cicatricis inductio, rectè vnquam cedat, nisi *Caro rectè*
 25 subiecta caro pro naturali modo se habeat. Hæc *se habet, si*
 25 autem rectè se habuerit, si (quod reliquis etiam o- *propria ser-*
 25 mnibus est commune) proprium temperamentum *uer tempera-*
 25 tueatur. Ergo si exulcerata caro iusto calidior, fri- *mentum.*
 25 gidi

gidiôrve effecta fuerit, vtique medelam exigit, quæ in tantum calfaciat, refrigeretve, in quantum ipsa à naturali suo habitu recessit. Subiectæ nanque carnis affectus, causæ rationem obtinet ad id quod efficitur. Quippe ex hac (vt Galenus inquit) & per hanc, tum quæ dissident, glutinantur, tum quæ caua sunt, carne implentur. Itaque temperatam esse subiectam carnem, ad vlcera tum glutinanda, tum carne implenda prorsus oportet. Dolor quoque vnum est, ex symptomaticis, quæ vlcera curationem remorantur, & impediunt. Quocirca si vehemens aliquis dolor vlcera parti incidat, protinus hic aut tollendus erit, aut saltem quoad licebit, demulcendus. Dolor enim præsertim vehemens, vires prostermit, & fluxionem proritat: proinde & vlcera ipsius curationem prohibet. Itaque tametsi quæ vlcera partis particulis ad doloris sedationem admoventur, vlcera aduersentur quoniam tamen ex doloris vehementia plerumque imminet laboranti periculum, & propriam vlcera curationem moratur, neglecto ad tempus vlcere, dolori tanquam vrgentiori primum, maximeque intendendum est. In complicatis nanque affectibus, id ex quo primum maximeque homini imminet periculum, quodque magis accelerat, & vrget, primum curari, atque auferri debet. Cæterum quibus auxiliis dolor mitigari, aut sedari possit, in duobus libris superioribus copiose satis dictum est, diceturque iterum in antidotario.

Vlcus crucians.

In complicatis affectibus vrgentiori semper primum succurrendum est.

De Vlcere cum tumore particula. C A P. V I I I. 30



AEterum ad eundem quoque modum, & partium, quæ cum aliquo præter naturam tumore exulceratae sunt, earum prius sanandus tumor est: fieri enim non potest, vt vlcus tumore manente, ad sanitatem perducatur. Quocirca omni studio laborandum est, ne phlegmone, aut quouis alius tumor in loco vlcera ex-
cite

- citetur: quòd si id prohiberi non possit remediis dictis curari debebit, vlcere tamen interim non neglecto. Quæ autem omnis præter naturam tumoris curandi ratio sit, in præcedentibus fusissimè dictū est.
- 5 Nunc quantum eius rei coniunctum cum vlcere *Lib. I.*
 curatione est, obiter, ac compendiosè tractabitur.
- Compendiaria igitur obfessorum phlegmone par- *Phlegmon-*
 tium vlceratarum curatio, per id genus præsidia *si vlcere cu*
 obitur Galeno, quæ sanè vel affectum prorsus sum- *ratio.*
- 10 mouent: vel si quid exiguū, quod suppuret relique- *Lib. 4 met.*
 rint, alterū medicamentum acre, quod educere pus
 queat, requiritur: vel si tenuis circūposita cutis sit,
 velisq; celerius explicatum ægrū, sectio petenda est.
- Quod si cataplasmate ex hordei farina, aqua & oleo
 15 quod calfaciat humectetq;, illinantur partes vlcera-
 20 tæ, quæ phlegmone infestantur, lenientis (vt Gale-
 nus ait) tractatio est, non medentis, & contra malum
 pugnantis. Id enim non ex prima ratione fit, hoc est,
 vt remediū affectus, sed vt sympt^a mat^{is} mitigatio.
- 20 Siquidem ipsius phlegmones remedia (vt autor est
 Hippocrates) sicciorem sunt virium. Itaque si in- *Si inflama-*
 flammatio vlcera aut etiam vulnera adhuc recentia *rio vlcera*
 obfideat, vsus est medicamentorum quæ desiccant, *exerceant.*
 atq; inflammationē arcent. Ex liquidis igitur (inquit
 25 Paulus) laudatissimum est vinum, deindè posca. Si *Vinum.*
 verò sordes quoq; cum inflammatione occupēt, malsa *Posca.*
 diluta conuenit. Ex iis autē medicamētis, quæ siccādi
 potestate prædita sunt, cōiter quidē conferent, in flā-
 mationibus dicata, quæ in tractatu de tumoribus
 30 præter naturam descripta sunt, si oleosa, acriaq; exci-
 pias: priuatim autem hoc proficit. Malum punicum *Malum pu-*
 dulce, vino incoctū tritūq; illinitur. Mirabile nimis *niciū dulce.*
 rūm, & (vt Paulus ait) multiplici vsu commendatū
 est remediū: facit enim tum ad capitis, tum naturalium
 35 vlcera, tum etiam ea, quæ toto corpore excruciant,
 oculorumq; inflammationes. At si erysipelas, aut eius
 modi quippiā vlceri accefferit, iis vtendum erit præ-
 sidiis, quæ aduersus illa superius scripta sunt.

Vlceris contusi curatio.

CAP. IX.

*Vlcera cum
cōtusione fa-
cta, ad sup-
purationem
ducenda.*



*Cataplas-
mata suppu-
ratoria.
Aqua cali-
da.
Tetraphar-
macum.
Hippo.*

Aleni ex Hippocratis testimonio sen-
tentia fuit, vlcera omnia, præter ea
quæ contusa sunt, ficcari oportere. In
iis verò quæ cū contusione facta sunt,
quàm celerrimè pus mouendum esse.
Siquidem necesse est carnes sic contus-
sas putrescere, vt noua tandem caro gignatur. Pus
autem ipsum siue carnis contusæ suppuratio, cum
aliqua putrescentia fit. Porro quæ putrescunt omnia,
ex calido, & humido sic afficiuntur. Proindè fit, vt
ea quæ calefaciunt & humectant, omnibus his affe-
ctibus, quibus moueri pus expedit, semper admo-
ueamus. Cataplasmata igitur ex hordei farina,
aqua, & oleo: item quæ ex pane, aqua, & oleo, com-
ponuntur, conueniunt. Præterea fomentum multæ
calidæ aquæ, & tetrapharmacum (ceu quæ calfa-
ciant, humectentq;, & pus quàm celerrimè moueant)
vlceribus contusis rectè adhibentur. Sed præstat
ipsius Hippocratis verba subiicere: Quodcunque
vlcus (inquit) cæsum percussimve acuto telo est dis-
uisum, medicamentum enhæmū & ficcans aliquod,
quod suppurare vetet, admittit. Sin caro aliquo telo
tum contusa, tum cæsa sit, huic ita medendum est,
vt quàm celerrimè suppuret. Nam & minis phle-
gmone vrgebitur, & necesse est carnes, quæ contu-
sæ cæseq; sint, putrefactas, & in pus veras liquari,
postea nouam carnem nasci. His itaque verbis aper-
tè nos docet Hippocrates vlcera quæ sine contusio-
ne accepta sunt, quàm maximè ficcare. His verò que
cum contusione facta sunt, quàmprimū pus mo-
uere. Porro eorum quæ puri mouendo aptissima
sunt, materiam in sermone de tumoribus præter na-
turam, & in antidotario copiosam reperies. Sed &
de iis etiam suprà tractauimus, vbi de vulneribus
contusis meminimus.

De carne in Vlceribus supercrescente, quam Græci hy-
persarcosin nominant, tollenda. CAP. X.



- 5 **C**aro in vlceribus suprà quàm par est
 excrefcens, medicamentis exiccantis
 bus tollitur. Equorum fanè numero
 sunt diphryges (cuius tria sunt gene- *Diphryges.*
 ra apud Diofcoridem) infperfum, aut
 10 cataplainatis instar inductū, squāma æris omniatq; *Squamma*
 testacea cōbusta. Item echini, hoc est, erinacei vtriq; *æris.*
 ram terrestres quàm marini, cum toto corpore con- *Echini.*
 cremati. Verūm hæc non admodū eximie, sed mo-
 dicè ac mediocriter duntaxat purgant, & supercres-
 scentia compescunt. Asiæ verò petræ flos longè valis *Asiæ lapidis*
 diūs id numeris obit, atque hoc magis adhuc fori, *flos. myrti.*
 15 chryfocolla, chalcitis, misy. Quæ si combusta fue-
 rint, minùs vellicant, ac rodunt. Item æris flos, qui
 chalcanthos Græcis vocatur. Cæterū ærugo his
 20 adhuc omnibus valentior est. Sales autem cōcrema- *Sales cōcre-*
 ti carnes cum humore flaccidas consumunt, ac lique- *mati.*
 faciunt. Siceriam linamenta è panniculo discerpta,
 muria acriori imbuta, & denuò reficcata atque im-
 posita, mediocres carniū supercrescentias, liquefa-
 25 ciunt, atque exedunt. At maximas carniū excre- *Medicame-*
 scentias adusque penitiora crustis obducunt, Fau- *tum ad ma-*
 stiani pastilli, triti atque insperfi. Item medicamentū *ximas hip-*
 quod recipit calcis viuæ, id est, aqua non extinctæ, *sarcosiss.*
 squammæ æris, & mannæ (quæ mica est thuris, con-
 30 cussū seu attritu elisa) pares modos, hoc est, partes
 æquales. Porro Faustini pastilli, id est, trochisci, *Faustini pa-*
 Paulo Aeginetæ libro, septimo ad hunc modum des- *stilli.*
 cribuntur. Auripigmenti drachmæ duodecim, sans-
 darachæ quæ rubrum est auripigmentum, & à natu-
 35 ra magis excoctum) drachmæ sex, calcis viuæ drach.
 octo, chartæ combustæ drachma: myrti baccarum
 succo vel decocto excepta in pastillos redigito. Sed
 de eiusmodi supercrescētē carnem cōpescentibus,
 & absumentibus iterū in antidotario dicemus.

370 Institut. Chirurgicarum, Lib. III.

Vnguentum Aegyptiacū. Ad hanc autem intentionem in communi vsu est vnguentum Aegyptiacum nōminatum. Cāterū dum hāc caustica atque erodentia medicamēta admouentur, partes quā in circuitu sunt, refrigerantia desyderant, ne scilicet in partem vlceratam ex rosione, calore, & dolore, humorum fluxio aduocetur. Deindē crustae vlcerebus inductae resoluendae erunt, & vlcus ad sanitatem perducendum.

Vlceris cum duritie, & decoloratione laborum curatio.

C A P. XI.

Excisio Galen. Scarificatio Auic.



Vm labra tātūm vlceris decolorata durae plusculū fuerint, excidenda ea sunt (Galenō autore) ad sanam vsque carnē. Auicēnas autem decolorata eiusmodi, duraq; vlceris labra scarificanda esse praecipit, & ab eis sanguinem, ad motis etiam cucurbitulis, extrahendum. Sanguine autem, quod satis esse videbitur, educto, spongiā siccam, hoc est, nullo liquore madentē, ac postea etiam medicamēta quādam resiccantia superimponere iubet. Sed & de iis antē Auicennam ad eundem ferē modum scripserat Hippoc. qui certē nihil omninō eorū, quibus ad vlcerrum curationē est opus, omisisse videtur. Hic enim non solūm vlcerrū ipso etiam Galenō teste) quā citra alium affectū consistunt, sanandorū rationem inuenit (vt quā in siccando, vt suprà dictū est, consistat) sed etiam priuatim per species affectuum cuiusque. Siquidem vel liuidum, vel nigrū, vel rubrū conspicitur, scarificando, ac sanguinem emittendo. Mox spōgiā statim sicciorē magis, quā humidiorē, hoc est, siccā potius quā humefactā superimponendo. Posthāc verō etiam siccantia remedia applicando. Ab his, si res postulet, rursus sanguinē auferrēdo. Ac mox iterum talia peragendo, donec parta omninō sanitas sit. Quod si labra vlceris dura callosa q; appareant, etiam ea excidendo. Cū verō amplius

Hippocr.

Lib. 4. the.

plius progressus huiusmodi affectus est, deliberatio incidit, excidendumne omne id sit, quod præter naturam visitur, an spatium potius curandum: proculq; dubio est, ægri animum hoc casu consulendum esse.

5 Aliqui enim longiori tempore curari citra sectionem malunt: aliqui quidvis subire, dummodò citius sanentur, sunt parati. Cæterum excidere (ut postea Galenus ait) res est promptissima: maius verò quippiam atque artis egens medicamentis, sanare.

10

Varicum cum Ulcere complicatarum curatio.

CAP. XII.



15

Varicum superiacetum, hoc est, supra exulceratum locum existentium occasione, cōtumax ad sanandum sæpe vlcus redditur: quippe quòd ex his humiditas aliqua ad exulceratas partes defluat. Eas igitur (ut supra dictum est)

20

prius sanare oportet, ut deinde mox vlcus sanemus. Igitur varices, qui cruribus & alibi quam in testiculis provenire solent, hoc modo ex Hippo. Atq; Aëtij Antiocheni, & Pauli Aeginetæ sententia curabis. Pri-

*Varicum
curatio.*

25

mò in cute, vasi elato seu venæ in fastigiū tumefactæ hoc est, varici, adiacente, simpliciter sectionem scalpello per longitudinem facito. Ita leuiter tamen, ut venam sic in verticem elatam non diuidas, & scalpello penetres, sed sola cutis incidatur. Ducta sic leuiter in

30

cute sectione, oras vulneris hamulis diducito, & membranas, cultro ad ramicem aquosum accommodo, sensim ac blādè excoriato. Mox vena detecta nudataue, & à circumiacentibus corporibus vndiquaque explicata, eam voluella aut obtuso hamo attrahito, ac suspensam teneto. Deinde acum duplex linum, seu

35

lineum funiculū duplicē, trahētē subiucito, subterue trāsmittito: liniq; habenulā amputato, sic ut duo funiculi efficiantur. Tum venam dilatatam, non aliter quam in phlebotomia fieri solet, scalpello per medium diuidito, ac sanguinis quātū satis esse videbitur,

detrahito. Deinde altero funiculo superiorem vasis partem constringito, crureq; eleuato, sanguinem qui in ipso apparebit, manuum expressu euacuato. Quod vbi factum fuerit, venam ab altera parte līs no altero rursus deuincito. Partem verò illam venæ, quæ inter duo vincula est, vel statim excindito, vel manere finito, vsque dum putrefacta sua spōte cum funibus excidat. Peracto opere, sicca linamenta in plagam inferenda sunt, spleniumq; œnelæo, id est, vino cui oleum adiectum sit, madens super imponē- 10 dum, ac deligandū est. Tum linamētis, medicamen- to aliquo ad pus faciendum apto, imbutis, curatio prosequenda erit, cætera quæ reliquis vlceribus cō- munia sunt, peragendo. Sed interim quies ægro im- peranda, seruato accliui membri decubitu: ne si de- 15 cliue iaceat, humores ad ipsum confluant. Pranso au- tem magis quàm ieiunos & parum pleno, potōq;, item concalescō, & (vt Paulus voluit) loto, dieq; calido potiùs quàm frigido, venam eiusmodi (si dis- cīs Hippocratis auscultes) secabis, atque ex ea san- 20 guinem mittes. Itaque si varix crus (vt magna ex parte solet) occupauerit, loto prius (vt præcepit Pau- lus) homine, funiculū superiori femoris regioni cir- cundato, ac vt inambulet iubeto. Inde venam ita res- pletam, attramento scriptorio, aut collyrio notato, 25 iuxta eius situm trium digitorum spatium aut paulò ampliori interposito. Deinde reclinato seu decubēte ægro, crusq; ipsum extendente, alterum vinculum paululū suprà genui iniicito, ac mox quā attramē- ti nota est, sectionem facito, & reliquam curationem 30 (vt suprà modò annōtauimus) prosequitor. Quidā ex veteribus, funibus siue vinculis minimè vteban- tur, sed venam vel statim vbi à carne absoluta erat, & vndiquaq; nudata, excindebant, vel ab imo etiā adhærentem violenter extrahendo abrumpebant. 35 Alij verò vstionem eligentes, digitalibus interval- lis innixa cauteria vasis admovent. Atque vbi crus ita exciderit, vlcusq; incarnatū, & cicatrix inducta fuerit

Si varix
crus occupa-
uerit.

Euulsio va-
ricis.
Vstio.

fuerit locum roborant. Verum omnium tutissimus
chirurgiæ modus est, quæ suprà diximus. Porro vas-
rices in imo ventris suborientes, cõmilitèr trachan-
di sunt. Illi item, qui in temporibus existunt, ea ratio-
ne, quàm in angiologia, siue exemptione venarum do-
cuit Aegineta tolluntur. Atq; hæc satis de varicum *Lib. 6. ca. 5.*
curatione, quantum saltem præsens locus postulat.

De Verminoso Vlcere. CAP. XIII.

Vermes qui vlceribus procreantur, *Ad vlcerũ
vermes.*
arceas primum quidẽ est: vt humiditatẽ
putredinemq; , eorum opificem tollas.
Itaq; vermes in vlceribus exortos in-
terficiunt, & putredinem simul auferunt
succus & decoctum ablynthij, & agrimonix, vel
cennaurij, vel marrubij calamenthi quoq; officina-
rum (quod primum genus est calaminthæ Diosco.)
succus iugiter instillatus, atq; id genus multa, quæ
etiam aurium vermes enecant. Priuatim autem ad
vermes qui vlcera infestant commendatur Archige-
ni, & Theodoro medicamentum, quod recipitur cer-
russæ & polij parem mensuram, cum pice liquida
illitum. Conducit etiam magnopere linamentum fa-
liua ieiuni hominis illitum, & applicatũ. Hoc ver-
mes etiam in auribus perimit, & concolores cicatris-
ces reddit: vt testatur Aëtius.

*Vlceris disrupti, & cum ossis corruptione complicati, cu-
ratio. CAP. XIII.*

Vlcerum nonnulla cicatrice obdu-
cta, postea tẽpore haud ita multo
interiecto denuo inflammatione
tentantur, rursumq; sua spõte &
per se rumpuntur, & à continuita-
te sua discedunt. Osse enim quos-
piã subtractio malè affecto, hoc
est, vitiato & corrupto circumdata ac superiacēs caro
ex facili quidẽ interdũ ad cicatricẽ ducitur, & sana
ex toto, ad vnguemq; resututa esse videtur: verum

374 Institut. Chirurgicarum, Lib. III.

cursu humoris valido, paulatim ex osse in alto cōtra
 bescente, ac putrescente, tum inflāmatio, tū pus ob-
 oritur, quod cicatricē lacerat, ac distrūpit. Cāterū
 vitiatū ac corruptū ossis signa hāc sūnt. Primō ferē
 pingue fit: deindē vel nigrū, vel cariosum. Quā su-
 pernatis (vt Celsus ait) grauib. vlcenib. aut fistu-
 lis, hisq. v. longa vetūitate, vel etiā cancro occupa-
 ris, eueniūt. Quā nā igitur horū vlcenū curatio erit?
 certē eatenū exiccāre, quatenū squāmā affecti ossis
 exciderit. Ossium autē squāmā facili excidēt, si agre-
 tis papaueris, & fici arboris foliis cum polenta lā-
 uigatis, atque ex vino illitis ipsius ossis sinus concas-
 uos repleueris, aut alterci quē Græci hyoscy amum
 dicunt, semen, & atramentū futorium, pari pondere
 contrita imposueris. Sed & peceudani radix cōtrita,
 subito squāmas ossiū remouet, ac separat. Squāmas
 etiā ossium breui detrahit, & nouam probamq.
 carnem desuper renasci facit, sequens medicamentū
 quod admirabile vocat Auicennas. Recipit autem
 aristolochiā, ireos, myrrhā, aloēs, corticis plantæ pa-
 naxis [ex qua fit succus opopanax dictus] canabil-
 (quod apud Arabes genus est cuiusdam terræ rubi-
 minutæ vt arenā, & Galeno ac Græcis eretrias, vt
 puto, dicitur) adustū, scorix æris, corticis pini, singul-
 lorum portiones æquas, melle omnia excipiātur,
 & fiat emplastrum. Oportet autem ante omnia vi-
 tiatum ac corruptum os nudare, vlcere exciso, & si
 latius eius corrupti ossis vitiū est, quā vlcus fuit,
 carnem subsecare, donec integrum os vndique pa-
 teat. Osse autem sic nudato, totum id quod pingue
 & corruptū est, candente ferramēto semel iterūmue-
 (vt res exigit) admoto adurēdū est, vt ex eo fratu ses-
 cedat. Aut certē eradendum, donec iam aliquid cruo-
 ris ostendatur, quā integrioris & minimē corrupti
 ossis nota est. Neque alia faciēda sūnt, vbi caries
 nigritiesue in summo osse est. Siquidem id vel pau-
 lō diutius eodem ferramento adurendum, vel radēd-
 um est. Porro qui radit hāc (inquit Celsus)
 audacter

Ossis vitia-
ti nota.

Que ossium
squāmas ex-
cidere faciūt

Emplast.
Auic.

Canabil.

Terræ re-
trias.

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

60

65

70

audaciter imprimere ferramentum debet: vt & agat
 aliquid, & maturius definat. Finis est, cum vel ad al-
 bum os: vel ad solidum ventum est. Albo namq; fis-
 niri ex nigritie vitium, soliditate quadam ex carie
 manifestum est. Accedere etiam cruoris aliquid in-
 tegro supra dictum est. Cæterum si caries altè descē- *Si caries al-*
 dit, per terebram vrgenda crebris foraminibus est, *tè descēdit.*
 quæ altitudine vitium æquent. Tum in ea forami-
 na demittenda candentia ferramenta sunt, donec
 10 inde siccum os ex toto fiat. Simul enim post hæc
 & resoluetur ab inferiori osse quodcunq; vitiatum
 est, & is sinus carne replebitur, & humor aut nul-
 lus postea feretur, aut mediocris. Sin autem nigris-
 ties est, aut si caries ad alteram quoque partē ossis
 15 transit, oportet excidi. Sed quod totum vitiatum
 est, totum eximendū est. Si inferior pars integra est,
 eatenus, hoc est, vsq; ad subiectam partem ossis in-
 tegram, quod corruptum est excidi debet. Sunt qui
 post abrasionem cauterium admouendum esse suas-
 20 dent: nec immerito sanè. Nam si corruptela ossis ex
 humiditate excrementosa & superuacanea, ipsius
 ossis substantiā labefactante ortum habet (vt certè
 magna ex parte habet) nullū præsentius aut tutius
 remediū excogitari potest, ipsa vñione, seu cauterio
 25 (vt vocant) actuali. Hoc enim decenter admotū, &
 citò, & tutò in summo quoq; & in alto (non secus
 quā ignis ipse actualis) deficcet. Post vñionem verò
 ferro candēte factam, rosaceum calidum infundunt. *Cue post*
vñionē fa-
cienda.
 Guido autē à Cauliaco post vñionem cauterio (vt
 30 dicūt) actuali (quod in hoc affectu magnoperè pro-
 bat) decenter factam, rosaceum oui can. & so liquore
 permixtū, tribus primis diebus admouet: triduo ve-
 rò alio sequente, loco albuminis, luteum oui (quod
 vitellum appellant) rhodino, id est, rosaceo commi-
 35 scet. Postea butyrum cū melle rosato infundit. Sed
 33 præstat eius verba hoc loco subiicere. Ego (inquit)
 34 post cauterium pono oleum rosarum cum albumi-
 35 ne oui per tres dies, & per alios tres dies cū vitello

oui, & postea butyrum cum melle rosato. Et desu-
per continuo vnum de mundificatiuis vsq; ad ossis
exfoliationem, & post cum puluere emplastri dicti,
hoc est, ex Auicenna superius commemorati, incar-
no, & consolido.

*De Vlcerebus dyssepulotix inueteratis, & iis, quæ cacoëthe,
& chironia dicunt.* CAP. XV.

*Dyssepulota
Cocoëthe.*



Lcera quæ ad cicatricem ægrè du-
cuntur, Galenus Græcè dyssepulo-
ta nominat. Quæ verò ægrè sana-
bilia dolosa, malefica siue maligna
contumacia rebelliaue dicimus,
eidem, & Græcis alijs, qui de re
medica scripserunt, autoribus ca-

*Chironia.
Telephia.*

cocëthe nominantur. Hæc quoq; præsertim inuetera-
ta, & quæ vix cicatricem recipiunt, alijs chironia ap-
pellantur, ceu Chirone medicinæ peritissimo indigen-
tia: alijs telephia, quòd in tali vlcere Telephus con-
fenerit. Galenus libro quarto de cõpositiõne medis-
camentorũ secundũ genera, vlcera cacoëthe diuidit
penes vehemētiæ differentiã in maligniora, seu præ-
ter modũ malefica, & mediocria seu moderatiora:
atq; hæc quidem imbecillioribus, illa verò valen-
tioribus remedijs curari præcipit. Illa autem nõ me-
diocriter: sed maximè maligna contumaciaq; vlce-

*Chironij vl-
ceris descri-
ptio ex cor-
nelio Cel.*

ra, Asclepiades atq; alijs veteribus vel ipso Galeno tes-
te chironia propriè nominabant. Caterũ Cornelio
Celfo autore, chironium vlcus appellatur, quod &
magnum est, & habet oras duas callosas, tumentes:
exitantes nõ multa: sed tenuis. Odor malus, neq; in
vlcere, neq; in eius tumore est. Nulla inflammatio,
dolor modicus est, nihil serpit: ideoq; nullum pericu-
lum adfert: sed non facile sanescit. Interdum tenuis
cicatrix inducitur: deinde iterum rumpitur, vlcusq;
renouatur, & maximè in pedibus & cruribus. His
similia sunt, quæ Auicennas ægrè sanabilia, & oc-
cultam quandã nobis proprietatem habentia nomi-
nat.

nat. Hæc enim (inquit ille) neq; putrida sunt, neque
 corrosiua, neq; ambulatiua: sed sunt vnus disposi-
 tionis plana, claudētia sese, & recidiuātia sæpe, hoc
 est, cicatricem frequenter ducētia, & rursus sæpē se
 5 aperientia & renouātia. Porro multæ ac variæ sunt
 causæ, quæ eiusmodi malignorū contumaciam, atq; *Varia cau-*
 ægrè sanabilium vlcerum cōtionem & sanationem *se propter*
 remorantur, & impediunt. Nempe fieri aliquando *quas nō sa-*
 potest: vt labra exulceratæ partis callosa, & dura *nescat vlcus*
 10 causa sint, quominus sanescat vlcus. Pōt etiā causa *Labra cal-*
 esse intēperies: vel quæ citra tumore præter naturā *losa.*
 in vlceratis partibus consistat: vel quæ cum tumo- *Intēperies.*
 re quidem aliquo coniuncta sit. Potest & varix su- *Varix.*
 periacens: vel lienis auctio & malè affectus: vel in *Lienis, aut*
 15 iocinore vitium aliquod præterq; hæc omnia imbe- *iocinoris vi-*
 cillitas ægræ pris, quæ (vt Galenus ait) ipsa quoq; *tium.*
 intensa quædā est intemperies, vlceris curationē in *Imbecillitas*
 multos menses protrahere. Quinetiā vitiosus in tot *partis.*
 to corpore succus (cacochymia vocāt) maxima cau- *Cacochy-*
 20 sarum est, quæ incommodare vlceribus possunt, &
 ea diuturna contumaciaq; efficere. Vexat sanè non
 minus vlcera, atq; ea curatu difficilia reddit, succo-
 rum æquabiliter se habentium exuperantia, quam
 plethoram appellant. Quæ omnes causæ, & si quæ
 25 sint aliæ, in duas (vt suprà docuimus) reuocari pos-
 sunt: nempe in carnis subiectæ intemperiem, & hus-
 morem confluentem. Itaque si eiusmodi vlceribus
 dyspulotidis, id est, ægrè cicatricem admittentibus,
 maleficis, contumacibus, atq; inueteratis, aliquādo
 30 mederi velis, necesse est causas, quæ illa creant, pri-
 mum summoveas atque abscindas: deinde maligni
 ipsius vlceris curationē aggrediaris. In morbis nanq;
 que omnibus nedum vlceribus, in quibus effectrix
 causa adhuc manet, ab hac inchoanda curatio est.
 35 Magna igitur attentione inspiciendum venit, num
 corpus totum cacochymum vel plethoricum exis-
 fiat, vel lien, aut iecur malè afficiatur, vel labra vls-
 ceris dura, & callosa sint. Item num aliqua insignis

Plethora.

subsit partis ulceratæ intemperies, aut etiam varix aliquis superiacens fuerit, cuius occasione cõtumax ad sanandum vlcus redditur. Ergo si totum corpus cacochy mia aut plethora laboret, prius expurgare, vacuareq; expedit, quàm medicamētum vlceri ad-
 moueas. Si verò lien, aut iecur malè afficiatur, his prius providere, deinde ad vlcus curandum venire oportet. Adeundē modum & varices, qui sæpè sup-
 pra exulceratum locum sunt, prius (vt iuprà docuimus) tollendi sunt, deinde mox vlcus sanandum. In-
 temperies quoque atq; imbecillitas, quam sæpè in-
 signis quædam parit intemperies, antequam ad vlc-
 ceris curationem accedamus corrigenda erit. Breui-
 ter ei quod fluxionis in partem vlceratam decum-
 bentis est causa, atque agrè sanabile vlcus red-
 dit, providendum, ac si fieri potest, medēdum prius
 erit. Deinde maligni ipsius vlceris & cõtumacis cu-
 rationem aggredi oportebit.

*Malignorū
 & cõtuma-
 cium vlc-
 erū summus
 curationis
 c opus.* Itaq; malignorum & difficulter cicatricem reci-
 pientium vlcerum curationis summus scopus est,
 valida citra demorsum exiccatio. Hæc enim ab aliis
 vlceribus hoc vno dissident, quòd medicamenta cis-
 tra demorsum, atque erosionem vehementer exiccā-
 tia desiderant. Quæ enim mordendo vlcus, & mani-

*Mordacia
 medicamen-
 ta quæ ef-
 ficiant.* festam in eo exasperationem excitādo, dolorem in-
 ferunt fluores, hoc est, humores vlceratis partibus
 influentes irritāt, & phlegmonas cõcitant. Talis igitur
 pharmacorū materia, quoad eius fieri potest, ad
 dysepulota, id est, agrè cicatricem admittentia, &
 cacoëthe, id est, maligna vlcera inueniēda est, vnde

*Duo aliī sco-
 pi ad sum-
 mū, & gene-
 ralē scopum
 assequendū
 necessarij.* vlcus citra mordicationē & dolorem siccescat. Hæc
 autem non ita inuentu facilis statim videbitur, si at-
 tentius rem ipsam fueris contemplatus. Vt enim ge-
 neralem hunc scopum, nempe validam vlcerum des-
 siccationem, assequaris, duo tibi alij scopi proponū-
 tur: vnus vt id quod influit, regeras, repellāsve, si sal-
 tem qui vlceratis partibus influit succus, nec multò
 plus iusto, nec multò deterior sit; alter: vt quod as-
 sectæ

fectæ parti inhæret, infixumq; est discutias. Atque hæc contrariæ vires præstant. Siquidem influxum *1. Repellen-* reprimunt, quæ sunt adstringentia pharmaca: diger *dum quod* runt impacta iam exceptaq; trahendi potestate præ *influxit.*

5 dita. Porro quæ adstringunt: vt plurimum exasperant, atque hac occasione molesta sunt. Trahentia *2. Digeren-* verò, ac digerentia ex alto humiditates, non citra *dum quod* acrimoniam id efficiunt. At acrimoniam dolor alie *iam parti* quæ necessario sequitur vlceratam partem erodēs. *inhæsit.*

10 Atq; sic propter dolorem, quem exasperantia erodentiæq; concitant humores (vt paulò antè dicebamus) vlceratis partibus influentes irritari, & vlcus plegmone obsideri exediq; contingit. Ex quibus sanè dictis colligitur, vlceribus dysepuloris, id est,

15 cicatricem difficulter recipientibus, præsidia inueniri non posse: & multò minus adhuc malignis, quæ Græca dictione cacoëthe suprà iam sæpius vocauimus. Quid ergo nobis agendum erit, vt talia vlcera cacoëthe, & dysepulota dicta, ad integram

20 sanitatem perducantur?

Deligēda sanè erunt pharmaca, quæ vtraq; vi & *Medicamen-* facultate (nēpe adstrictoria & digerente) polleant, *ta dysepulo*

atq; ita quod influit, repellant, quod verò iā affectæ *tis & mali* parti inhæsit discutiat. His itaq; mista facultate præ *gnis vlceri-*

25 ditis medicamētis, vlcera de quibus nobis in præsen *bis sanādis* tia sermo est, citra erosionē demorsumve vt res ex *accomoda-* postulat desiccabis. Cæterum tametsi medicamētū

ex ambobus cōpositum erodēte puta, & adstringēte

necessariò validū existat: sordes tamen & humida

30 tis copia id genus vlceribus inestibens, veluti propu

gnacula quædā vlceratis particulis facta, rosionem

valēribus pharmacis adimūt, soluuntq;. Porro artifi

cio hac in re potius (vt videtur) vti debebit medicus

quàm experimēto inniti: nēpe quod sciat rationalis

35 medicus vlcus non alia medicamentorū virtute curari, quàm dum affecta pars eam siccitatē consequatur, quàm in naturali statu sita possidebat. Quòd factum intelligimus: vbi neq; tenuis amplius sanies

influxat

Lib. 4. cōp.
secundum ge
nera.

influat, neque pus producat. Hanc autem dispositionem vlcera nanciscuntur; quo dicebamus modo siccescentia, hoc est, adstricta, discussa. Deinde ubi sicca quidem fuerint, verum sordida adhuc appareant, deterforis pharmacis repurgantur. Ceterum cum manifestò constet omnibus in artis operibus exercitatis, rationem sine operum exploratione probabilem non esse, medicus diligenter attendere debet, quem effectum medicamentum vlceri adhibuit, quotiescunque ipsum soluerit, in particula vlcera præstitit, quantum scilicet humiditatis in vlcere deficcauerit, vel si etiam sordes adsint, quantum inde absterferit. Sed & animum intendere oportet, vtrum vlcus carne quæ subest exesa, ac colliquecente, sordidum euaserit, an quia medicamen fordibus auferendis aptum requirat, impositum verò tale non sit. Quod nimirum medicis etiam bonis (Galeno attestante) existimatis, nonnunquam imposuit, ac nostris quoque chirurgis quotidie adhuc imponit. Vbi enim vlcus post vnam aut alteram medicamentum applicationem sordidius conspexerint, statim non cogitantes, an id ex rosione pharmaci acciderit, ad absterforium valentius acriusque se conferunt, unde iterum vlcus erosum ex æquo sordidum, vel etiam magis adhuc altera solutione visitur. Carne enim id foedatur, à medicamento colliquata. Nam ita in prauam sanie degenerat. Quicquid autem in his ipsis tenuioris substantiæ est à pharmaco diffilatur, reliquum ibidem vlcibus infixum, sordes ipsis redditur. Ceterum cum ampla sit latitudo vtriusque in eo, quod alterum vlcus altero magis minusve dysepulotum, malignumque sit, corporaque omnia, quibus mederi cogimur, non eandem omnino temperaturam ac dispositionem habeant, sed alia vitioso succo, alia plethora laborent, quædam dura & robusta sint, quædam verò tenera & mollia, atque ad sentiendum insigniter habilia: fieri non potest, ut vno eodemque medicamento omnibus indifferenter dysepulotis & malignis vlcibus, quæ-

uis

*Diligenter
inspiciendū,
vnde sordes
in vlcere e-
nata sit.*

*Non vnum
idēq; medi-
camentū o-
mnibus cor-
poribus me-
deri potest.*

uis corpora occupantibus, medeamur: sed tantū me-
dicantium pharmacorum (vt Galenus ait) esse nu- *Lib. 4. xara*
merum oportet, quantus ipsorum quoque vlcere *viu.*
extiterit. Ergo in curandis eiusmodi vlcerebus a- *Qua in cu-*
5 sanabilibus, supposita eorum natura, & maiori cu- *randis ma-*
iusque minorive à naturali habitu recessu, laborātis *lignis vlc-*
cuiusque corporis habitus ac dispositio diligenti ani- *ribus praci-*
maduersione erit consideranda. Deindē cuiusq; me- *pue conside-*
dicamenti tam simplicis, quā compositi, vis & fa- *randa.*
10 cultas adamussim ediscenda. Quæ scilicet desiccant,
non tamen vlcere sordes abstergunt. Item quæ ab-
stergunt quidem, non tamen probè desiccant, ac que
vtrunque etiā possunt efficere. Sed & accuratè
prospiciendum est, ex quoto quodque medicamen-
15 tum ordine existat, hoc est, an imbecillum, an modes-
ratum, an validum. Atque in vno quoque ordine ma-
ioris minorive ratio attendenda erit. Quod maxis-
mum Galeno censetur, inter ea, quæ ad horum vlcere-
rum curationem pertinet, neglectum tamen (inquit)
20 plerisque medicinalis materiæ scriptoribus. Vnde
solas vniuersales ipsius vires dicere studuerunt: in-
ter quos fuit & Dioscorides, quem nulli eorum, qui *Dioscorid.*
in eadem quasi arena defudarunt, hoc est, de medici-
nali materia scripserunt, secundum esse, vel Galeni
25 ipsius testimonio quisquam dixerit. Sed & qui com-
posita medicamēta tradiderūt, de iis indeterminatè,
& citra distinctionem scripserunt. Neque enim vir-
tutem ipsius medicamenti, an scilicet validissimum,
an moderatum, vel imbecillum esset, explicuerunt:
30 neque difficultatis, aut malignitatis latitudinē ipso-
rum vlcere, aut naturam, habitūve corporum
vlcere laborantium expresserunt: qua nimirum dis-
tinctione omīssa, permultos medicos & chirurgos,
interdū benè, interdū malè, ipsis pharmacis, quæ
35 posteris scripto reliquerunt, vti contingit: ideoq;
nonnunquā scopum mirificè adsequi, interim ab
illo errare, aliò delabentes. Itaque non iniuria tam
veteres, vt Andromachus, Crito, Asclepiades, quā
recen-

*Qui de me-
dicamētis in
determina-
tè, & cura
distinctionē
scripserunt,
erroris occa-
sionem aliis
dederunt.*

recentiores scriptores accusandi veniunt, qui sine vlla distinctione remedia scripserunt ad dysepulota, id est, cicatricem difficulter recipientia: item ad cacothē, id est, malefica, siue maligna, & contumacia vlcera: plurima enim ex iis sunt virtute inuicem longe diuersa. Siquidem nonnulla horum vehementiora sunt, alia moderatiora: quædam verò imbecilliora. Adde, quod & alia vlcera (vt diximus) magis, alia minus dysepulota, & difficilia, maligna quæ sunt. Sed nec corpora omnia eius generis vlceribus scatentia, eiusdem prorsus (vt paulò antè dicebamus) naturæ ac dispositionis reperiuntur. Quare neque eadem omnino medicamenta desiderant. Itaque ad maligniora vlcera, & corpora duriora ac robustiora, valentioribus vtendum erit remediis: ad mediocria verò, & molliores ac delicatiora corporum habitus, imbecillioribus. Merito igitur (vt initio quarti libri de compositione medic. κατὰ γένος scribit Galenus) omnes, qui vnum duntaxat medicamentum vlceribus malignis cicatricem inducere promittentes habent, successu crebrò frustrantur. Nam duo (minimum) quæ idem pollicentur, eandemque facultatem ostendunt, diuersa alioquin inter se non simpliciter maioris minorisque, verum (vt inquit ille) maximi ac minimi ratione, in promptum adesse illi conuenit, qui omnia id genus vitia curare proposuerit. Nos itaque deinceps pharmaca, primum quidem simplicia, deinde composita recensebimus, ac etiam seriatim enumerabimus, quæ vlcera (de quibus nobis hic sermo est) citra demorsum, & manifestam exasperationem exiccare possunt. Cæterum cum variè (vt iam sæpius dictum est) inter se differant, in eo quòd magis minùsve siccent, expressam eorum mentionem faciemus, quæ validè ac vehementer, quæ moderate, & quæ obscurius seu imbecillius exiccent: à metallicis, Galenum secuti, incipientes: quibus etiam terræ species adnumerantur. Siccant igitur modicè lemnia sphragis, siue lemnium sigillum, ita

Ordo dicendorum.

Moderatè
siccantia

ita quidem cognominatum ob impressam illi sphra *simplicia.*
 gida, hoc est, sigillum Dianæ sacrum: nos & terram *Lemniū si-*
 figillatam eam vocamus. Et cadmia, quam climiam *gillum.*
 & cathimiam nuncupant. Hæc autem pluribus dein *Cadmia.*
 5 ceps diebus sub canis feruore ex aceto trita, aut vis
 no planè giluo, & substantia pellucido, facultatem
 acquirit magis siccantem. Quòd si ex acri aceto tes
 ratur, siccataq; reponatur, vlceribus valdè etiam ma
 10 gnis, Galeno & Aëtio commodè inspergitur. Valen
 tius cadmia & lemnio sigillo, hoc est, terra sigillata,
 pharmacum est chalcitis (quæ species est vitreoli, *Chalcitis.*
 apud Arabes colcotar, chalcadis, & zegi nuncupa
 ta) combusta, in cadmieq; morem trita, atque in pul
 15 uerem redacta, & postea exiccata. Nam cruda, hoc
 est, ignem non experta, tanta pollet efficacia, vt iam
 crustas inducat. Lota quàm vsta minùs desiccatur, mis
 nusq; mordax reperitur. Persimile quoque medica
 20 mentum est ærugo cremata, quæ & æris ærugo etiã
 dicitur, & vulgò hodiè ab omnibus viride æris. Nō
 combusta autem nimis efficax medicamen est, sicuti
 & chalcitis, quæ ignem non experta est. Verùm hæc
 (chalcitis inquam) nonnihil etiam adstringit, & ea
 multò magis adhuc chalcantum, id est, atramentum
 25 futorium, quod inter metalla maximè siccatur. Misf
 autem & sari chalcitidi genere cognata sunt, ex vi
 na, vt ita cum Galeno dicam, radice producta. Itaq;
 que tria hæc (quæ sub vitreoli genere comprehen
 30 duntur) maioris tantum, & minoris ratione differ
 runt. Stibi siue stibium, quod Græcis *σιψι*, vulgò
 autem in officinis antimonium dicitur, magis quàm
 sari desiccatur, & adstringit. Porro diphryges appel
 35 larum pharmacum, vlceribus ægrè humiditatis vi
 rio ad cicatricem venientibus aptissimum est. Valis
 dè enim desiccatur, tametsi modicè mordax sit. Adhuc
 præter acrem tum, qualitatem, tum potentiam, vim
 habet adstrictoriam: quas tamen vtrasque fortiores,
 & chalcitis cruda, & chalcantum, id est atramen
 tum futorium, representat. Omne quoque aluminis *Alumen.*
 genus

Erosio metallicis p combustionem edomatur.

genus vlcera exquisitè desiccant, & generosè adstringit. Vnde nemo (inquit Galenus) solis his ad vlcera vtitur, sicut nec cruda chalcitide, & æruginè: vsta verò & hæc, & mysi vtilia sunt: vt elota morsum quidè remittunt, verùm minùs siccant. Illud enim metallicis omnibus commune est, quod combustis elotisq; erosio, quæ priùs adfuit, edomatur, ac interit. Quamobrem his sic crematis & lotis vti quis dem licebit in pueris, eunuchis, mulieribusq; præsertim candidis, imò etiam & viris, qui cutè alba videntur, & molli carne naturà sunt præditi. Item in eis, qui ad sentiendum habiles admodum sunt, & plethora, vitiososq; succo laborant. Taliū enim corpora faciliè ex morsu, seu rosione phlegmonem accerunt. Itaque cum permulta corpora, quibus mederi cogimur, vnā quandam dispositionem habeant,

Tutius est lotis metallicis, quàm non lotis vti. Sarcocolla. Ichthyocol-la. Chrysocol-la. Plumbi combustum. Scoria plumbi. Squamma ferri. Squamma æris.

qua vehementem commorsum ferendo nō sunt, tutius est lotis, quàm non lotis vti. Cæterum alia, præter hæc metallica superiùs commemorata, plurima adhuc simplicia sunt pharmaca, quæ malignis vlceribus curandis sunt idonea. Sarcocolla nanque, & ichthyocol-la, id est, glutè pisciū, & his magis adhuc chrysocol-la, quam auri glutinum appellant, tali facultate prædita sunt. Huc etiā optime faciunt, plumbum combustum, plumbiq; recrementum, quod Græci vocant, & vulgus cacaturam: siccant & ferri squamma, præsertim stomomaris, id est, partis ipsius squammæ subtilioris, hæc enim probe siccant. Porro æris squamma, ex malleorum percussionibus decussa, quæ Græcè λεπίς χαλκοῦ, vulgò autem baritura æris dicitur, præter quòd siccant, etiam abstergit, purgatq; Galeno & Aëtio, vnde pura quoque vlcera efficit, quod reliquæ squammæ præstare non possunt. Itaque si hæc omnia medicamenta arida vlceribus malignis ac contumacibus insperseris, mirificè (inquit Galenus) videbis citra erosionē ea desiccari, sicut vbi buccinorū, purpurarumq; , ostreorum [sepiarum] aliorumq; id genus ostræ

ostracordermorum piscium testas concrematas, & *Ostracoder-*
 (vt addit Aërius) lotas adhibueris. Vitrum combus- *morū teste*
 stum leuiter ac sine morfu exiccat, hinc dy sepuloris, *concremate.*
 id est, cicatricem difficulter admittentibus, non item Vitrum com-
 malignis, ac rebellibus conducit: quippe minū exic- *bustum.*
 cat, quā illa requirunt. Cæterū galla omphacis *Galla om-*
 ris, hoc est, immatura: & malicoria, id est, mali Pus *phacitis.*
 nici corticis seu putamina, cremata, & arida apposit, *Malicoriū.*
 10 ra, ad malefica & quæ malè coalescunt vlcera, effica-
 ciūsimum medicamentumprehenditur. Hæc enim
 non solū siccandi, sed etiam adstringendi potestatem *Cortex cap-*
 habent. Cortex etiam capparis tritus, & aridus ma- *paris.*
 lefico & putrido vlceri vtilissimè imponitur Aëtio, *Astati ex-*
 15 Malum terræ, quod Græci aristolochiam appellant, *iccantia.*
 iris, acorum, arthemisia, panacis radix, argemone,
 chamæleontis nigri radix, cyperum, dracunculus, &
 gladiolus affatim exiccant Galeno. His euidentius
 adhuc centauryum, & polium: quibus paulò imbe-
 20 cillior est terra nomine eretrias, quæ Auicennæ & *Terra ere-*
 aliis sectæ Arabicæ scriptoribus, cambil nominatur, *trias.*
 Talis sanè medicamentorum simplicium, ad dy ses- *Cambil.*
 pulota vlcera, maligna ac contumacia, materies exi-
 stit, quibus & humorum fluxionem intercipere, &
 25 locum vlceratum valenter, citra demorsum tamen
 atque erosionem, exiccare possis. Quomodo autem
 simplicibus eiusmodi medicamentis siccis modò cō-
 memoratis, in vlceribus ad cicatricem ægrè veniens-
 30 ribus, & malignis vtendum sit, ex Galeno & Aëtio
 requirendum est. Porro ex his suprā memoratis
 simplicibus pharmacis, Galenus libro quarto de cō-
 positione medicamentorum secundum genera, vas-
 rias remediorum formulas, nempe cerata, vnguenta
 35 emplastra, & pulueres conficit, quæ ad eiusmodi ma-
 ligna, & ægrè ad cicatricem venientia vlcera, mirè
 proficiunt. Ex cuius quidem scriptis Auicennas for- *Vnguentum*
 mulam vnā medicamenti desumpsit, quā magno *Auicē. longè*
 perè Guido à Cauliaco, & illius ætatis chirurgi ces- *optimum.*
 lebrarunt. Recipit autem cadmia, aluminis, chryso-

386 Institut. Chirurgicarum, Lib. III.

Aerugo, vel æris ærugo, est viride æris.
collæ, id est, glutini auri, singulorum partes octo, floris æris, qui sponte ex ære profilit, & corticis æris, hoc est, æruginis, quæ in officinis viride æris nominatur, & Græcis ἰὸν ἐν σάπῃ, vstorum ana partem vnā, gummi cupressi, partes quatuor, ceræ, olei rosacei, aut myrtini ana quantum satis esse videbitur, fiat vnguentum. Caterum, cum vnum omnibus medicamentum (vt frequenter dictum est) commodè adaptari non possit, tutiorq; sit leniorum pharmacorum vsus, mordaciorum verò periculosior, composita medicamenta distinguere hoc loco describam, quæ ad dysepulota, id est, cicatricem difficulter recipientia, inueterata, contumacia, maligna, & chironia vlcera, ex Galeni sententia bene faciunt: primumq; mitiora ac moderatiora referam: deinde validiora, ac potentiora subiiciam.

Andromachi emplastrum ad vlcera dysepulota, id est, ægrè ad cicatricem venientia, sed nondum maligna, quod probatur Galeno.

Diphrygis denarium pondo quatuordecim, argenti spumæ, denarium pondo quadraginta, ceræ denarium pondo quinquaginta trium, olei myrtei pondo vnciæ decem.

Aliud eiusdem generis mitissimum & lenissimum.

Eloti plumbi denarium pondo duum, spodij denarium pondo quatuor, cadmiæ tantundem, diphrygis denarij pondo vnus. Ea omnia excipiantur terebinthinæ denarij sex.

Aliud cicatricem obducens, imbecillius autem, quam vt cacoethe persanet.

Compositio hæc capit, molybdenæ, id est, plumbaginis, drachmas quinque & viginti, diphrygis drachmas quatuor, sorios [aut vitreoli] drachmas duas & semissem, misyos tosti drachmas duas, terebinthinæ drachmas nouem, ceræ & myrtei

tei vtriusque drachmas decem. Porro in omnibus eius notæ pharmacis, illa quæ liquari possunt, liques facta & refrigerata, deindè rafa siccis diligenter in puluerem redactis admisceto. Nam si liquida ipsis affundas, sæpe fient grumicera modo maximè cùm frigus fuerit. In sole feruenti si mistura fiat, licet ea superfundere: mouendo vehementer rudiculâ primū deindè cochleari. Præstat autem in hisce omnibus
 10 (inquit Galenus) rudiculam palmæ esse ramusculū.

*Aliud medicamen epuloticum, id est, cicatricem ducens, optimum quod δὲ λανάνος, id est, ex ladano inscribitur, ad
 15 Critonem relatum, callosis, veteribus, & curatu difficilibus Vlceribus apprimè idoneum.*

20 **P**lcis aridæ denariū pondo viginti quinque, æris
 ginis rafa denarium pondo octo, æris combusti
 denarium pondo quinque, squammæ rubræ des
 narium pondo octo, ladani vncias tres, vini optimi
 sextarium semis, quod capit vncias duodecim Oris
 basio. Conuenit etiam hoc medicamentum prætu
 25 midis vlceribus & cauis. Deligatum verò membrū
 in diem quartum continendum est. Argenti spumā
 & oleum coquito, donec aliquam spissitudinem ac
 cipiant: deindè squammam æris, æruginem diu con
 fluxerint, vt colorem bonum acquirant, mox picem
 30 adiecto. Posteaquā refrigeratum fuerit, ladanum
 ex vino tritum: obseruans, ne ex hoc adiecto, efferve
 scat. Postremò suprà moderatū ignem vnita con
 fundito subigito.

*Mediocre medicamentum ad moderatè
 35 maligna Vlcera idoneum.*

Accipe æris combusti, & æruginis, vtriusque
 vnciam vnā, aluminis scissi, vel scissilis
 (quod vulgò in officinis alumen de pluma
 appellatur) semunciam, ceræ vncias duas semis: hoc

388 Institut. Chirurgicarum, Lib. III.

pharmacum temperatum est, & medium facultate.

Porro minus mordebit medicamentum, leneq;
prorsus efficietur, si loco aluminis scissilis diphry-
gem acceperis, & æruginem cōbustam appofueris.
Quòd si expurgare sordes statueris, aris squammæ
semuncia addetur. Hæc autem pingui cera & recens
ti excipienda sunt. Quòd si siccior paulò fuerit, quā
vt commemorata excipiat, temperandum est oleum
myrteum, quo mollescat: vel melinum, quod oleum
de cydoniis appellant: vel ricininum, quod vulgò in
officinis oleum de cherua nominatur: vel omotribes
vetus. Aut si omninò nihil oleosum medicamento
adhibere placet, laricem resinam admisceto: cuius si
copia non est, terebinthinam assumito.

*Aliud validius medicamentum ad chironia vlcera, id
est, non mediocriter, sed maxime maligna
contumaciaq;, ex Asclepiade.*

Aris squammæ, & æruginis rasæ vtriusque
pondo vnciam, ceræ selibram, hoc est, vncias
sex, resinæ laricis, vel si eius copia non est ter-
rebinthinæ, pondo vnc. & semissem. Ea quæ liquari
possunt aridis affunduntur. Quibus acceptis, ac cu-
rriose mollitis vtor. Item platysma (hoc est, lintē
latum, cui emplastrum illitum sit) exiguum soli affe-
ctæ parti, vt vlcus tantum comprehendat inicito.
Cæterum ambiētes particulas, pharmaco quod phle-
gmonem arceat, circundare oportet, atque inter cu-
randum tertio quoque die soluere expedit, deinde
fomentis mitigare, ipsumq; emplastrum, quod ala-
titudine platysma vocatur, abluendo emollire, ac
rursus (vt iam suprà diximus) imponere, donec cicat-
ricem inducere incipiat. Porro mediam, ac (vt Gale-
ait) symmerriā habebit tēperiē, vt etiā modicè mali-
gna curet, si nō tripla, vt in præcedenti descriptione
sed quadrupla ceræ portio metallicis, squammæ scis-
siles & ærugini, commixta fuerit. Sed moderatius
adhuc extiterit, si quincupla adiciatur, vt nondum
cacoethe

cacoëthe, sed ægrè cicatricē ducentia perfanet. Itaq̃ cum auxiliū ad aliquid spectet, ac mollius pharmas cum ad moderatiora cacoëthe, id est, malefica, magis quā vehementius conducat, satiū fuerit in vlceribus non ita in malignis & contumacibus cerā quas druplam, vel quincuplum amborum simul metallis eorum esse, vt rectè Galenus admonuit.

*Aliud Pharmacum vehemens & mitigatorium
ad cacoëthe, Andromachi.*

10

CEræ tyrrenica (vel eius loco pinguis & recē-
tis, optimæ) drach. octo, seui taurini, terebin-
thinæ, plumbi vsti, singulorū drachmas quas-
tuor, linamentis excepto vtitur.

15

*Ad desperata vlcera, quorum scilicet curationem plæ-
rique aggressi, non absoluerunt, sed tanquā ab insanabi-
libus destitute, emplastrum admirandum, cui autore Gale-
no) cum propter alia, tum quoniam longo experimento pro-
batum est, multum confidere oporteat.*

20

Sorios [cuius loco vitriolum sumi potest] drach. In codice
viginquatuor, aluminis scissilis [quod vulgò *Græc. Gale.*
25 Salumen de pluma nominant] calcis viuæ, malico-
rū [id est, corticis mali granati] singulorū drachmas
sexdecim, thuris, gallarum immaturarum, vtriusq̃
drachmas vigintiduas, ceræ drachmas centū viginti
seui vitulini, vel si eius copia non sit, veteris suilli,
30 quam axungiam vocant, drachmas centū sexaginta
olei veteris heminam, hoc est, vncias nouē. (Aëtius
assumit olei antiqui libram vnā.) Arida trita, &
tenuissimō cribro excussa, denuò simul terito. Quæ
deindè, his quæ liquari oportet, liquatis, & ab igne
35 remotis, permisceto. Cumq̃ omnia probè vnita fue-
rint, alumen, thus, seri, calcem, singula prius è vino
adstringenti trita adiicito, & vtitur. Dum Galenus
medicamentum hoc conficeret, oleum & adipem

*Græc. Gale.
& Aëtij
hæc pondera
reperiuntur.*

*Hemina,
Gratio cory-
le dicta, cōti-
net oleum vnc.
9. vini 10.
mellis 13.
Oleum, &
adeps anno-
rum 40.*

quadraginta annorum adiciebat, atque ita semper diuturna vlcera, præter modum maligna ac deplo-
rata, opinione melius sanauit. Eius autem generis
sunt ea, à quibus pars affecta in tã vitiosum, ac de-
prauatum habitum ducitur: vt sanguinem probè
etiam coctum, qui ad eam nutriendi causa defertur,
mutet corruptaq; , vel id quod influit, adeò caco-
chymum existit: vt etiam si pars nihil passa fuerit,
ab illo certè ipso solo erodatur. Hoc itaque medica-
mento quod noxium est transmutatur: atque discus-
titur. Satiùs autem fuerit cacochymiam prius con-
uenienti medicamento expurgare deinde (vt suprà
is monuimus) vlceris curationem aggredi.

Aliud Galeni, ad chironia vlcera in mollibus corporibus. 15

Ceræ libram vnā cerussæ vncias octo, rosacei
libram vnā salis ammoniaci vncias quatuor,
squammæ aris vncias duas, thuris aluminis,
æruginis malicoriæ calcis viuæ singulorum vnciam 20
vnā: quæ liquari debent, liquata, & frigefacta, ari-
dis è vino tritis admisceto, atque placidiori igne des-
coquito. Caterùm innumeræ propemodū aliæ for-
mulæ compositorū medicamentorū ex veterū scri-
ptis à Galeno libro quarto de compositione medi- 25
camentorū secundū genera referūtur, quæ ad dys-
pnotia, cacoëthe, inueterata & chironia vlcera per-
sananda apprimè idonea sunt. Ex illo igitur libro,
veluti è sylua quadam remediorum rationalis quis-
que medicus: & qui methodum ab eo illic traditam 30
artificiosè didicerit, idoneam vlceri: quod curandum
suscepit: remedij formulam sibi deligere poterit,
atque hac solus vti sciet. Porro nonnullas, easdemq;
ex ipsis præcipuas, exempli gratia hoc loco adscri-
psimus, quo magis lectori ad manum essent, & in 35
particularibus, non vniuersalibus solis contentus,
exerceretur. Sed iam tempus est, quartam curandos
rum vlcerū in vniuersum intentionē persequamur.
Quarta

Quarta igitur intentio curādorū vlcerū cum aliis dispositionibus complicatorium: quæ ablata, & (vt loquuntur) rectificata dispositione agglutinationi seu cōsolidationi repugnante, loci vlcerati cū rationem nos aggredi debere suadet, iisdem omnino intentionibus & modis perficitur: qui suprà dicti sunt in curatione vulnerum cōcauorum, in quibus substantiæ aliqua deperditio facta est. Proinde methodus ad curandi ratio: quæ illic à nobis tradita est, in memoriam reuocanda erit. Itaque cū tanta sit curationis vlcerum: cum vulnerum atque etiam apostematum curatione communitas ac conuenientia, nil mirum, si Galenus multis locis eorum tractationem ac doctrinam commiscuerit. Cæterum his ita ad vmbilicū deductis tempestiuum est, de propriis ac (vt dicūt) famosis vlcerum differentiis pertractemus, inter quas primum se offert vlcus, quod virulentum & corrosiuum appellant.

20 *De propriis ac (vt loquuntur) magis famosis vlcerum differentiis, & primo de vlcere virulento, & corrosiuo, quod Græci nomodes, id est, exedens appellatur.*

C A P.

XV.

25 **Q**uid sit vlcus virulentum seu saniosum & vlcus corrosiuum, siue arrodēs, quid item ambulatiuum, & depaſcens siue manducans, quod Græci *vomēis* appellant & quomodo hæc inuicem dissideant: in
30 definitionibus differentiarum vlcerum: abundè est explicatum. Excitātur aut̃ eiusmodi vlcera à prauis humoribus: sed præsertim biliosis acris, & mordacibus, qui propter aduſtionē, cacoethiam quandā hoc est, malignitatem acquirunt. Atq; hæc magna
35 ex parte oriuntur post herpetas, & pruriētes pustulas, quas acris, & biliosus humor excitauit: atque etiam post vulnera: quæ mordacibus medicamentis exacerbata atque irritata fuere. Cæterum vt ad

Cause.

392 Institut. Chirurgicarum, Lib. III.

Curatio *ut* perfectam sanationem perducantur eiusmodi vlceris excedentis. *ra*, triplici egent auxiliorum genere, sicuti & plaraque alia, nempe victus ratione proba, & conuenienti purgatione, quæ succo prauo acri, & erosionem in affecta particula excitanti sit accommodata, & loz

Hypothesis. *ex li. 4. thes.* calibus remediis. Age igitur, esto aliquis, qui sanus quidem sit, hoc est, omnia naturæ munia inculpatè exerceat: sed ex scabenda de repente quapiam particula, veluti brachio, postulat statim excitarit, mox eadem ipsa particula iterum atque iterum pruritu ¹⁰ vexetur pustulaq; dirupta vlcus decolor, & inæqualiter erosum gignatur, atq; hæc in tribus quatuorve diebus à principio inciderint. Hac itaq; hypothesi posita, dicat mihi hoc loco quispiā: quonā pacto sanare huiusmodi vlcus conueniat? Certè vt eius curationē feliciter assequaris, imprimis qualis sit totius corporis tali vlcere laborantis affectus, statim tibi erit cōsiderandū. Inuenies namq; tū ex vlceris ipsius symptōmatis, id est, accidētibus, tū ex notis quas totum corpus præseferet, cuius maximè generis sit is ²⁰ qui redūdat succus. Atq; hñc (si Gale. cōsiliū sequearis) idoneo purgante medicamēto protinus educes, nec protrahes, dū totus hominis cubitus affectum quendā contumacem rebellemq; curationi contrahat, quemadmodum facere solebant Thessali sectatores, ipsius videlicet præcepta mordicus obseruantes. Præcipitur nanque ab omnibus ferè (inquit Galenus) antiquis medicis, quicumque ratione quadam ac methodo de vlcerum curatione scripserunt, causas quæ illa creant abscindendas esse, æquè profectò vt cæterorum omnium morborum. Itaque hoc tibi tanquam commune præceptum esto, omnino in omnibus morbis nedum vlceribus, in quibus effectrix causa adhuc manet, ab hac inchoandam curationem esse. Hinc rectè monebat Galenus libro de ³⁰ cimetertio methodi medendi digerentia, hoc est, resoluentia, seu discutientia medicamenta, nequaquam particulis quibusdam applicanda esse, vbi redun

A purgatio
ne incipien-
da curatio.

Lib. 4. thes.

Cōmune de
digerentib.
præceptum.

- redundantia in toto corpore aut superiacente partícula subest. Quippe quòd hæc sic admota implerèr potius quàm educerent. Itaque tunc à totius corporis, aut superabundantiæ mittentis particulæ superiacentis vacuatione incipienda curatio est. Deinde euaporante auxilio vtendum. Facta igitur totius corporis, vt decet vacuatione (vt factum quondam fuit in Romana quadam illustri muliere, quæ herpetem esthiomenum, id est, exedetem, in malleolo primum habebat, qui tandem ad bubones vsque ascenderat) ad curationem particularis affectus, hoc est, ipsius vlceris arrodentis deueniendum erit. Ergo si particulam exulceratam atque arrosam, supra modum calefactam videris, ipsam statim frigidis stypticis deficcantibus refrigerabis. Commodè autem feceris, si vlcus ipsum, & particulam totam vlceratam aqua aluminosa ablueris: hæc enim ablutio magno vsui talibus vlceribus esse solet. Quippe quæ influentes humores potenter repellat, & siccandi facultatem obtineat, vt auctor est Auicennas. Poteris etiam affectum locum irrigare: vel aqua plantaginis & rosarum: vel aqua in qua ferrum candens extinctum fuerit, aut etiam decocto cyperi myrobala norū cupressi, plantaginis malicorni balaufti, quod flos est mali Punici syluestris, & confimilium. Vt autem ab ingruentibus defluxionibus, vlcerata particula vindicetur, optimum fuerit, circuniacentes partes vnguento ex bolo Armenia illinere. In medio verò vlceris, puluis aliquis, qui vim deficcandi habeat apponendus erit: vt ex lithargyro, plumbo vito pompholyge, quæ vulgò rutia dicitur, antimonio, quod stimmi & stibium Græcè dicitur, ære combusto, corallio, lapide hæmatite, spodio lotis. Atque etiam sidiis, id est, corticibus mali granati myrobalanis, & id genus aliis. Item pannorum lacinia in lincamenta formatæ, splenia Græci vocant, vnguento albo Rhafis illitæ, aut vnguento quod sextam partem lithargyri recipiat, in quo omnes consentiunt,

Particularis curatio
vlceris arrodentis.

Aque aluminose vis

Repellens,
& siccans.

Bolus armenia.

Puluis exicatorius.

Horū vnguentorum
formule & compositiones
lib. 6. describuntur.

vel vnguento quod diapompholygos nuncupatur, supra vlcus ipsum dandæ sunt. Cæterum supra eiuz modi pulueres: ac linamenta vlceri imposita, puluilsus, seu puluinus aliquis, quem plumaceolum vocat posca aquosa imbutus adhibendus erit: deinde conueniens deligatura, quam exprimentem nominant, cuius suprà in tractatu de vulneribus meminimus. Guido à Cauliaco in talibus vlceribus solebat post lotionem nullo alio adhibito auxilio apponere laminam plumbi tenuem perforatam, in qua virtus argenti viui, cum aqua plantaginis erat infixa, & ligare ligatura exprimente, quod non est inquit, fas loqui propter idiotas. Itaque tria hæc molybdos, id est, plumbum, aqua aluminosa, & deligatura decenter facta miram, ac ferè incredibilem vim habent, in sanandis eiusmodi vlceribus. Porro deligaturam talẽ esse conueniet, quæ ad vsum magis, quàm ad elegãtem formam conducatur: hæc autem duobus modis fit, nempe vel vnico vinculo seu fascia vna, vel duabus. Itaque si vna tantum fascia fuerit, principio eius versus superiorem vlceris partem statuto neccitenda erit siue sura, siue genu, siue malleolus, siue cubitus, siue manus summa, aut alia quæuis pars laborauerit. At si duabus fascis vti malueris, quemadmodum in fracturis fieri solet, altera à parte affecta, hoc est, ab ipso vlcere, ad superiorẽ regionem fereatur altera deorsum prius ducetur, mox in superiore parte desinet, eo videlicet loco quo prior incepit. Cæterum præter reliqua commoda, quæ ex hac deligatione proueniunt, illud etiam accedet, quod vlceris: quæ ob rotunditatẽ coalescere nequeunt, oblonga reddentur. Solutio autem non singulis diebus: sed alternis facienda est. Neque in solutione vlcus aqua inspergendum: sed molli linteolo, puro, & sicco sanies detergenda. Quod si partes vlceri adiacentes inflàmari videantur, & iam phlegmonodes quippiam repræsentent platysmati exterius plurimo spatio liquidum medicamentum illinere oportet, quale

Nota de plumbæ lamina.

Deligatura duplex.

Deligatura alternis diebus soluenda si partes adiacentes inflàmmentur.

quale est Galeni phœnicinū, hoc est, ē palmulis cons-
 fectum, vel aliquod simile, non quidem quocunque
 contigerit dilutum, sed vino adstringente, quantum
 imbibi poterit. Sitq; oleum quod adicitur refrige- *Olea refrige-*
 5 rans, & adstringens, cuiusmodi sunt myrteum, & *rancia, &*
 melinum. Quod si hæc non adsint, omphacinum, & *adstringen-*
 omotribes nominatum adhibebis. At si durities cir- *tia.*
 ca partes vlceri adiacentes apparuerit, ipsum phœni- *Si durities*
 cinum, seu emplastrum ē palmulis, oleo veteri, aut *adfu.*
 10 ricinino (quod officinæ oleum de cherua nominant)
 diluendum est. Tutiusq; fuerit superpositæ regioni,
 quodpiam ex medicamentis repellentibus liquidis
 adhibere, quo si quid vel prauū, vel plusquā par
 est, influat, regeratur. Atque id maximē, cū in cru-
 15 re vlcus obortū, superpositam venam varicosam ha-
 beat. Quæ dum magna est, ac sanguinem nec colore
 rubrum, nec probum, sed attriorem & melancholis-
 cum continere videtur, excidenda, vt prius diximus,
 auferendaq; est. Cæterū si vlcera eiusmodi admora *Si erosio non*
 20 medicamenta contemnant, indiesq; magis atque *cedat medi-*
 magis erosio serpat, & augeatur, corpus subinde à *camentis.*
 vitiosis succis repurgandum erit, continensq; ipsa
 seu (vt vocant) coniuncta materia depaicens at-
 que arrodens, inustione seu cauterio (vt loquuntur) *vstio.*
 25 actuali absumenda & desiccanda veniet, modolaz-
 borans id genus auxiliij tutum, atque vtile, cæte-
 risq; aliis longē præstantius, non reformidet, ac res-
 nuat. Quod si ferrum candens ob timiditatem, aut
 delicatam nimis naturam pati, atque admittere nos
 30 luerit, medicamenta acriora, & quæ ignis vires
 habeant admouebis, cuiusmodi sunt pastilli An- *Pastilli can-*
 dronis, Musæ, aut Pasionis, in tractatu de tumoris *fici.*
 bus præter naturam descripti: vel trochisci aspho-
 delorum, aut qui calidicon nominantur, quorum for-
 35 mulæ ac descriptiones libro sexto referuntur. His
 etiam atramentum scriptorium, quod & incaustum
 vocant, magna vtilitate admouetur. Quod si hæc
 parū profecerint, arsenicum, quod sublimatū nos, *Arsenicum.*
 minant,

minant, modica tamen (vt alibi dictum est) quantitate, tutò adhiberi potest. Locus autem ambiens, hoc est, circūpositæ vlceri partes, interim refrigeratibus perpetuò muniendus erit, ne tã vehemētibus admotis præsidis, fluxio irriteretur. Porro sine his quidem tã potentibus auxiliis malū aliquandò victū fuerit, nec erosio ipsa depascens quouis modo sisti possit, membrum amputare necessariū est, vt voluit Auicēnas.

De sordidi & putris vlceris curatione. CAP. XVI. 10

Vlcus sordidum & putre.



Vid sit vlcus sordidum, quod Græci rhy paron vocāt: quid item putre, seu putrefactum vlcus dicatur, suprà diffiniuimus. Porro sordidum, & putrefactum vlcus Guidoni dicitur, quod sui malitia (vt eius verbis vtar) putrefa-

Vlcus fraudulentum.

cit membrum, dimittendo viscositatem, aut carnem mollem, siue (inquit) crustosam foetidā, à qua fumus eleuatur foetidus, & cadauerosus. Ac tale quidem vlcus fraudulentum etiam appellant. Cæterum si eius malitia vlteriùs progrediatur, & serpat, in sphacelū

Cause vlcum putris & sordidum.

(quem vulgus esthiomenum vocat) degenerat, & homini vitam adimit. Horum autem vlcum cause sunt, succi prauis, crassis, sanguinis naturam quodam modò resipiscentes, hoc est, sanguinei, qui feruore quodam velut ebullientes, venenositatem, atq; malignitatem quandam indispiscuntur. Et hæc quidem magna ex parte carbunculos maleficos, siue anthracas, abscessus, & vulnera malè curata, consequuntur.

Curandiratio.

Porro talium vlcum curatio consistit in proba vinctus obseruatione, & euacuationibus accommodis, quibus corpus vniuersum ab excrementis, atque à natura alienis humoribus expurgetur. Vbi autem iam purum ab excrementitiis, atque à natura alienis humoribus corpus vniuersum tibi apparuerit, tum particula ipsa laborans, hoc est, vlcerata, cucurbitulis, scarificationibus, hirudinibus, atq; epiz

the

thematis siue fotibus, à corruptis ac deprauatis suc-
 cis ipsam occupantibus, vindicanda erit, vt rectè
 præcepit Auicennas. Post hæc verò propriam ipsius *Sordis ablu-*
 vlceris curationem aggredieris. Sordes igitur pri- *tio.*
 5 mò tibi abluenda erit, aut hydromelite quidè, aut
 marina aqua, vel si eius copia non est, salsa. Deindè *Vlceris muns-*
 mundificandum vlcus, vnguento vulgò Apostolo *dificatio.*
 rum dicto, aut eo quod Aegyptiacum nominatur.
 Post hæc, quidam desuper adhuc dandum esse mor-
 10 nent mundificatiuum aliud, ex absinthij succo, melle
 le rosaceo, myrrha, & farina hordei compositum, &
 circuniacentes vlceri partes, vnguento ex bolo Ar-
 menia illinunt, ac supra cætera prædicta puluillos,
 ex stupis canabinis studiosè pexis, aut ex lineis pan-
 15 nis læuibus, pusca aquosa (quod oxy cratum vocat)
 imbutos apponunt, atque alligant. Si verò sordes *Si sordes in*
 in putredinem, aut corruptionem degeneret, locus *putredinem*
 abluendus erit oxy crato, aut (vt voluit Guido) aqua *degeneret.*
 cineris, vel saponis. Deindè emplastrum ex carnibus
 20 piscium salforum, farina orobi, & aristolochia lons-
 ga, non autem rotunda, & scilla, omnibus ex vino
 coctis, & cum melle mixtis, superaccommodandum
 est. Ad eandem intentionem Auicennas subsequens
 medicamentum describit, multa (vt adfirmat) expe-
 25 rientia comprobatum. Concipit tragaganthi rui-
 bri vnc. vnam, calcis viua, aluminis, corticis granat-
 torum, ana drach. sex, thuris, gallarum, ana drach.
 quatuor, ceræ, & olei, ana quod fuerit satis. Aliud. *Emplastrū*
 Vitrioli partes duodecim, chalcitis (quod & colco- *Auicennæ.*
 30 tar Arabes appellant) partes decem, tragacathi par-
 tes nouem, coquantur in aceto, & ex eis fiat linimen-
 tum. Ac semper quidè vnguentum ex bolo in am-
 bitu vlceris, vt supra monuimus, apponito: desuper
 verò stupeos puluillos oxy crato madefactos. Porro
 35 si vlcera eiusmodi depascentia putridaq;, eousque
 feritatis, & malitiæ deuenierint, vt partes adiacen-
 tes magis atque magis semper erodant, ac sine mor-
 do in illis corruptelam excitent, vehementissimis
 medic

398 Institut. Chirurgicarum, Lib. III.

medicamentis (qualia suprà in curatione malignorū
 vlcere recensuimus) indigebunt. Imò verò frequē
 ter inuisiones, atque etiā excisiones illis erunt ne
 cessarię, ita vt quicquid vitiatum, ac corruptum est,
 prorsus extirpetur, & viua, ac sana duntaxat caro
 relinquatur: quā ex natiuo ipsius colore, & sangui
 nis bonitate, facili deprehendes. Inter cætera autem
 medicamenta acria, quæ viuum à corrupto separāt,
 & in hoc affectu celebrari solent, omnium præstan
 tissimum atque efficacissimum quotidiano experi
 mento deprehenditur arsenicum, quod sublimatum
 vocant, vt aliquoties alibi annorauimus. Hoc enim
 confestim malum sistit, & id quidem sine dolore.
 Quod si medicamentis eiusmodi malum non cesses
 rit, membrum ipsum tali depascente ac putrido vl
 cere affectum, cogimur abscindere, vt cætera pars
 tuta sit. Id autem miserum atque vltimum auxiliū,
 nunquā tentandum est, nisi dum cætera præsidia
 nihil proficiunt, & malo prorsus victa sunt, vt alibi
 admonuimus.

*Arsenicum
 sublimatū.*

*De profundo & cuniculoso vlcere, quod & sinus Latini
 dicuntur.*

C A P. XVII.

*Vlcus caver
 nosum.*



Lcera cuniculosa, seu cauernosa suprà
 appellauimus, quorum orificia stricta
 sunt, profunditas verò in latum se diffun
 dit, & sensui occulta est, multos inters
 dū anfractus habens, modò rectos, mo
 dō obliquos, citra duritiem tamen & callum. Atque
 hoc vno à fistula dissidet, quamuis promiscua tur
 ba, eiusmodi vlcera omnia cuniculosa, fistulas no
 minent: cū tamen fistula propriè vlcus sit altum,
 angustum, & callosum, Galeno, Cel. Aët. & Paulo.
 Itaque quod profundum & cauernosum vlcus res
 centiores chirurgi appellant, id Latini appositè si
 num, Græci colpon nominant. Fit autem cū ad
 iacens vlcerebus cutis, diutiùs subiectis corporibus
 non coalescit, glutinaturq; : cuius multæ ac variæ
 sunt

Fistula qd.

*Sinus quid,
 & eius dif
 ferentiæ mul
 tiplices.*

sunt differentię, nimirũ ex cauernarũ magnitudine,
 situ, figura, ac numero desumptę. Aut enim breues
 sunt, aut altę penetrantes, iuxta carnem desinentes,
 aut ad ossa, vel cartilaginem subeuntes, sursum, deor-
 sum, vel ad latus tendentes, recti aut flexuosi, simpli-
 ces ac duplices, triplicęsve. Galenus autem eorũ dun-
 taxat, quia positionis figura sumuntur, meminit: vt
 qui pręcipuę curandi rationem immutet. Siue enim
 magnus, siue parvus aut brevis, vel altus, aut iuxta
 10 superficiem cõsistens, simplex vel duplex, triplęxve
 fuerit, eadem semper est eorum curandi ratio. At si
 vel sursum, vel deorsum, vel ad latus, vel intrõ ad os
 fa tendit, curationem variat. Cũ enim sursum ten-
 dit, facili per eius os saniosa colluies, atque ipsum
 15 pus effluit. Cũ verõ deorsum vergit, intus retentũ
 pus, aut sanies, cõtiguas partes erodit. Quare nisi fa-
 cto ex aduerso (vt statim dicetur) emissario, nihil o-
 mninõ profeceris, siue carnẽ generare, siue glutinare
 velis. Cũ verõ ad latus declinat, aut iursum vergit,
 20 aut intrõ fertur, sed ita locari pars afflicta potest, vt
 liberẽ sanies, aut pus, e sinu effluere possit, incisione
 ex aduerso facta opus nõ est: sed de his adhuc in ses-
 quẽtibus. Cæterũ causę eiusmodi finuum, seu cu-
 niculorum vlcerũ, sunt abscessus, siue suppurãtes
 25 affectus tardius dissecti, & vulnera perperam cura-
 ta. Pus nanq; lōgo nimis spatio in suppurato absces-
 su, aut in profundo vulnere, quod nõ ritẽ expurga-
 tur, retentum ac delitescens, malignitatem, & velus-
 tiacrem atq; erodentem quandam naturam acqui-
 30 rit, & cuniculos tandem molitur, qui difficilẽ ad-
 modũ carne impleri, & glutinari queunt. Ad affes-
 ctam nanq; particulã, quę iam imbecillitatem con-
 traxit, vndiq; ex circũiacẽtibus ac vicinis partibus,
 imõ verõ & ab vniuerso corpore, superuacanei hu-
 35 mores cõfluũt, atq; ita ægrẽ sanabile redditur vlcus.

Differentię cuniculorum, seu cauernularũ eiusmo-
 di vlcerũ deprehẽdũtur turũdis (quas tentas vocãt)
 & specillis, siue contis (quę probę vulgõ dicuntur)

Quę sinuũ
 differentie
 curandi ra-
 tionem eua-
 riet, & quę
 nov.

Cause si-
 nuum.

Sinuum dis-
 ferentie qui
 bus deprehe-
 duntur.

argen

Iudicia

argenteis, vel plumbeis, aut alia consimili materia factis, in ipsos cuniculos leuiter, ac blandè immisis. Itè minutis quibusdam, atque exilibus radicibus, & cereis candelis, necnon & coloratis quibusdam iniectionibus. Color verò materię, quę ab ipsis cauernis & sinubus egreditur, qualitatem eius manifestè insinuat: si enim tenuis fuerit, & loturę carnis persimilis appareat, calidā esse haud temerè eā iudicabis. At si candida visitur & serosa, indubiè frigida erit. Sed & saniei purissve bonitas, & paucitas, doloris quoque & tumoris, qui prius aderant, priuatio, sinum, carne impleri, & glutinari demonstrant. Si verò contraria his adfuerint, glutinationē nequaquam adhuc fieri nobis indicant: vt Galenus iis verbis nobis testatum reliquit libro secundo de ratione curandi, ad Glauconem. An verò (inquit) altę sinus partes coaluerint, ex manante sanie deprehendes, si ea multa vel pauca, cocta vel cruda sit. Præterea si neque in ipso sinu dolor sentiatur, nec tumor appareat, sed totus locus æquabilis sit, siccus ac doloris expers. Quòd si puris probè cocti portio exigua in ore conspicitur, multò magis de glutinando sinu sperandum est. Hactenus de sinuum differētiis, causis, & iudiciis dicta sufficiant. Itaque tempestiuum est, eorum curationem aggrediamur, & qua poterimus breuitate, nunc prosequamur.

Ratio curandi sinus, seu vlcera profundæ & cauernosi, non tamen adhuc callosi.

In curando
sinu, geminum esse scopum.

Cum sinus, quo de hîc agimus, vlcus sit cauum, & profundum, geminus in eo curando scopus, ac finis medenti proponitur, vnitiō scilicet & repletio. Vlcus enim quā vlcus est, vnitionem, cavitates verò impletionē desiderat. At quę dissident, vniri non possunt, nisi prius cavitatem (si cum vlcere, vt in sinu coniuncta sit) impleuerimus. Ordo igitur curationis postulat, vt à cavitatis impletionē ordiamur. Sed cavitās rursus carne impleri nō potest, nisi labora


- laborans particula & iusto temperamento prædita sit, & sinus ipse omninò purus, & ab omni sorde immunis extiterit. Itaque si vel phlegmone, vel erysipelas, vel gâgræna, vel intemperies aliqua simplex aut composita, partem affectam obsederit, manifestum est, quòd nisi quis illos affectus prius sanauerit implere cauum vlcus non poterit. Fieri enim nò potest (vt libro tertio methodi medendi Galen. inquit) vt in vlcere vel carnis productio, vel sinus impletio, vel agglutinatio, vel cicatricis inductio, rectè vnquã cedat, nisi subiecta caro pro naturali modo se habeat. Adhæc cum in ipsa nouæ carnis generatione, duplex prouenire excrementum necesse sit, alterum quidem crassius, quod sordes propriè appellatur: al-
 15 terum tenuius, quod Græcis *ixwρ*, nobis verò sanies dicitur: ac ex tenui quidem hoc excremento, vlcus humidum reddatur, sicuti ex crasso sordidum: duplicibus sanè medicamentis sinuosum vlcus egebit, antequàm carne repleatur: nempe vt humidum est
 20 siccantibus, vt sordidum expurgantibus seu detergentibus. Ordo igitur sanationis à sorde expurganda in curando sinu incipiet, quòd videlicet nec glutinari quicquàm, nec carne impleri possit priusquàm purum, hoc est, detersum, & à sordibus ritè expurgatum fuerit. Vbi verò iam ab omni alio affectu immunis, & purus ab excrementis sinus fuerit, tum pri-
 25 mum agglutinantibus medicamentis vtendum erit. Hæc autem nec detergent, nec expurgant, vt sarco-
 30 tica, id est, carnem generantia, sed contra prorsus inquit Galenus) substantiam omnem in idem cogunt. Cuiusmodi facultatem habent medicamenta ea, quæ austera & adstringentia vocantur. Hæc enim siccant tantisper, dum humoris redundantiam qui secundum naturam est, absumant. Sed de iis alibi fusius à nobis dictum est. Pone ergo in eadem particula sinu occu-
 35 pata, intemperiem aliquam, vel phlegmonem, aut con- similem affectum, & cauitatem, & vlcus, & sordem simul consistere, ordo curationis exposulat, vt prius

*In nouæ car-
nis genera-
tione duplex
prouenire
excrementum.*

*Vlcus sinuo-
sum duplici-
bus eget me-
dicamentis.*

*Agglutinā-
tiua facultas*

Hypothesis.



402 Institut. Chirurgicarum, Lib.III.

mum phlegmonem aut intemperiem, secundo loco
 sordem, tertio cavitatem, & quarto vlcus persanes.
 Si quidem iusta subiectæ carnis temperies, causæ ra-
 tionem habet, vt quæ concrefcere secum quod vlce
 ratum est, faciat, & cavitatem impleat. Puritas vlce-
 ris, rationem eius sine quo non. Atque hanc sordes
 interpellans, curationem moratur. Habet verò &
 ipsa cavitatis, ad vlcus, rationem eius sine quo non, vt
 libro tertio Therapeutices Gale. annotauit. Quan-
 dō, inquit, nisi cavitatis prius impleta sit, induci cic-
 atrice vlcus non possit. Atque hæc in vniuersum di-
 cta sint de ratione curandi sinus, quod & vlcus pro-
 fundum, & cauernosum nostri chirurgi appellant.
 Cui magna ex parte complicari solent, quæ supra
 commemorauimus. Hac igitur vniuersali metho-
 dō præmissa, particularium ipsorum sinus differentias
 rum (quas curandi rationem variare diximus) sanan-
 tionem subiungamus. Constituatur igitur impar-
 tis sinus ad superiorem partē porrectus, ita vt eius
 orificium deorsum spectet, talis certē non adeo mul-
 tum negotij in sanando faceffet. Quandoquidē per
 os eius faciliē sanies effluer, atque idē promptē con-
 glutinabitur, adhibitis saltem iis, quæ statim dicētur
 auxilijs. Sed neque cū ad latus declinat, aut intrō
 fertur, aut etiam deorsum vergit, incisione ex aduer-
 so facta opus erit, si pars ipsa afflicta ita locari possit
 vt liberē sanies ē sinu emanare queat. Itaque ponat-
 ur sinus, artus aliquos, nempe cubitum, aut femur
 occupare, poterit vtrique declinatus figuratus, citra di-
 uisionem ex aduerso factam coalescere. Etenim in
 cubito cū oræ gibbero vicinæ sunt, summam mas-
 num elatius protendens, sinum ad effluxionem inci-
 tabis. Sic & in femore, si sinus deorsum vergat, &
 ad genu terminetur, os autem ipsius sublime supra
 femoris medium sit, popliti mollem puluinū subiici-
 es, quō demissius inguen quā genu positum sit.

Cæterū si sinus deorsum vergat, aut ad latus
 declinet, vel intrō feratur, & situm affectæ parti cō-
 modum

*Si sinus ori-
 ficium deorsū
 spectet.*

*Incisio ex
 aduerso,
 quādo in si-
 nu fieri de-
 beat, & quā
 dō non.*

*Ex Paul.
 Ex Gal.
 2. ad Gl.*

modum dare non possis, quò liberè sanies effluat,
 nihil vnquam promouebis, siue carnem generare,
 siue glutinare velis, nisi prius collectioni purulentæ
 effluxum molitus fueris. Intus enim retenta sanies
 5 contiguas partes erodet. Porro saniosa illi collu- *Bisariam efflu-*
 uiei effluxum bisariam molliri poteris. Nempe vel *xum moliri*
 factio, tantum in imo sinus, vulnere, vel tota cavitare *posse saniei,*
 dissecta. In imo, seu radice sinus fit sectio, si vlcus ma- *aut puri, in*
 gnum fuerit, & locus totus sine periculo secari non *sinu.*
 10 possit. Præstiterit autem semper, si nihil obstitit,
 totam ipsius sinus cavitatem dissecare, quam ex ad-
 uerso plagam facere. Ita enim facilius, ac citius mul-
 to, ad sanitatem vlcus perducetur. Tota igitur cavis-
 tate dissecta, ellychniis, & pannorum laciniis in lina-
 15 menta formatis, congruisq; medicamentis sic expur-
 gandus, atque resiccandus erit sinus, vt tandem caro
 regignatur, cavitatis impleatur, & ad perfectam sana-
 tionem, modo quo supra de altis, & cauis vulneris
 bus docuimus, perducatur. Cæterum priusquam *Quod mul-*
 20 ex aduersa parte diuisio fiat, purulenta colluies si- *ta puris con-*
 nenda est, magna satis copia in fundo ipsius sinus *pia sinenda*
 colligi, quo sinus parietes magis attenuentur, atque *est colligi in*
 ita melius specillum (suprà quod sectio fieri debet) *sinu sinus.*
 in cavitatem demittatur, sinu scilicet ex puris copia *priusquàm ex*
 25 distento, & ampliore facto. Specillum autem ipsum *aduerso diui-*
 quod sic in sinum immittitur, leuæ, hoc est, minime *datur.*
 asperum esse debet, ac vnctuosum aliquo (vt citra do- *Specillum qd i*
 lorem immitti possit) illitum. Adhæc parte postea *sinu immitti-*
 30 riore perforatum esse decet in modum acus, vt in eo *tur, quale ee*
 imponi possit ceto aliquis (vt vocant) ex stupis ca-
 nabinis, aut aliqua gracili fascia, aut certè funiculo
 quopiam molli, vt canabino factus. Incisione au-
 tem facta, dolor qui per eam excitatus est, sedan-
 35 dus erit, & impetus profluentis sanguinis, oui
 candido, atque aliis id genus suppressendæ san-
 guinis profusioni dicatis auxiliis, compescendus.
 Post hæc autem ceto alius, quando opus erit, des-
 tergente aliquo medicamento imbutus, indendus

404 Institut. Chirurgicarum, Lib. III.

erit, atque vt id commodius fiat, alteri, qui sinū adhuc occupat, aut assuetur, aut alligabitur. Poterunt & ellychnia, seu linamenta in mundificatione aliquo tincta, in sinū ipsum imponi, superque, atque in ambitu danda sunt, quæ mox infra dicemus. Porro si neque in imo ipsius sinuosi vlcæris, plaga cōmodè fieri possit, neque cavitās tota dissecari, sinus totus eluendus erit collutionibus, primū quidem deterforis, si inhærentem saniem subesse suspicaris: dein de sarcoticis, id est, carnem generantibus: postea vero ad glutinans medicamentum trāseundū erit. Proinde Galenus libro secundo de ratione curandi ad Glauconem, sinum ipsum nunc melicrato solo id est, mulsa, nunc quidem puro vino, nunc verò mulso eluendum esse monet Itaque ad detergēdam, expurgandāque sinui inhærentem saniem, melicratum præferendum est. Sed præsertim in sinu cuius os deorsum spectat, per quod sanies liberè effluat. Huius nanque sinus profunditatem totam, ad glutinationē aptam (vt Galenus inquit) sola reddere potest injecta mulsa. Ad purgandum verò simul & roborandum, vbi scilicet adhuc aliqua levis cuiusdam sordis derelictę suspitio est, vel ipso etiā Aëtio autore mulsum eligimus. At vbi carnem iam in sinu mediocriter reformatam, omninò puram esse coniecerimus, & glutinationem quærimus, vino puro subadstringente sinum ipsum eluimus. Vinū enim eiusmodi, quod medium est inter dulce & adstringens, leuiter glutinatur. Si autem cruentus foetidusque sit humor, qui in sinu excernitur, oxymeli (Aëtio autore) cæteris præstat. Auicennas & quidam alii sinum præsertim maligniorem, & vehementer sordidum detergent, & eluunt, aut lixiuio, aut marina aqua, aut etiam aluminosa, quæ in hoc affectu præstantissima est. Hæc enim præterquàm quòd potenter sordes abluunt, a parte quoque affecta fluxionem arcet, & repellit. Albucasis chirurgus insignis vnguentū Aegyptiacum, cū aqua & melle liquatum, in sinum eiusmodi, deter

*Si neque ap-
tio in imo,
neque cavi-
tas tota dis-
secari possit.
Sinus quibus
liquoribus
abluendus.*

Melicratum

Mulsum.

*Vinum sub-
austerum.
Oxymeli.*

*Aqua alu-
minosa.*

10

15

20

25

30

35

deterfionis & corrigendę malignitatis gratia immit-
 ti iubet. Galenus quoque, vbi sinus ipſe, aut ſitus,
 aut alterius cuiuſius occaſione, ſordidior aut humi-
 dior eſt, medicamenta, quę valentius quàm muſſa
 5 deſiccant, & detergent, admouenda eſſe iuadet. Cuſ
 iuſmodi eſt medicamentum ex combuſta charta cõ-
 poſitum, quod ad hunc modum temperatur. Squās
 10 mæ, gallæ, myrrhæ, ſingulorū pondo denariū octo,
 ſandarachæ, arſenici, elaterij, id eſt, ſucci cucumeris
 agreſtis, ſingulorum pondo denarium quatuor, thu-
 ris pondo denarium trium, atramenti ſutorij (quod
 15 Græci chalcanthum vocant) tantundē, chartæ quan-
 tum ſatis eſt ad inducendum colorem. Debet autem
 exigua eiuiſmodi medicamenti portio largo roſaceo
 miſceri, quò & eius vehementia remittatur, & per
 anguſtum foramen, in ſinus profundum, per fiſtulā,
 aut æneam, aut corneam, recto ductu foratam poſſit
 iniici. Iniecto autem medicamento, vlceris oſlinas-
 20 mento concerpro claudendum eſt, ne id reſſuat. Niſi
 enim diutius maneat, exiccare non poterit. Cæterum
 ſi vlcus calidum fuerit, hoc eſt, calidam intemperie
 ſibi adiunctam habuerit, & virus ab ipſo ſinuſo vl-
 cere manans, rubrum & loturæ carnis recenter ma-
 25 ciatæ perſimile appareat, non alienum fuerit ipſum
 abluere melicrato, hoc eſt, aqua muſſa recēti, in quo
 lenticula, hordeum, roſæ, & balauſtium incocta fue-
 rint. Si verò vlcus frigidum ſit, & ſanies tenuis &
 30 aquoſa conſpicitur, muſſa in qua incocta ſint, mar-
 rubium, abſinthium, pimpinella, & myrrha eluen-
 dum eſt. Porro vbi ſic ab omni ſorde pueros ſinus eſſe
 fecerimus, carne replentibus medicamentis ſarcotici-
 ca Græci vocant ſi caui ſaltem fuerint, deindē glutin-
 35 tantibus, & tandem cicatricem inducentibus, ſimi-
 liter reliquis vlceribus vtendum erit. Carne autem
 replent, quę humiditatem ſiccant, & ſordem deter-
 gent. Itaque, idem medicamentum primariò atque
 ex ſeſe ſordis deterſorium Galeno appellatur, alte-
 ro verò ſignificatu ſarcoticum & glutinās. Quippe

*Medicamen-
 tū ex char-
 ta cõbuſta.*

*Si vlcus ſi-
 nuſum calis-
 dum fuerit.*

*Si vlcus ſi-
 nuſum fri-
 gidū fuerit.*

*Idē medica-
 mentū deter-
 ſoriū, ſarco-
 ticū ex glu-
 tinans.*

quodd tali imposito medicamēto, vlcera carne replētur, ac coeunt. Opus enim ipsorum proprium est (vt alicubi scripsit Galenus) affectam partem recrementis vacuare, ne videlicet sanies carnis generationem glutinationemq; impediāt. Sarcotica igitur detergendi etiā vim habent, sed omnis rosionis seu morisuse expertem. Finis autem glutinantium est, nullam inter coitura subnascentem humiditatem permittere. Glutinatio nāque (vt tertio methodi Galenus ait) vnum id propositum est, vt eius quod secundum naturam est, redundantia consumat. Epuloticorum verò, id est, cicatricem inducentium medicamentorum finis est, non hanc totam subnascentem, ac redundantem humiditatem impedire, sed etiam nunc consistentem, in iis quæ mox cicatricem ducent, consumere: adhæc callo obducere, & adstringendo indurare. Sed de iis in antidotario fusiùs dicemus. Ergo (vt ad propositum reuertamur) si cauus sinus carnem requirat, primum medicamenti, quod charta constat, aridi, paululum cum multo rosaceo inferi conuenit. Deinde carpto linamento os obturari. Inde emplastrum Isis aut Machæronis, aut simile quoddam, vnā cum rosaceo cerato liquidiore solutum intucitur. Vbi verò mediocriter carne repletus est sinus, aliquid ex glutinantibus medicamentis, non vehementer siccantibus adhibendum est, quod crescentem tenellam carnem blandē, & sine morfu cogat, non aliter ac si recens ac cruentum vulnus curaretur. Curatur autem hoc mollibus, blandis, minimēque dolorem excitantibus medicamentis, qualia sunt enhæma, quorum opus seu facultas est coniungere, & diuisas partes conglutinare, vt in pristinam vnitatem particula reducatur. Multa (inquit Galenus) eiusmodi medicamenta inueniuntur, alia quidem ex bitumine confecta, vocanturque nescio qua ratione, vt idem ait, emplastra Barbara: alia verò, quia fului & fusci sunt coloris, cyrrha, & phæa nomi

*Sarcoticorū
facultas.
Glutinantium
finis.*

*Epuloticorū
finis.*

*Siccaus si-
nus carnem
requirat.*

Enhæma.

*Cyrrha, &
phæa medi-
camenta.*

nominantur, ex argenti spuma & ærugineliberalius decocta. Horum autem medicamentorum n̄ misturas, Galenus, Paulus, & Celsus docent.
 5 Sed præstat de hac re interpretis vulgaris Auicennæ *Auicennæ*
 5 verba subiicere. Ad incarnandum (inquit) oportet
 5 quod medicinæ fiant currentes lauatiuæ, cum vis
 5 scositate adhærente, & iniuciantur in eis cum clyster
 5 riis, & immittantur cum ellychniis & tentis. Et nos
 5 quidem iam experti sumus emplastrum Apostolis
 10 cum, id est, Apostolorum, & centauream, quâdo cū
 60 ea implentur, & est mirabilis valde. Succedit huic
 symphyton, deinde iridis Illyricæ radix, postremo
 erui farina, & id genus alia, quæ glutinandi facultas
 tem habent. Porro sequens medicamentū, quod in *Medicamen-*
 15 frequenti est v̄su apud chirurgos, miram vim habet *tum incar-*
 in glutinandis seu incarnandis eiusmodi vlceribus. *nans & glu-*
 5 aqua decoctionis hordei libram vnā, mellis ros *tinans.*
 5 faci vncias tres sarcocollæ drachmas duas, myrrhæ,
 thuris, singulorū drachmā vnā, vini odoriferi vnc.
 20 fex. Coquantur omnia simul vsq; ad tertiā, id est,
 vsq; ad consumptionē tertiæ partis. Quibus & addi
 potest aliquādo aliquid aloës. Cæterū post glutinan
 tis medicamēti impositionem, sola spongia noua ex
 mulso iuxta Galeni cōsiliū circūponenda est, quā
 25 fieri potest mollissima. Eius autē deligatura à sinu *Modus deli-*
 fundo incipiat, & eius ore finiat: fasciarum verò spi *gandi sinus*
 ræ siue circumflexus, sinus profundum sine dolore *post gluti-*
 arctent: ac paulatim vsq; ad os eius elaxentur, eidēq; *natorū me-*
 (ori inquam sinus) indatur medicamentum molle, *dicamenti*
 30 circumducto forinsecus emplastro ad os ipsius si *impositione.*
 nus forficibus discisso: vt sanies effluere possit. Etsi
 fluet autem ē sinu sanies, supposito aliquo alio par
 uo emplastro ad solutionem vsque, quam tertio
 quoque die faciens, hoc ipsum tanquam operculum
 35 circumpositum auferes: relicto eo quod totum am
 bit finum, medicamento. Ideo autem tertio quoque *Tertio quo-*
 die, aut certē citius aut tardius, putres efflagitabit *q; die spon-*
 demenda spongia est: ac paruum emplastrum quod *gia, ac par-*

408 Institut. Chirurgicarum, Lib. III.

ni *empla-* superpositum erat: vt si qua humoris colluuius in
strum de- ore sinus collecta sit, vacuetur exploremusq; an
menda. altae sinus partes coaluerint, an minimè, quod ex
Lib. 2. de ar manante sanie (vt docet Galenus) deprehēdetur. Si
te curat. ad scilicet ea multa vel pauca, cocta vel cruda sit. Itaq; 5
Glauc. altas ipsius partes coaluisse demonstrat, pus coctum
 ac paucum, praesertim si neque in ipso sinu dolor
 sentiatur: nec tumor appareat: sed locus totus aqua-
 bilis sit, siccus ac doloris expers. Cumq; spongiam
 rursus imposueris, rursusq; (vt diximus) adalliga- 10
 ueris, postero vel tertio die soluito, vt dictum est,
 semper linteolum sinus ori admotum permutans,
 quod eodem emplastro illitum, totum os ambitu
 cingat. Neque verò omnino appressum (vt Gale- 15
 nus admonet) esse debet: sed ita: vt per id tota sa-
 nies vacuari possit. Itaque cum secundo vel tertio
 quoque die (vt iam semel atque iterum dictum est)
 spongia: vel paruum emplastrum eximitur, consi-
 derandum multane an pauca, cruda an cocta mate- 20
 ria ad os vlcis affluerit. Deinde expers ne sit, an
 particeps doloris locus affectus, & an tumor reman-
 ferit: aut diminutus sit. Altas enim sinus partes cois-
 se testatur pus coctum ac paucum, praecipueq; si
 dolor & tumor non adsint. Contra multum, & cru- 25
 dum, & cum foetore, & loci humiditate, dolore &
 tumore, nondum coaluisse significant. Neque ve-
 rò (vt scribit Galenus) si primo vel secundo die te-
 nuis quaedam sanies ex sinu manet, de glutinatio-
 ne omnino desperandum est. Saepe enim vis medi- 30
 camenti affectae particulae admoti, ex ipsa cute &
 subiecta carne tenuem humiditatem vehementer
 exprimit, quoties eius qui curatur corpus ita affe-
 ctum est, siue ex natua temperie, siue mala victus
 ratione. Hac humiditate expressa, loca mediocri- 35
 ter resiccata glutinantur. Quod si tertio, aut quar-
 to ab initio die, sanies cruda in ore apparuerit, sci-
 to (inquit idem) sinum non esse glutinatum. Qua-
 re affecto loco medicamentum: quod vehementer
 qui

Note coitio
nis altaru
sinus par-
tium.

- quidem exiccat, sed nec mordeat, nec cutem contrahat, circumponendum est. Cuiusmodi Galeni *Cirrhū medicamentū* medicamentum est, quod à fuluo colore cirrhū dicitur, ex concoctis metallicis, oleo ricinino, quod oleum de cherua appellant, & aceto sine cera confectum. Hoc enim medicamentum (vt idem Galenus testatur) sine morſu vehementer exiccat. Cuius compositio & vsus ex libro secūdo de compositione medicamentorum *κατάγιον* requiri debent. Guido à Cauliaco.
- 10 do à Cauliaco iubet post glutinantis medicamenti impositionem, desuper apponenda esse emplastra, & pannos, aliquo quod habeat (vt eius verbis vtar) rectificare illa illitos. Cuiusmodi sunt, emplastrum *ἀπὸ χαλκίτεως* nominatum, quod à palma Græcè *φοῖβον*, & vulgò diapalma appellatur. Item emplastrum (inquit) nigrum vel flauum cum gallis: & mel coctū cū puluere thuris, myrrhæ, & aloës: vel quædam horum: vel omnia simul: & vinum stypticum crassum, quod grossum vocat. Postea li-
- 20 gare præcipit: vt docet Galenus libro secundo ad Glauconem. Paucis autem interiectis subdit, de tenta (vt loquitur) hæſitasse multos, vt Henricum, & præceptorem suum Bononiensem, quod solida non ponatur, qua saniem (inquit) in loco retinet: sed cannulata, aut duplicata: vt sanies continuè valeat exire: & spongia super orificium ponatur: vt sanies trahatur exterius sugendo. Spongia namque ideo circumdatur atque alligatur: vt exiccat, manantemq; è sinu saniem excipiat, alioqui partem erosuram, aut pruritum excitaturam. Imbuta autem (vt suprà diximus) mulso spongia sit: vt detergeat: mollis ne asperitate lædat: noua verò: vt aqua marina adhuc imbuta partem affectam deficiet. Hactenus de ratione curandi vlceris altri,
- 35 angusti, & cauernosi, non tamen callosi. Nūc ordo postulat: vt de calloso vlcere, seu callo obducto sinu, quàm fistulā nominant, dicamus.

Sinus.

Vum pus in abscessibus sic excoriat particulam: vt continentia à subiectis separet ac diducat, dein eo quomodo-
cunque euacuato, distantia inter se pri-
stinum statum recuperare nequeat, abs-

Sinus degenerat in fistulam.

Fistula quid.

fectio eiusmodi sinus appellatur Galeno, libro de tumoribus præter naturam. Quem si quis (ait ille) non statim curet, callo obducitur, durusq; temporis progressu fiet: nec conglutinare ipsum cum subiectis sibi possibile est, vocaturq; tunc hic affectus propriè fistula, de qua nunc dicere institimus. Est igitur fistula (quam Græci syringa nominant) artus oblongusq;, & callosus sinus, aliquatenus indolens, qui magna parte ex abscessibus parum dextre curatis, oritur: sed & ex aliis nonnunquam vlcerum generibus ac sinibus perperam curatis nascitur. Hæc autem nomen accepit ab harundinearum fistularum translatione, vt Paulus annotauit. Quandoquidem in eis cauitas quædamprehenditur, harundinum cauitatibus similis. Fit autem fistula in omni ferè parte corporis, habetq; quædam (vt Celsus ait) in singulis locis propria: sed de communibus hic dicemus. Differentiæ igitur fistularum plures sunt, sicuti & sinuum, quæ ex situ, figura, numero, magnitudine, & aliis id genus sumuntur. Siquidem aliæ sub cute extensæ sunt, aliæ altius penetrant: aliæ rectæ, aliæ flexæ & tortuosæ sunt: aliæ intra carnem desinunt, aliæ ad ossa, aut cartilaginem penetrant: aut vbi neutrum horum subest, ad interiora perueniunt. Aliæ nervos attingunt, aliæ venas aut arterias occupant. Aliæ præterea simplices sunt, aliæ duplices triplicisque, ab vno ore intus orsæ, quæ tres fiunt, aut etiam in plures sinus diuiduntur. Aliæ deinde facili, aliæ cum difficultate curantur. Atque etiam (inquit Celsus) quædam insanabiles reperiuntur.

Fistularum differentiæ multiplices.

De signis & iudiciis fistularum.

Fistularum dignotiones sumendæ sunt, ab his quæ secundum essentia rationem ipsis insunt, atq; etiam iis, quæ consequuntur accidētibus, & effectibus. A substantialiter quidem inhærentibus, vt ab illo (inquit Guido) corio calloso, & à forma fistulæ instrumentalis, & factitiæ. Callositas namq; cum forma fistulari, essentialis est differentia ipsius fistulæ. Ab accidentibus verò & effectibus, vt à virulentia illa horribili, quæ aliquandò ab ipsa fistula effluit, emanatve. Item à dolore, qui in ea modicus esse solet, nisi dum partes quæ iuxta neruum sunt, occupat. Cæterùm simplicisne fistulæ sint, aut in plures partes diducantur, cognosci potest ex modo puris. Cuius si plus fertur, quàm quod simplici spatio conuenit, plures sinus callosos esse manifestum est. Corporis quoque inquinatio docet, num in plures partes fistulæ penetrarint. Quia sæpe cùm quis aliter decubuit, aliterq; membrum collocauit, pus ferri, quod iam desierat, incipit testaturq; non solum aliū finem esse ex quo descendat, sed etiam in aliam corporis partem eum tendere. Cumq; ferè iuxta sint caro & nervus, & aliqua nervosa: quales ferè tunica, membranaq; sunt: genus quoq; puris docebit, num plures sinus intus diuersa corporis genera perrosent. Siquidem ex carne (inquit Celsus) pus læue, album, copiosius fertur. At ex nervoso loco coloris quidem eiusdem, sed tenuius, & minus. Ex nervo pingue, & oleo non dissimile. Cuius sententiæ refragari videtur Aëtius, sic de nerui fistula inquiring: Humor indè delatus tenuior est, ei similis, qui ab ossibus defluit, non quidem oleaginus, aut pinguis, sed saniosus & glutinosus. Sed & ex aliis notis, quàm ex pure, deprehenditur nerui fistula, nempe dolore: stuporis enim punctionisq; sensum incutit. Deindè motus, qui ab eo nervo perfici solet, deterior apparebit. Sed in specillo attractu (inquit Aëtius)

*Fistularum
notæ à qui-
bus petan-
tur.*

*Quibus no-
tis deprehen-
datur, sim-
plex ne sit fi-
stula, an
multiplex.*

Lib. 4.

Aëtius.

*Nerui in fi-
stula erosi
notæ.*

412 Institut. Chirurgicarum, Lib. III.

Vene atque arteria erosa signa. Aëtius) molestus acutusq; sensus redditus, rē manī festissimē iudicabit. At fistula locum erodente, si *Fistula specillo maxīe explorāda.* na suberit, plurimus crassiusq; sanguis effunditur. Sin arteria aperiatur, tenuis & flauus cum multo spiritu stridoreq; exhibit. Ante omnia autem (vt *Os cario- si nota.* rectē cōsuluīt Celiū) demitti specillum in fistulam conuenit: vt quo tendat, & quā altē perueniat, scire possimus. Simul etiā protinus humida, an sicciōr sit: quod extracto specillo patet. Si verō os in vicino est, id quod disci potest sic, iam nec ne eo fistula *Obliqua fistula quomodo exploranda.* penetrauit, quatenus nocuerit. Nam si molle est, quod vltimo specillo contingitur, intra carnem adhuc visum est. Si verō magis id renititur, ad os ventū est. Ibi deinde si labitur specillum, nondum caries est: si non labitur: sed æquali innititur, caries quidem: *15* verū adhuc levis est. Si inæquale quoq; & asperum subest, vehemētius os exesum est. At cartilago vbi subhæsit, ipsa sedes docet, peruentumq; esse ad eam *20* ex renixu patet. Cæterū si obliquæ fuerint fistulæ flexumq; aliquem: vel plures habuerint, vt specilli *25* apex progredi nequeat, virgulam plumbeam, stan- neā vne cōnflabimus, aut ceream potius candelam assumemus, quā iter pertēremus. Cū enim flexilis admodum sit, ad fistulæ figuram facilē accōmodabitur. *25* Hactenus de signis fistularum: nunc de iudiciis.

Fistularum iudicia, seu prognostica.

Lib. 7. **F**istulæ si altius penetrant: vt ad vltimas demitti collyrium non possit, si tortuosæ atque an- fractuosæ sunt, si multiplices: maius (inquit *30* Celiū) in manu, quā in medicamētis præsidium est: minusq; operæ est, si sub cute transuersæ feruntur, quā si rectæ intro tendunt. Expedita quoq; cura- *Cor. Cel. lib. 5.* tio est in fistula simplici recenti, intra carnem, adiu- uatq; ipsum corpus, si iuuenile, si firmum est, ini- *35* mica contraria his sunt. Itemq; si fistula, os, vel car- tilaginem, vel neruum: vel musculos læsit, si articu- lū occupauit: si vel ad vesicam, vel ad pulmones: vel *ad*

ad vuluā, vel ad grandes venas, arteriāsve, vel ad insania, vt guttur, stomachum, thoracem penetrauit. Ad intestina quoque eam tendere semper periculosum: sæpe pestiferum est. Quibus multum mali accedit, si corpus vel ægrum, vel senile, vel mali habitus est. Aegrè (inquit Paulus) consanescit in ano fistula, *Paulus.* quæ orificio caret, tum quæ delitescit, & in os terminatur, multifariamq; fissa est. Sed ex his quidem colliguntur fistularum sedes, spatia, & noxæ. Prætereā
 10 an simplices hæ sint, an multiplices, & in plures partes diductæ. Hactenùs igitur de fistularum differentiis, signis, & iudiciis. Deinceps verò de medicamentis ad easdem conferentibus differere oportet.

15 *De fistularum curatione in vniuersum.*

Imprimis genus victus conueniens, & quod sub-
 stantia & qualitate, causis, quæ fistulæ consoli-
 dationem impediūt, aduersatur, instituito. Deinceps
 20 de corpore vniuersum à superuacaneis, & noxiis humoribus (illis tamen prius, si ita res exigat, expulsio-
 ni paratis) idoneo cathartico medicamēto purgato. Mox potionibus roborandis ac desiccandis interioribus partibus accommodis, fistulam ad consolidationem præparato. Cæterum tametsi poriones mul-
 25 tæ ad hanc intentionem à variis autoribus descriptæ sint, duæ tamen sunt quæ frequenti vsu, & felici successu à recentioribus medicis probatæ sunt. Prior ad hunc modum habet:

30 Agrimonix partes tres, plantaginis partes duas foliorum oliuæ partem vnam, scindantur minutim, & contundantur, postea in vino albo coquantur, & fiat colatura, de qua quolibet die sub auroram cyathus vnus administretur.

35 Altera. & osmundæ quæ filix mas est Dioscoridi partes tres, gentianæ partes duas, centaurij partem vnam, coquantur in vino albo, & fiat potio, quæ vt prior administretur. Hæc postrema etiam valde effi-
 40 *cax*

*Ratio cura-
di vniuer-
salis.*

*Potiones fi-
stulis ido-
neæ.*

1

2.

414 Institut. Chirurgicalarum, Lib. III.

*Guaiacū, li-
gnū sanctū.* cax est in ossium corruptorum expulsionē. Ego au-
tem optimē factum existimauerim, si in prædictis
(quod lignum sanctum, & palmam sanctam appella-
t) aliquot horas maceretur, postea moderato igne
leuiter decoquatur, & ex colatura quantum assiden-
ti medico satis esse videbitur, manē bibendum offe-
ratur. Atque hæc regimen (vt loquuntur) vniuersæ
*Ratio curæ
di particu-
laris.* le concernunt. Quod autem ad topica pertinet auxi-
lia, & regimen (vt vocant) particulare, quatuor sunt
ordine peragenda.

- 1 Primum quidem fistulæ orificium, si non satis
hiet, hoc est, si nimis strictum fuerit, inò verò & si
nus ipse fistularis vsque ad fines eius, si fieri possit,
dilatari debet. 15
- 2 Secundo loco callum eximere, fistulamq; auferre,
atque omninò destruere conuenit.
- 3 Tertiò post exemptum (quocunq; modo id fiat)
callum, sordities detergenda veniet.
- 4 Quartò vbi purus iam ab omni sorde sinus vide- 20
bitur, similiter reliquis vlceribus ad sanitatem per-
ducetur: nempe glutinatoriis, seu (vt loquuntur) in-
carnantibus medicamentis, & epuloticis, id est, cicæ-
tricem inducentibus, atque etiam (si carnis aliqua
fuerit amissio) sarcoticis, id est, carnem generantibus
pharmacis. Ergo si nec aduri ferro, nec incidi com- 25
modè possit fistula, & eius os, aut sinus totus, siue v-
nus ac simplex, siue multiplex fuerit, nō latè satis pa-
teat, immisso collyrio aliquo, seu (vt vocant) tenta,
ampliari ac dilatari debebit. Materia autem ad con- 30
ficienda collyria, dilatandis eiusmodi fistulis, & sinus-
bus nō callosis idonea, sunt radices gentianæ, & ma-
li terræ (quam aristolochiam Græci nominant): ra-
dix item bryoniæ, hoc est, vitis albæ, & dracōtij seu
dracunculi, præsertim maioris, qui serpentaria officii 35
nis, & Romanis veteribus columbrina nuncupatur.
Sed imprimis huic negotio accommodata sunt frusta
spongiz contorta & validè compressa. Ex iis igitur
fiant

*Sinus fistu-
le amplia-
tio.*

- fiant collyria siue penicilla (quas tētas vocant) altera quidē parte tenuia, altera paulò pleniora. Atq; ea parte qua tenuia sunt, demitti oportet in fistulā, sed filo semper appēdice, vt tutius, si altius descēderint, & promptius, si nimis hæreant, extrahi possint. Dimittantur autem horis duodecim, aut certē plus, aut min⁹, donec scilicet latē satis dehiscat fistula. Cæterū orificio fistulæ, atq; eius sinu, sufficiēter dilataris, ipsius destructio, prorsus moliēda est. Id autem trifariā fieri cōsuevit. Nēpe vel medicamētis acrioribus, & callū exterētibus, vel incisione sinus, & v²stione: vel incisione citra v²stionē, cū calli euulsione. *Fistula destructio seu mortificatio.* Ergo si recens fuerit fistula, aut nō adeo multū antiquata, nec etiā admodū profunda aut flexuosa, *Trifariā fistula destruitur.* & chirurgiam, hoc est, sectionē & v²stionē, prorsus recuset æger, medicamenta callū exterētia adhibebimus. Deindē remoto callo ad curationē reliquis vlceribus cōmunē vertemur. Itaq; callos elidunt atq; excindunt, quæ ex Galeno, Paulo, Aëtio, Cornelio Celso, & aliis recentioribus chirurgis subiungam. *Callos extertia.*
- Sphōdylj radix circumrasa, & fistulis imposita, earum callos eximit. Item veratrū nigrum, duobus trib⁹sve diebus insertū idem præstat. Adhæc amurca cocta, & in collutionem adhibita. Ad idem elaterium, id est, succum cucumeris agrestis, seu (vt vocant) asinini, terebinthina exceptum in collyria co²gito, impositoq; vel laserpitij radicis succum infundito. Id quod sequitur etiam callos consumit Paulo Aëginetæ. Aeruginis drachmæ duodecim, ammoniaci drachmæ duæ, excepta aceto in longū inducūtur, & fiunt penicilla. Hoc medicamentū expeditissimū atq; ex primis esse ad callos eximendos, ex præcepto Megetis, nobis testatū reliquit Aurelius Cornelius Celsus. *Locus i. Cor. Cei. emendatus.* Verū exemplaria omnia eo loci corrupta sunt. Pro drachmis enim duodecim, habent tantū denarios duos. Plurima eius generis collyria, hoc est, fistulis callos exterētia, à modò nominatis autoribus describūtur, ex quibus quisq; quæ suo proposito

416 Institut. Chirurgicarum, Lib. III.

Trochisci asphodelorum. magis conducere videbuntur, poterit deligere, & in
vsum assumere. In communi autem vſu apud res-
centiores chirurgos sunt collyria ſiue penicilla ex
trochiſcis aſphodelorum, quorū deſcriptionem ha-
Aſenicum. bes in antidotario. Item ex calce & ſapone. Adhæc
quæ auripigmento, hoc eſt, aſenico illinuntur penis
cilla, neminem vnquā feſellerunt, vt præter quoti-
dianam experientiam recētorum ferē omnium ſcrip-
pta teſtātur. At verō ſi fiſtulæ multos & valde anfra-
ctuoſos altosq; cuniculos habeant, ita vt in eos col-
lyria eiufmodi, prout res exigit, indi non poſſint,
eadem ex aceto aut liquore aliquo ad rem accommo-
do per auriculariū clyſterem intro infundenda ſunt,
vt ſcilicet per omnes multiplicis ipſius fiſtulæ anfra-
ctus perferantur. Mirificè prodeſt in antiquis fiſtu-
lis, & admodū calloſis ſequens iniectio.

*Ad anti-
quas et val-
de calloſas fi-
ſtulas.* Vnguenti Aegyptiaci ſemuncia, ſublimati dras-
chma dimidia, lixiū vnciæ quatuor, aquæ roſarum
vnciæ duæ, aſenici ſcrup. i. aquæ plantaginis vnciæ
quatuor, bulliant vſque ad conſumptionem tertiæ
partis. Iniecto medicamento, fiſtuloſi vlceris os, li-
namento conſcripto (vt de ſinubus dictum eſt) aut
quouis alio claudendum eſt, ne id reſſuat. Niſi enim
aliquandiu maneat, nullum effectum effatu dignum
præſtare poterit. Si autem duplices aut multiplices
eiufmodi fiſtulæ, breues, intraq; carnem ſint, eadem
etiam medicamenta quæ callos elidunt, arida in ca-
lamum ſcriptorium contici poſſunt: Calamus igitur
ori fiſtulæ aptandus eſt, poſtea in eū inſufflare oportet,
vt ea medicamenta intus compellantur. Si quan-
do verō longior (inquit Celfus) & tranſuerſa fiſtula
eſt, demiſſo ſpecillo, contra principium huius incidi
commodiſſimum eſt, & collyrium vtrinque demit-
ti. Aqua fortis Alchymiſtarum ſaltem prima in eiuf-
modi tortuoſis, atque labyrinthi modo flexuoſis fi-
ſtulis, mirificè prodeſt. Hæc enim (inquit Guido ex
ſententiā Arnaldi à villa noua) omnes fiſtulas mor-
tificat, & diſrumpit.

Secun

Secundus modus abolendi fistulas est, qui primū ²
per incisionē totius cavitatis fit, deindē per adustio² *secundus mo*
nem, quæ vel caustico medicamento, vel ferro can² *dus abolen-*
denti & ignito inducitur. Cæterū quæ in magnas *di fistulas.*
⁵ arterias, vel nervos, vel tendines notato dignos, aut
membranā costas succingentem, aut aliquam princi
palem particulam deueniunt, vel nequaquam (vt su
prā diximus) vel certē cum multa artificiosaq; dili
gentia, ac prudentia attingendæ sunt. Reliquis verò
¹⁰ hunc in modum manū admoliermur. Primū quidē
tentabimus, an rectæ sint vel obliquæ, demisso intrō
(vt paulō antē monuimus) specillo, vel cerea candes
la. In quibus autem duæ pluresve oræ habentur, quæ
specillo aut ~~confimili~~ *confimili* instrumento tentari minime
¹⁵ possint, ita notantur. Clystere in sinū per vnū os li
quorē cōpellimus, exq; trāitu eius in reliqua ora, fas
cile deprehēdimus, vnāne, quæ multas oras habeat,
an multæ fistulæ sint. His ita exploratis, si in summo
²⁰ fuerit sinus, atque is angustus, specillo demisso expli
candus est, supraq; id accommodata figura, scalpel
lo incidendus. Si flexus reperiūtur, hi quoque simul
specillo & ferro persequendi sunt. Idemq; faciendū,
si plures se quasi ramuli ostendunt. Vbi ad fines fis
²⁵ tulæ ventum est, diuiso vlceri imponenda sunt pes
nicilla, oui candido liquore imbuta, quæ labra solus
tæ continuitatis distendant, & inuicem coīre non si
nant. Postera die locus adurendus erit, vel ferro can
dente, vel caustico, seu adurente aliquo medicamen
³⁰ to, nempe vel puluere asphodelorum, vel arsenico,
aut alio confimili, quod facultatis sit causticæ siue
vrentis. Auicennas hydrargyrum, id est, *argentum*
vium sublimatum admouet, quo efficitur, vt nihil *Argentum*
corruptum, nihil callosum, nihil denique quod præ *vium sub-*
³⁵ ter naturam sit, in vlcere remaneat, quod non omnis *limatum.*
nō desiccetur, elidatur, & absumatur. At si non *si fistula*
summa occupauerint fistulæ, & sub cute non trans *subcute in-*
uersæ ferantur, sed rectæ intrō tendant, vbi quā *trō tendant.*
profundissimē potest, & quatenus licet, incisus fue

rit sinus, orbicularim totum callum, modo qui nup-
 per dictus est, si fieri possit auferemus. Quod si alia
 quid ex eo relictum fuerit, adurente id medicamento
 to absumemus. Si autem multum sit, quod ex callo
 remansit, nec medicamento cedat, candentibus ferra-
 mentis adurendum est. Cæterum superponenda sunt,
 atque in circuitu semper admouenda quæ refrige-
 rent, & reprimat. Nam serè quæ circa fistulam sunt
 (vt Celsus ait) aliquid habent inflammationis. Signū
 autem, quo dignoscimus medicamentum acre atque
 adurens, suum effectum, quod satis est, induxisse, est,
 vlceris elatio siue tumefactio, ac trium dierū mora,
 vt communis vsus habet. Itaque adusta, & vt oportet
 resiccata fistula, mitigatorio aliquo medicamen-
 to primis diebus vtitur, vt oleo cum oui luteo mix-
 to. Deindè ea quæ crustas, ferro ignito aut adurente
 medicamento inductas resoluunt, ac dericiunt, ad-
 moueto: cuiusmodi est, butyrum, aut aliquod aliud
 simile, pingue ac vinctuosum. A quorum vsu non
 prius desistito, quam crustæ deciderint, & in pus cō-
 uersæ fuerint. Mortificata autem fistulæ euident ar-
 gumentum est, cum pus quod antè multum, & crus-
 dum apparuerat, nunc paucum, & coctum visitur.

3 Tercius modus abolendi fistulas est, qui per inci-
 sionem fit, sine cauterio, vel actuali (vt vocant) vel
 potentiali. Itaque facta quemadmodum antè proditum
 est, incisione vsque ad fines, seu fundum ipsius
 fistulæ, callus totus vel vnguibz, vel acie scalpri,
 vel cultro rasorio, id est, nouacula detrahi debet, ita
 vt locus, seu sinus ipse purus, & ab omni sorde mun-
 dus appareat, quod viuæ ac probæ carnis præsentia
 deprehenditur, vt docuit Avicennas. Et hæc vera est
 fistulæ curatio, quam statim, si nihil obstitit, aggre-
 di debemus, quoties fistula nobis sananda & abolenda
 proponitur. Cæterum dilatata fistula, atque in
 totum abolita, desergentibus, si quæ sordes adhuc
 supersit, & sarcoticis, siue incarnantibus medica-
 mentis vti nos oportebit: qui postremi duo scopi
 erant

Quid post
 adustionem
 & resicca-
 tionē fistule
 agendum sit.

Mortificata
 fistule si-
 gnum.

3 Tercius mo-
 dus abolēdi
 fistulas.

Vera fistule
 curatio.

- erant in sanandis fistulis propositi. Ergo callo ³ *fistulae eliso, atque absumpto si sordes aliqua subsit Deterfio.*
 mulso, vel aqua in qua eruum coctum sit, sic vt huic
 quoque mellis paulum adiciatur, locū abluito, vel
 sequenti medicamento repurgandis fistulis, post res
 motum callum longè accommodatissimo, vtor. ^{Medicamē-} *terebinthina in aqua vitæ abluta vnc. tres, succi apij,*
^{tum fistulas}
^{repu- gās, ac}
^{detergens.}
 succi cynoglossi, quod Romani linguā canis appel-
 lant, singulorū drach. sex, mellis rosacei collati sesqui-
 uncia, aristolochiæ rotundæ drach. duas, faring lupi-
 norū semuncia, coquatur succi, & terebinthina cum
 melle rosaceo, vsque ad cōsumptionē medietatis suc-
 corum, deinde reliqua cōmisceatur. Si prædicto me-
 dicamento absterfio, myrrhæ, sarcocollæ, radicis ⁴ *Carni gene-*
 Peucedani aridæ, & iridis singulorū momentū adte- ^{ratio.}
 ceris, oprimum iucarnans medicamentum effeceris,
 modò ex eo turrida iulinatur. Aliud Aëtij Amideni ^{Lib. 14.}
 experimento probatū, callum exterēs & incarnans. ^{Medicamē-}
 Radicum liliorum crematarū cinere fistulā repleto, ^{callū exte-}
 & callus excidet, quo ablato simlacem herbā sumi- ^{rens & in-}
 to, arundinibus se implicante, flore candido, foliis ^{carneis.}
 hortensi phaselo similibus: qua arefacta, vsta, & trita
 fistulam replebis, & incarnabitur. Aliud aridum
 Magistriani ab eodem relatum, fistulas incarnans. ^{Aliud fistu-}
 Chamaeleontis nigri radicē, pini corticē, thus mascu- ^{las incarnas.}
 lum, aristolochiam longā pari pondere terito, fistu-
 lā mulla abluta aridum applicato. Sequens quos-
 que collyrium, a quodā chirurgus nostri tēporis vfur-
 patum, fistulā agglutinat, insigniter desiccatur, & as-
 secta parti robur addit. Aquæ vitæ vnc. duas, vini ^{Medicamē-}
 maluatici vnc. vnā mellis rosacei drach. decē, myr- ^{tum ad fistu-}
 rhæ, radicis peucedani trita, vtriusque drach. duas, ^{las longe op-}
 sarcocollæ, aloës hepaticæ, vtriusq; sesquidrachmā, ^{tinum.}
 id est drach. vnā & semissem misceatur, deinde bul-
 liant omnia ad ignē moderatū vnico feruore, & per
 oricularium chyliterem, quam syringā vocāt inuiciantur
 in fistulam. Aliud ad fistulas, vsque ad os attinge ^{Aliud.}
 res, ex Aëtio. Squammæ aris, aruginis ammoniaci Aëtij.

420 Institut. Chirurgicarum, Lib. III.

thymiamatis, portiones æquas, ex aceto terito, & pastillum, id est trochiscum conflato. Deinde collyria, hoc est, tūrūdas, fistulæ æqualia formato, & imposito. Quomodo autem ossi vitiato & corrupto medendum sit, in præcedentibus diximus. Hæc igitur de fistulis dicta sufficiant, superest de cancro ulcerato dicamus.

De cancro exulcerato. CAP. XIX.



Ancrorum (ut in tractatu de tumoribus præter naturā diximus) alij cum exulceratione, alij citra vlcus fatigāt. Ac de his quidem qui sine vlcere molestant, quos Hippocrates latentes nominauit abūdē à nobis supra dictum est. Itaque præsens locus postulat, ut de his differamus, qui exulcerati sunt, & adeo laborātes affligūt, ut interdum illis manum admoliri (ægris etiā vltro id efflagitantibus) cogamur. Cæterum quibus locis maximē accidant cancri tam vlcerati, quā non vlcerati, ex quo humore potissimum gignantur, & à quibus causis excitentur, quibus notis deprehendantur, qui ex illis curationem recipiāt, & qui nō, atque in totum quid de illis præfagiendum sit, fusissimē à nobis explicatum est, vbi de cancerosis tumoribus, qui citra vlcus inuadunt, egimus. Reliquū est igitur ut cōpendiosam exulcerati ipsius cancri curationem describamus. Sed priusquā id agamus, non alienū fuerit, eius notas in memoriam reuocare. Itaque in cancro vlcerato, præter dolorem, duritiem, tumoremq; vlcera erosa, ac inæqualia conspiciuntur, plurima ex parte sordida, labris prætumidis, aspectu horrenda, & concreta humorum colluue ingrata. Quæ verō (inquit Paulus) pura videntur, fœculenta, liuida, atque interdum etiam subrubra, & cruenta apparent: sanies inde manat continuo tenuis, aquosa, nigra, aut fulua, & rauriter olens.

Ergo si eiusmodi affectus chirurgiam, hoc est manu:

Signa cancri
exulcerati.

10

15

20

25

30

35

- manus operam desiderat à vacuatione humoris me- *Ratio curæ*
 lancholici curatio auspicianda est. Deinde totū carci- *di canceri*
 nomma, si locus patiatur, prorsus rescindendum, sic vt *exulcerati.*
 nulla superfit radix, sinemusq; sanguinem effluere, *Vacuatio.*
 nec statim eum inhibebimus. Imo pressis vicinis *Excisio.*
 partibus, crassum ac melancholicum sanguinem ex-
 primemus. Postea alius vlceribus similiter curabi-
 mus. Hæc curandi ratio tradita & probata est libro
 decimoquarto method. Therap. Cuius verba hoc
 10 loco subicere placuit. Caterum (inquit) si quan- *Vide Paulū*
 do cancerum per chirurgiam curare audebis, cœpif- *lib. 6.*
 se quidem ab vacuando per purgationem melan-
 cholico humore oportebit: vbi verò totum quod
 vitiatum est prorsus excideris, sic vt nulla superfit
 15 radix, sinēs effluere sanguinem: nec properē eum
 inhibebis: nō premendo potius vicinas partes, ex-
 primes ex his crassiore sanguinem. Mox aliis vlcē-
 ribus similiter curabis. Hactenus Galenus. Sunt qui
 exciso carcinomate, & crassiore sanguine ex circū-
 20 cūstantibus partibus expresso, ferramenti igni
 flagrantibus locum adurant. Alij cū partē aliā *Vitio.*
 quam corporis carcinoma eiusmodi, quod cum vlcē-
 cere est occupauit, hoc (si locus non refragetur)
 circuncidi opus esse tradunt, dein vitotenus adu-
 25 ri, tritasq; cantharides ex alumine & cyprino oleo
 superponi. Alij verò à sectione, & vitione quæ fit
 ignito ferramento abstinentes, corrosione valida
 ex adurentibus medicamentis facta vitium hoc to- *Corrosio.*
 tum extirpant, & destruunt.
- 30 Porro medicamenta eiusmodi si quando adhiben-
 da sunt: valentis admodum facultatis esse debent.
 Nam, vt scribit Hipp. extremis morbis, extrema
 remedia adhibenda sunt. Tanta autem est huius *Carcinoma*
 vitij malignitas: vt mitiora planē contemnat reme- *mitiora*
 35 dia. Inter cætera autem, præstantissimum ac tutissi- *cōtemnit re-*
 mum auxilium in hoc affectu Guidoni à Cauliaco *media.*
 prædicatur, arsenicum sublimatum, cuius egregias *Arsenicum*
 dotes supra iam multoties commemorauimus, & *sublimatū.*

422 Institut. Chirurgicarum, Lib. III.

in sequentibus adhuc celebrabimus. Hoc (inquit Theodoricus) cancerum, lupum, eschiomenum (hoc est sphacelum, seu fiderationem: Noli me tangere, fistulam, & omnes tales pessimos morbos, prima die occidit, & extirpat. Cateium magna locorum circumstantum, interim dum admogetur, cura semper habenda est, ne scilicet ea ipia inflammatione, atque humorum confluxu, occupentur. Quod incommodum facile deuitabis, si partes illas vicinas, & carcinoma cingentes, bolo armenia & id genus aliis, illeueris. Sed & modo legitimo, seu iusta quantitate (quā coniectura tantum artificiali rationalis definit medicus)

Legitimi est adhibendum est, arrhenicum ipsum siue artemicum: *fectus arse-* vocant) sublimatum. Vbi autem effectum quem des- *nici nota.* fideras, praestiterit: quod ex loci inflatione siue tumore, & mora triduana, deprehendes: dolor mitigandus erit, & cruste casus, modò, quo supra docuimus procurandus. Cancro verò sic penitus extincto, ac radicibus extirpato, vicus ipsum quod remansit, simili-

Extincti carcinomae nota. ter aliis cauis vlceribus curabis. Carcinoma autem prorsus extinctum agnosces, si proba & sana caro appa-
paruerit, si & nulla virulenta proluuiet, se in parte affecta ostenderit, nullaq; amplius graueolentia, eorum qui proxime astant, nares offenderit.

*Quinā can-
cri vlcerati,
vstione, aut
sectione de-
siderent.* Ceterum soli illi canceri etiam cum vlcere consistentes, curationem eiusmodi, quæ vstione vel sectione fit, admittunt, qui in summa corporis parte hærent, quique adeò laborantes fatigant, vt ipsi vltro (inquit Galenus) chirurgi manum efflagitent, & simul in talibus partibus consistant, quas resecare & exutere vnâ cum radicibus possis. Sed cum hæc curandi ratio, non sine graui agrotantis periculo (vt supra de cancro non vlcerato monuimus) administrari possit, temere adhuc in talibus

*Quibus can-
cri datur axat
aut bladij edū
vera cura-
tione omissa.* bus adhibenda non est. Itaque si in penitioribus corporis partibus, constituti sunt canceri istiusmodi, aut in talibus quidem consistant, quas nec adurere, nec excindere vnâ cum radicibus possis, vel

vel si loca principibus membris vicina occupent,
 vel laborans ob virium imbecillitatem tale cura-
 tionis genus sustinere non possit, aut forsitan (quia
 nimis timidus sit & pusillanimus) extrema hæc res
 media subire non velit, adhuc si ex hac curandi ra-
 tione deterius aliquid malum sequeretur: breviter
 si periculum ex chirurgia, id est, sectione aut vltio-
 ne, timeamus, nec curari affectus aliter possit, sat
 fecerimus, si hunc augeri prohibeamus proba-
 10 primis victus ratione, & commodis vacationibus
 solisque lenibus, & quasi adblandientibus medicamē-
 tis vtentes: a vehementibus verò, & acerbis (quis
 bus malum hoc veluti crabro irritatur, & excan-
 descit) prorsus absonantes. Ergo imperanda ægris
 15 talis victus ratio est, quæ tenuis sit, bonumque & mi-
 nimè melancholicum succum generet. Quod si ob
 jecoris caliditatem & siccitatem excedentem, prohi-
 beri non possit, quin crassus & melancholicus in
 corpore sanguis procreetur cibis refrigerantibus,
 20 & humectantibus erit vtendum quibus hepatis in-
 temperies paulatim emendetur. Conueniunt itaque
 in hoc affectu priscana cremor, lactisque serum, vi-
 num paucissimum & aquosum, pisces saxatiles, atque
 omnis generis aues præterquam palustres. Ex oleris
 25 bus malua, atriplex, blitum cucurbita, atque id ge-
 nus alia. Acrum esus, & repletio omnis vitanda.
 Sed & crassior ille succus qui in venis colligitur, ex
 intervallo vacuandus erit, interdum purgante medi-
 camento interdum (nisi quid prohibeat) ventris ses-
 30 sione. In mulieribus quoque, si quidem liceat per-
 aratam, menses euocandi, atque etiam in viris hæ-
 morrhoides (si eas pati consueuerunt) proritanda.
 Loco autem affecto imponenda remedia sunt, quæ
 dolorem leniant, & ita ipsum firmare possint, vt
 35 nihil redundantia humorum amplius excipiat, quæ
 item refrigerent & exiccent, minimè verò mordeat
 aut irriter. Cuiusmodi sunt solani succus, vel aqua
 destillata: cum succi copia non est, plumbum vltum

Vicius ra-
 tio in cæcro
 vlcero ob
 seruanda.

Succus me-
 lancholicus
 ex interval-
 lis vacuan-
 dus.

Quæ loco
 affecto ipo-
 nenda.

Succus so-
 lani.

424 Institut. Chirurgicarum, Lib. III.

& elotum : vnguentum album : vnguentum ex li-
thargyro & plumbo vſto, item medicamentum
quod ex pompholyge, vel chalcite cōſtat, aut aliis
id genus metallicis vſtis & elōtis. Atque etiam (vt
vocat) camphorata, ſimiliter & ſucci in mortario
plumbeo ducti, huic vitio efficaciffimè admouen-
tur. Lamina quoque plūbea maximo & pene in-
credibili vſu cancris iſtis exulceratis ſuperinducun-
tur. Modus autem vſus ſucci ſolani (quod medica-
mentum eiufmodi affectibus vtiliſſimum eſſe ſcri-
bit Gale.) talis eſto. Solani ſucco linteam molle du-
plicatum imbuto, & loco affecto imponito. Extrin-
ſecus lanam molliuſculam eodem ſucco madentem
linteo circumdato, atque hæcne ſicceſcant, eo ſucco
ſubinde irrigato. Hoc remedium loco dolenti indu-
ctum ſine dolore ac moleſtia (inquit Paulus) exul-
ceratis cancris ſubuenit. Plurima medicamenta cō-
poſita à Galeno, Paulo, Celſo & Aëtio, ad hunc
vſum conſcripta ſunt, ex quibus duo hæc ſelegi-
mus. Argenti ſpumam, & ceruſam in plumbea pi-
la : cū oleo roſaceo in ſole tantisper conterito, dū
plumbi colorem : vnguētum quod ex his fit, acqui-
ſiuerit. Aliud quod magnopere probo recipit plum-
bi vſti & eloti pompholygis, thuris ſingulorum
vnc. quinque abſinthij vnc. vnam olei roſacei ſeli-
bram ceræ ſeſcunciam ſucci ſolani quod ſufficit, ad
vnguēti craſſitudinem. Inſigniter autem leniunt,
ſolanturq; plurimum in iſtis exacerbationibus, &
cruciatus tempore malua : aut althea (quam biſmal-
uam appellant) in mulſo ſubaſta liquefactæ ve, &
roſacei paululo leuigata, inſtarq; cataplaſmaris il-
lita. Adhæc cataplaſma ex ficibus aridis meliloto,
quam Latini ſertulam campanam vocant, ruta thu-
re, buniade herba, id eſt, napo, diligenter cum oleo
contuſa. Lenit item cataplaſma quod conſtat pal-
mularum daſtylis in paſſo decoctis, quibus adiecta
ſint ouorum lutea polentaq;. Adhæc quod ex pa-
pauere cum coriano factum eſt, aut polygono, aut
feri

Lamina plu-
bea.

Modus vſus
ſucci ſolani.

Vnguētum
ad cancris
vſceratos.
Aliud lon-
gè optimū.

Malua.

Althea.

Cataplaſ-
ma leniens.

Aliud.

Aliud.

feri: hoc est, cichorio: hæc quidem in doloribus vñ sunt. Multi (inquit Guido) mitigant eius fraudulentiam & lupacitatem, ita enim loquitur cum pecia scarlati, & appositione carniū gallinarum.

- ¶ Hinc vitium hoc ideo lupum appellari vulgus putat, quoniam carnes vñus gallinæ si apponantur, quotidie ferè absumit & deuorat. Quod si forsitan eiusmodi gallinacæ carnes vel similes, illi pro pabulo non offerrentur, carnes sibi proximas, ceu lupus quidam famelicus, ad eandem quantitatem despaceretur & exederet. Quidam huic malo veluti adblandiuntur, admoto puluere stercoris humani, & anethi, igne cōcrematorum. Item appositus quibusdam herbis, vt scabiosa, trifolio verbasco, id est, *Cæcer vlc-
ratus cur
quibusdā
Lupus ap-
pelletur.*
- ¶ tapso barbato, & herba robertiana nuncupata, quæ *Herba Ro-
berti.*
- ¶ quibusdam myrrhis Dioscoridis esse putatur.

Cæterum vtcunque res habeat, commemo-
morata nuper remedia, (quoniam
ferè temperata sunt) si ma-
gnopere non prorsus, no-
cere saltem non
possunt.

FINIS LIBRI TERTII CHIR-
urgicarum institutionum, de Vlceribus.

Ioanne Tagautio Doctore me-

dico autore.



GENERALIS

DIVISIO FRACTVRARVM,

*In librum Quartum Chirurgi-
carum institutionum Io.*

Tagautj Medici.

Fractura, quæ Græcis κάρυα dicitur, differentia.

Simplices.

Compositæ.

Simplices fractura differentia, plures sunt.

Alia enim fiunt

Καυλίου

Ραφανίου

Σικυνοῦ

Ξιδίου

Εἰς ὄνυχον

Αλεπίου

Κατὰ ἀνέκρουσιν

} Id est, ad

Caulium

Raphani

Cucumerum

Id est, quasi affertur modo, per longitudinem.

Id est, in unguis formam.

Id est, ad similitudinem farinae, vel pollinis, quando

scilicet os in multas tenues partes confingitur.

Id est, iuxta abruptionem, fit cum pars ossis per

superficiem abruptionem detrahatur, ac recedit.

} fracturæ speciem

ac similitudinem,

per transversum.

*Composita fracturarum differentia, seu potius implexus
cum aliis morbis & symptomatibus.*

Fractura cum vulnere.

Fractura cum inflammatione.

Fractura cum gangræna.

Fractura cum dolore.

Fractura cum pruritu.

Fractura cum fragmento ossis eminente.

Fractura cum contusione.

Fractura malè ferruminata.

Fractura cum callo nimium excrecente.

Fractura cum nimia calli siccitate, & duritie.

Fra

Generalis diuifio Fractu.in Lib. II II. 2427

Fractura cum fupervua calli humiditate.

*sunt & alia fracturarum differentie Albucasi, & re-
centioribus chirurgis, a locis in quibus consistunt
desumptæ, quæ tamen propriè differentie di-
ci non debent, vt,*

Fractura in caluaria.

Fractura in maxillis.

10 Fractura in naribus.

Fractura in clauiculis.

Fractura in spina dorsi.

Fractura in costis.

Fractura in scapulis.

15 Fractura in humero.

Fractura in brachio, id est, cubito & radio.

Fractura in femore.

Fractura in crure siue tibia.

Fractura in patella seu rotula genu.

20 Fractura in digitis, tum pedum tum manuum.

INSTITVTIO- NVM CHIRVRGI- CARVM IOANNIS

TAGAVTII ME-
DICI,

LIBER QVARTVS.

De fracturis.

Quid fractura, & quæ sint eius differentiæ.

CAPVT I.



Vandoquidem tribus libris super-
rioribus, de vitis chirurgiæ subie-
ctis; quæ carnosæ & mollioribus
corporis partibus accidunt; abun-
dè satis dictum est, ordo iam pos-
tulat, vt de aliis quæ ossibus con-
tingunt, hoc est, fracturis & lux-
ationibus, differamus: hæc enim Chirurgiæ generi
etiam subiiciuntur. Ac primam quidem de fracturis
agemus, quas etiam Hippocrates luxationibus an-
teposuit. Est igitur fractura, vt in vniuersum dis-
catur, vnitionis, siue continuitatis solutio quæcun-
que in osse, quam Græci proprio nomine & omni-
bus suæ gentis hominibus noto, catagma vocant vt
Galenus sexto methodi medendi, & aliis plerisque
locis testatum reliquit. Paulo verò Aeginetæ, at-
que aliis posterioris medicinæ Graui scriptoribus,
fractura ossis est diuisio, aut ruptura, aut præcisio,
discisio, à violentia quadam extrinsecus irruente
accidens. Guido à Cauliaco, & alij quidam ætatis il-
lius medici, fracturam definiunt, continuitatis solu-
tionem in osse, non à qualibet re factam, sed ab ea
tant

*Fractura
quid.*

κατάγμα.

Paulus.

*Guido à
Cauliaco.*

- tantum, quæ contundit. Vt vera sit (inquit) prima differentia solutionis ossis, quòd quædam est incisa, quædam contusa, ossium enim diuisionem quæ incisione fit, non fracturam, sed ossis vulnus appellant.
- 5 Cæterum plures fracturarum eiusmodi differentiae sunt: aliae namque simplices sunt, aliae compositae. Ex simplicibus quidem aliae sunt, quæ fracti ossis partes iam prorsus separarunt, easque caledon, raphanidon, atque etiam sicydon factas Græcè dicunt,
- 10 hoc est, ad caulium, raphani & cucumerum fracturam speciem ac similitudinem. Manifestum autem est eiusmodi ossium diuisionem transfugerim per crassitudinem fieri. Hæc quibusdam virgalis & transfuersalis nominatur. Aliae verò fiunt schidacidon,
- 15 quasi asservis modo: hæc autem per longitudinem magis fiunt, dicunturque oblongæ ossis fissuræ. In iis non omnino separantur à se partes sic affecti ossis, sed veluti per rectitudinem finduntur. Præter has aliae
- 20 quædam adhuc simplices numerantur fracturæ differentiae, quarum aliae Græcis dicuntur fieri, *eis* *δυνος* *κα*, id est, ad instar vnguis, aliae alphitidon, id est, ad farinæ vel pollinis similitudinē. Aliae *κατὰ* *αποθραυσ* *σιν*, id est, iuxta refractionem, seu vt alij interpretantur abruptionem. Fractura quæ *eis* *δυνος* *α*, id est, in vnguis formam fit, fissura est ossis, quæ cum aliqua in
- 25 parte recta sit, in extremo tamen lunata euadit. Atque hæc etiam calamidon, id est, harundinatum ab alijs quibus nuncupatur. Alphitidon ad similitudinem farinæ vel pollinis dicta, est cum os in multas tenues
- 30 partes confringitur, quæ & ipsa caryedon, id est, nucatum, à quibusdam vocatur. Apothrausis, quæ & apocope dicitur, id est, abscisio seu præcisio, est cum pars ossis per summitatis rupturam, seu superficiem abruptionem detrahitur, ita vt pars ea quæ detracta est, & recessit, super emineat, vt ferè fit cum squama ab osse resoluitur. Cæterum hæc fracturarum differentiae curiosè nimis (vt Galenus inquit) atque ambitiosè, à medicis Hippocrate iunioribus, iis propriis

430 Institut. Chirurgicarum, Lib. IIII.

priis nominibus interpretata sunt. Non contenti
 enim fuerunt oratione, os quod variè seu multifar-
 riam sit fractum, explicasse. Ab huiusmodi autem
 appellationibus, omninò abstinuit Hippocrates, ~~in~~
 quo àd fieri licuit, vñtatisimis vrēs nominibus, ora-
 tione interpretari non est grauat, non has modò
 fracturarum differentias, verumetiam quæ in capis
 tis ossibus eueniunt. Breuiter duo potissimæ sunt
 fracturarum differentia simplices Galeno, à quibus
 curandi indicationes sumuntur, nempe quæ per trās
 uersum, & quæ per longitudinem facta est. Cornes-
 lius Celsus tertiam addidit, quæ scilicet obliquè fit.
 Omne (inquit) os, modò rectum vt lignum in longi-
 tudinem finditur, modò frangitur transuersum, in-
 terdum obliquum. Cæterum ossis fracturæ, nonnun-
 quam carnis quoque vulnus accedit, sed potissimū
 cum ossa multifariam fracta sunt, sæpe etiam dolor
 ingens, & interdum inflammatio. Contingit etiam
 aliquando vt aliud os super aliud efferatur, & ex os-
 se malè ferruminato ac commissio, veluti tophaceus
 aliquis nodus relinquatur. Horū autem affectuum
 & symptomatum cum ossium cōtinuitatis solutio-
 ne complexus, compositas fracturæ differentias, iu-
 niores medici vocauerunt, cum tamen propriè differ-
 rentia non sint. Quandoquidem quod seorsum &
 per se consistere potest (vt alibi ex Galeno diximus)
 nunquàm alterius erit differentia. Vulnus autem,
 dolor inflammatio, & id genus alia seorsum, & per
 se consistere possunt. Proinde veræ fracturarum dif-
 ferentia, & à propria ipsarum natura desumptæ, nec
 reuera sunt, nec rectè dici possunt. Quòd si quæ à lo-
 co quoque, seu parte in qua est fractura, differentias
 censeas, veluti sinares, aures, maxillæ, costæ, clauicu-
 læ, caluaria, spina, dorſi, humeri, brachia, femora,
 crura, digiti, fracturam pariantur, fuerint profectò,
 & ipse fracturarum differentia Albucasi non vtique
 à propria ipsarum natura, sicuti neque præceden-
 tes, desumptæ, sed à locis, in quibus consistunt. *Ves-*
ram

*Due sunt
 potissime
 fracturarū
 differentia
 simplices.*

*Cōpositæ fra-
 cturæ diffe-
 rentia.*

Meth. 3.

ram

nimenimnerò quoniam ab iis omnibus suprà commemoratis agendorum sumuntur indicationes, donec nemo eas cum recentioribus medicis & chirurgis differentias appellari.

De causis, signis, & indicij fractura in vniuersum.

C A P. 11.



Causae fracturarum internæ nullæ sunt, CAUSAE. externæ verò ea omnia, vt breuiter dicam, quæ contundere, vel diuidere ossa possunt. Quæ contundunt, ea dura grauiusq; & mole non exigua sint oportet,

vehementib; impetu deferri ac irruere. Ossâ diuidit

quæ vulnerando incidunt: item casus ab alto, præsertim si ossâ succiora sint, nec admodum crassa. Fractura quoque ossibus interdum accidit ex circumtortione in luctantibus: vt si tibia siue crus Dioclis, cruri aduersarij Socratis cum eo luctantis per transversum supposita sit, ita vt vtriusq; eius capita, & iuxta pedem, & iuxta genu deorsum vehementer deprimantur, os proculdubio tibie ipsius Dioclis, præsertim si infirmum sit naturâ, hoc luctationis genere medium disrumpetur, seu si maioris frâgetur. Id quod

in lignis quoque, quæ à nobis ipsis circumtorquentur, videre licet. Si enim lignum aliquod neque magnum neque validum, sed paruum & imbecillū supra femur tuum impositum, ex utroque capite deorsum vehemēter manibus vrgeas, statim id in media

parte frangi aspicies. Signa aut ossis fracti, & præsertim per transversum atq; in artubus, hæc ferè sunt. Tactu ossis partes disiunctæ separatè ac variè resperiuntur, membri figura inequalis percipitur: cum membrum dimouetur, & manu variè tractatur, ossa colliduntur, & veluti crepitus quidam ex ea collisione auditur. Pars afflicta, contracta dolet, corpus membro fracto haudquaquam innici potest: causa quæ frangunt, aut contundunt, præcesserunt.

In osse

432 Institut. Chirurgicarum, Lib. IIII.

In osse verò quod per lōgitudinem fractum est, substantia eius crassities nō naturalis tactu percipitur, cetera signa nō adsunt, prāterquā quod dolor & inæqualitas iudicio sensus etiam deprehendūtur.

IVDICIA.

Prognostica. Ossa minimè periculose media franguntur in humeris, brachijs, femoribus, cruribus, & digitis. Quò autem propior fractura capiti vel superiori, vel inferiori ipsius ossis, est, eò peior iudicatur. Nam & maiores dolores adfert, & difficilius curatur. Ea itidem quæ in artuum vicinia est, curatu difficilis est, vel eo potissimum nomine, quod commodè ligari non possit. Atque hæc vt plurimum motum relinquit difficilem. Maximè tolerabilis est, simplex transversa, peior vbi fragmenta, atque vbi obliqua. Pessima vbi eadem acuta. Nam & carnem vulnērant, interdum nervum quoque, aut musculum. Fractura quæ cum dolore vel inflammatione, aut carnis contusione incidit, mala est. Quippe quæ instaurari non possit, donec ea prius curationem receperint. Si ossis fracturæ, carnis quoque vulnus accessit, in malo etiam æger est, maximeq; si id musculi femoris, aut humeri senserunt. Nam & inflammationes multo grauiores, & (vt inquit Celsus) promptiores can-
cros habent. Adde quod in eiusmodi fractura, neq; ferulis neque canalibus (inter quæ vulnus sanescere nō potest) vti possumus. Sed nec primis fasciis, quas Hippocrates *σποδαμνισμός*, id est, subligamina vocat, vulnus contegendum esse volunt, tum huius ætatis chirurgi, tum qui seculo Hippocratis fracturas curabant. Itaque vlcere non deligato, hinc & inde, hoc est vtrinque ab eo fasciis circumiectis quā vlcus est, fenestellam relinquunt, per quam medicamenta vulneri accommoda imponant. Quem deligandi modum damnat ille medicorū princeps & ante signatus Hipp. libro quem de fracturis inscripsit, eumq; lemmatis ac rationibus non absurdis quidem, aut probabilibus tantum, sed scientificis quoque & necessariis, inutilem, erroneum, prauūq; esse conuincit

ac de

*Per caneros
hic gangre-
nā & spha-
celum intel-
lexit, sicuti
et alius qui-
buslibet locis.*

ac demonstrat. Si brachium aut crus fractum est, bonum est alterum saltem os integrum manere. Ali-
 tero namque osse integro manente, necesse est ner-
 uos ac tendines minus contrahi, quippe qui ab inte-
 gro ipso osse & non comminuto adhuc intendantur.
 Adde quod curiosius omnia in continendis ossibus
 fieri debent, vbi vtrunque os fractum est, & neutrum
 alteri auxilio est. Itaque si alterum os integrum ma-
 net, plus opis in eo quam in fasciis, ferulisq; est. Cor.
 10 Cellius memoriæ tradidit ignorari minimè oportere
 si femur perfractum est fieri breuius, quia nunquam
 inquit, in antiquum statum reuertitur, summisque di-
 gitis postea cruris eius insisti. Quod equidem à ra-
 tione, & experientia, ab ipsiusq; Hippocratis senten-
 15 tia prorsus est alienum. Non enim quoties femur
 frangitur, protinus necessario ipsum breuius efficitur.
 Sed duntaxat si statim quam fractum est, minus
 quam par sit, à chirurgo distentum fuerit, vel tortuos-
 se distractum, & separatae ac distantes inter se ossis
 20 cōfracti partes, nō rectè atque admodum, priusquā
 ferrumen impleant, coaptatae extiterint. Tunc enim
 & breuius femur reddetur, & crure eius partis clau-
 dicabit homo. Sic autem de hac re lib. de fracturis
 scripsit Hippocrates, At verò si femoris os fractum sit,
 25 extensio imprimis diligenter facienda est, ne minus
 quam debeat efficiatur. Amplior enim si sit, nullam
 lationem affert. Verum quoque est ut in eodē opere
 idē testatur Hippo. quod quibuscunque vtraque vel
 30 tibiæ vel cubiti effracta ossa fuerint, illa breuiora ef-
 fici. Quod sanè intelligendum est nempe ut Gale. in-
 terpretatur, nisi ante conformationem extensio de-
 bita adhibeatur, & commoda deligatione ossium co-
 aptatio seruetur, quoad callus obducatur: tunc enim
 35 non solum maiorem tumorem, quam naturaliter con-
 ueniat, membrum illis attollitur, verum etiam bre-
 uius propter retractos musculos efficitur. Sed hæc
 præfagia particularia sunt.

*Locus i Cor.
 Celsi, aut
 falsus, aut
 nuncius.*

*Prognostica
 quedam de*

fractura in non omnino eadem est de fractis præfagiendi ratio,
veterinis. quæ in hominibus. Nam si quadrupes pedis postero-
 ris radium fregerit, præsertim mulus aut asinus: iis
 quod medulla careat, quavis sanguinis compotes
 sunt, nunquam solidescit. Quæ supra genua fracturâ
 senserunt, ut deplorata non continges. Siquidem ea
 nunquam feruntur. Si femur fractum sit, in pe-
 riculum venit, spesq; salutis in angusto est. Fractis
 armis, nullus medicinæ locus. Nam nervorum disten-
 sio sequitur, quæ caput scapulis annectat. Vix vn-
 quam sanitas contingit, si fracturæ vulnus aut luxa-
 tio coniuncta sit. Si verò costa perfringatur, facilis
 medendi ratio est. Fracturæ quæ calloso ferumine
 coaluit, nunquam vrens medicamentum admouebis:
 quandoquidem eo callus ille tophaceus resoluitur,
 nec ullam ferè medicinam sentit. Hæc & quædam
 alia de fracturis veterinorum, Hierocles & Apfy-
 rus veterinarii medici, nobis scripto reliquerunt.
 Fractura siue in quadrupede, siue in homine sit quo
 vetustior est, hoc est, quod tardius fracta ossa ut opor-
 tet committuntur, eò deterior efficitur. Quandoquis-
 dem & callus illic gignitur, & spatia ipsa inania,
 aliena quadam substantia opplentur. Quo fit ut dū
 instauratio molienda sit, maiore ac valentiore mul-
 to extensione sit opus. Magna autem & valens eius-
 modi extensio, non rarò conuulsionem inuehit, ut
 alicubi testatus est Auicennas. Fracturæ non pari die-
 rum numero in omnibus ossibus ferruminantur, sed
 in aliis tardius, in aliis citius, Caluaria triginta quin-
 que diebus glutinatur. Brachium & tibia si ritè
 curentur, diebus circiter quadraginta occalescunt.
 Firmatur cubitus diebus plurimum triginta. Si in
 naribus os perfractum est, decem & octo dierum
 spatio consolidescit. Costa post vnum & vigesi-
 mum diem Celso, aliis non nisi post vigesimum
 octauum, ferrumen implet. Fere etiam intra des-
 cimū quartum & vnum & vigesimum diem sas-
 nescunt: maxilla, iugulum, scapula, os tali calx, ma-
 nus,

nus, planta. Inter vigesimum septimum, & quadragetimū, humeri & femina. Coxa verò diebus quinquaginta coalescit Hippocrati, pes eidem sexaginta dierum spatio, si quiescat: consanescit. Et ita de aliis pro fracti cuiusque ossis natura dicendum est. Quinetiam confert aliquid ad celerem aut tardam sanationem, & ætas, & corpus, & vitæ propositum, & anni tempus, ut & de vulneribus dictum est. Proinde in iis nihil certum aut perpetuum est. Factionis

10 Arabicæ princeps Auicennas affirmabat ossium agglutinationem in biliosis, cōualescentibus, & primis senibus, difficillimā esse: in decrepitis verò ac valde senibus impossibilem. Cæterum costa aliquando tota, interdum non tota frangitur: nempe cum pars

15 eius interior (quæ rara est) duntaxat læditur, iunimo osse manente integro. Si tota costa perfracta est, casus asperior est. Nam & graues inflammationes, & febris, & suppuratio, & sæpe vitæ periculum sequitur, & sanguis sputur. Narium fractura peior

20 est, ubi aut ossi, aut cartilagini fractæ, cutis quoque vulnus accessit. In cranij fractura malum portendunt, membrana immobilis, nigra vel liuida, vel aliter coloris corrupti, dementia, acris vomitus, nervorum vel resolutio, vel dissentio, caro liuida, maxillarum rigor atque ceruicis. Spem verò certam faciunt membrana mobilis, ac sui coloris, caro increscens rubicunda, facilis motus maxillæ, atque ceruicis. Cætera quæ ad somnum, cibi desiderium, febrem, puris colorem attinent, eadem quæ in cæteris

30 vulneribus, vel salutaria, vel mortifera sunt. Fersu rumen seu agglutinationem in ossibus remorantur, multa ex aqua calida perfusio, crebra superpositorum mutatio, festina nimis ac præpropere membri affecti dimotio, nimia coarctatio, & quæ parti oblatæ (alimenti in eam distributionem prohibendo) atrophiam inducit. Sanguinis quoque viscosi penuria. Item & fragmenta quæ remanserunt.

Ossa quæ fracturam experta sunt, rectè commissa

*Nota mali
aut boni
indices in
fractura cranij*

*Quæ agglu
tinatione re
moratur in
fractis ossi
bus.*

*Ossis fracti
rectè commissi
si note.*

esse, restantur, æqualis membri perfracti compositio & figura naturalis, si alteri sibi compari, nihil noxæ perpeffo, conferatur: dolor sublatus, ac veluti quidā voluptatis sensus, sanguinis quoque solerti quadam naturæ prouidentia, ac fracturæ locum expulsi apparitio. Proindè non minùs verè quàm communiter, dici solet, quòd tumor membri perfracti, post primā eorum quæ fracturæ admota sunt mutationem, sine magno dolore apparens: atque vbi fracti ossis partes rectè concurrerint, & in naturalem situm aptatæ fuerint, euanesceat, certam salutis spem pollicetur. Sed iam tempestiuum est fracturæ in vniuersum curandæ veram methodum, quamq; ipsa rei natura præscribit, tradamus.

Generalis curandæ fracturæ methodus.

CAP. III.

Vnitio, finis primus quòd redit is qui fracturam curat.



Voniam fracti ossis soluta partium continuitas est, vtiq; (inquit Gale.) finis quò tendet is qui fracturas curabit, saltem primus vnitio est. Quòd si is primus in curatione propositus finis per affectarum partium siccitatem perfici non possit, restat alter, qui est vt alterius cuiusdā interuentu disiectæ ossis partes glutinentur. Qui si nec ipse comparabilis aduertitur, insanabile esse vitium dixeris. Quod igitur coalescere (saltem per se & nullius alterius ope) nequeat tam durum os, quàm id quod in iuuenibus & adolescentibus, & viris, multoq; magis in senibus cernitur, id profectò (inquit Galenus) vel cuius patere potest. Quæcunque enim concreescere ac coalescere debent, omnino mollia humidaq; sint naturaliter oportet. Quæ igitur dura siccaq; sunt, eorum diuisæ partes coire simul nequeunt, sed glutinum aliquod vinculum eue, quo cõmissa maneant, requirunt. Itaque potest certè illud os tantum vnitio nem per se, & nullius alterius interuentu recipere, quod abundè molle est, cuiusmodi cõspicitur in puerilis

Quorū fracta ossa coalescere non possunt: & quorum possunt. Lib. 5. meth. medendi.

- rilis: in adultis verò, & ficcioribus corporibus, sepa-
 rata fracti ossis particula, non per se vnquã, sed sub-
 stantia duntaxat quapiam interueniente, ceu glutis
 no quodam, ferruminari colligariq; secum possunt.
 Interuenit autem ea substantia, quoniam omnis pars *Pars. i. calli*
 rricula sibi familiare trahit alimentum, os autẽ cras- *substantiam*
 sius ac terrenum magis quàm aliud quoduis nostri *de nascatur.*
 corporis membrum alimẽtum ad se allicit, exugitq;.
 10 Quod autem ex hoc ipso proprio ac maximẽ idoneo
 ois alimento redundat, & in labris fracturæ cõres-
 cit, suo ipsius interuentu ossi, extrema dura licet &
 sicca conglutinat, vt sæpẽ vsu euenire conspiciamus.
 Vocatur autem corpus id, quod sic fracturis innas-
 15 tur, Græcis *πῶρος*, Latinis verò callus, qui (vt suprà de *Calli medio*
 vulneribus ossium diximus) mediocritatem in cras- *critas.*
 sitie, & tenuitate, duritiẽ etiam ac mollitiẽ feruet
 oportet. Sed de hoc adhuc in sequentibus. Age
 igitur dicamus, quomodo finem hunc primum,
 20 quo tendit is qui fracturam curat, nempe vnitio-
 nem assequi valeamus, initium quidem facientes
 ab ea fracturæ differentia, qua per transversum
 os frãgitur, & suo loco excidit. Quãdoquidẽ hoc fra- *Scopi qua-*
 cturæ genus sæpius incidit. Itaque quatuor me- *tuor. in cu-*
 25 cle intentionibus, in hac fracturæ differentia curãda, *rãda fractu*
 est opus, quas & scopos appellare possis. Prima intẽ- *ra. q. p. trã-*
 tio est, vt fracti ossis partes rectẽ committãtur, & in *uersu facta*
 naturalẽ sitũ coaptentur. Secunda, vt ritẽ commissa *est, medico,*
 ossis perfracti extrema, cõiuncta atque immota ma- *pponuntur.*
 30 neant. Tertia vt *πῶρος*, seu (vt dicimus) callo interue-
 niente disiunctæ ossis partes agglutinentur, coales-
 scantue. Quarta est, sympt. matum, hoc est accidẽs-
 tium, quæ fracturam sequi consueuerunt, correctio.
 35 Quod ad primam intentionem attinet, cum in hac
 fracturæ differentia quam *καυλῶν καὶ ῥακανῶν*, id
 est, per transversum fieri diximus, sic à se fracti ossis
 partes dissideant, vt è directo nõ iaceant, clarum est
 primum id esse agendum vt in directum agantur. *Recta par-*
 Directum autem hĩc vocamus, quum in figuram *tiũ fracturũ*
in uicẽ com-
missio, &
coaptatio.

Lib. 6.
Methodi.

pristinam naturalemq; situm reducuntur. Sanè (inquit Galenus) eum situm habuerint, si quis ea quæ sic dissident integræ partis exemplo usus, in contrariū adducat. A qua nimirum certissima iudicatio trāspo-
sitionis eorum erit. Fieri enim potest, ut tum prorsum, tum retrorsum, tum in hanc partem membri, tum in illam facta translatio sit. Quæcunque igitur retrorsum magis sunt acta ea prorsum impelli conueniet. Nec minus alteram quoq; fracti ossis partē modicè ad contrariū retrudi. Contra quæ prorsum sunt emota, hæc rursus ipsa quidē retrosum, reliquā verò partem sensim duci prorsum. Eodē etiam modo, & eorum quæ ad dextrā sunt detorta medicatio est: si ad sinistram ducantur contraq; eorum quæ ad sinistram, si mutetur ad dextram semper scilicet altera parte modicè in contrarium acta. Guido à Cauliaco (præmissis quibusdam præceptis communibus: quæ hic suo loco referemus) quomodo primam hanc intentionē assequi possit, verbis non adco multis perstringit. Itaq; iubet imprimis membrum per fractum, [si ossa suis sedibus (quod sæpius cōtingit) exciderint, aliudq; super aliud efferatur, & musculi ad capita sua retracti sint] decenter intendendū esse.

Guidonis
præcepta
de reductione
fractura.
Cel. libr. 8.

Deinde os depressum attollendum, & eleuatum depressum, atq; id quatenus fieri licet sine dolore, donec ossis fracti fines rectè concurrant, & in naturalem situm coaptentur. Neq; enim vnquam fracta eiusmodi ossa, & suis etiam sedibus mota, in suum locum veniunt, nisi illa per vim aliquis intendar. Intendere autem digitum: vel aliud quoq; membrum si adhuc tenerum est, etiam vnus homo potest, cum alteram partem dextra, alteram sinistra apprehēdit. At verò valentius membrum duobus eget, qui in diuersa contendant. Si firmiores nerui ac tendines sunt, (ut in viris robustis, maximeq; eorum femuribus & cruribus euenit) habenis quoque vel lineis fasciis vtrinque capita articulorum deliganda, & per plures in diuersa ducenda sunt. Cavendum autem

autem semper est: ne immoderatus contractum
 membrum extendatur. Immoderata enim distentio
 in duris praesertim & siccis corporibus, vehementes
 dolores febres conuulsiones, & resolutione interdū
 5 inducit. Quin etiam per eam diuelli ac distrūpi mus-
 sculorum: ac neruorum fibras aliquando contingit.
 Proinde summa in hac re prudentia opus est. Igitur *Aeger quo*
 agro in sedili collocato: vel resupinato potius: vt *modo collo-*
 Sorano placuit, ministris duobus iubeamus huic, *candus, in*
 10 supra fracturam illi, infra digitos circūponant, atq; *fractis artu-*
 sic tensionem perficiant. Quod si valentiore opus *bus.*
 sit intentione, non solum manibus: sed etiam vt dixi-
 mus habentis aut funibus intendere aggrediemur.
 Ergo duos funes aequales contractio membro, verbi
 15 gratia brachio aut cruri circundamus: vnum supra
 fracturam: alterum infra: atque vni ministro ad
 aegrotantis caput consistenti, alteri iuxta pedes, ca-
 pita funium tradentes, iubeamus in diuersa mem-
 brum perfractum distendere. Vbi paulò lōgius, quā
 20 naturaliter esse debet, membrum vis fecit distentio
 remittenda est: ac tum demum ossa manibus in suā
 sedem compellenda sunt. Ossis autem repositi certū *Distentio*
 indicium est dolor sublatus. Ceterum ossibus fra- *quando re-*
 cturā iam sic probè coaptatis iuxta Hippocraticā *mittenda.*
 25 consuetudinem membrum deligandum erit: vt fra-
 ctum subiungemus. Modus alius reducendi ossa fra-
 ctā in suum locum & naturalem situm per disten-
 sionem, libro de fracturis traditur ab Hippocrate,
 qui & à Paulo refertur libro sexto sui operis de re
 30 medica, quo etiam si velis, & parata habeas quę des-
 cribit instrumenta vti poteris. Sed hic modus quē
 supra posuimus longè facilior, & magis ad ma-
 num est. Atque eo etiam Soranus medicus uteba-
 tur, estq; hodie apud nos in frequentiore vsu. Opor-
 35 ter igitur (vt summarium dicamus) aut manibus *Anacepha-*
 ipsis, vtique si contractum membrum exiguum *leosia.*
 est, aut vinculis impositis: si maius est, & validior
 re tractu opus sit: aut eiusmodi instrumento quod

440 Institut. Chirurgicarum, Lib. IIII.

nobis Hippocrates descripsit, antitaxim ossium facere, hoc est retrorsum ea trahere: ut è directo committantur, exactaq; eorum coniunctio fiat: sic ut pristinam unionem imitentur. Postea verò quàm abundè retracta fuerint, & nullus amplius superfit metus, ne se in adducendo contingant, tum in directum opponere, vinculaq; relaxare, ac musculis ipsis diductorum in idem commissionem permittere opus est. Interim verò (rectè Galenus admonet) re ipsam quoque qui operi præses, manibus subservire expedit: ac sicubi aliquid paulum subsultet, ac promineat, corrigere atque formare. Cæterum in adducendis sic: ut supra expressimus, contrario motu partibus, ne aliquæ frangantur ossium extantia non leve periculū est. Non enim veluti (inquit Gale-
 nus) in ferra defectis visitur lævis est semper utriusq; partis finis. Quòd si illæ (ossium inquam extantia) fortè fortuna frangantur, non poterunt ad amussim secum coaptari fracti ossis fines: tum quia forsitan fragmenta inter partes uniendo intercederint, tum etiam quòd quidpiam ossium fortè extra ceciderit, & comminutum perierit: unde spatia inter applicata simul ossa, maneant inania: in quæ sanies collecta: atque temporis tractu putrescens, totum pariter membrum secum corrumpet. Atque hæc tractandæ fracturæ ratio omnibus propemodum confractis artubus convenit: ubi præsertim ossa fracta suo loco (ut sæpius contingit) exciderint, aliudq; super aliud effertur. Neque enim semper dum franguntur ossa suis sedibus moveri contingit: sed interdum fracta in suo loco: ac naturali situ remanent. Quòd ante omnia (ut nos admonet Celsus) considerari debet: & sunt notæ certæ, quibus id discrimen deprehendere possis. Namq; si suis sedibus mota sunt: resima apparent punitionisq; sensum repræsentant: ac tactu (ut supra annotavimus) inæqualia sunt. Vbi verò loco suo non exciderunt, neque punitionis sensus ullus, neque vlla quæ

Ossium extantia.

Notæ ossis fracti, & sua sedemoti.

quæ tactu percipi possit inæqualitas adest. Caterū si primis diebus ossa ipsa perfracta & suis sedibus mota reposita non sunt: non leue inflammationis periculum subest. Sub qua & difficile, & periculorū se vis neruis & tendinibus adhibetur. Atq; hæc de prima intentione dicta sufficiant.

- Secundus scopus in curandis fracturis nobis propositus est: vt ossibus iam sic (vt supra docuimus) ^{Secundus scopus.} probè coaptatis: & è directo admotis, eorum positura seruetur, & exactè coniuncta maneant, sic vt pristinam vnionem imitentur. Porro nequaquam prohibere poteris, quin diuisa eiusmodi ossa, quæ sic effinxeris & adamussim secum coaptaueris, iua se de moueantur, & rursus dissideant, si laboras quorū quopactō vel vigilans: vel dormiens, membrum fractum dimoueat. Ergo vt secūdu hunc scopum ^{Membrum perfractum} assequaris, perfractum membrum prorsus immotū ^{prorsus immotum seruandum.} consistat necesse est. Quod si ipsi quidem ægrotantes: vt quietudini membri prospiciat permiseris, ^{Libro.6. Metho.} vigilans: fortassis (quemadmodum inquit Galenus) probè id curauerit, at dormiens omnino membrum mouebit. Vt igitur non dormientis modò hominis, sed etiam ad desidendum, itemq; cum cubile refternitur surgentis, eorum quæ ritè formata, & exactè coniuncta sunt positura seruetur, tuta deligatura ^{Oss fractum deligandum esse, & quare.} complecti fracturam oportet, quæq; fracti ossis partes secum coarctare adamussim possit, Tuta autem non erit deligatio, si vel nimis arcta: vel laxa nimis fuerit. Quandoquidem per laxiorem ossibus moueri licet, per arctiorē verò & vehementius adstringentem, &imenti in locum affectum distributio prohibetur, & dolor (qui humorum in ægram partem affluxus euocat, & phlegmonas creat) excisatur. Danda itaque opera est: vt vtrumque excessum ^{Deligaturæ modus.} declinemus. Confirctio igitur mediocris esto, tum nostri sensus, tum ipsius ægrotantis iudicio. Ac si quidem æqualis esset crassitudinis membrum quodque, vtrique latissima fascia (vt Galenus ait)

Cō in libro Hippo. de fract. & 6. therap. commodissima esset, utpote quæ totum æqualiter, cōtinenterq; ex omni parte fractum os complectens retur. Sed quoniam id non est, quod deest nobis ex fasciarum latitudine, circuituum numero pensabimus, ut in artubus ipsis, qui omnium maxime fracturæ per transuersum factæ, expositi sunt. In talibus nanque utilior est angusta deligatura quam valde lata & remissa. Quippe quæ nec rugas, ut ea que latiore fascia fit, contrahat, & totius membri cui circumdata est, cutem coningat. Eò igitur usque augere tibi latitudinem fasciæ licet, quoad nulla eius pars laxior efficiatur. Cæterum in eiusmodi deligatura, quæ fracturis (in medio præsertim brachij, vel tibie, aut femoris existentibus) adhibetur, duabus fasciis lineis mollibus (iuxta Hippocratis dogma) opus est. Has autem Hippo. ipse nomine peculiari perfractos, *ὑποδομῆς*, id est, subligamina, seu malis subfascias ex Hippo. tiones appellauit. Primæ fasciæ initium super fracturam initiari debet, ac circa eam bis terue conuoluta, sursum versum ferri, & quasi in cochlea serpere, atque illic desinere. Id tamen perpetuò obseruandum est: ut multum partis sanæ fascia hæc complectatur. Ita enim fiet: ut & firmus reposita ac conformata ossa contineantur, & magis ab affecto loco in circumvicinas partes humores elidantur, magisque ne hi à superiori parte eo defluant, impediatur. Altera etiam super fracturam debet incipere priori aduersa, deorsumq; (ubi primos complexus super fracturam fecit) tendere: atque inde iterum reducta in superiore parte ultra priorem fasciam desinere. Quocirca dimidio longior priore esse debet. Terminus autem longitudinis earum fasciarum, non vnus ac certus statui potest, sicuti nec etiam latitudinis, sed pro magnitudine fracturæ, & perfracti membri crassitie vtraque dimensio varianda est. Hunc Hippocrates libro *πρὸ κατ' ἰντρον*, id est, de medicina seu medici officina, & libro de fracturis, trium aut quatuor, aut quinque: aut sex cubito

bitorum longitudinem : digitorum verò latitudi-
 nem constituit. Digiti autem & cubiti intelligendi
 sunt eius ipsius qui deligatur, nempe vel viri adulti
 vel pueruli. Hæc autem duplicis deligaturæ ratio,
 ex ipsa rei natura desumitur. Quandoquidem duo
 hæc prima lintea fracturam quidem muniunt ac
 stabiliunt, nec phlegmonem (quæ in hac re impris-
 mis est arcenda) oriri sinunt. Siquidem & ab inter-
 gris ad laborantem particulam sanguinis confus-
 10 xum arcent, & quod iam collectum in ea est expri-
 munt. Prior quidem deligatura quod in læsa par-
 te continetur, ad superposita expellit atque elidit:
 quod verò ex iis (superpositis inquam partibus) in
 locum perfractum confluit, repellit. Altera verò pri-
 15 mis quidem complexibus, quos, ut suprà diximus,
 super ipsius fracturæ locum facit, itemq; dispensa-
 tione deorsum tendente, quædam ad inferiora ex-
 trudit, quædam, ne quid ex iis in locum fracturæ
 confluat prohibet. Reliquis verò deinceps complex-
 20 xibus, quibus videlicet ab infimis partibus sursum
 versum recurrere deligaturam diximus, ut eodem
 scilicet loco cum priore fascia, secunda desinat: tum
 ad superiora (vtri & priore ligatura) repellimus,
 tum confluxum ab iis prohibemus. Cæterum prius
 25 quàm fasciis huiusmodi fractura deligetur, vnus
 aut alter panniculus lineus, Candido oui liquore &
 rosaceo delibutus, nudo membro non absque ra-
 tione à recentioribus chirurgis superaccommoda-
 tur, ea quidem magnitudine, ut etiam aliquid par-
 30 tis sanæ comprehendat. Sunt autem eiusmodi fas-
 ciæ duæ prælongæ, nempe quatuor, aut quinque,
 aut sex, ut diximus cubitorū, & circa tres quatuor-
 ve digitos latæ, aqua aut posca potius madefactæ,
 & postea expressæ, præsertim si fractura inflam-
 35 matione vacet, recensq; sit. Si verò dolor vehes-
 mens, aut inflammatio adest, lanis tenuibus mol-
 libusq; aut stupis læuibus oleo vel oxycrato im-
 butis membrum contegendum est, & non ita arctè
 delig

Prioris deli-
 gaturæ vis
 et facultas.
 Quid secun-
 da deligatu-
 ra efficiat.

Fasciæ nū-
 mero &
 latitudo.

Si inflama-
 tio adest, cū
 fractura.

444 Institut. Chirurgicarum, Lib. IIII.

deligandum. Satis enim fuerit tunc, si deligatura adhibeatur, quæ & membrum utcumque fulciat, & admota medicamenta, ad hæc symptomata profulganda idonea, contineat. Verum enim vero cum hæc duæ primæ deligaturæ, ad ambos hos vîsus quos supra retulimus, (nempe ad fracturæ munimentū stabilimentumq; & ut phlegmone excitari prohibeatur) non satis adhuc faciant, præsertim solæ, ad earū quidem tutelam & fracturæ stabilimen Hippocrates remedium excogitauit, ut scilicet plagulæ, siue

*Splenia cur
adhibeat
Hippocrates*

splenia à splenis forma ita appellata vnâ cum exterioribus fasciis, quas, *ἐπιθίγματα*, id est, superligamina vocat, desuper adhiberetur. Et hæc quidē tertiæ deligaturæ rationē quibusdā obtinet. Splenia enim eiusmodi siue plagulæ, duarum primarum fasciarum quæ peculiari nomine *ὀπιοειδή*, id est, subligamina Hippocrati appellantur, firmamenta sunt, ut commentariis in librum Hippocratis de fracturis Galenus annotauit. Ne autē phlegmone suscitetur, medicamento quoqiā ex iis, quæ inflammationū iniurias

*Ceratū humidum cur
adhibetur.*

arcent, uti censuit. Quale nimirū est ceratū humidū siue liquidum, quod confici solet ex cera in rosaceo aut oleo colliquata, aut eius loco rosaceum. Huius sententiæ fuit & Cornelius Celsus libro octauo, sic inquit: Super has (duas inquam primas deligaturas) iniiciendum latiore linteo ceratum est, quod eas continet. Quod si ossis fracturæ, carnis quoque vulnus accessit, neque ceratum, neque rosaceum rutò admouetur: quandoquidem hæc vlcus tum sordidū tum putre efficerent, sed in vicem eorum puluilli prelongi vino nigro ac styptico imbuti, superiniiciendi erunt. Reliqua autem curatio, quæ eiusmodi fracturis cum vulnere incidentibus conuenit, in sequentibus dicetur. Porro præter has modò à nobis

Si ossis fractura carnis quoque vulnus accessit.

Aliæ quatuor Corn. Celsi deligaturæ.

commemoratas deligationes: quasdam adhuc alias quatuor commemorat aurelius Cornelius Celsus capite decimo, libri paulo antè citati. Sic autem eas dispensat, ut semper insequens priori aduersa sit, & tertia

- tertia fascia (quæ duas primas ac splenia comprehen-
 dit) tantum in inferiore parte, tres reliquæ in super-
 5 riore finiant. Quia satius est (inquit) sapius circuire
 10 quàm adstringi. Siquidem id quod adstrictum est
 alienatur, & cancro oportunitum est. Quo loco (ni
 fallor) cancrum pro sphacelo, quem vulgus medis-
 corum esthiomenum vocat, vsurpauit, vt & quis-
 busdam aliis locis. Cæterum cum multis complexi-
 bus atque inuolutionibus quæ illæ superius comme-
 15 moratæ Hippocratis deligaturæ, fracturam conti-
 neant, (aliàs enim parum tutæ essent) tam numero-
 sis fasciis opus esse minimè censeo. Hæ enim in mem-
 bro ipso perfracto, præter solitum cooperto, & pru-
 ritum & dolorem (quæ duo symptomata à fractis
 20 membris diligenti studio arcenda sunt) excitare, at-
 que etiam eius quod iam infixum fracturæ est, pers-
 pirationem prohibere possunt. Porro vbi decenter
 sic membrum confractum deligaueris, de apposis
 25 ta repositionis ipsius figura, maxima tibi sollicitudo
 habenda est. Siquidem sub alia forma aut figura
 membrum perfractum deligare, in aliam verò mu-
 tare ac reponere, non dolorem modò (vt inquit
 Galenus) excitare potest, verum etiam ossa intor-
 30 quere. Necesse enim est, vbi figura mutatur, alios
 musculorum tendi, ac velut contractos rotundari,
 alios verò solui ac remitti. Vbi autem tenduntur,
 tum premi eos à deligatura est necesse, tum ex com-
 pressionem ipsa dolere. At vbi tensio remittitur, quo
 loco deligatura est laxa, ibi fracturam fulcimens
 35 to destitui. Cæterum aptissima fuerit in ossium frac-
 tiorum repositione, sicuti etiam & in retractione,
 (quam Antitasin diximus à Græcis appellari) &
 coaptatione, & deligatione: partis figura, quæ (vt
 verbo vno dicatur) maximè à dolore abest, & in
 40 qua æger persistere immotus diu possit. Hæc enim
 & rectissima est, & maximè naturalis membro, ac
 ferè consueta. Rectissimam autem hîc partis figu-
 ram cum Galeno vocamus, quæ venas, arterias, & mus-

*Cornelij Cel-
si opinio re-
felleatur.*

*De apposita
repositionis
perfractum
bri figura.
Ex Galeno.*

*Repositionis
figuram ad
duo directâ
esse.*

*Rectissima
figura que
mus-*

dicatur Ga musculos quàm rectissimos habet. Itaque angus
leno. losa figura, quæ ἰσχυρὸν Græcè dicitur, brachio
 quidem maximè naturalis est crurì verò, quæ pau
 lò minus porrecta est. Hæc namque & rectissis
 ma est, & à dolore maximè aliena. Cæteràm ta
 met si angularis figura, quæ Græcis ἰσχυρὸν dicitur
 tur, propriè ea dicatur, quæ acutum angulum,
 quem recto minorem appellamus, efficit, per engu
 non tamen, id est angularem figuram, Hippocra
 tes eam intelligit, quæ recto angulo constituitur, 10
 non prorsus tamen recto, vt quodam in loco Gale
 nus est interpretatus, sed propè ad rectum acceden
 te, ita vt paululum ad obtusum tendat: cuiusmodi in
 manu, quòd vulgò brachium appellamus, ea figura
 est, non quæ prorsus quidem inter extensionem & 15
 inflexionem media est, sed quæ ad extensionem pro
 cedere incipit. Quo plærumque positu eos qui do
 lore afficiuntur, sed diligenter inspexeris, manus re
 nere deprehendes. Porro vt dolor vitetur, cùm ad
 quietem membrum reponitur, non modò naturalis 20
 habitus cuius instrumentum est utilis, verumetiam
 consuetudo quoque conducere nonnihil videtur.

Ratio inue- Ergo vt aptè membrum perfractum, & decenter li
nienda figu gatum reponatur, ea situs figura illi inuenienda est,
re, in qua quæ & naturalis sit & consueta, & à dolore maxi
custodie mè aliena. Sed iam hæc indicationes inter se consens
membru per- tiunt, & conspirant maximè. Nam quæcunque figu
fractum con- ra magis quàm alia est à dolore libera, ea & maxi
ueniat. mè naturalis membro, & ferè consueta esse solet.

Ex Galeno Atque econtrà, quæ naturalis & consueta est, ea à 30
& Hippo. dolore est alienissima. Atque hæc quidem figuræ,
 in qua custodire membrum perfractum conueniat,
 inueniendæ ratio est. Vt autem in hac naturali, &
 quæ doloris minimum habeat, figura immotum

Ferule qua- prorsus (quo ad expediet) membrum persistat, res 35
do in fractu centiores Chirurgi secundum deligaturam, protis
ris circumpo nus ferulas etiam circumponunt, ipsas quidem cons
nende. stringentes, prout sensus & tumor ex inflammaz
 tione

- tione (si qua adfit) postulat. Veteres autem, ut Hippocrates. Celsus & Galenus, à die tantum septimo vel etiam nono & undecimo, ferulas accommodabant. Verum non abs re factum putamus, si statim ab initio post deligaturam, ferulæ iniiciantur, modò nimis premendo dolorem non excitent, aut phlegmonem (quæ maximè arcenda erat) accerfant, vel præsentem si adfit) exacerbent. Quæ igitur à principio adhibentur à recentioribus ferulæ, non eo nomine adhibentur circumponenturve, ut adstringant, sed ut adaptationis figuram contineant, & ossa in suam sedem reposita utcumque fulciant. Primis nanque diebus cum phlegmones deuitandæ consilium vinceret, tutum non erat perfractum membrum ita ferulis premere. Cum verò nullus iam amplius futuræ inflammationis metus sit, aut ea quæ prius fuit discussa, membrum aliquanto gracilius quam pro naturali habitu apparuerit, (quod intra septimum diem ferè solet contingere) tum licebit ferulas circumponere, & eas (ut fracturam stabiliant) validè satis astringere. Ferularum enim usus idem est, qui & plagularum seu spleniorum, nempe ut fractum os contineant, & deligationem stabiliant ac firment. Suntu autem ferulæ, ut libro qui inscribitur τὸ κατ' ἰατρικὸν, id est, de iis quæ in medicatrina seu medici officina fiunt, rectè præcepit Hippocrates, læves, id est, læuigatæ & planæ: æquabiles, id est, neque in latus, neque in superiorem, aut inferiorem partem distortæ: in summis partibus, id est, extremitatibus, resimæ, id est, leniter derastræ ac resustæ: minores hinc inde quam deligatio est: & ea parte crassiores, id est, latiores & valentiores, ἢ ἐξ ἑξήκοντα τοῦ κατὰ μῆκος, id est, qua fractura erupit. Læves autem ferulas, id est, non asperas (Iqui enim asperum opponitur) adhibendas esse censet Hippocrates sua asperitate, & inequabilitate (quod enim asperum est, continuò etiam est inæquale) fractis partibus negotium facessant. Vtroque enim modo

compr

448 Institut. Chirurgicarum, Lib. IIII.

cōprimūt. Cæterum quoniā fieri potest, vt ferulæ le-
ues sint, nō tñ æquabiles (inæquabile enim nō pro-
nus necessariō est asperū: vt patet de via quæ ascēsus
habet & descensus, non asperos) ideō non solū læ-
Aequabiles. ues, sed etiam æquabiles, id est, non distortas assu-
mendas esse ferulas monet. Quæ enim distorte sunt,
similiter, vt aspera lædunt. ac illud insuper efficiunt,
Simas. quòd deligationem simul distorquent: qua distorta,
pars etiam fracta distorqueatur necesse est. Simas
prætereā in extremis partibus eas deligi voluit, id
est, vt Galenus interpretatur, leniter derafas ac retu-
sas in extrema parte, ne sua acutie articulum lædant,
& æqualiter vbiq; partem fractam, propter æqua-
Crassæ. lem suam crassitudinem, compriment: quod certè
fieri nullo modo debet. Vult enim Hippo. vt in me-
dia parte, hoc est, supra locum fracturæ, *νάρθηκες*, id
est, ferulæ, deligationem magis astringant. Hinc ea
parte, hoc est, supra fracturam ipsam, crassiores esse
iubet: quia scilicet locus is potissimum (vt suprā
ostendimus) compressione ipsarum indiget. Vult itē
Minores. minores eas esse longitudine, id est, aliquanto bre-
uiiores, quàm sit ipsa deligatio, ne cutem ultra deli-
gationem attingant: quæ sæpenumero ex eo quod
humores à fasciis expressos suscipit, paulò altius tur-
gescit atque extat. Sed & breuioribus ferulis vtens
dum præcepit senior ille Hippo. ne pars eminentior,
id est, gibba & carne nudata, attingatur, vt circa cu-
bitum, & malleolos, vbi ossium extuberationes
sunt. Modus autem ac ratio adhibendi ferulas, talis
*Modus ac ra-
tio adhiben-
di ferulas.* esto. Splenia triplicia aut quadruplicia oleo delibu-
ta, super fascias similiter atque æqualiter, si mem-
brum in crassitie fuerit æquale, circumdato. Si verò
inequale, partibus magis concavis, per splenia reple-
tis, membrum vndique æquale ferulis accommo-
dandis effcito. Deinde ferulas lana, aut stuppa me-
diocriter inuolutas, in orbem, non minore quàm
vnius digiti spatio inter se distantes fracturæ circum-
dato, easq; leniter ac moderatè constringito. Sed &
in hac

in hac ferularum accommodatione summopere casuero, quatenus fieri potest, ne articulus aliquis, (vt paulò antè notauimus) & præcipue interior flexus pars, ab eis attingatur. Vlcera siquidem in ipsis nonnunquam, & neruorum inflammationes pariunt: itaque illic, hoc est, iuxta articulos ipsos deligatione aliquantò (vt diximus) breuiiores, tenuiores, laxiores, & magis flexibiles ferulas esse oportet, quæadmodum valentiores qua fractura excidit atque inclinat. Cæterum si nulla prurigo, nulla inflammatio, nulla suspecta exulceratio, nullusue dolor adest, & ossa rectè commissa fuerint, fracturæq; rectè procedat, sic manere ferulas, & ligamenta, ad decimum vsque diem, vel quintum & decimum, aut etiam vigesimum, vtile est. Si verò in membro perfracto præter solitū cooperto, vel dolor exciteretur, vel pruritus creetur, vel eius quod iam infixum fracturæ est perspiratio prohibeatur, propter quàm non modò noxius pruritus quibusdam accidit, sed etiam erosa à saniei acrimonia nonnunquam cute, exulceratio concitatur, non abs re feceris, si tertio quoque die vt iussit Hippocr. deligationem solueris, & membrum ipsum aqua temperata perfuderis ac foueris. Hac enim perfusione & acrem atque erodentem sanie discuties, & dolorem mitigabis, & prurigini pulchre medeberis.

Porro cum nec ferulis, nec deligatione, nec figura sitūye membri appposito, diuisæ ossis partes (tametsi exactè atque adamussim coniunctæ fuerint) citra glutinum aliquot vinculumue (vti suprà diximus) coire, ac concreescere possint, maxima calli, quem peron Græci dicunt, gignendi sollicitudo habenda est. Ad hunc igitur gignendum cogi crescereque aliquid proprii ossium alimenti, crassi terreniq; oportet, quod in labris fracturæ coalescit. Ipsum igitur nec eluendum, nec foras euocandum est, sed sinendum. Crassa autem hæc terrenaque substantia, ex genuino, maximeque idoneo ossis ali-

mento redundans (quæ propria est calli materia) diem circiter duodecimum, aut decimum quintum ab ossis fractura ferè gigni, atque accrescere incipit, vt recentiores chirurgi testatum reliquerunt. Cæterum huius generatio (quæ in aliis citius, in aliis

Callus quibus notis generari deprehendatur.
Victus parò gignendo aptus.

Dolor qui prius aderat, sedatur, nullus amplius inflammationis, aut tumoris alicuius præter naturam metus adest, in membro perfracto bonus ac natus color efflorescit: vniuersa autem victus ratio parò gignendo accommodata, talis esto. Dum callus gignitur, victum paulò pleniorē, quàm ab initio fracturæ, laboranti instituito. Cibos, qui boni succi sint, & multum nutriat, nisi vulnus adsit) exhibeto. Sed & quæ offeruntur alimenta, talia sunt, ex quibus

Lib. 6. Metho.

prouenire succus soleat non solum bonus, sed etiam tenax, ex quali fieri callum maximè expedit. Quippe (inquit Galenus) cum ex serosa humiditate, ac tenui gigni prorsus nequeat: ex crassa verò, sed quæ fragilis sit, ac pinguitudinis expers gigni quidē poterit non segniter: cæterum tempore siccescens friabilior, atque ita fractioni obnoxius redditur. Itaque parò gignendo conueniunt Auicennæ: Risum, panis similagineus, frumentum triticeum, tan-

xi sumat

dū in aqua coctum, donec fiat (inquit) sicut puls: id Galli vulgo appellant (fromentée.) Alicam nonnulli esse eximant. Ad hæc, pedes, ventres, & capita animalium, sed præsertim hædi, & veruecis: Hæc enim & multū alunt, & crassi ac tenacis succi sunt. Circa initium fracturæ vsque dum callus gignitur, (quod ferè circiter decimum diem contingit) egrum tenuissimè cibato. Cibi namque subexiles (vt censuit Hippocrates) & non validæ materiæ tunc satis sunt. Venam interdum, cum scilicet res exposcular, secato, & per ventrem superuacua expellito. Carne & vino vsq; ad decem dies, ex Hippocratis præscripto, abstineto. Post hoc tempus, vinum crassum & stypticum audacter concedito tamen si Celsus

Lib. de fracturis.

vinum

vinum per omne tempus alienum esse dixerit. *Parī magnitudo* calli nec minor quā par est, nec maior *magnitudo*. iusto sit, sed mediocritatem ad vnguem seruet. qui enim iusto minor est, hic ossa parum tuta reddit: qui maior est, dolorem musculis inuehit. ergo calli magnitudo, vt breuiter dicam, ea sit, quæ & ossibus tuto vinculo sit, nec musculos tamen comprimat, attendendum verò diligenter est, quemadmodum nos Galenus admonet, vt vel promoueatur, si minor iusto proueniat: vel inhibeatur, si immodicè crescat. Quibus verò hæc efficies, paulò pōt dicemus. Atque hæc de parī generatione, qui tertius erat scopus, in curandis fracturis nobis propositus, dicta sufficiant. Superest igitur de quarto, & vltimò scopo agamus, qui dispositionum præter naturam, *Quartus scopus.* quæ fracturæ interueniunt, emendationem, atque *Symptumata quæ fracturam committantur.* ablationem concernit. Ex autem ferè sunt, dolor, *Dolor.* inflammatio, pruritus, vulnus, immoderata siccitas, *Inflammatio.* aut humiditas callo gignendo obfistens: gangrena, durities, *parī magnitudo*, aut deficiens, aut excedens. Itaque si dolor, aut inflammatio adsit, deligationem, si iam facta est, statim soluito, & lanam, oleum, & acetum, congruæque id genus alia auxilia parti dolenti, atque inflammate admoueto. Sed neque priusquā hæc sedata fuerint, vel deligationem adhibeto, vel ferulas circumponito, nisi duntaxat eatenus, vt membrum fulciant, & vt impositum medicamentum contineant, hoc est, laxè admodum. Celsus consulit liberale fomentum aquæ *Fomentum aquæ calidæ.* calidæ, dum inflammatio adest, cum verò ea deest, *quæ calidæ.* modicum: sedata inflammatione, & dolore sublato, *Pruritus.* deligationes, & ferulæ, vt supra diximus, adhibendæ sunt. Si noxiùs pruritus accidit, & erosa à faciei acrimonia (vt aliquando contingit) cute exulceratio concitatur, aquæ temperatæ tantum superinfundere oportet, quātum ad euocandā eiusmodi faciem est satis. Hoc quidem Hippocratis & Galeni

452 Institut. Chirurgicarum, Lib. IIII.

consilium fuit. Recentiores autem chirurgici aquā
 fassam infundi præcipiunt, aut vnguento albo, vel
 eo, quod vulgò populeum appellatur, membrum
Vulnus. illini, & vt supra dictū est, deligari. Cum ossis fracturā,
 carnis quoque vulnus accessit, siue statim ab initio
 id factum sit, siue postea à chirurgo inductum, vt
 ossium fragmenta, & ea præsertim quæ pungunt,
 eximantur, si quidem sanguis profundatur, hunc
 prius aptis remediis sistito. Si inflammatio oriatur,
Contusio. præfidiis in eam efficacibus vtitor. Si carnes contusæ
Gangræna. sint, partem affectam, vt gangrænæ periculū euiz-
 tetur, scarificato. Quòd si gangræna quoque ipsa,
 aut alia quæpiam serpens putredo, iam occupauit,
 conuenienter occurrito: horum autem omnium cura-
 rationem in superioribus libris tradidimus. At si nihil
 horum adfuerit, neque magna ossis pars nudata
 sit, hamulis suturisq; vsi, his medicamentis, quæ
 cruentis imponuntur, medebimur, prius tamen frag-
Deligatura gmentis ossium euulsis. Ceterum deligatura fracturæ
fracturæ cū eijsmodi cum vulnere factæ, hoc modo adhibenda
vulnere ac- est. Orbiculares fasciæ partibus vulneris vtrobique,
commoda. hoc est ab vtraq; vlceris parte, initici debent, oblique
 verò supra ipsum vulnus in longitudinem collocandæ
 sunt, sic vt per decussim ad X literæ similitudinem,
 iuxta hiatus occlusio ex omnibus fiat Hippocrates
Hippoc. tamen à prima statim circūuolutione, fascia latiore
 totum vlcus comprehendit, ita vt nulla eius pars
 nuda relinquatur. Itaque si sordidum adhuc vulnus
 est, expurgantia medicamenta, quando opus erit im-
 pones. Si purum, carnem producentia, linteolis illita
 aliamq; vsu comprobata materiam adhibebis. Hip-
 pocrates tamen statim ab initio * picatum ceratum,
 quod ceram in rosaceo, aut oleo colliquatam, & pi-
 cis ficcæ aliquantulum assumit, supra vulnus in lin-
 teolis adhibet. At Galen. autore vtilius à tertio die,
 cū ea quæ in vlcere sunt concoquat, adhibetur.
 Cornelius Celsus omnibus his vulneribus primò
 imponendum iubet linamentum vino madens, cui
 rosæ

rosæ paulum admodum adiectum sit. Si æstiuū tem-
 pus est (inquit Hippo.) ipsa plenā vino frequenter sunt
 irriganda: si hyemale, lanæ multæ succidæ ex vino
 & oleo superimponendæ sunt. Lanarum nanque
 superpositione, & olei commissione refrigerationis
 vehementia, quæ in huiusmodi affectibus conuul-
 sionis periculum interdum inuehit, obtunditur. Vino
 autem madefactæ plagulæ, ob vinum reprimendi
 vim habent. Cæterum ubi purgata vlcera fuerint,
 10 & in eis iam caro concreuit, ferulæ non incommodè
 iniiciuntur: aliqui verò etiam ab initio ipsas accom-
 modant, vlceris locum vitantes, & prout necessitas, ac
 vñs rulerit, ipsas modò cōstringūt modò remittunt:
 sed hæc curandi ratio ab Hipp. & Cor. Celfo nō pro-
 15 batur. Hi enim pluribus tantummodò, & latioribus
 fasciis, ferulas ne videlicet comprimendo lædāt,
 similiter & canales omninò reiicientes, deligaturam
 in eiusmodi fractura, quæ cum vulnere incidit, fieri
 iubent, laxiùs scilicet quàm si ea plaga nō esset: adeo
 20 vt affulcitæ quidem, non compressæ tamen fasciæ
 ipsæ esse videantur. Ita namque (inquit Celsus) nu-
 mero fasciarum efficietur, vt laxæ quoque æquè con-
 tineant. Ac satius quidem est, sæpius circuire, vt antè
 Celsum scripserat Hippoc. quàm astringi. Sed & in
 25 eas fascias multiplices ingerendum subinde, eodem
 Celf. autore, est calidum oleum, & vinum: magisq;
 ubi sic cum vulnere fractura à principio incidit, fas-
 me, id est, exquisitiore victu vtendum, vulnus calis-
 da aqua fouendum, frigusq; omni ratione vitandum,
 30 & transeundum ad medicamenta, quæ puri mouens
 do sunt: maiorq; vulnere, quàm ossi cura agenda. Vt
 autem de hac re, quod ad ferularum appositionem
 attinet, sic apud autores etiam eximios controuer-
 35 sa, id quod res est semel statuamus, hoc tibi tanquàm
 axioma, id est, pronuntiatum esto. Cum fractura
 cum vlcere interdum in longitudinem membri con-
 tingit, tunc ex vtraque vlceris parte ferulas etiam
 ab ipso curationis principio circumdare licitum

*Ferule quæ
 do in fract.
 ra cū vuln
 re adhiben
 de
 Cor. Celsu*

esto. Cùm verò transuersum vlcus euasit, idq; maxis
Si ossis pars me si maius sit, ferulas statim ne imposito. At si
aliqua recess squamula aliqua ex ossē resoluitur (id quidem colz
sura est. ligi ex eo potest, quod & copiosior, tenuiorq; huius
 mor profuit, & caro circa vlcus laxa, & mollis effe-
 cta intumescit) deligatura laxiore ad curationem
 vtendum est, ne scilicet pus intercludatur, sed effluere
 facile queat: frequentiusq; , vt consilic Hippocrates
 religandum, quoad os recesserit, ferulaq; non
 apponendæ. Vbi verò vel hamulo, vel quopiam
 alio eiusmodi instrumento squamam euulseris,
 deligatura iterum validiore membrum adstringes.
 Porro per totum id, quo vlcus curatur tempus,
 medicamen aliquod, ex his quæ inflammatio-
 nem arcet, linamentum continens vulnere in-
 cumbet, ac simplices fasciæ iniiciuntur, quæ singulis
 curationibus resoluentur, cùm aliæ suprà dictæ
 remaneant. Inter hæc autem, si quod paruulum frag-
 mentum ossis eminet, si id retusum est, in suam se-
 dem dandum: si acutum, antè acumen eius longius
 est præcidendum: si breuius limandum, & vtrinque
 (inquit Celsus) scalpro limandum. Tum ipsum
 recondendum est: ac si id manus facere non potest,
 vulsella (quali fabri vtuntur) iniicienda est, rectè se
 habenti capiti ab ea parte, qua sima est, vt ea parte
 qua gibba est, eminens os in suam sedem compe-
 illat. Si id maius est, & membranulis fragmenta
 cinguntur, finire oportet ea sub medicamentis res-
 solui, idque os vbi iam nudatum est, abscindere:
 quod maturius scilicet faciendum est, potestque
 ea ratione & os coire, & vulnus sanescere: illud
 suo tempore, hoc prout se habet. Nonnunquam
 etiam (inquit) in magno vulnere euenit,
 vt fragmenta quædam velut emoriantur, neque
 cùm cæteris coeant. Quod hîc quoque ex modo
 fluentis humoris colligitur, quo magis necessarium
 est, sæpius vlcus resolvere, atque nutrire. Sequi-
 tur verò, vt id os per se post aliquot dies excidat.
 Cæterum

Cæterum cum tam misera antea cōditio vulneris sit *vulnus in-*
 tamen id interdum maius, diutiusq; facies. Sæpe *terdum ma-*
 enim integra cutis ossē abrupitur, protinusq; prius *ius efficien-*
 25 rigo, & dolo oritur. Quæ solvere (si accidit) ma-
 35 turius oportet, & fouere aqua per æstatem frigida,
 per hyemem egelida. Deinde ceratum myrteum
 imponere. Interdum fractura quibusdā velut aculeis *Si fractura*
 45 leis carnem vexat, quo à prurigine, & punctiōib; *quibusdā*
 bus cognito, aperire id melius, eosq; aculeos præci- *velut acu-*
 10 dere necesse habet. Reliqua verò curatio in utroq; *leis carnem*
 hoc casu eadem est, quæ ubi ictus protinus vulnus *dimexer.*
 intulit. Hactenus Cor. Celsus de fractura cum vul-
 nere facta. Nunc cætera prosequamur. Dum valen-
 ter nimis siccantur ossa, callus agrè provenit: expe- *Siccitas cal-*
 15 dit igitur istis ita reficcatis ossibus tertio: vel quar- *lo gignendo*
 to die modice aquam calidam infundere. Hanc mes- *obstans.*
 tam finiendæ perfusionis habentes, cum carnes in ru-
 brum tumorem attolluntur. Atque in iis quidem,
 priusquam subsidere incipiant desistendum est. Cons-
 20 tra, ubi digeri quid volumus, non prius est desisten-
 dum: quàm quod ex perfusione intumuit, subsidat.
 Si verò humiditas abundantior calli generationem *Humiditas*
 impediat: ibi hanc siccare cōuenienti deligatura & *calli genera-*
 perfusione aquæ, quæ vel minima omnino sit: vel *tionem im-*
 25 plurima conabimur. Quippe minima (vt sexto me- *pediens.*
 35 thodi Galenus ait) cum prius desistat, quàm aliquid
 confluat, & qui ad manum, id est, in superficie, sunt
 humores, per halitū digerit, & qui in alto sunt mor-
 40 dicè liquat. Expedit autem ita solui liquariq; ea,
 30 quæ per deligaturam sunt expellenda. Plurima ve-
 35 rò perfusio plus digerit, quàm attrahit: atque ita cō-
 40 modat superfluxæ humiditati. Attendendum verò
 (vt supra monuimus) diligenter est, vt vel augeas-
 35 tur callus, si minor iusto est: vel inhibeatur, si ni-
 40 mius superuenit. Vtrumque autem vitium corrigis-
 tur perfusionis quantitate, & qualitate ciborū etiā, *Qua ratio-*
 ac medicamentorum, quæ extrinsecus apponuntur, *ne parus,*
 facultate. Ac de perfusionibus quidem, & victus *vel augeri.*

vel minui
possit.

ratione, iam supra est dictum. Ex medicamentis vero quæcunque emplastricam substantiam habet (cuiusmodi est emplastrum, quod ex pice conficitur) ac modicè calfaciant, ea (Galeno autore) callos tū promouent, tum verò augent. Alimentum enim copiosius in locum perfractum attrahunt, sicuti & moderatæ aquæ temperatæ, perfusiones, & idoneæ friciones. Quæ verò digerendi vim obtinent medicamenta, ea callos maiores iam factos eidem Gale-¹⁰

Si nimius
callus super
increuit.

Lamina plu-
bea.

camentis valde astringentibus Paulus vtendum esse censuit, compressamq; admodum deligatio- nem adhibendam, lamina plumbea etiam interdum imposita: hæc enim calli excrescentiam mirè repris- mit ac imminuit. Huic rei efficaciter quoque sub-¹⁵ uenit Celso, multa leuisq; ex oleo, & sale, & nitro, membri perfrictio, plurimusq; ex aqua calida salsa forus. Post hæc malagma quod digerat impos- nendum, adstrictiusque alligandum esse admonuit, imo verò oleribus, & præterea vomitu vtendum.²⁰

Si callus in
lapideâ du-
ritiæ & in-
signe nimis
magnitudi-
nem euase-
rit.

Si ossa di-
uersa inter
se cõferueât,
& membrũ
distortũ cal-
lus firmave-
rit.

Siquidem per hæc (vt existimat) cum carne callus quoque extenuatur. Confert etiam eidem aliquid de sinapi, cum ficu in alterum par membrum im- ponere, donec, inquit, id paulum erodat, eoq; euo-²⁵ cet materiam. Atque vbi is tumor extenuatus, & qui nimius supercreuerat callus, ad mediocritatem redactus fuerit, rursus ad ordinem vitæ reuertens- dum erit. At si solidus, lapideusq; callus, qui sic immodicè increuit, iam euasit, aperta ibi cute des-³⁰ radendus est, parsq; eius eminens scalpris, & tes- rebris etiam, si res exigat, admotis excidenda est. Cæterum solent aliquando in fracturis diuersa in- ter se ossa conferuere, & membra distorta callo fir- mari, difficultate functionum obeundarum haud³⁵ exigua subsequente. Quòd vbi contingit, & bre- uius membrum, & indecorum fit, & si capita acus- tiora sunt, assiduæ punções sentiuntur. Ergo vbi perfracta ossa sic conferbuerunt, & perperam fer- rumi

ruminata sunt, si tener saltē adhuc callus est, & non ossa quādo
 ultra sex menses, ut quidam dixerunt, radices ege- *uerū frangē*
 rit, frangere rursus, & dirigere ea oportet. Id hoc da.
 modo fit: Calida aqua multa, vel decocto aliquo
 5 emolliente diebus aliquot membrum id fouetur,
 & ex cerato liquido perfricatur: aut emplastro ex
 althæa: vel cataplasmate ex ficis pinguibus aridis
 aliisque medicamentis callum soluentibus (poroly-
 tica Græci dicunt) contegitur. Deinde facta iussicē
 10 ti emolitione, modo quem suprà posuimus, à mini-
 stris duobus qui in diuersa contendant intenditur:
 & inter hæc medicus chirurgus pertractans ossa, ut
 callo adhuc tenero existente, manibus ea diducit, cō-
 pellitq; id quod eminet in suam sedem, & si parum
 15 valuit ab ea parte, in qua os se inclinat, inuolutam
 lana regulam obicit, atque ita deligando (inquit
 Celsus) assuescere iterum verusæ sedi cogit. Nostræ *Quid agēt*
 ætatis chirurgi malè ferruminatum os, in fractura *chirurgi re-*
 non admodum antiquata, diebus plus minus quin- *cetiores i os-*
 20 decim, ut suprà diximus, primū emolliunt. Deins *se malè fer-*
 de id in diuersa extendi iubent, & genu vehemens *ruminato.*
 ter impulso, iterum frangunt: quod tamen verustio-
 res medici non probarunt. Mox fracti ossis fines ad
 amussim secum coaptant, ac ut suprà exposuimus
 25 curant. Si ab ossē perperam ferruminato, verustas *Si ab osse*
 iam occupauit: ac callus vehementer obduruerit, *malè agglu-*
 satius est manum illi (ut consuluit Albucasis) non *tinato. vetu-*
 admoliri. Quicumque enim id rursus frangere ag- *stas iam oc-*
 gressi sunt, post vehementes cruciatus in extrema *cupauit.*
 30 discrimina laborantes adduxerunt, adeo ut valde *Albucasis.*
 pauci eorum, qui hoc tormenti genus perpessi sunt,
 mortem euaserint. Atqui melius est eum, qui sic
 affectus est claudicatu, aut membri alicuius deformi-
 tate affectum, ad annos adhuc multos supersitem
 35 remanere, quàm post talem, tātumq; cruciatum, mis-
 serrimè sic inter manus crudelis chirurgi occumbes-
 re. Adde quòd sæpenumero alio loco, quàm ubi fras-
 ctura iam coierat, os ipsum quod lapidosus callus

Avicennas. firmauerat) frangitur : vt præter quotidianum ex-
perimentum, nobis autor extitit Auicennas. Quod
si laborans, & qui illi assident amici, importunis
precibus, atque assiduo rogatu te compellant : vt
ossis eiusmodi malè ferruminati, & cuius callus iam
obduruir : ac inueterauit, curationem suscipias, in
angusto spem esse coram illis præfator : deinde opus
*Ex recentio-
ribus.* aggreditor. Summam igitur cutem, & carnem cal-
lo superiacetam cultro ratorio aut scalpello dextrè,
ac prudenter secato, magna cura habita, ne nerui,
musculiue lædantur : deinde ossium, quæ non rectè
coaluerant, agglutinationem, seu continuationem
(quod aiunt) excisoris scalpris dissoluto : mox ve-
rò eorum sic diductorum fines secū ad amussim coas-

*Si membrū
ex attritu
corrūpatur.* prato, ita vt pristinam vñionem, quoad licebit, imi-
tentur. Demum cætera fiant quæ suprà scripsimus.
Cæterum si ex attritu, membri corruptelæ metus
impendet, protinus scarificandum erit, reliquaq;
facienda, quæ suprà, in gangrænæ, & sphaceli cus-
ratione diximus : si verò tophacea aliqua dunties
post ossis perfracti agglutinationem remanserit, ea
modo qui in antidotario exprimeretur discutienda,
& tollenda erit. Fracturæ quædam, supra diffini-
*Si fractura
sine callo su-
pra definitū
tempus re-
manserit.* tum naturæ tempus, sine callo interdum permanet
quod ob varias causas solet accidere, nempe vel ob
assiduas solutiones, vel ob immodicas superfusio-
nes, quas & fomentationes vocant, vel ob intem-
pestiuum motum, vel ex fasciarum multitudine,
nonnunquam etiam quia totum corpus, non suffi-

Libr. 6. cienter alitur, quo in casu membrū quoque ipsum
(vt Paulus annotauit) gracilius euadit. Oportet
igitur cum aliis, tum præcipuè maciei corporis oc-
currere : quod commodè fiet, si vel calidis admotis
materiam ad membrum perfractum euocemus, vel
alimentum copiosius subministremus, & balnea,
*Note ossis
perfracti
callo firma-* reliquasq; animi voluptates adhibeamus. Porro
eorum quæ iam callo firmantur, indicio esse, cum
alia tum illud præcipuè potest, si fasciolæ cruentæ
conspic-

conspiciuntur, nullo etiam in parte oborto vulnere. *ri incipit*
 Quod ideo forsan accidit, quoniam calli substantia,
 dum coit, in ossium cauernosos meatus perumpens
 sanguinis guttas aliquot inde extundit, exprimitq.

5 Ac de tranuerfis quidem fracturis, hæc dicta suffi-
 ciant. De longis verò, quæ non tam crebrò contin-
 gunt, reliqua omnia ad eundem se habent modum.

Cæterum comprimendæ hæc magis (Galeno

autore) in ipso fracturæ loco sunt, tum

Lib. 6. me-
thodi.

10

quod recessit, retrudendū intror-

sus est. Ac de fractis quidē

ossibus hæcenus in

vniversum

dictum

15

fit.

*

FINIS LIBRI QVARTI CHI-

rurgicarum institutionum, de fracturis,


Ioanne Tagautio Doctore me-

dico autore.

*



FORMULA GLOSSOCOMI, INSTRUMENTI ad gignendum callum in fracturis idonei, cuius pluribus in locis meminit Galenus.



A, Axis. B, Laqueus translatus. C, Laqueus in rectum procedens. D, Trochlae, seu rotulae. E, Tabella. F, fractura. Vide huius machinae seu instrumenti descriptionem apud Galenum lib. de usu partium. VII. & lib. VI. de morbis curandis. Item in commentariis eiusdem in librum secundum Hippocratis de fracturis.

GEN

GENERALIS

DIVISIO LVXATIONVM,

5 *In Librum Quintum Chirurgicarum Institutionum Ioannis Tagautj Medici.*

*

Luxatio, Græcis exarthrema, ossis è sua sede dimotio.

- 10 **Simplex.** Nulli alteri affectui coniuncta.
Composita. Alteri præter naturam dispositioni complicata.

Luxatio tam simplex quam composita,

- 15 **Perfecta,** siue absoluta, aut completa.
Imperfecta, siue non absoluta.

Completa luxatio, siue absoluta,

Cùm os suo loco omninò excidit.

- 20 **Generis nomen retinet, diciturq; absolute Luxatio Romanis, & exarthrema Græcis.**

Luxatio imperfecta, siue incompleta,

Cùm os, non in totum, sed aliquatenùs duntaxat suo naturali positu dimotum est, diciturq; subluxatio Latinis pararthrema Græcis.

- 25 **subluxatio, seu imperfecta luxatio,**

Peruersio, siue distortio.

Laxatio, seu elongatio ligamenti.

Peruersio ossis, quæ spinæ vertebrae maximè est peculiaris.

- 30 **Lordosis,**
Cyphosis,
Scoliosis, } in { **priorem partem.**
 } **posteriorem partem.**
 } **latera.**

Compositæ luxationum differentia posterioris seculi chirurgis.

35

Luxatio cum

{ **fractura,**
inflammatione,
vulnere,
dolore,
lunaticæ.

Hæ propriæ differentie non sunt, sed complicati affectus.

Instit

INSTITVTIO- NVM CHIRVRGI- CARVM IOANNIS


TAGAVTII ME-

DICI,

LIBER QVINTVS.

*De luxatis ossibus in vniuersum.**Quid luxatio, quæ sint luxationum differentia, & quot
modis ossa luxentur.*

CAPVT I.

Luxatio
quid.

Vum luxationes fracturis
proximæ sint, consequens 20
est, vt de iis generatim,
(quemadmodū & de aliis
suprà, in quatuor libris su-
perioribus, commemora-
tis affectibus, fecimus) 25
nunc sermonem faciamus.
Luxatio igitur, vt formu-
la quadam definiatur, est

articuli è natiuo positu, seu proprio (quod dicitur)
acetabulo, in alienam atque insolitam sedem prolapsus, 30
quo motus arbitrarius impeditur: Græci exarthrema
vocant. Huius autem (vt Paulus inquit) nul-
læ aliæ differentia habentur, præter eam quæ ex ma-
ioris minorisq; ratione sumitur. Quum enim articu-
lus sua sede in totum excussus deciderit, communi 35

Exarthre-
ma.

generis vocabulo Græcis exarthrema, Latinis luxa-
tio dicitur. Si autem è compagibus suis paululum
duntaxat emorus est, aut vsq; ad sinus seu cavitatis
sup

- supercilium (nonnulli marginem vocāt) prolapsus, nobis subluxatio, Græca verò consuetudine pararthre- *Pararthre-*
 threma nominatur. Sub qua sanè differentia, & laxa- *ma.*
 xationem, seu vt vulgares chirurgi Auicennæ inter-
 ; pretem sequuti loquuntur, elongationem ligamenti
 comprehendimus, sicuti & distortionem, ac peruersi-
 fiones cum pluribus ossibus, tum verò maxime spi-
 næ vertebris familiares. Ossa duobus modis potissimum *Ca. 2. li. 8.*
 suis sedibus Celfo mouentur. Nam modò *Quæ ossa in*
 10 quæ iuncta sunt inter se duntaxat inquit) dehiscunt *ter se debi-*
 (vt cum latum scapulari os ab humero recedit, & *scant.*
 in brachio radius à cubito, & in crure tibia à sura,
 atque etiam interdum à saltu, calcis os à talo, quod
 rarò tamen fit) modò verò suis acetabulis ex toto
 15 prolabuntur, hoc est, suis omnino sedibus excidunt.
 Vertebrae nanque & articuli propemodum omnes,
 tametsi validis nervis ac ligamentis comprehendan- *Quæ ossa*
 tur, sæpius tamen suis sedibus elapsum decidunt: aut *proprie lux-*
 vi scilicet expulsi, aut aliquo casu nerveis ligamen- *xiuntur.*
 20 tis vel ruptis vel infirmatis, faciliusq; in pueris &
 adulescentulis, quam in robustioribus. Itaque mos-
 dus hic posterior exarthrema: prior verò, quo tan-
 tum ossa dehiscunt, & suis ex toto sinibus haudqua-
 quam prolabuntur, pararthrema non immerito ap-
 25 pellabitur. Atque hæc sunt luxationum discrimina
 seu differentia. Præter has tamen aliquot adhuc
 alias posterioris ætatis chirurgi statuerunt, quæ res
 uerà differentia non sunt, sed potius quædam ves-
 luti præter naturam dispositiones, cum luxatione
 30 complicata: vt cum ipsi luxationi accedit inflam- *Affectus cum*
 matio, aut fractura, aut vulnus, aut dolor aliquis in- *luxatione*
 gens, aut tophacea quædam durities. Hæc enim do- *complicati-*
 lor inquam, fractura, durities, vulnus, & inflamma-
 tio, cum seorsum & per se subsistere possint, nuli-
 35 lius vnquam alterius (si saltem Galeno credimus)
 differentiam constituent: Si quis tamen proterue
 contendat, differentias esse, cum eo certamen ini-
 re recusamus: quandoquidem hæc curanda lux-
 xatio

xationis rationem & peruertunt, & non parum alijs
 quando inturbant. Ac de his quidem in sequens
 Modis luxa-
 tionum à si-
 tus differen-
 tia sumpti.
 tibus suo loco dicemus. Cæterum modis quatuor
 potissimum, quod ad situs differentias attinet, con-
 tingit ossa luxari aut perverti, seu aliquatenus detor-
 queri: in partem nimirum priorem seu anteriorem,
 posteriorem, interiorem, & exteriorem. Alij supe-
 riorem & inferiorem addunt. Quædam autem in os
 mnes quatuor partes, quædam in certas promouen-
 tur. Sed præstat singulorum exempla subiicere. Ma-
 Maxilla in-
 ferior, qui
 luxatur.
 xilla superior, cum non in homine solum, sed & in
 omni animante, præterquam in crocodilo, immobili
 existat, luxatione non periclitatur: inferior verò
 subinde oris hiatu in anteriorem partem luxatur, al-
 ternatimve ac pervertitur, hoc est, aliqua ex parte di-
 storquetur, & ex naturali situ in alterum repente
 transmutatur, quod verbo *ῥῆται* expressit Hipp. Sed
 modò altera parte, modò vtraque: toto autem loco
 non admodum excidit, ut idem annotavit Hippocra-
 tes: quippe quòd capita, id est, extrema, qui & pro-
 cessus appellantur, habeat in superiori maxilla, fir-
 miter ac tutò cardinis modò infixæ, ex quibus ner-
 uosi tendones, validis annexi musculis, exoriuntur.
 Itaque hanc nunquam luxari contingit, nisi quàm
 maxima oris apertio fiat. Ut cum vel maximam rei
 alicuius molem ore excipere quispiam conatur, vel
 cum oscitando quàm maximè potest, os diducit, &
 in alteram partem os traducit, quorum primum ra-
 rò contingit: secundum (inquit Galenus) euenire de-
 mentibus tantum potest. Capitis processus, in duos
 Capitis lu-
 xatio.
 sinus summæ vertebræ dimissi, in omnes partes pro-
 labuntur: sed dum in partem posteriorem excidunt,
 mentum pectori agglutinatur, æger neque bibere,
 neque loqui potest: atque illi celerrimè mors super-
 uenit. Vertebræ in spina & in posteriorem partem,
 & in priorem, tam supra septum transuersum, quàm
 infra subinde peruertuntur, ac nonnunquam etiam
 ex toto prolabuntur. Sed cum toto loco mutatæ sunt,
 null

nulla restitutionis spes relinquitur, præcipitèmq;
 etiam mortem inferunt. Nam intra triduum (vt Cel
 sus ait) homo moritur. Clauicula (quam soli homini *Clauicula
quæ luxetur.*
 inter cætera animantia concessam esse Paulus exis
 timauit) nunquàm in totum excidit: quippe quæ
 pectori ita committatur, & inhæreat, vt ne moueri
 quidem in ipso possit. Interdum tamen ex violenta
 quadã extrinsecus facta percussione, paululum auel
 litur. Sed neque altero fine, qui humeri articulo in ses
 10 ritur, excidere admodum potest. Nam & à bicipiti
 musculo, & summo humero prohibetur. Brachij *Brachij ca
put.*
 seu humeri caput, quod in sinum omoplatæ seu scap
 ulæ demittitur, modò ad ima in alam decidit, id quæ
 frequenter, sed in iis maximè qui non multa carne
 15 præditi sunt: modò licet rarò in priorem & exterior
 rem. In superiorem verò ferè nunquàm promouetur,
 vt quod ad vtròque scapularum processu, & eo scilicet
 qui anchoræ similis est, & quod acromion Græ
 ci vocant, impediatur. Genu in tres partes excidit, *Genu tres
partes lu
xatur.*
 20 interiorem nimirum, anteriorem, & posteriorem iux
 ta poplitem. In priorè prolabi opposita patella pro
 hibetur. Meges tamen eum cui in priorem partem
 excidisset, à se (vt Celsus refer) curatum esse memo
 riæ prodidit. Cubitus, manus, & femur, in omnes
 25 quatuor partes prolabuntur, nempe in interiorem, *Cubitus, ma
nus, & fe
mur, in .4.
partes pro
labuntur.*
 anteriorem, & posteriorem: Atque hæc
 pro exemplis adducta sint. Nunc ad communem de
 luxatis ossibus tractationem reuertamur, & iuxta
 30 prognostica, & curationem laxationum in vniuers
 sum persequamur.

*De causis & signis luxationis ossium in vni
 uersum. C. A. P. I. I.*

35 **C**ausæ luxationum ossium & à sua sede
 motorum, quadam sunt extrinsecus in
 gruantes, vt casus percussio, & violenta *Causæ ex
terne.*
 atque incōgrua membri alicuius exten
 sio, aut distorsio, seu peruersio. Quadã
 G

*Causae in-
ternæ.*

*Signaluxa-
tionū cum
cōia à tri-
bus potissi-
mum desu-
muntur.*

I

2

3

verò intrinsecus eueniunt, atque ideo internæ dicun-
tur, sicuti & superiores externæ: vt cū mucosus
aliquis humor, & pituitosus, in articulis seu iunctu-
ris acervatur, qui articulationis ipsius ligamēta pri-
mum madefacit, deinde laxiora reddit, & tandem
ob eius multitudinem, sua sede os ipsum protrudit.
Signaluxationum, quædam sunt omnium commu-
nia, quædam verò propria cuiusque. Ac de commu-
nibus duntaxat hîc agemus. Hæc autem factionis
Arabicæ principi Auicennæ à tribus potissimum¹⁰
desumuntur. Nempe vel à substantialiter (vt loquū-
tur) inhærentibus, hoc est, ab iis quæ secundum es-
sentia rationem insunt: vt à mala partis ipsius labo-
rantis constitutione seu compositione, in qua & tu-
mor præter naturam ea parte qua os prorumpit, &
sinus seu cavitatis insolita ea à qua recessit, manifestò¹⁵
apparent. Vel ab iis, quæ ex necessitate consequun-
tur (casus & accidentia vocant) vt à dolore, qui ex lu-
xatione contrahitur. Vel ab actione læsa, seu opera-
tionibus etiam ex necessitate consequentibus, vt à²⁰
motus afflictæ partis difficultate, aut priuatione. He-
itaque notæ in luxatis omnibus deprehenduntur,
aliæ verò in singulis.

De prognosticis, seu iudiciis luxationum.

25

C A P.

I I I.



I

Consequens est, vt communia quædā
de luxationibus iudicia, quæ & pro-
gnostica vocāt, hoc loco subiiciamus. 30
Primum prognosticum ex Auicennæ
& aliorum quorundam scriptis eru-
tum, ad hunc modum habet. Quibus
luxationibus inflammatio, aut vulnus, aut dolor in-
gens & acris accedit, hæ præterquàm quòd curatu³⁵
admodum difficiles sunt, periculo quoque non va-
cant. Adeò vt aliquoties in iis casibus tutum non sit,
luxatæ particulæ reductionem aggredi, sed sic eā res
manere (ne pro læsione mors sequatur) melius esse

hoc clarissime dixit Gal. in 1.º & 2.º de articulis, censent.

cēſent. Aliud. Vetusſtæ omnes luxationes & quæ ſpa-
 tio rēporis iam callo obduruerūt, vel difficillimè, vel
 nunquām conſaneſcunt. Proinde ſtatim, ſi fieri po-
 teſt, reponi luxata debent. Luxatio, in qua inquit
 5 Guido (frangūtur margines oſsium, hoc eſt ſinus ſeu
 cavitatis ſupercilia, peſſima iudicatur. Repulſi enim
 in ſuum poſitum articuli, inibi diu perſiſtere nō poſ-
 ſunt: ſed leuiſſima quaque occasione iterum relas-
 buntur. Articuli qui neruorum ac ligamentorū vi-
 10 tio prolapſi ſunt, & poſtea in ſuas ſedes cōpulſi iter-
 um excidunt. Indiciū euidentis oſſis in ſuam natu-
 ralem ſedem reducti, eſt, cū veluti ſtrepitus aliquis
 auditus eſt, dum in natiuum ſuum acetabulum in-
 grediebatur: & mēbri nuper luxati figura & cōfor-
 15 matio, ſuæ ipſius aut alterius paris figuræ, quām ſi-
 milima tum viſu tū attactu deprehēditur. Cæterū
 ſi reposito oſſe nerui diſtendūtur, rurfus id protinus
 (vt conſulit Celfus) expellendum eſt. Vt excidere
 omnes articuli non poſſunt, ſic non omnes reponun-
 20 tur. Caput enim ſi in partem (vt ſuprà diximus) poſ-
 teriorem aliquādo prolabitur, nunquām in ſuos ſi-
 nus cōpellitur, ſed mortē ſtatim adfert inēuitabilem.
 Sic neque in ſpina vertebræ cū toto loco mutatæ
 ſunt: neq; etiam maxilla, quæ vtraque parte prolā-
 25 pſa eſt, & antequam reposita ſit inflammationem
 concitauit, vt Celfus memoriæ prodidit. Oſſa, quæ
 ſuis ſedibus mouentur alia aliis facilius alia diffici-
 lius & excidunt & reponuntur: nempe pro ratione
 & natura iuncturæ vnde propelluntur. Itaque genu
 30 vt facilè prolabitur, ſic non magno impēdio in ſuam
 rurfus ſedem compellitur. Digitorum luxatio nul-
 lum etiam faceſſit negocium. Cubitus verò vt tar-
 dius quidē ac difficilius excidit, ita prolapſus negocij
 plurimū exhibet. Aegerrimè enim propter tubercu-
 35 lorū ſeu eminētiarū ſinuūmq; frequentia reponitur.
 Humerus autem, vt neq; difficulter admodum præ
 ſertim in macilentis, elabitur, ſic nec difficillimè in
 ſedē ſuā reponitur. Et ita de alijs. Multū quoq; eò cō-

Genu.

Digiti.
Cubitus.

Humerus.

468 Institut. Chirurgicalarum, Lib. V.

Nervorum nomine apud Celsum, ligamenta intelliguntur.
Ex Hippoc. & Celso.
Aph. 59. & 60. lib. 5.
Interpretatio duorum aphorismorum Hippo.

fert (vt Celsus inquit) & corporis, & nervorum, hoc est, tendinum, habitus. Nam si corpus tenue ac macilentum, si humidum est, si nervi & ligamenta infirma, expeditius os reponitur. Sed & primo facilius excidit, & postea minus fideliter continetur. Quæ contraria his sunt melius continent, sed id quod expulsus est difficulter admittunt. Quibus in pueritia articuli exciderunt, neque repositi sunt, minus quam cæteri crescunt. Quæ loco suo non sunt, caro ea increfcit, magisq; in proximo membro, quam in ulteriore. Vtputa si humerus loco suo non est, maior in eo ipso fit, quam in brachio, & in hoc (brachio inquam) maior quoque, quam in manus acie. Tum pro sedibus & pro casibus qui inciderunt, aut maior aut minor vsus eius membri relinquitur: quoq; in eo plus vsus superest, eò minus id extenuatur. Inter luxatorum eiusmodi prognostica numerantur & duo hi sequentes Hippocratis aphorismi. Quibus cunque à coxendicum dolore molestatis, excidit coxa, & rursus incidit, iis mucres superueniunt. Quibuscunq; à coxendicū dolore molestatis diuturno, excidit coxa, iis crus tabescit, & claudicant si non vrantur. Hos autem nunc sic coniunctim legimus & interpretamur. Quibus cunque à diuturno coxendicum dolore conflictatis, propter mucoris seu mucosi humoris ac pituitosi copiam, in articulo siue iunctura coxæ coaceruatam, ipsa, (hoc est femoris caput, quod in coxæ siue ossis ischii cauo inseritur) suo naturali acetabulo propulsa excidit, & rursus incidit, (id est, in nativam suam sedem iterum spontè resiliit, aut aliter repulsa est, inibi tamen diu persistere non potest, sed soluta compage lubrica continenter relabitur) iis processus temporis crus (quod Grecis *οκλαος* dicitur, hoc est, totum membrum, tam tibia scilicet quam femur) necessario alimonix penuria contabescit, & ariditate conficitur, omnesque in claudicationem euadunt, si non vrantur, hoc est

est, nisi prius ferramentis igne candentibus vrendo, & mucus ille qui ossis iuncturam sinum occupat, absumatur, & laxitas cutis, ad quam femoris caput subinde lubricum procidebat contrahatur.

5 *Deratione curandi luxata in vniuersum.*

C A P.

IIII.



10 **Q**Uum luxata suo nativo positu, in aliam nam atque (vt supra retulimus) insolitam sedem prolapsa sint, vna nimirum communis omnium luxationum curandi indicatio erit. Nempe luxati articuli & suo loco moti in propriam ac naturalem sedem reductio. Porro, vt scopum hunc primum & vniuersalem assequaris, luxatum membrum in diuersas partes decenter extendendum est, donec spatium inter ossa liberum sit. Tum id os quod suo loco excidit, ab ea parte in quam prolapsum est, in contrariam impellere oportet, atque ita in germanum suum acetabulum restituere: vt sinus seu
15 cavitatis insolita vacuitas impleatur. Hæc autem leniter, & sine dolore, quatenus fieri licet agenda sunt. Cæterum non vna eademque in omnibus extendendi ratio est: sed alia atque alia pro natura scilicet partis luxatæ, proutque nerui ac tendines valent, aut ossa
20 huc illuc ve federunt. Modò enim manibus solis, modò habentis iniectionis vtendum est, modò verò quædam alia machinamenta adhibenda sunt, vt ex vno Hippocrate lecto, libro de luxatis & fractis, ducere poteris.

30 Ab iis secundum quo tendes fuerit, vt membrum quod exciderat, & iam repositum est, non amplius deinceps sua sede prolabatur: sed inibi continenter persistat. Repositi igitur articuli iunctura, modis omnibus statim firmanda ac roboranda est. Firmabitur autem optime, si rosaceo perlinatur, ac postea
35 pannus aliquis lineæ gracilis, vetus, & lenis rhodino delibutus, ipsi applicetur: deinde si stupæ lenes ac panni multiplices, quorum candido perfusi,

Secundus scopus.

super accommodentur, & postremo si fasciis pos-
 ca madentibus, pro ratione particulæ longis latissi-
 que, subligetur. Quinetiam ferulæ ex corio aut
 densa papyro factæ, si necessitas vocet, circumdandæ
 sunt. Cauenda autem semper est vehementior per-
 strictio, ne inflammationem moueat. Iis ita ritè ap-
 paratis, membrum in figura ei maximè naturali, at-
 que à dolore alienissimæ, ad quietè, reponendum est.
 Nec verò ante diem septimum, aut etiam decimum,
 si nullum symptoma prauum accesserit, ipsum res- 10
 soluere oportet, aut aliis adhibitis medicamentis cu-
 rare, sed ita finire. Porro nihil noxæ attuleris, si dum
 legitimo tempore resoluitur, & secundo curatur,
 aqua modicè calida foveris. Hic enim fons gemina
 tunc ratione prodest. Nam & dolorem (si quis sit) 15
 demulcet, & quod in laborante particula noxium
 conceptum est, digerit. Vbi autem sic vt res exigit
 luxatum membrum foveris, mox huic emplastrum
 adhibebis, quod costet polline, id est, farina volatili
 puluere rubro communiter appellato, & albo oui in 20
 vnum corpus redactis. Post hæc verò membrum stric-
 tius obligandum erit, vt Razes medicus Arabs per-
 celebris consulit. Ad eundem quoque modum, verus
 omnis luxatio, & quæ spatio temporis callo iam obs-
 duruit, non modò fons eiusmodi aquæ simplicis ca- 25
 lida (qui in hac re plurimum confert) antequàm res-
 ducatur, desiderat: sed etiam & eum, qui fit ex deco-
 cto maluæ, althææ, sanigræci, atq; id genus aliorum
 postulat. Quippe qui molliat, laxet, discutiat, & mē- 30
 brum aptius extensioni efficiat. Recentes verò ad-
 huc luxationes, & quæ nuper inciderunt eius na-
 turæ fons tanquam sibi non parum incommodan-
 tes auersantur & respuunt. Hi enim calfaciendo ac
 humectando relaxant, & dissolunt: vnde pars ipsa 35
 afflictæ imbecilior redditur, & ad recipiendam flux-
 ionem pronior. Proinde & inflammationi op-
 portuna efficitur, & luxati sinus superflua humi-
 ditate oppletur. Inde consequitur, vt articulus
 in

in natiuo suo acetabulo diu persistere nō possit, sed lubricus ac subterfugiens delabatur. Verat etiam Auicennas pannos impensē calidos membro recens ter luxato admoueri, ne fluxionem etiam euocent, & inflammationem eo loci excitent. Quin potius eos cerato (inquit) refrigeratorio, aut vmo aliquo austero imbutos adhibere conuenit.

Caterū luxato, ita vt dictū est, in suam sedem ^{Tertius} reducto, firmatoq; & ad quietem conueniente sche ^{scopus} mate seu figura reposito, ipsum à dolore, & inflammatione vindicandum est, qui tertius est scopus in curandis luxatis medenti propositus. Hunc igitur si consequi studueris, humorum in partem affectam influxū modis omnibus prohibeto. Si enim fluxio ne tentetur, & dolorem statim persentiscet, & inflammationem experietur. Quæ duo incōmoda in luxatis & fractis maximē vitanda sunt. Hæc autem deu itabis, si quæ roborant & repellunt, parti luxatæ, vt paulò antè docuimus adposueris: si præterea tenuem ab initio probamq; victus rationē agro imperaueris, illiq; venam, si nihil prohibeat, iuxta periti alicuius medici præscriptū secueris: & ventrem, si opus est, purgāte medicamento subduxeris. Vtroq; enim auxilij genere (purgatione inquā & sanguinis ^{Quartus} missione) fluxionem (si commodē adhibentur) à laborante particula auerrimus. Verū enim verò si ^{scopus, qui} antè quā ad curationem voceris, luxata pars iam do ^{est acciden-} lore infestetur, aut inflammatione occupetur, nō prius ^{tiū corre-} eam in locum suum à quo excidit reponere tentabis ^{ctio.} quā dolor finitus fuerit, & inflammatio conquiesuerit. Si enim membrū sic dolore, aut inflammatione affectum distendendo lacerassiueris, periculum est ne conulsio, vel neruorum distētio, aut aliud prauū id genus symptoma suscitetur. Hoc præceptum in luxatis omnibus diligenter, curiosēq; obseruandū: à Cornelio Celso ex Hippocratis sententia, non minus doctē quā eleganter, iis verbis traditum est, ^{Cap. 11.} Quicquid loco suo (inquit) motum est, antè inflam ^{lib. 8.}

472 Institut. Chirurgicarum, Lib. V.


mationem reponendum est. Si illa iam occupauit,
 dum conquiescat, haud quaquam lacescendum est.
 Vbi finita est, tentandum est in his membris quæ id
 patiuntur. Oportet autem inflammationem ipsam
 atque dolorem leuare succida lana ex hydreisæ, id
 est, aqua & oleo moderatè calido, acetiq; momento
 superimposita. Si verò etiam febris accessit, & ossa
 quæ suo loco mora sunt, validisq; plenisq; musculis,
 & tendonibus contineantur, curiosius omnia faciès
 da sunt: sed maximè quæ ad victus rationem, venæ
 sectionem, & purgationem attinent. Cæterum sedato
 dolore, & finita omnino inflammatione, pleniore
 victu (sicuti & de fracturis dictum est) laborans res
 fieri potest: cibusq; vti bonis, vti vino modicè. Ac
 sub finem quidem curationis, si è sententia res cess
 ferit, luxatum ipsum roborabis perfusiõe aquæ de
 coctionis rosarum, absinthij, & musci albi quercis
 ni. Peracto foru, Guido à Cauliaco iubet superpo
 nendum esse spanadrapum, quod vocant, aut oxy
 croceum. Sed iamq; ad vsus quoque suos, id mēbrū
 sensim, ac suauiter promouere oportet. Motus enim
 vt in dolore, atq; inflammatione noxius, ac (vt ita
 dicam) pestifer, sic aliàs luxato præsertim iam obfir
 mato, saluberrimus corpori est. Si luxatis ossibus
 vulnus quoque accessit, multa diligentia, ac etiam
 prudentia est opus. Dum enim hæc reponuntur, in
 gens periculum, nonnunquam & mortem etiā ma
 turam inferunt. Nam cum ex distensione adiacentes
 nerui & musculi inflammanur, dolores validi, con
 uulsiones, & febres acutæ oboriuntur, atque hoc
 præsertim in cubiti gibbero, genu, superioribusq;
 articulis etiam magis. Quantò enim principalibus
 membris, luxati cum vulnere articuli, viciniore
 sunt: tantò maior timor est. Sed eo quoque grauius
 periculum concitatur, quo maius membrum est,
 quòve validioribus neruis: aut musculis contine
 tur. Ideoq; humeris femoribusq; metus mortis est.
 Ac si reposita ossa sunt, spes (inquit Cels.) nulla est.
 Non

Non repositis tamen, nonnullum periculum est. Eoq̃
 maior in utroq̃ timor est, quo proprius vulnus ar-
 ticulo est. Eam ob rem Hippocrates horum repos- *Lib. de luxa-*
 sitionem, valentiorēq̃ deligaturam omnino auer- *totū fractu-*
 5 satur, solisq̃ inflammationem abigentibus, & mis- *rumve ossis*
 rigan- *comptatione* tibus præsidiis, per initia vti iubet. Sic enim
 (inquit) ipsis superesse licebit. Itaq̃ nihil tuto repos-
 ni posse præter digitos, & plantas, & manus dixit:
 atq̃ in his quoque diligenter esse agendum, ne præ-
 10 cipitent. Verum ne digitus quidem in quo minimū
 vt malum: sic etiam periculum est, reponi debet,
 nisi antē inflammationem, aut postea cum iam ves-
 tus res est. Cæterum quod ipse in solis digitis faciēs
 dum consulit, id nos in reliquis quoque articulis fa-
 15 cere aggrediemur, ac statim quidem inter initia, dū
 pars adhuc inflammatione vacat, prolapsū cum
 vulnere articulum mediocri intēsiōne (validā enim
 citra periculum perferre non potest) reponere ten-
 tabimus. Quod si iuxta animi institutum euenerit,
 20 in sola ratione, quæ inflammationem arceat, persiste-
 mus. Si verò inflammatio aliqua, aut conuulsio, aut
 quidpiā ex supradictis, reposito osse acciderit, rur-
 sus id (si modò sine vlla vi potest) suo loco protinus
 expellendum est. At si hoc quoque discrimen, seu pe-
 25 riculum metuamus (non enim inflammatus articu-
 lus sine vi fortasse cedit, & sua sede iterum propel-
 letur) satius fuerit per initia in maioribus quidem
 membris, vt femoribus & humeris, superiedere,
 & repositionem differre. Vbi verò inflammatio cō-
 30 quieverit (id autem fit communiter post septimum
 nonūmve diem) præfati etiam periculum apud ne-
 cessarios ægrotantis, quod ex repositione futurum
 sit, tum quod si non reponatur, debilem ea parte ho-
 minem, & claudum mancūmve prorsus fore, cos-
 35 nabimur tutò: & sine vlla violentia, os in suam ses-
 dem compellere. Porro vlceris curationem eandem
 quæ proposita est in fracturis cum vulnere, adminis-
 trabimus. Omne autem membrum: quod cum

474 Institut. Chirurgicarum, Lib. V.


vulnere loco motum, neque repositum est, sic (si
 Celso & Hippocrati credimus (iacere conuenit, vt
 maximè cubantem iuuat; tantum ne moueatur, ne
 si luxatio ve dependeat. Si luxatio cum fractura, sine vlcere
 cu fractura tamen euenerit, communi ratione membrum extrinsecus
 auenerit. dendum est: ac manibus conformandum: vt in simi-
 plicibus fracturis superiore libro docuimus. Si verò
 etiam vlcus accedit, rursus ab iis quæ de fracturis cū
 vlcere: & luxationibus etiam cum exulceratione
 incidentibus priuatim à nobis dicta sunt, congrua
 repetenda curatio est. Cæterum vt verbo vno dica-
 mus: si cum fractura luxatio incidit: hæc primū,
 si fieri possit: illa verò secundo curanda erit. At si
 ante fracturæ administrationem luxatum cōmodè
 reduci non possit, fracturam ipsam primum curabi-
 mus: deinde cū fractura callo iam obfirmata fue-
 rit: luxationis curationem aggrediemur. Quòd si
 luxatio inueterauerit: & ob temporis spatium, cal-
 losa inibi durities contracta fuerit, ea decocto malug
 & althææ (quam officinæ bismaluam appellant) 20
 perfundenda est, deinde vnguento dialthæa vulgò
 nuncupato, collinenda: post hæc, emplastrum quod
 Diachylon magnum nominatur: super apponen-
 dū erit: vel eius loco, lana succida viscillagine quas-
 piam emolliente delibuta. Ad hoc etiam efficax ha-
 betur, cortex radicis maluauiſci, hoc est althææ, in
 aqua decoctus, & cum axungia: vel anserino pingui
 subactus: vt quasi malagmatis lentor cons-
 trahatur. Itaque loco sub his sufficiens
 ter emollito, luxatum in suam ses-
 dem dandum est.

FINIS LIBRI QVINTI CHI-
 rurgicarum institutionum, de luxatis os-
 sibus Ioanne Tagautio Doctore
 medico autore.



PARTE ANTERIORI EXPRESSA. 477

- A Os coronale, quod & os frontis appellatur.
- B Clavicula, & ossa furculæ.
- C ἀκρωτιον, processus superior omoplate.
- D Caput brachij, seu pars humeri superior.
- 5 E Os pectoris, quod στήθιον Græci vocant, constans ossibus septē excipientibus: septem veras costas, quæ superiores sunt & perfectæ: inferiores vero, quæ numero sunt quinque, nothæ, imperfectæ & mendosæ dicuntur.
- F Cartilago fini sterni adhaerescens, ab ensis similitudine dicta Græcis ἑταροειδὴς, hoc est, ensiformis, vulgus malum punicum seu granatum appellat.
- 10 G Brachium seu humerus & os adiutorij Guidoni, omnium ossium (femore excepto) maximum.
- H Collum brachij.
- I Humeri orbita trochleis similis.
- 15 K Os inferius & longius cubiti, quod Latinis vlna, & nomine totius cubitus dicitur, Guidoni & vulgò focile maius, Græcis πῦλον, minimo occurrit digito, ἑστῆ, rectum, ut superius obliquum.
- L Os superius cubiti (latius sumpto nomine) quod Latinis radius, & focile minus Guidoni, Græcis ῥαδιὸς vocatur: occurrit pol-
- 20 lici.
- N καρπὸς Græcè, Latine brachiale, & rasceta Arabicè. Constat ossibus octo duris & exiguis, si os quod ad pollicem pertinet, non numeraveris.
- O μετὰ ἀκρωτιον, i. postbrachiale, & pecten, constat tantum ossibus
- 25 quatuor Galeno à sese distantibus, palmam inter digitos ad carpum explentibus.
- P Ossa digitorum, quæ numero sunt 15, nempe tria singulis.
- Q Patella & rotula genu, græcè nonnullis μῶλον, id est, mola, aliis ἐπιγονάρις, quasi supra genu, os cartilaginosum nulli alteri confertum.
- 30 R Os baliste vulgò Latinus talus, ἀστέρας Græcis.
- S Os σκαφοειδὴς, hoc est naviforme, sua cavitare navi simile, unde nomen sumpsit, circumambit caput astragali.
- T Ossa tarsi, & rascetæ 4. carpo respondent.
- V Ossa pectinis seu pedij ac plantæ 5. figura tereti & oblonga metacarpio respondent.
- 35 X Ossa digitorum pedis, quæ numero sunt quatuor, decim. In singulis digitis præter pollicem terna.



B Sutura labdoædes, posterior in occipitio: anterior quæ in sincipite est, σεφανιαία. i. coronalis dicitur. Vide in prima figu.

C Sutura ὀβελιαία dicta, quæ recta & sagittalis vulgò appellatur.

E Scapularum ossi duo, penè pectus sita, lata, figuratriquetra, Græci ὀμοπλάται, Latini scoptula operta, vulgò spathula. Nulli alteri ossi committuntur.

G Collum omoplatae.

10 H Os sacrum, ἱερόν Græcè, amplum seu latum quibusdam appellarum, finis spinæ dorsi.

K Os femoris, quod brachio seu humero, hoc est, ossi adiutorij respondet, Græcè μῦς dicitur.

15 L Caput femoris.

M Collum femoris.

N Trochanter.


P Tubercula duo ossis femoris.

20

DISTICHON OSSIVM NVMERVM COMPLECTENS.

25 Adde quater denis, bis centum, sena q̃, habebis.
Quam sit multiplici conditus osse, semel.

30 Ossa fiunt è semine, cum id quod est crassissimum, à calido vrente induratur, sicut lapides coquuntur à calido vrente. Sunt autem ossa veluti truncus sustinens reliquum corpus.



FIGURÆ DESIGNATIO. 481

- A Offa $\gamma\epsilon\gamma\mu\alpha\tau\omicron\varsigma$, id est, sincipitis 2. Vulgo parietalia ap-
pellantur.
- B Offa $\lambda\alpha\theta\omicron\lambda\lambda\acute{\iota}\alpha$, id est, lapidosa vel petrosa, 2.
- C Os frontis 2. quod & coronale vocant.
- D Os occipitis 2. densissimum & firmissimum.
- E $\Sigma\upsilon\gamma\omega\mu\alpha$, vel os $\Sigma\upsilon\rho\omicron\lambda\delta\iota\varsigma$, id est, iugale, et Paris Vulgo. su-
perio rem maxillam capiti coniungit.
- F Os $\sigma\phi\eta\nu\omicron\upsilon\alpha\delta\iota\varsigma$, cuneiforme, basilare, aliquando à multi-
plici forma $\pi\omicron\lambda\iota\mu\omicron\sigma\phi\omicron\upsilon$, colatorij, cauilla.
- G Maxilla inferior: hæc in maximis oris hiationibus in-
terdum à sua sede distorquetur.
- H Processus duo maxillæ inferioris.
- K $\omicron\lambda\epsilon\gamma\epsilon\alpha\tau\omicron\upsilon$, seu cubiti tuber, superior Vlnæ processus
grandior, Hipp. $\omicron\gamma\kappa\omega\upsilon\alpha$ nominavit.
- L Ossa validissima quæ ossi sacro committuntur, Arabi-
cè $gaf\ herua$ dicta.
- M Os ilium, & anchæ, pars superior ossis coxæ.
- N $\iota\chi\iota\omicron\upsilon$, seu os ischii, quod recipit femoris caput. Pixis
coxæ dicta.
- O Os pubis & pectinis, pars est anterior ossis coxæ ad
pudenda.
- Q Os maius tibiæ, quod & tibiæ nomine totius appella-
tur, & crus. Vlnæ seu cubito respondet, $\kappa\upsilon\epsilon\mu\alpha$ Græcis no-
minatur.
- R $\Pi\epsilon\phi\upsilon\alpha$ seu fibula, & os suræ os minus tibiæ radio cue-
biti, quod facile minus appellant, consimile.
- S Malleolus externus, ima pars fibulæ.
- T Malleolus internus, pars infima cruris seu tibiæ.
- V Os calcis, seu calcaneus, Græcè $\pi\epsilon\phi\upsilon\alpha$ ossum pedis ma-
ximum.

INSTITVTIO- NVM CHIRVR-

GICARVM,

LIB. VI.

DE MATERIA CHI- RURGICA.

PRAEFATIO.

*Interpretes
materiae chi-
rurgorum.*



Emateria remediorum, quae ad chirurgum pertinent, plurima quidem Hippocrates, Galenus, & ante hunc Anazarbaeus Dioscorides memoriae tradiderunt. 20

Quaedam posteritas addidit non fraudata laude: sua enim veterum sua posterorum gloria est. Atque

iniquum decreti genus est, quod omne fructum laudis & gloriae huius disciplinae vni Graeciae detulit, ut 25

Laus alligata Arabum & posterorum.

Arabum ac posteritatis studia perpetuis tenebris opprimantur. Inaudato solo laudatae fruges saepe numero proueniunt: Vixerunt Graeci in media luce literarum. Extiterunt Arabes, & inde ductae famulae, iam desertis ac sepultis melioribus disciplinis, 30

Vnde petenda materia.

digna tamen luce aeternaeque memoria nobis reliquerunt. E viuis fontibus Graecorum remedia primum petenda sunt: sed ita, ut nec Arabum

Natura fertilitas in materia chirurgorum.

riuos, nes posteritatis ingenia contemnamus. In his hauriendum quod saluum & incolume: repudiandum, quicquid fecerit cœnum, & disciplinae veterum male conuenerit. Atque omnino hac parte perlustranda nobis naturae fertilitas, à qua omnis vbe 35

- vbertas, & quasi sylva remediorum ducta primū
 est. Nūquam natura magis luxuriat, nulla in re
 pariter atque his chirurgiæ opibus ambitiosa est.
 In quibus tam prolixè numē suū explicat, vt Pro-
 5 neca illa non tam Epicuria, quod quidam ait, quā
chirurgos fuisse videatur. Plurima quidem ad vo-
 luptatem & delicias hominis: omnia verò ad salu-
 tem eius & conseruationem chirurgus comparauit.
 Nam quæcunque tota rerum facie exposita, quæ *Prona chi-*
 10 cunque cauernis terræ ac visceribus latent, quicquid *rurgos po-*
 est aquarum, stirpium, animalium, terra, ignis, ma- *lius quā*
 ria, chirurgus inferunt. In fece rerum & excremen- *epicurea.*
 tis, in carie, in rebus minimis, obsoletis, ac propē nū-
 15 lis, remedia condita sunt. In re vna multiplex na-
 tura vario genere remediorum foeta est. In apicula
 quā variè lufit, quā multas diuitias chirurgus
 condidit, mella, ceram, metyn, sandaracham, fauos,
 propolim, quicquid denique locuples illa alueorum
 20 respublica continet. Quin & apes ipsas ad auxi-
 lia tranſtulit. Et in homine multa sunt, quæ pro-
 sunt homini, vt quocunque animum aduertat,
 quocunque oculos coniciat, remediorum turba
 sese offerat. In quo summopere probanda est ma-
 iorum diligentia, multoque magis imitanda stus-
 25 dia, qui in ea vastitate rerum nihil intentatum, ni-
 hil inexpertum reliquerunt omnia elaborata &
 summo iure existimata, literis consignarunt, quæ
 bus iam perfrui datum est, alienis scilicet bonis, *Taxantur*
 30 Primū ergo consuetudine, natura, & ma- *noſtri homi-*
 iorum historia, infinita nobis materia comparata *nes.*
 est, quæ iam deserta ac supressa iacet, quia ne-
 glecta. Satis est capsula pauculis alueis distincta:
 iatis pyxidicula: hic vno atque altero remedio *morſi*
 35 contentus est, quæ scilicet accepit oraculo, nec *gicæ n*
 vlli reuelanda putat. Sed ego sic arbitror, op- *ſpor*
 tima esse remedia, quæ plurimis cognita, plus
 rimis probata sunt. Alteri elementa for-
 dent, & quicquid elementare est. Hinc noua
 H 2

*Argumen-
tum libri
explicatur.*

*Antidota-
rium.*

elementorum soboles, hinc æther & cœlum ipsum
ad remedia exprimenda sunt. Vernaculæ sunt nos
bis atque domesticæ, naturæ opes, quibus vulnera
coniungas, repurges sordida, sinus impleas & cicat-
trice tegas, cæteraque præstes omnia, quæ chirurgi
opere continentur. Verum suis cuique studiis frui li-
ceat. Nos ex immensa, omnibusque exposita naturæ
sylvæ & maiorum historia, quæ iam publica vel
multorum fide consent, remedia transferemus. Ex-
hibebimusque rudimentum operis suis quidem li-
neis descriptum, quod alius impleat informet, suis
denique numeris absoluat. Nos speciem aliquam &
formam argumenti adumbrabimus, secuti Cosmo-
graphos, qui totius orbis ambitum angusta tabula
contrahunt. Idem enim condonandum nobis, cum
non alios fines imperii, alios materie, de qua præsens
instituta oratio, natura posuerit. Genera quædam
rerum, & præcepta artis primum explicabimus,
utendi methodum, & leges aliquas instituemus,
ex quo censebitur particularis materia, & formulæ
describentur, quas partim ars ipsa reperit, partim
optimorum medicorum usus atque experientia com-
probavit. Antidotarium inscribunt hoc genus ar-
gumenti, nulla ratione aut usu veterum, sed, ut fuit
annorum licentia, è Græca voce Latina analogia
nomen detorserunt. Multa nobis, plurima aliis re-
liquimus, ne volumen, quod quinque libris Ioannis
Tagautij, & hoc de materia chirurgica commen-
tario cogendum erat, in maiorem molem accresceret
deinde non plus operæ hac in reliquit collocare no-
bis, quam à quotidianis studiis statâque interpre-
tandi cura relictum fuit, idque breviori tempore,
quam hoc institutum nostrum breve, quidem, sed
varium, exposculet. Ideoque dignum venia, si con-
tractio ambitu verborum, pressaque periodo, quæ-
dam describentur. Et in tam numerosa medelarum
turba potior est verborum moderatio, brevibusque
sententiis res premenda est. Adhæc ponimus idos
neos

neos esse huic doctrinæ, qui iam intincti fuerint præceptis artis, quam Ioannes Tagautius singulari ingenio atque incredibili studio informauit. In quæ ^{Latus operis} genera morborum diuifa sunt, circumscriptæ formæ, ^{Ioannis Tagautij.} designata indicia, notata præiagia, institutæ leges, scriptæ medelæ plurimæ: in qua quæcumque collasbeabantur in disciplina vetere, constituta, quæ vitium fecerant, reformatæ: tota denique ars, quasi res diuino lapide instaurata est. Vnicam hanc partem ¹⁰ operis interceptus negociis in nos transtulit, quàm idè recepimus, ne & publica ratio deserir à nobis, & officium necessitudinis repudiari videretur. Multa igitur è Græcis, quædam ex aliis transtulimus. Quæ à Guidone, eiùsque notæ scriptoribus rudius ¹⁵ tradita sunt, paulò purius reddere contendimus, etiamsi intelligamus vitia corporum non curari eloquentiâ. Sed nec barbarismo depelli possunt. Prohibemus quidem omnem orationem, modò sententiis rerum, quasi suo succo & sanguine condita sit. ²⁰ Melior tamen hæc, si neque neglecta, neque ambitiosa, sed mediocriter culta est. Adde quòd barbarismus ille multas sæpe tenebras rebus attulit, & optima quæque, sordescunt plurimis, quæ sordidis, nec ita puris vocibus describuntur. In damnandis quibusdam ²⁵ rebus, autores Græcos adhibui: in remediis ea selegi, quæ præceptis artis congruerent magis, quæque vt res præstò sunt facilius comparentur. Atque hæc præfati, ad institutum opus veniamus.

30

De repellentibus.

CAP.

I.



35

Porpousinæ Græci vocant, quibus & ini- ^{Utilitas n} tiis fluxionum & post initia vtendum ^{pell.} est quâdiu videlicet humor affluit: hinc enim phlegmones ortus atq; incremēta hinc vomicas, maligna vlcera, febrium dolorumq; causas, alia denique permulta vitia corporum declinamus. Ideoque principiis obsta. Sed va ^{Vacuatio.} cuādū prius corpus est, siquidē postulat, casus ac ferē

486 Institut. Chirurgicarum, Lib. VI.

postulat: quia in plethora & cacochymia rheumatismi plurimum commouentur, quāquam etiam in mediocri vitio humorū & copia: vbi phlebotomo
Modus. vel pharmaco natura leuanda est. Idem remedium
 sapius innouandum: si quidem metus est: ne cum
 incaluerit morā, affecta inde pars nimium recalescat. Vis quoque remediū vitio conferenda: Leuius
 enim pharmacum vrlactuca, in graui ardore inutua
est: fortius qualis est succus ē pomo Mandragoræ,
 liuore inficit, indurat scirrhum, & aliquando ita res 10
primit: vt in viscera fluxionis impetus rapiatur. Ad
 consiliū adhibenda hæc omnia natura situs figura
 sensus robur, partiū humoris copia, qualitas, corpus
 viā præterea per quas is illabitur. Neque perpetuo
 satis est infirmo loco repellens auxilium adhiberi: 15
 aliquando enim superius collocandum: vt veluti
 præmissa manus vias intercipiat, nequid transfluat,
 vbi venarum ductus atq; coniugia animaduertens
 da. Cæterum reprimentium consuetudine naturæ
 admodum controuersa est. Arabibus repellunt quæ 20
 influxum prohibent, refrenant crassant illinunt, op-
 pilant: quæ denique robur partium consumant. In
 Græcorum libris astringentium materia cum repel-
 lentibus ferè cōmiscetur. Apud Latinos Cor. Cels.
 scripta reliquit: quæ simul repellant atque refrige- 25
 rent: & rursus quæ sine frigore repellant. Aurelianus
 in chronicis alia scribit vnā astringere atque res-
 primere, alia astringere quæ non reprimant. Sed
 vtriusque: vt aliquot locis Arabum, in censenda ma-
 teria non sine vitio est oratio. Iustissima Græcorum 30
 sententia: eaq; nobis explicanda est. Repellit per-
 petuò quod frigidum est: frigidum aliud aqueum
 natura molli ac soluta, aliud terrenum crassiore ma-
 teria: quod quia astringit & magis contrahit par-
 tes, efficacius reprimat: aut certè solum id efficit, si 35
 quidem ab actionis vehementia repellentibus nos-
 men inditum est. Ac certe in rheumatibus præstans-
 tissima medicamenta sunt: quæ cum quadam astring-
 ctione

*Quæ ad con-
 silium adhi-
 benda.*

*Controuersa
 repellentium
 natura.*

*Græcorum
 sententia.*

ctione vehementer siccant vt non mordeant: quae
 lia terrena sunt. Quanquam & alterū genus, quod
 aqueum est: vtcunque reprimat, & ex a quo frigidum
 vel terreno frigidius est, ac refrigerio magis
 conuenit. Verū praterquam quod humor frigore
 re repercutitur, si quidem accelsit cōstringendi vis,
 quod iam contr. loco exstringitur, magis etiam si tes-
 nue est: & si quid reliquum sit, sapenumero resiccat-
 tur: confirmatur pars: vt sine pharmacorum ope
 10 quod postea influat possit retundere. Verū hac *Cautio in*
 parte prouidendum: ne quid nimis, ne cutis grauius *stringenti-
bus.*
 contrahatur: crassescat humor, dolor exasperetur,
 fluxio increascat: grauius denique incendium irrite-
 tur. Atque vt initio quidem te iuuille putes, reli-
 15 quum tamen & scirrholes & contumax persistit,
 quod imposterum ægerrimè discutias. Ac grauior
 metus: si quid viscerum infirmius est. Excipit enim
 celeriter quicquid retūdatur: vbi omnia firma sunt,
 in magnas venas & viscera citra periculum aliquid
 20 refluat. Videndum quoque ne vitra modum con-
 trahas in materia: copia crassitie, vitio molli ve-
 getoq; sensu corpore: dolore graui pariter & calore.
 Vbi laxanda potius via est, vt diffluat calor, ac
 dolor tēperetur: qui vbi cruciat vehementius, ad las-
 25 xantia & anodyna omninò confugiendum est. Ad
 stringenti simul atque repellenti auxilio vis effica-
 cior est: si quid tenuium partium vel natura insitū,
 vel arte commixtum est: modò non mordeat. Iusto
 enim calore tēperari potest, multò magis, si quod
 30 ferè fit) ab infirmitate fluxio, à frigore infirmitas
 orta est. Pestifera materia non occurrimus, vbi in *vbi non re-
superficiem diuerit: sed potius illicimus: atque ras-
pellendum.*
 pimus vi maiore, si tardius mora resistit. Neque
 dissimilis ratio est in criticis apostematibus, coxar-
 35 riis, lue venerea: vbi non repellenda in corpus: sed
 foras potius materia trahenda est. Iam verò quæ il-
 leniunt, oppilant, offarciunt: alias quidem dolorem *Oppilantia.*
 leniunt, alias acrimoniam heberant, viasq; interce-

488 Institut. Chirurgicarum, Lib. VI.

piunt. Ex quibus si vis, reprimant: ac reuera non
nunquam reprimunt, oleum rosaceum omphacis
num, myrtinum, oui candidum, aliaq; id genus.
At gummi genera resina, gluten, farina pistrinalis
gyris tritici hydrelæo, exelæo, Rhodino, repellens
te succo: austero vino dissoluta, non tam ipse sua
quàm aduentitia vi reprimunt. Adstringunt calis
da folium casia, cinnamomum spica, aloë, crocus
cyperus, calamus aromaticus myrrha absinthium
marrubium polium, saluia, centaurium: vina qui
dem austera, & aromata plurima. Reliqua verò
tum austera, tum acerba in proximum ordinem res
feremus. Leniter repellunt aqua vinum lactuca, ins
tyba, polygonium trifolium, auricula muris, lentis
cula palustris psyllium, liquor oui, vmbilicus ve
neris, semperuium portulaca. In summa, quæcun
que frigida aqueo elemento soluta sunt. Omphas
cium adstringendo efficax: Solanum ambigit. Hoc
potentior rubus est immaturo fructu & floribus
mollioribus autem foliis & asparagis plurimum
aquæ continet, ideoq; leuius contrahit. Adstring
unt vitium folia, & capreoli, plantago sorborum
cornorum mespilorum, pirastrorum cydoniorum,
myrtorum, spinorum fructus & folia, rhodonia,
rosarum capita, obelisci, deinde sed minus semina flos
res: & folia: oxyacantha mediocriter malicorium
magis, cytinus balauſtia rhus, acacia bolus Arme
nus terra sigillata quercus, cupressi folia germina,
& nuces. Vehementer refrigerant pomi mandra
goræ, hyoscyami & papaueris succus: quæ reliquis
interdum temperari possunt: vbi acrior inflammas
tio est: sed prius auferenda: quam inde partes liuos
rem ducant. Spongia è frigida expressa partim con
trahit, fluxum inhibet, dissipatq; in viciniã, quod
iam coit. Eodem modo lana succida & splenia aus
stero vino insuccata. Magis etiam, si aqua prius,
galla & similia incoxerint. Vinum aquæ præferens
dum, & maximè austereum, vbi reprimendum est.

In

*Que calida
adstringūt.*

*Materia re-
pellentium.
Aquea.*

*Omphaciū.
Rubus.*

*Que rebe-
menter refri-
gerant.*

*Aqua.
Vinum.*

In deligationibus fasciæ vino insuccantur. Acetum ^{Acetum.} repellit, adstringitq; vehementer. Caphura repellit, & tenuitate partium faciliè permear. Oculi populi veteribus Græcis calfacit. Repellit gypsum ^{Rosaceum.} oxycrato maceratum. Olei rosacei frequens vsus est: sed sit ex oleo omphacino, in quo rosæ sapius mutata maduerint. Quod annum superat, exolest ^{Rō. in oleis.} tum est. Oleum omphacinum si deficit, recenti oleo ^{q. d. oleo in} & vix acerba succo vna coctis, dum succus omnis ^{placino} no exhalauerit fingito, & ad ignem saligno ramo, vel simili assiduè commoueto. Oleum verò nec sit conditum sale, nec atate rancidum: in myrtino, melino lentiscino, & similibus eadem vitia fugienda sunt, verustas rancor falsugo. Mastichinum nardinum costinum adstringendo roborant, & calfaciunt. Vitiosum oleum: cum integrum deficit, tandiu eluatur: dum virus exuat. Eluatur aqua vel sim ^{Olea facti.} plici, vel rosacea. Descriptæ materiæ oleum vim ^{tiria.} combibet, si vel materia ipsa: vel succus eius oleo incoquatur. Plantaginem gratia exempli, oleo recenti & pari aqua aut vino coques, dum solum oleum reliquum sit. In ardore nimio periculosus olei vsus ^{Cautio.} est: quia calore incenditur & frigit. Expressis succis melius vtimur in lana succida: panniculis, ac sple ^{Succorum} niis. Portulaca semperuium: vmbilicus veneris, ^{vsus.} ægrè succum reddunt: nisi in mortario tritis aliquid omphacii: vel liquoris similis affundatur.

Cataplasmata fiunt farina in succo pista. Ex oleis ^{Cataplasmata & ce} cerora coeunt, & succis imbuuntur. Remedia ne ^{rosæ.} que dura sint: neque grauiā, ne presso loco dolor ^{Cautio.} res augeant. Cerusa cichorii succo & acetoleuiter diluitur. Ceratum è psyllio, Psyllii vnc. quatuor ^{Ceratum è} in aquæ lib. quatuor macerentur percoquanturq; ^{psyllio.} expresso succo, adde rosacei libram vnam: ceræ ^{Ceratum ro} vnc. sex, contra articulorum rheumata. Non ab ^{saceum.} simile ceratum rosaceum. Duplice vase cera cum ^{saceum.} oleo liquefit: vbi refrixerint, conspersa aqua com ^{saceum.} mouentur: aqua reicitur, succus plantaginis affun-

490 Institut. Chirurgicarum, Lib. VI.

ditur: vt quantum fieri potest, absorbeant. Inflammationes sinus, vlcera genitalium quæ serpunt, *Ecoriandro.* adiutur. In teneris corporibus idem ceratum conmandri succum imbibat. Coriandrum leniter adstringit, aliis refrigerat, Galeno calfacit: vtere in *Cerata magis adstringentia.* crementis. Ceratum myrtinum & melinum magis adstringunt. Herpetibus, & nimio humore flaccidis vlceribus conuenit, Myrtini lib. vna: ceræ vnc. duæ: pollinis myrtorum vnc. vna. In ceratis vtendum cera, quam adolefcentior apum populus confecerit: ceram virginiam apianam nominant, eaq; è nouis fauis separanda. Alioqui cera alba vtendum erit, non iponte quidem nata, sed factitia, qualis olim Tyrrenica, quia suauior est, & acrimonia hoc genus remediorum carere debet: ideoq; præferenda cera è dulci ac diluto melle. In coagulato lacte & inde nascente inflammatione farina fabacea hydrelæo vel rhodino pista, mammis imponitur. Idem opitulatur testibus inflammatis. *Διὰ χαλκίτιδος* χαλκίτιδος contra rheumata hoc modo temperari debet: Adipis suili recentis, exemptis fibris vnc. duæ olei recentis, lithargyri, ana vnc. tres: chalcitidis vnc. dimid. Conficiendum arte medicamentum: vltus tempore, vnc. duas medicamenti, olei rosacei vnc. tres colliquabis: vbi refluxerint: aqua frigida, succo portulacæ psyllij, lactuca: vino auitero, vt res postulat, subiges, animaduertens quantum repellendum, adstringendum refrigerandum, siccandum, leniendum: vt modò rhodini loco myrteum aut melinum misceas: oxycratum hunc vel illum succum aliis præferas. Quod sequitur, exprimit vlceribus quod influxit: & quod influat, repellit. Lithargyri vnc. quatuor: olei dulcis vel rhodini vnc. quatuor: aquæ vnc. tres: lithargyrum die vno hydrelæo coquitur: difficilius enim illi quiescit: teneris corporibus & paruis vlceribus *Defensiuæ.* conuenit. Defensiuæ vocant è boli Armeni parte vna, terræ sigillatæ dimidio, rosacei triplo, aceti vel

vel succi repellentis humid. Liquidis reliqua infriata
 commiscuntur: vel è bolo Armeno liquore quicunq; Deligatio.
 leuato: deinde affuso succo è capreolis vitu, aut om-
 phacj. Fasciæ ritè conuolutæ in repellentibus cens-
 5 feri possunt: quales in fracturis, & quia vlcere sur-
 sum adducuntur: vt. adstricta parte, & ita ductis or-
 bibus paulatim laxes. Similiter cum altero mem-
 bro atrophîa intabescente, alterum deligamus. Vin-
 cula quoque superioribus partibus iniecta, quâ vis
 10 delictet materiæ cursus est. Aliquando etiam inferio-
 res illaqueamus, vt cum è crure exhalat virus quod
 viscera appetat, ex quo & epilepsiæ & syncope cau-
 sa præciditur. Sed in viceribus plurimam & fractus-
 ris, vias laqueo comprehendere oportet, ne si quid
 15 transfluat, dolor, phlegmone, putredo, syderatio,
 aliâq; id genus concitentur.

De attrahentibus.

CAP. II.

Attirax & *trioraxia* Græcis appellata, vfu Attrahentiū
 20 quidem repellentibus cōferri possunt, materia-
 sed natura plurimam dissidēt calida, te-
 nui substantia, quæque vi quadā rapiat,
 quæ in alto corpore posita sunt. Ideoq; Multiplex
 viscera, internūq; corpus exonerant, foras translata vsus.
 25 materia: venena in cutim euocāt. Criticos abscessus
 accelerant, desperatos pleuriticos & fortasse attoni-
 tos releuant: inguinum tumores amplificāt: quodq;
 vel pestiferum, vel nimis vitiosum medio corpore
 conceptum est, aliò pertrahunt. Tabidas ac velut sy-
 30 deratas partes vitæ restituunt: perfrigeratas spi-
 riū refoquent: vitiosam saniem exhauriunt, quæ ner-
 uis & cuniculosis vlcerebus latet: squammas ossium
 detrahunt, coxaricos iuuant: hydropicos exugunt:
 paxillos, clauos, spinas, sagittas reuocant: multo ma-
 35 gis, si locus vlcereis periculo inciditur, nec patitur æ-
 ger angustiorē plagā ferro ampliari. Quod in vomis-
 cis, strumis, panis, egilope, oculis, auribus, reliquisq;
 partibus aliū desedit, eliciunt. Multiplex ergo
 attrah

492 Institut. Chirurgicarum, Lib. VI.

Differentia attrahentium. attrahentium vsus, sed nihilominus varia materia est. Aliis ea vis à natura insita est: atque in his modò manifesta qualitas elementaris: modò occulta quædam proprietas & naturæ familiaritas attrahit. Aliud genus hoc habet aduentitia qualitate ex putredine contracta acrimonia. Calor Galeno omninò attrahit, sed quod attrahit, non protinus calidum est. Aphrodisæus aliud sensit. Attrahunt cucurbitulæ, sanguisugæ, pyulcus, suctus, dolor, vincula, frictio, cauteria. In attrahentium vsu aliquandò quod fuerit attractum, corpore excludimus: sed hic modus est, ne cum vitio partem frugi materiæ eripias. Nonnunquàm tantum attrahimus, non etiam discutimus: vt quum in partem emortuam calor & spiritus attrahitur. Argenti spumam, ceram, resinam picem, oleum, epispasticis veteres miscuerunt, vt & temperarent, & magis emplasticum pharmacum efficerent. Quidam etiam adstringente materia ob-

*Particula-
ris materia.
Propolis.* tundi voluerunt. In primo genere sunt dictamus, propolis, ceram virginiam vertit Scribonius. Rurdis est & crassa materia in apum officinis, nondum cera: odore graui, vt qua pro galbano veteres vterentur. Ea mellatione verna, separari potest fauorum pars quæ cellas obstitat. Sed iam exemplis fauis, posteaquàm mella diffluxerunt, quicquid est in fauis, vnà confundunt, vt nihil syncerum haberi possit. Magna verò synceræ propoleos virtus est: spiritus crassos & vitiosam materiam ex alto elicit. Recens per se satis est mollis & pinguis. Sic in puncto neruo agricolæ Galenus vsus est: quæ ætate induruit, oleo veteri molliori debet. In mollioribus corporibus oleo illiquatur. In duris lactæ multo tithymalli: cum terebinthina satis attrahit.

Thapsia & viscum. Thapsia recens utilis: bimula & vetustior exolefcit. Cerato misceri solet: quæ quia vt viscum plurimum aquæ continet, quatuor & quinque horas insistere oportet. Radix arundinis cum melle. Sagapenum, galbanum, ammoniacum, opopanax,

- nax, calx viua, cinis è face vini vel aceti, quæ loco *Loco nitri*
 nitri est, struthion, aristolochia longa, quæ & spi *face cremata*
 cula, & squammas extrahit, lepidium, sinapi, nascitur *vini vel ace*
 tium, tithymallus, draconium, pyrethrum, ranunc *ti.*
 5 culus, sales, tum qui edi possunt, tum ammoniaci.
 Quædam infriata affricantur, aut gummi & resis
 nis concorporantur. Lixiuum in subtili calidaq;
 materia extillatum: ex eadem cinis Anemonæ, cal
 lamintha, narcissi radix, cyclaminus. Sparthi quo
 10 yites alligant fructus, & è foliis succus. *Acerum, Acetum.*
 sed hoc suspectum, vbi siccitas, dolor, inflammatio,
 ylcus, adstrictio, & à neruis dolor est. Cantharides
 ex polenta & melle pistæ. *Medulla & adipēs æta Medulla &*
 te acrimoniam contrahunt: vrsinus adeps, *hyemi adeps.*
 15 nus, pardalinus, leoninus, & alij, sed hi maxime. In
 alopecis & profluuiis capillorum vitium discus
 riunt, attrahuntq; quod ad capillitium vtile sit.
 Oleo & oleæ flore, tela sibi refigere elephantos, *Oleum.*
 20 stis est Aelianus. vetus sit oleum tenue & calidum,
 Sulphur infriatum melle, oleo terebinthina, salua *Sulphur.*
 hominis, axungia. Idem in œnostagmate feruescit
 dum enatet lentor quidam (oleum appellant) quem
 concha excipere oportet aliquoties commutanda
 aqua, dum satis olei collectum sit, quo demersum
 25 corpore hydrargyron foras elici voluerunt statim
 illito à balneis. Euphorbium recens acris est: *Euphorbium.*
 mum trimumq; paulatim remittitur, quinto & ses
 xto anno exolescit. Cerato temperatur, quod vel
 decuplum, vel duodecuplum oleum habeat, & tri
 30 plam ceram. Modus est vt tantum erubescat *Modus eu-*
 cus, & pruriat, non vratur, nec ylcus contrahat, nisi *phorby &*
 & hoc etiam necesse sit. Cerato largiore dilui potest *similium.*
 quod est acris: quod verò languidius pharmacum,
 aucto euphorbio, cerato immixto augeri debet.
 35 Eadem lex in reliquis eiusmodi seruanda est. Ar
 dor affusa aqua, aceto (quod vim thapsiæ efficaciss
 me diluit) cerusa è rhodo stagmate lota extinguitur.
 Succus cyrenaicus medicus, opobalsamum & alia,
 quæ

- quæ partim exoleta sunt, partim vsui esse possunt, ex 3. de comp. pharmacorum κατὰ γένος, & aliis Græcorum libris repetenda. Aduentitio calore trahunt, fermentum, sterqus anserinum, gallinaceum, columbinum, arietinum, humanum, & quæcunque talia sunt. Scatebat quidam è grege medicabulorum lue venerea: aliquot diebus vniuersum corpus equino fimo obruit, vt tantum esset quàm respiraret. Erat sterqus scabularium, equino lorio sapius perfusum, quod & iam computruerat. Effecit ille hac arte, vt totum virus exprimeret: addidit aliquoties enchiristion ex axungia, larigna, & hydrargyro. Nec alia vitæ lex seruata est, quàm mantica offerebat: atque his remediis curatus est. Fermentum oleo incoquitur: fundit, liquat, furculos trahit, pedes contusos sanat, mollit, discutit. Axungia veteri, larigna, terebinthina & resinis liquidis pistum efficacissimum est. Alias cum cepa cocta subigitur: coquit, trahit, discutit, aperit. Coagulum quod vetustius, eò efficacius. Ex echino animalium (quæ περὶ κιννα) lepore & vitulo marino colligitur. Lac est in lactentium animalium ventriculo vel omaso ita concoctum. Aristoteles ad alui profluvia utile facit magis leporinum: equinum Diosc. Arabes & quidam è Græcis ad sternus gens frigidum, ac reprimens auxilium faciunt.
- Quæ qualitate occulta. Alij acrimoniam elementis, reliqua occulta qualitate attribunt. Hoc certò habet, quod dissipata cogit, & coacta dissoluit. Magnes ferrum attrahit: repellit Theamenes. Succinum illicet festucas igno-
rata vi. Cancer fluuiatilis tritus tela extrahit: lacer-
tæ caput: rana summis partibus resectis. Cochlearum & limacum carnes, alias per se, alias cum suis volutis tritæ, ac mixto interdum coagulo, tela rapiunt, atque hydropicis aquam exugunt: non prius soluere oportet, quàm totus humor exudauerit.
- Ostrea viua pestiferos bubones loco transferunt, & ad se trahunt. Scorpio tritus & impositus, quod infixit virus, retrahit. Oleum quod ex eo fit, idem efficit,

efficit, & calculo educit illicitum glandi, si in cole res-
 stiterint: vel pubi ac perinæo, si superius inhæserint.
 Cucurbitula summa vi rapit. Hirudines superficiẽ
 sugunt. Pus, vrinas, calculos suctus elicit: ore muna-
 do ac prius loto sit qui exugit. Pyulcus* catheter
 iisdem vtilia sunt: vincula frictio, phœnyginus,
 dropax, sinapismus, ferrum candens, vel admo-
 tum, vel impressum, calore trahunt. Sed hoc violens
 tum remedium est. Verum quæ non sanant phar-
 10 maca, sanat ferrum: quæ nec ferrum, sanat ignis:
 quod Hippocratem in Aphorismis scripsisse videretur. *Aph. Hip.*
 lunt. Mixta remedia sunt theriaca. Psoricum dicitur *Psoricum.*
 pla chalcite & lithargyro, aut æquis partibus cad-
 mia & chalciteos: vel duabus chalciteos, & tribus
 15 cadmiæ: fortius est quod cadmiæ, quàm quod lith-
 argyrum recipit: minus acre lotis metallicis. Ex
 acerrimo aceto trita & fictili clausa sepeliuntur fis-
 mo. Hac arte macerata, triplo, duplove cerato excis-
 piuntur. Ceratum seiquialtera ratione dupla, tri- *Quomodo*
 20 pla olei, ad ceram conficitur. Ea metallicorum *tenuiora me-*
 ra pharmaca tenuiora fiunt, facilius penetrant, & *tallica.*
 inde trahunt. Oleum sit vetus, ricinum, sinapi, *Olea como-*
 num, ficyonium. Raphaninum, è terebinthina, la- *da.*
 rigna, strobilina, pinea, picea, abietina, arte chymis *Resine &*
 25 ca si vis distillatum: quæ resinæ etiam è profundo *inde olea.*
 trahunt, sed in primis terebinthina, deinde strobil-
 ina: in quibus non modò calor, sed tenuitas par-
 tium in attrahendo spectari debet. Formulæ sunt. *Formule ex*
 Cerati vnc. quatuor: terebinthinæ vnc. dimid. liquas *Gal. Orib.*
 30 tis immisce pulvisculi, euphorbi drachmas tres. In *Aet.*
 terioris fermenti vnc. vna: terebinthinæ liquidæ
 vnc. vna: incorporata plerimum valent in punctis
 nervis. Propoleos acris & pinguis (nam cera virgis
 nea abutendum non est) vnc. duæ: olei veteris vnc.
 35 quatuor: galbani vnc. dimid. coquant ad ignem. Pic-
 cis liquidæ, picis aridæ, propoleos, partes æquales.
 Lithargyri, cerossæ, salis, ana drach. decem, seorsum
 tusa, & cum olei vnc. tribus in mortario pista, ad
 ignem

Relatū ad
Androma-
chum.

Necēpsōnis
cupressō.

ignem diu versentur, paulatimq; decoquantur. *Lis*
thargyri, cerusæ, nitri, ceræ Colophonæ, ammos
niaci, ana vncia vna: olei veteris vnc. sex: reliqua vn
ciis sex lxiij ficulnei dum non inquinant, conco
quantur. Deinde cera Colophonæ, ammoniacum,
deinceps quidem ac paulatim adiciantur. Nucleo
rum è dactylis crematorum, nitri rubri, salis ammo
niaci, vel gemmæ, aristolochiæ rotundæ, radice cus
cumeris agrestis, terebinthinæ ana drach. viginti: pi
peris nigri & albi, ammoniaci, amomi, xylobalsæ
mi, myrrhæ, resinæ siccæ, capitum lacertæ, lactei
succu mori, ceræ, ana drachmas decem: adipis cas
prini drachmas quindecim: olei lirini quod sufficit
ad emplastrum. Vix parari potest, nisi ad vocata
confugas. Quod sequitur admiran
dum ad strumas, ramicem gutturis, parotidas, os
mnem duritiem, & œdemata. Cupressi folia ne
que teneriora, neque duriora in puluerem commin
ues: tortiuo vino consperges, atque ita volutab
bis, dum infæcis corpus coëant. Inde struma vel
ramex inducitur, tertio primū die soluitur medis
camentum: contractum locum inuenies, qui digitis
exprimi debet. Rursus ad tres dies idem phar
macum applicabis, eodemq; modo solues & expri
mes: septimo die, vel ad summum nono, strumæ
velut miraculo abolebuntur. Exugit hoc saniem
per poros affectæ partis. Olei antiqui vnc. viginti
duæ: ceræ albæ vnc. quindecim: nitri vel salis tor
refacti, aut fæcis crematæ vini vnc. tres: terebinth.
vnc. duodecim: lxiij querni, vel ficulnei vnc. octo
decim: cera cum oleo liquatur: terebinthina adij
citur, refrigeratis nitrum conspergitur, lxiuium
paulatim affunditur: omnia pistillo conuoluuntur,
Plurima ex tertio & sexto de compositione phar
macorum κατὰ γινωσκ., & 15. Aët. repetenda. De sinas
pismo, dropace, phœnygmo, & aliis alio loco.
Addunt Apostolicon Nicolai, Oxycroceum, &
alia.

De resoluētibus.

CAP.

III.



- 5 **L**euiores rheumatum discutiens materia cum repellente misceri debet. Inclinate vitio diaphoretica pura sint & horum vnicum fortasse genus est: sed clarior doctrina fuerit, si duplici differentia separemus, vt alia quidem
 10 leuiores, quæ *ῥαιωτικὰ*; alia fortiora, quæ *διαφορητικὰ* si
 vis appelles. *Ἀραιωτικὰ.* *Διαφορητικὰ.*
 Arxotica mediæ naturæ vicina sunt eo calore, quem humiditas temperet, ex quo minimè
 15 ficcant, dolorem leniunt, relaxant cutem, spiramenta corporis rarefaciunt, tenuitate partium intro penetran-
 20 tunt, quòdque inhæsit parti liquefaciunt: hinc ex humore vapor fit, qui subinde expirat, dum omnis nò locus detumeat. Et adhuc quidem satisfaciunt, vbi tumor in superficiem exponitur. Locusq; mol-
 25 lis est ac rarus, materia verò calida, humida, & tenuis est. Quòd si in alto corpore humor deponitur; si idem frigidus, crassus, glutinosus: si dura densaq; cutis: si viæ longitudo quædam est flexus & anfractus, iam vi maiore opus est, videndumq; non quale
 30 in præsentia, sed quale futurum sit medicamentum, quum eò peruenierit. Ex quo nec acribus quidē parcendū erit. Etenim pars exterior perferet, quæ agra dolensq; tolerare non potest. Maiora verò remedia in diaphoreticis numerentur, iam vicina epispasticis
 35 quanquàm vtraque virtus euocandi atque digerendi plurimis rebus insita est: sed vt in vnoquoque vis altera superat, ita genera distincta sunt. In hepate, liene, ventriculo, atque id genus partibus, à relaxantibus metus est ne dissoluant vires: ideoq; adstringens materia, qualis est aromatum, misceri debet.
 40 Frigida crassaq; materia, incidente auxilio prius cōparanda. Mollienda quoq; vbi durior concreuit, ex quo à leuiorib⁹ ad maiora remedia gradus paulatim fiat, vt sine periculo discutias. Alioqui dissilabit res. *Cautio.* *Ab acrioribus quū con-*
 45 *tingat.*

nue, lapidescet quod crassius est. Cum parte stupida
durius: cum ea quæ vegetius sentit, clementius agē-
dum est: quanquam stupore partis abutendum non
est, ut ea imperes, quæ exulcerent. Sic enim sensile
corpus intabescet: contrahetur, non rarefcet: cogetur
materia, non liquefcet: horror, dolor, fluxio irritabi-
tur: dehiscent veng, omnia in deterius cōmutabūtur:
multo magis si pharmaca crassiore consistēt materia
& siccent. In phlegmone quæ vetus est, videndum
nunquid affluat: id ferè accidit tumoribus qui inues-
terasunt, ubi medela quæ reprimat, cōmiscenda est. 10
Posteaquā verò subsedit tumor, ac nihil quod ex-
halet reliquum est, cōfirmanda pars, quæ longo vis-
tio elanguit, multo magis si statis periodis, rheuma-
tismo vexari solet. Aræotica sunt, chamemelum, lini
semen: in maluis efficacissima, althæa: sequitur agrez 15
stis, domesticę vis nimio humore elanguit. Aqua cas-
lida utitur Hippo. in fracturarum exolutione, quā
vocat *πυλωνα*, vinū exiccat, reprimat, & digerit: lana
sordida bene carminata inebriata vino, & inde pres-
sa: ceratū similiter. Butyrum digerit, molliū corpo- 20
rum parotidas, bubonas, oris plegmonas, aliāq; in-
numera, ut per se satis esse possit. Oleum dulce, cas-
lēs, & in quo illa efferbuerint. Sicyoniū ē foliis, frus- 25
ctu & radice cucumeris agrestis. Crinelaon intin-
ctum croco, omnes inflāmationes discutit. Oleū cas-
rynon efficacius ē rancidis. Nux rancida per se, vel
cum melle trita efficacissimē suggillata rapit, inuris-
tur, aut candente ferro premitur, ut reddat oleum, 30
quod optimē discutiat. Omne oleum concalfactum
igne, quale est lucernarum, vel ignito ferro extortū,
efficacius est. Oleum vetus, ricinum, cannabinum,
anethinum, quod ē rosmarino, maiorana, zambace,
leucoio, hyssopo, aliisq; eiusmodi cnelæo coctis, dū 35
omnino expiret vinū Raphaninū, sinapinum, melā-
thinon, terebinthinum, hypericinon, potenter diges-
runt. E radice bryoniæ, & vocati figilli Mariæ, cni-
co, grano gnidio, hydropicis & œdematis olea com-
parantur.

*Particularis
materia.*

*Olea.
Oleū liliorū
cum croco.
Nux rancida*

parantur. E galbano, hāmoniaco, & similibus quæ
 molliant ac digerant. E dauco, caro, cumino, ruta, vt
 flatu excutias, cui rei galbanarium vtile est. Si quid
 incidendum, detergendūve, aliquid aceti vel oxy-
 5 melitis affundi potest, quo tempore absinthium, pos-
 lium, centaurium, iris, aristolochia, gentiana, vrtica,
 hyssopus, & similia œnelæo incoquantur. Hic vinū
 melius non adstringens, giluū, tenue & odorum.
 In phymatibus & parotidibus duriorum corporū
 10 talia ex vsu sunt. Brassica per se, vel cum
 axungia trita, induratas phlegmonas & vetera ery-
 sipelata discutit. Adipe & medullis recētib; laxan-
 do, veteribus discutiendo vtendum est. Mastiche,
 furunculis. Ammoniacum & similia choeradibus &
 15 articulorum tophis conueniunt. Fermentum oleo
 pistum, & cum cocta cepa mixtum, potenter co-
 quit, mollit, ac digerit. Pellibus animalium recē-
 detractis, in contulis verberūque plagis vti con-
 20 uenit. Fœnum græcum duris phlegmonis adhi-
 bendum. Acetum achoribus & œdematis vtile est. *Acetum.*
 Agrippa concalfacto aceto pedes immerfit, vnde Agrippa ace-
 intolerabili pedum cruciatu liberatus est. *neptian[us] 10 liberatus.*
 collo appenduntur & vi latente, vel elementari
 25 qualitate vitia corporibus excutunt, corallus,
 viscum, pœonia. Mirum est quod affirmant. Co-
 luberē cauda suspenditur subiecto vase aqua ples-
 no, in quod ille dehiscat ore: aliquot pōt horis
 vel diebus lapidem euomit, qui in breui totam
 30 vasis aquam combibat. Alligatur lapis hydropi-
 corum ventri, atque in totum exhausta aqua libes-
 rat. E sambuco & ebulo oleum œdemata iuuat, &
 hydropicos. Composita sunt Cerata, quæ simplicita,
 35 oleo minū digerunt, sed fortius hærrent. *Cerata.*
 Oleum abietinum, chamæmelinum, anethinum, sampsu-
 chinum, & similia, cum subquadrupla cera vase
 duplici colliquabis: liquatis duodecimam pars-
 tem terebinthinæ, vel larignæ commiscebis. Iis-
 dem oleis & gduo vino erinaceus coquitur, dum

500 Institut. Chirurgicarum, Lib. VI.

putrescat, oleum pinguius relictum arthriticis cōue-
 nit: idem ē vulpe, lutra, mele, fieri potest. E lini semis-
 ne oleum mola exprimitur, cum sarmentitio lixiui-
 o subigitur, modicum larignæ ad lentorem adicitur.
 Panis cibarius, falsus, fermentatus ē ricinino pistus,
 fugillata delet. Fauos mellis ē vino frigēs, cum solia-
 cea farina, momento butyri, & larignæ subiges.
 Bdellium cum melle teritur; calx cum veteri axun-
 gia, laserpitium cum sulphure: hæc omnia, molliunt,
 tergent, discutiunt. Sulphur cum oleo vetere, melle,
 terebinthina, vel salina mixtum, aut yrinā macera-
 tum, in venenatis morsibus deterget, attrahit, discus-
 tit. Calce lota, & recenti axungia mixta in tenellis
 corporibus vtendum erit. Lixiuuium cum melle faris-
 na hordeacea, fabacea, cōuenienti oleo pista, calidiori
 phlegmone conuenit. *δία χαλκίτεας* vncia vna, in olei
 veteris, vel ricinini vnc. duabus liquefit, declinanti
 phlegmone: ante declinationem, & in vigore oleum
 sit dulce ætate media. Orobi farina diluto oxycrato
 cocta, vt sit calidum cataplasma, crassa & viscida ses-
 cat, & discutit. In contumaci vitio & minus calente:
 olei chamæmeli vnc. tres: ceræ drach. tres: axungia
 anaris & gallinæ ana vnc. vna: chamæmeli & anethi
 ana drach. duæ, omnia lento igne cocta percolantur
 vt fiat vnguentum. Olei sicyonis vnc. tres: ceræ dra-
 chmas sex; terebinthinæ drach. duæ. In frigidiore
 materia ita temperabis: seminis fœniculi, anisi, anes-
 thi ana drach. duæ; farinæ lupinorum, seminis fœnis
 græci, lini ana vnc. vna, cocta vino, tusa ex oleo &
 aceto imponantur. Papaueris cornuti folia cum axū-
 gia & propoli pingui trita, strumas, bubones, & si-
 milia molliunt, atque discutiunt. Colophonix lib.
 vna: ceræ sesquilibra: oleo liquentur: liquatis addito
 salis torrefacti vnc. sex, vbi refrixerint manibus con-
 uoluto, cylindros vel magdaleones fingito, vsus
 tempore aluta intendito adhibito hoc pharmacum:
 pus in se rapit, quod cum hæreat, eradi debet, ac rur-
 sus aluta imponi, idq; sæpius repetendum. Nam ves-
 luti

Sulphur.

vsus *Δία*
χαλκίτεας.



luti miraculo conditum pus emulget, & vitium discutit: sed quia durius, in dolore abstinendum. Eidē rei picis aridæ, ceræ nouæ ana lib. vnam: olei lib. duas blādo igne fusa cōiūgito. Adipis porcini, picis, ceræ nouæ, saponis nigri ana vnc. duæ: liquata transcolato, hidropismos & dothienos adiuuat. Vehementer discutit galbani, castorei ana vnc. vna: liquefiant in olei ricinini sesquilibra: expresso & colato oleo adde picis, terebinthinæ ana drach. quatuor: ceræ quod sufficit, vt fiat solidum pharmacum. Hæc autem cōtumacibus vitiis imperanda sunt, in quibus est quod molliat, coquat, trahat, discutiat. Plura sexto & septimo de compositiōe pharmacorū κατὰ γένος, 15. Aētj & aliis Galeni libris. Partem chalasticis fouebis, ex quo diaphoreticum induces, quod initium quidem lenius: postea verò vt subsidet tumor efficacius esse oportet.

De mollientibus.

C A P. I I I I.

20



25

30

35

Μαλακτικὰ sunt, quæ modicè calida nulla vi siccandi vel humectandi manifesta indurata corpora emolliūt, quanquā (vt omnia ferè multiplici natura coierunt) in malacticis cēsentur plurima, quæ primo ordine calfaciant, secundo siccent, ac tertio. Sed quā malactica sunt, humido calidoq; elemēto temperari necesse est. Plurimus vsus est in tumoribus, quos σκισφώδεις Medici appellant. Hi in musculorū finibus ferè cōcrescunt: aliquādō in medijs musculis, glādib⁹, viscerib⁹, vlcerū labris, ex materia crassa, lentā, & frigida, qualis est pituita, & melancholicus succus. Sed è melancholico succo omninò cancrōsi sunt, & malagmatis exasperari solent. Inflammationes in scirrhū cogi contingit, si materia crassa & lenta est: si adhibita pharmaca, quæ nimium siccent & calfaciant, qualia sunt πτισασικά & ἱστικωτικά. Hinc enim tenue exprimitur, reliquum occalescit. Sic enim tophi in articulis,

Malagmatis natura.

Vfus. Scirrhigena.

Scir. cancrōsus irritatur malacticis.

502 Institut. Chirurgicarum, Lib. VI.

Cautio.

*Leges i^o v^o su
malag.*

*Desperatur
scirrhus.*

*Particulari
materia.*

& calculi in renibus lapidescunt. In tenui serosaq^{ue} materia non ita metuendum: tota enim facile exhalat. In crassa & viscida omnino declinanda quæ siccant, discutunt, adstringunt: siquidem sola molliendi cura est. Malacticis quod clementer digerat, interrim commiscemus, ubi iam malagmate coeperit tumor durus edomari. Phlegmone & erysipelata in scirrhum degenerant nimis refrigerante atque adstringente materia. Sed à phlegmone scirrhus antiprior est. In usu malagmatum certæ sunt leges. 10
Primum enim cognoscendum, quantum pars ægra à sua symmetria recesserit, quantumq^{ue} vitium increuerit: ex quo estimandæ remedium vires. Tum naturas partium distinguere oportet: postremò artificiosè colligendum, quæ ratione emollias: numquid ammisceas quod detergeat, incîdat, discutiat. 15
In quorum omnium usu modum, occasionem, quasle, quantumque animaduertas. Desperatur scirrhus qui sic occaluit, ut iam non sentiat, & inde glabrescat locus. Desperari dico, quia nullo malagmate domari possit. Etenim rescindi ferro, & sepsis excidi potest, nisi à subiectis nervis, venis, & arteriis metus est. Scirrhus cui sensus aliquis vel obscurus, ut magis minusve induruit, ita leuius aut efficacius auxilium requirit. Mulieribus, eunuchis, pueris, vrbanis, ociosam atque umbratilem vitam degentibus, lenior medela: messoribus, fossoribus, duris omnino & laboriosis corporibus fortior utilis est. In lenta & contumaci materia miscendum aliquid quod incîdat, atque detergeat: quod in chordis & tendonibus facitari solet. 20
Tale est acetum mulsum, vel per se, vel in quo hyssopum, thymum, puslegium, & similia præcoxerint. Est & hoc animaduertendum. Scirrhus quidam simplex, alius φλεγμονώδης, ut quædam inflammatio σκίρρῳδης est. 25
Scirrhum malacticis & diaphoreticis excuties: phlegmonem lenies & concoques. Vbi utrumque coit, ut hoc vel illud superat, ita remedia 30
dia 35

- dia temperabis. Leniter emolliunt butyrum, ^{Particularis}
 cum oſypus, & lana succida: hæc oleo infuccanda ^{materia.}
 amygdalino, chamæmelino, in quo ſemen lini, al-
 theæ ſœni græci: in quo malux cucumeris agreſtis, ^{Olea mala-}
 & liliorum radix: tenella malux agreſtis, & liliorum ^{ſtica.}
 folia, vel anethi cucumina præcoxerint: in quo illis
 quatum fuerit aliquid galbani, hammoniæ bdels
 liq. Lentifcinum, terebinthinum, maſtichinum, vſur
 pari debent vbi molliendum digerendum, ac lenis
 10 ter repellendum. Hyoſcyamino locus eſt in calida
 & iam dureſcente inflammatione. Hæc ergo olea
 in lana ſordida molliter apprimenda ſunt: hinc
 enim multò cōmodius malaſticon impones. Omnia
 15 verò prius intepere oportet, & frigida omnino
 vitanda ſunt. Exprefſa oleorum materia, & cum
 adipe piſta, malagmata confinges. In hoc quoque
 genere cenſentur, vitellus oui crocus, cera pinguis,
 caricæ pingues, ^{κερίλαιον} è duplo oleo, vt ſit humis ^{κερίλαιον}
 diſſimum: æquali vt ſit medium. Iam craſſius eſt:
 20 quod ceræ partes quatuor, & olei tres continet. Car-
 ricæ pingues cum irino tritæ, ſcirrhis hepatis & lies
 nis opitulantur. Id habet peculiariter ſcirrhus he-
 patis, quod leniter mollientia deſiderat, mixtis aro-
 matibus, quæ calfaciant, & attenuent. Si æcne eſt ^{ſcircon.}
 25 guibus caricis ad melliginem coctis mollit, deter-
 get, ac digerit. Adeps & ſebum: vtrumque coquit ^{ſebum &}
 laxat, & mollit. quæ quia materia vnde generantur ^{adeps.}
 tur, genere animalium, & loco vbi concreſcunt ^{na} ^{cōcreſcunt}
 30 cum Ariſtotele diſtinguas licet: vt in natura molli,
 adipe, in dura ſebo potius vtendum putes. Rurſus
 quia minimum eſt quod diſſident, miſceri poſſunt.
 verum vtrumque genus natura, & ſpecie anima-
 lium ratione vitæ, & pabulo, ſexu & ætate: deinde
 35 quia hæc recentia, illa vetuſta, alia ſyncera, alia
 condita ſale, aromate: vel externa imbuta qualis
 tate diſtinguendum eſt. Leniſſimus ſuillus adeps, ^{Mirum de}
 axungiam vocant, in qua mirum eſt, & experimen- ^{axungia.}

to constare veteres scripserunt, quod ea genibus
 adligata, redit in os sapor, ut etiam expui videar
 tur. Ex quo fortasse non vnus hydragryri quas
 litari, sed totius mixturæ ex hoc & axungia illitis
 in lue venerea, os grauius exhalat, & salua madet. 5
 A suillo sunt vitulinus, hœdinus caprinus, bubus
 lus: quibus si vis, vulpinum & leporinum adicies.
 Atque hi leniunt magis, & concoquunt. Efficac
 cissimus est leoninus, cui proximi sunt hyeminus,
 pardalinus, vrsinus, & hi duriora corpora emol
 liunt. In medio sunt taurinus, hircinus, ceruinus. In
 volatiliū genere efficax anserinus, anatinus, olo
 rinus: ficior ē gruibus: suauis gallinaceus: calidior
 columbinus. Ex anguillis & piscibus fluuiatilibus
 languet: humanus mediocriter valet ad omnia. Do 15
 mesticorum animalium pingua humidiora sunt, ut
 suum, quàm aprorum: ē maribus ficiora & calid
 iora. Castrati mares fœminis respondent. Ei iunior
 ribus humidior, ē senioribus ficior est adeps. Pin
 guia oleo magis molliunt, & calfaciunt, ætate te 20
 nuiora fiunt, & acrimoniam contrahunt. Purga
 tur adeps exemptis venis, quas fibras vocant. Sal
 sus vel conditus aromate ficior est: confiat verò
 pepticis & malacticis aduersari, quæ nimium sic
 cant, quanquam Plinius conuenire scribit salsam 25
 axungiam mollire magis. Id in suillo fortasse con
 cedi potest. Recens adeps si deficit, & vetus ad
 ram reuocandus est, liquefieri prius oportet, mox
 frigida sæpius lauari: postremò etiam vino quàm odo
 ratissimo. Eo modo sæpius liquatur, cogitur, la 30
 uatur aqua, dum omne virus exuat. Medulla in ses
 balibus sebo, in adiposis animalibus, adipi respon
 det: viscera, chordas, tendines, musculos emol
 lit. Ex ossibus humidior, ē spina ficior est.
 Prima laus ceruinæ, quæ nullis malacticis inferior 35
 est: vitulina sequitur, tum ouilla, & caprilla a
 crior taurina quàm ut emolliat. Atque hæc leuior
 ra sunt. Durioribus naturis conueniunt: Ammos
 nia

Tres natu
ra adipum

Salsus adeps

Vetus adeps
ut recens
fiat.

Medulla

Secundus or
do.

- niacum quod aceto liquari potest, leniter decoquendum: ne efferuescat. Bdelium molle ac pingue fasliua hominis subigitur mollit, coquit modicè digerit. Styrax idem efficit. Galbanum præter hæc lespon, & anodyn non est: repurgatur, liquefit vino vel aceto, neque coctionem sustinet, his efficacior opopanax. Ladanum mollit, ac repellit. Propolis ammoniaco vicina est. Sint hæc omnia mollia & pingua pro sua quæque natura. Malacticis resinae commiscantur, quia hæc emplastica esse oportet. Resinae sint, quæ acrimonia careant. Chia, laseigna picea abietina, terebinthina. Pinea nimium siccata, strobilina acrior est. Bitumen pix aridior: infumma, quæ nimium siccant, quæque acria sunt, reicienda. Pix mollis & bene pinguis, qualis olim brutia, commisceri potest. Succedit his miraculosum ex aceto remedium. Scirrhus malactico oleo fouetur, tum emplastico malagmate inducitur, idque aliquot diebus repetendum. Sitque initius leuius malacticum, postea etiam paulo efficacius, ac postremo aliquid aceti combibere oportet: ubi verò mollior tumor extiterit, pyritem: lapidem molarem: aut silicem unde scintilla decutitur, candentem igne, acerrimo aceto demerges. Exhalabit plurimus vapor, quo scirrhus aptè infumandus est contacta parte, & omnino præclusa via, ne dissipetur fumus, sed totus in scirrhum coeat. Locum verò satis infumatum oleo tepido fouebis, & ut prius, malagmate conteges: post dies aliquot aceti usum reuocabis, ut sit aceti & remediorum vicissitudo. Verum neque diutius, neque sæpius halitu aceti pars vexanda est, ne in lapidem concreascit, & nervosum genus grauius lædatur. Sed ut molliendo profeceris, ita acetum repetes. Et in malacticis usus similiter interpellari debet, primum enim è caricis, medullis, adipibus, cera & oleis, exigua resina, malagma conficies. Tum ut res succedet, ad ammoniacum & similia veniendum: ac primum quidem

Emplastica esse oportet malag.

Aceti vsus.

Hoc primo lib. dictum est c. p. de curatione scirrhii alleguimus.

citra acetum, post etiam cum aceto comparentur: quibus cum vno, vel altero die fueris vius, ad ea: quæ leniora, quæq; sine aceto sunt, redeundū: vt ves luti circulo quodam, & è re nata auxilia repetantur. In musculis & liene tutior aceti consuetudo est. In chordis & tendonibus neque diutius neque frequentius vtendum erit. Ammoniacum aceto fustum manibus ducitur, vt sit luti crassitudo.

Fermentum coquitur aceto, hepatis duro & lieni ac fortius acetum in quo tritum hyssopum, thymum pulegium, & similia maduerint. Elini semine hydrelæo cocto, & adipi mixto: althææ radice arida trita, vel inde rasa parte medullacea, resinæ momento mediocri fiet malagma. Πάφυρον recens (si quid phlegmones) inueteratum alioqui. Heræ & veteribus laudatum est. Adipis suillis recentis & bene purgati vnc. quadraginta quatuor: ceræ vnc. viginti quatuor: cerusæ, lithargyri ana vnc. sex. liquabilibus fufis reliqua trita misceantur.

Aliud πάφυρον. Aliud, Lithargyri, cerusæ ana vnc. tres: succi seminis lini, olei, ana vnc. viginti, ceræ vnc. octo: adipis suilli vnc. quatuordecim: Colophonie vnc. octo: decim: pernionibus, & callosis rimis calcaneorum competit. Διαλαστόν, carbunculis, clauis, furunculis: litharg. olei, ana lib. vna: galbani libræ dimidium, ceræ terebinthinæ, ana libram vnam, radicis cum althææ, fasciculos quatuor: litharg. diu ex oleo teritur in mortario, cera & terebinthina fusa

commiscentur: postremo radices tusæ ligneo pistillo concorporantur. Radicum althææ & lihorum, ana vnc. duæ coquantur in hydrelæo ad aquæ consumptionem. tum ʒ. olei inde expressi, adipis suilli, lithargyri, ana libram vnam: litharg. ol. coquitur dum non inquinet, & adeps cōmiscetur. Colophonix purissimæ vnc. duæ: ceræ albæ vnc. quatuor mastiches vnc. vna olei, quod sufficit, vt sit iusta crassitudo. Terebinth. ceræ, ana vnc. nouem: galbani, nitri, ana vnciam: thuris pinguis, sesquunciam

- ciam: medullæ cerui, vncias duas: propolis pinguis,
 fessquinciā: olei laurini, sepi vitulini, ana drachmas
 duas, vel eo plus, vehementer molliet, atque discus-
 riet. Violentum quod sequitur, tantum rusticorum,
 & iam præmollito scirrho. Caprinum stercus solus-
 tum oxycrato, polentæ iunges, & affuso si vis oleo,
 cataplasma finges. Stercoris caprini vnc. duæ: radi *Διά κορυμ*
 cis cucumeris agrestis, ficuum immaturarum, ana *γίας Gale*
 vncia vna: staphios, agrias, bdellij, farinæ fabarum, *Αυγ.*
 10 amygdalarum amararum, ana drachmas quatuor:
 facis olei antiqui, quod sit satis ad emplastrum. *E putrica*
 Veteri caseo, ac iam putri, potentissimum fit reme- *scio.*
 dium. Subigitur caseus, e iure in quo suilla perna be-
 ne pinguis coxerit. Tophos mollit quasi miraculo
 15 coccum cnidium desquammatum, cum myrrha &
 aceto tritum. *Διά χυλῶν*, Aquæ sext. viginti [Orib. *Διά χυλῶν*
 duodecim] radicum althææ recentis, lib. tres: [Orib.
 quatuor] fœni græci, feminis lini, vnciæ nouem: [O-
 rib. vnc. octodecim] radices purgatæ tusæ, diem in-
 20 tegrum macerentur aqua, postridiæ fœnum græcum
 lotum fideliter & purgatum adiicitur: tertio die lini ses-
 men similiter lotum eadem aqua in qua reliqua
 etiam dum madent, immergitur, quarto die coquun-
 tur omnia ad crassitiem, tum expressa & traiecta co-
 25 lo materia vsui seruetur. Iam vero & olei pinguis
 æstate lib. septem & semis, hyeme lib. quatuor: succi
 ci prioris lib. quatuor: mixta in primis coquito,
 dum bullæ extent, tum litharg. triti lib. duas sedus
 30 lo commisceto, agitato bene puro foco, bullire finis
 to dum non inquinent, & medicamentum colorem
 flauum iucundumq; trahat. Hoc sublatum igne con-
 uoluto rude, manibus subigito, in pastillos fingito.
 Vsus tempore & pastillorū vnc. duas: cere, olei, ana *Vis medica*
 vnc. vnam colliquato. Potest medicamentū aliis ma- *menti Διά*
 35 lacticis vniri, tam efficax, vt hoc vnum sine aliis chi- *χυλῶν*
 rurgo satis esse possit: glutinat superficialia vlcera
 solutū rosaceo, vel myrrino: alias implet, & cicatri-
 ce tegit. Liquatū chamæmelino, yulnera neruorum
 inflam

508 Institut. Chirurgicarum, Lib. VI.

inflammatione liberat: podagricis quouis tempore opitulatur: veteres vteri phlegmonas perfanat inditum pessario.

Διά χυλῶν
Oribasij.

E femine lini, foeni græci, hordei radice altheæ, vt prius maceratis, coctisq; succus exprimitur: tum libris duabus succi, adduntur litharg. olei, ana libræ duæ: ceræ vnciæ octo: lithargyrum cum oleo diu teritur, & cum cera leniter concoquitur, infuso oleo postremò succus adiicitur, versantur omnia, & ferdulò commiscentur. Sunt & alia διά χυλῶν malagmata, vt Alexandri è psyllio, quod Aëtius describit: & Magnum Mesuæ ad strumas sine gummi, & gummosum quodq; paruum, album: & magnum, passim conficiuntur. Paruo vtendum in duris inflammationibus: album mediocres scirrhus adiuuat: magnum reliquis efficacius est. Est & μέλιλωτον veterum & recentiorum dialthæas de muscicillinibus. Oleo è maiorana & sicyonio, aliisq; id genus molliri possunt, & adiecto galbano, & similibus, fortiora reddi. Priuatim conueniunt duris inflammationibus mammarum, violaria & altheæ folia hydrelæo cocta, adipe vituli conteruntur ouorum vitelli duo, infecta croco commiscuntur. Hædina capita, veruecini pedes cum althæa & violaria percoquuntur: in expresso succo, oryza bene munda, & asperiore linteo attrita, decoquitur: butyrum recens iniicitur: postremo cum iam corpulenta pulcra est, ouorum vitella croco tincta commiscuntur. Plura malagmata septimo de compositione pharmacorum κατὰ γίνῃ, & decimoquinto Aëtij describuntur. Sed octauo κατὰ τόπος alia sunt: quæ siccant, contrahunt, indurant, nec emolliunt: quanquam malagmata & Asclepiadi, & Andromacho appellata. Quæ verò malactica, corpulenta & emplastica sunt, si neque dolor, neque phlegmone prohibet. Locus oleo fouendus, ex quo subiiciatur malagma remollitum pingui vel oleo, ne celerius exarescat, tum enim reuellens

Malagma-
ta quæ vsur
passim.

dcm

dum est, & aliud imponendum, alio qui pluribus diebus hærere conueniet.

De suppurantibus.

CAP. V.

Am hoc genere vtēdum nobis est, cum ^{Quando vbi præci-} ab aliis remediis desperatio est. Ac ferè ^{maiores phlegmonē suppurāt, pulsant, p̄ue vtendū.} dolent. Dum pus conficitur, inquit Hip-
pocrates, dolores fiunt ac febres. Suppu-
ratis, omnia ferè conquiescunt. In suggillatis hæc eas-
dem remedia sæpe conueniunt. Sunt autem natura ^{Natura sup-} modicè calida & humida, iisdem limitibus circūscri- ^{pturantium.} pta, quibus temperiem hominis definias, Ideoq; eligenda materia, quæ naturæ corporū elementari fas-
miliaritate cōsentiat. Emplastica sunt ^{δ' ἐκ πυρρῆς} (sic enim hæc appellant vt ^{ἐκ πυρρῆς} & ^{ἐκ πυρρῆς}) vt præclu- ^{ἐκ πυρρῆς} sis inde spiraculis, natium calorem inhi-
beas, in quo concoquentis naturæ robur est. Ita substantia qui-
dem calor augebitur, neq; qualitate crescet: solidæ
partes confirmabuntur, insitus humor saluus persis-
tet: dissipabitur verò, qui inanibus spatiis alienus
est. Ex quo vitium concoquetur, & consuetudine
partium simularium exalbescet, fietq; tādē pus al-
bum, lene, & vniforme: quod quia alimento esse nō
potest, exesa cute vias sibi faciet, atq; ita effluet. Nō
ab simili ratione ^{χαλαστικὰ} vocata ^{ἐκ πυρρῆς} fiet, si ac- ^{χαλαστικὰ} cesserit crassities partium: eodem modo quæ leniūt, ^{fiunt ἐκ πυρρῆς} calfaciunt, & adstringunt. Emplastica modicè cali-
da, omnia concoquunt. Præit in iis, quod est tenue:
reliquum verò vel contracta, vel illita cute vias in-
tercipit, ne quid spiritus exhalet. Contrà verò si ex-
pirat calor, nec emplastica materia est, nihil suppu-
rat, & aliquandò alienus calor succenditur, vndē pu-
tredō. Echecolla per se hærēt: reliqua verò vel gū-
mi, vel resinis implicanda, vel commodè alliganda ^{Malactica} sunt. Malactica calidiora sunt, & lenitèr siccant, in- ^{quomodo dis-} situmq; humorem paulò minuunt: quo nomine à pe- ^{ferant à pe-} pticis distingueda, ne similitudine fallāt. In pepticis ^{ptici-} vitan

510 Institut. Chirurgicarum, Lib. VI.

Vitanda. vitanda, quæ detergent, & vehementer calfaciunt. Nihil enim quod valde discutiat, pepticum est: & quod deterget, poros expurgat, quos illinere oportet. A siccantibus metuitur, ne frugi materiam exoriant: multò magis, si præterea calfaciant. Neque verò contra nos faciet, quòd in hy storiis medicorum permulta peptica sint, quæ mixtis diaphoreticis, destersoriis, atque siccantibus temperentur. Qualitas enim rerum mixtura retundi potest, & multa vitia eodem tempore interdum coeunt, vnde varia misceri necesse sit. Ac sæpè facit abscessus natura, vt acria etiam misceamus. Peptica sunt, aqua temperatè calida affusa parti: modus est, vt inde erubescat locus, ac leniter extumeat. Nimium fit, si inde subsidet, aut expalleat. Hydrelæo, & oleo pingui ac dulci, modicè calido, & butyro similiter vtendum est. Triticū ore præmansum, salinaq; hominis commolitum rusticis corporibus conuenit: leniora sunt, farina tritici, & inde panis, perpurgata furfure: dissoluenda aqua, oleum, vel butyrum additur: coquuntur omnia vt sit cataplasma quod lenit inflammationes vulnerum, & celeriter maturat. Vbi calor aliquis superest, minùs cocto pane ac recenti, quem vel hydrelæo, vel pauciore oleo insperseris, vtendum erit. In contumaci vitio, sed minùs calenti, panis sicior vberiore oleo molliiri debet. Panis conditus facile, efficacior est. Farina hordeacea per se inutilis, verùm quæ bene purgato grano extunditur, & castratur furfure, eodem modo quo triticea comparari potest, hydrelæo cocta, cōspersa oleo, mixta butyro: sic enim pus faciet, & calidioribus phlegmonis conferet, præsertim hydrelæo cocta. Tale fuit cataplasma veterum ἀμύλας, vel ἀμύλας ex farina hordei, quod priùs tostum non fuerit: quam etiam licentia quadam ad alia farinarum generanomen transfulerunt. Est & alia ἀμύλας ex farina hordei, fecni græci, seminis lini, in sapa coctis ad glutinis corpus, adiectis interim duobus vel tribus

Materia.

Aqua.

Oleum.

Triticum, farina, panis.

Farina hordeacea.

ἀμύλας.

bus

- bus vitellis. Adeps suillus phlegmone familiarissimus, deinde vitulinus. Taurino & caprino induris frigidisq; tumoribus vtendum est. Leoninus, & reliqui huiusmodi, inutiles Gallinaceus, & hoc paulo acrior anserinus vsurpari potest. Pix & resina inferuenti phlegmone, rosaceo: in frigidiore, vetere oleo, Sicyonio, vel simili liquanda sunt. Pix arida, qualis Coracina & Colophos Pix, vberiore oleo dissoluitur: pauciore, quæ lio quida est: mediocri, quæ naturâ mollis, digitis cedit, lentoris particeps, qualis olim Brytia & Lytia. Picatum ceratum, & anodynon, & pyopeon Picatum, ce est, ideoq; inflammatis vlceribus conuenit. Res ratum. fina sit terebinthina, & lentiscina. Cera languidior, resina acrior, confusa ad suppurandum valent. Eluantur prius, si quid acrimoniæ conceperint: molliantur oleo, vel butyro, cum exaruerint. Oesypon veteres in pepticis censuerunt. E flore lilij succus exprimitur, suppuraciones concoquit, & vuluas mollit, quod mel, & syrian vel Syriotes teres appellarunt Siræon verò melligo è coctis cas Siræon. ricis derergendo & molliendo idoneum est. Des Decoctu caricarum. coctum caricarum lenissimum est, quod maximè ricarum. coquit, ac digerit: In aquæ sextariis sex, pinguium caricarum lib. quinque decoquendæ, dum sextarii duo reliqui sint: magis maturabis, si indè pista farina triticea, cataplasma finges. Vbi verò diges Cataplasma. rendum magis, ac refrigerandum, hordeacea me mata. lior est. Eodem modo althææ decocto, & vuar passæ succo, farinas vel panem purissimum incoques, & indè cataplasmata intinges croco. Crocus coq; Crocus. quit, & leni adstrictione confirmat partes, & poros contrahit. Pinguissimas passas, exemptis nuz Melligo pas cleis, per noctem aqua macerabis, postridiè coques se v. u. e. ad melliginem. Inueteratis & callosis tumoribus Efficaciora conueniunt, colla librariorum quæ sit è purissis remedia. ma farina: viscum aucupatorium, styra pinguis, ladanum, galbanum, thus in corporibus temperatis molle,

molle, album, pingue, dumq; māditur, minimè friabile, Rhodinum & myrtheum in calidiore & dolenti phlegmone misceri possunt: vt pix, resina, visciū, colla, & similia: vbi peruicax malum & platiſmata diutius hærere necesse est. Miscentur quoque ster-
cus suillum, columbinum, caprillū, nitrum. Et iam notum mulierculis remedium, pueri ster-
cus calidū, duris & inflammatis mammis: aliis quoque partibus impositum. Certum experimento est, breui tempore concoquere. Ac in fæditate excrementorum
auxilia inuenta sunt: furūculos & parotidas mollit, ac suppurat cataplasma ē coctis ficubus, calce, iridis radice, vel nitro. Omnino si nitrum deficit, sale torrefacto in mollioribus: vsta fæce vini, vel aceti, quæ acrior est in durioribus, vtendum erit. Flex sit recēs,
nam celeriter exoleſcit: vulgò etiam nota est medela ē cepis cineribus coctis. Tetrapharmaco veterum primas tribuit mouendo puri, non aspernabilis autor Cornelius Celsus. Idem remedium à Græcis suppurando vsurpatum. Constat pice, resina, cera & adipe: vsus tempore, oleo, vel butyro subigitur. Pix sit mollior, resina fricta, vel Colophonia, quæ in teneris corporibus oleo molliiri potest: cera pinguis, adeps in mollibus naturis, vel suillus, vel virulinus: in durioribus, taurinus, vel hircinus. Hoc
tetrapharmacum Paulus basilicon, Scribonius emplastrum Aristi nigrum appellauit, & aliud basilicon descripsit. Tetrapharmaco thus additum facit Macedonicum, quod & pepticon est. Basilicon minus, hoc imbecillius commutato adipe in oleum, quanto adeps oleo efficacior est. Sic oleum quoque, variè commutare licet. Oleo rhodino, myrrino, vel simili, tetrapharmacum durius molliatur, vt corpus & affectuum natura exigit. Mirabile hoc ad molliendum & suppurandum. Cera terebinthinæ, mellis, cerui, adipis viruli, anserini, bubuli, butyri recentis, mellis optimi, olei rosarum, myrrhæ, anacyncia vna. Myrrha cum melle subigitur, & prunis leuiter

Loco nitri.

Tetrapharmacum.

impligaris
nigrum

Macedonicum.

leuiter incoquitur, ex quo reliqua adiecta sedulo misceantur. Picis vnc. vna: ceræ vnc. tres; axungia veteris purgatæ vnc. sex: adipis taurini, cæsyptiana vnc. tres: resina pinea, vel magis picea vnc. quinque: ^{Viride Antromachi.} liquis quatis vtitor. Resina vnc. duodecim: ceræ æruginis rasa ana vnc. 8. sapi vituli vnc. duæ: aceti, mānæ, ana vnc. i. manna & erugo cum aceto liquantur & conteruntur: reliqua dissoluta commiscentur: molliquit, purgat, digerit. Ceparum & alliorum coctorum in cinere ana lib. vnā: vitellorum numero quinarium: radicis lapathi coctæ lib. dimid. farina, feni graci, vnc. tres: fermenti vnc. duas, axungia lib. vnā: fiat corpus. In frigidis & crassis humoribus conuenit. Locus oleo peptico, succo, vel hydrelæo foueatur, ^{Viendi modus.} sympepticon medicamentum inducatur, mollis stuppa, vel lana succida superponatur: omnia decussata fascia colligentur, vt qua parte diuisa facia est, conus abscessus aduertat, nec affectum locum opprimas: semel in die vel rariùs cōmutari debet, nisi vel dolor vrgeat, vel pharmacum exarescat, ita verò formari sympeptica oportet, vt neque liquidiora disfluant, neque corpulenta nimis locū opprimant. Iustum corpus est cerotomalagmatum & emplastrorum, ac quod antè dictum est *ἰχθυόλαια* & glutinosa esse melius est, vt per se sine vinculis hæreant: quanquam & emplasticis lanam succidam, aut mollicula splenia super dari & omnia colligari nihil prohibet, idque hyeme magis & frigore.

30

De aperienda Vomica.

CAP. VI.



^{Noxe suppressæ sanies}
 Væsuppuratio, sponte sua non rumpitur, ferro, igne, vel medicamentis aperienda est. Alioqui serpit sanies, & cuniculos agit: venas, neruos, arterias, & vicina corpora depascitur: atteruntur ossa, & cariem ducunt, liuescit cutis, & in rugas quasi senio marcescens contrahitur, idque metuendum magis

K

in digitis, articulis, partibus corporis, quæ in de-
 cliue patent. Sic enim parotides femorum, abscessus
 in fistulas cauatur, & quæ facile putrescunt, quas
 lisanus est, os, & loci genitales. Quare etiâ si tumor
 nondû satis maturuit, ea pericula ferro anteuertunt, &
 multò magis si pestifera aut virulêra materia, vomica
 includitur: quanquàm animaduertendum, vt ne
 nimis citò. Nunquàm enim vis natura gratis inferē
da est, sed semper aliquid beneficii, nihil maleficii
proponi debet. In vomica quæ tardius erupit, mem-
 branæ, neruacea corpora, & alia semiputria saepe oc-
 curunt, quæ nec intempetiue rescindenda sunt. Sua
 enim putredini maturitas est. Alioquin noua inflam-
 mationis & conuulsionis pericula creari solent. Ne-
 que perpetuum est aperire vi, quod supuratum est:
 sed si nullum in mora periculum apparet, diapho-
 reticum remedium imponendum, quo loco mollior
 abscessus est, & digito cedit. Sic enim sanies exugi
 potest, idque faciendum magis, cum alta parte vo-
 mica, non decliui, suppuratio se colligit. Quod si
 ferro, vel igne vtendum est, prius animaduertere
 oportet, ne quod vas insignis, neruus, tendo, vincu-
 lum, ne quid neruosum, quales membranæ quædam
 sunt, aut potius lati tendines conuulnerentur. Pars-
 cendum etiam quibusdam partibus, quæ vegetius
 sentiunt, & à quibus vis ignis ad principia transeat
 celerius. In musculis fibrarum interstitia cultello li-
 gneo, vel digito diducenda, ne fibre præcidantur: id-
 quæ cum in profundo sanies resedit. In his omnibus anat-
 mica disciplina opus est. Cauteria periculosa, occipiti-
 o, tēporibus, & vbiq; caluaria mollior est, vbi-
 cūq; vel exitus neruorū, vel aditus vasorū est: nec ea
 ipsa oculus sustinet. In cranij fracturis, vbi modiolis,
 cydiscis, terebellis, via puri fit, à futuris neruorū ra-
 dicibus molliori offe ferrū declinamus. In strumis, &
 colli abscessibus, à carotide arteria, vena sphagitide
 vocali neruo abstinendum. Illinc hæmorrhagia, quæ
 egrè supprimas: hinc vel omninò mutus, vel certè se-
 minutus

Cautio.

*Animaduer-
 tēda in vsu
 ferri et ignis*

*Vbi caute-
 ria pericu-
 losa.
 In capite.*

In collo.

mimutus homo relinquitur. Exteriore parte hume-
 ri tendo est, qui ignem ferrumq; non sustinet. In *In exteriore*
 empyicis & deploratis pleuriticis scalprum & cau- *humero.*
 terium inferiore parte mesopleurij collocamus, quia *In mesopleu-*
 5 videlicet superiore vena, arteria, nervus est. In ex- *rys.*
 tremis ilibus multi sunt tendines, multa vasa coeunt *In ilibus.*
 ex quo vomicas hac parte prudenter aperire necesse *In scote.*
 est. Inuritur carnosus podex, & ferrum sustinet
 non ita, quod illic nervaceum est. Eadem ratio in *In genitali-*
 10 genitalibus seruari debet, vbi ab arteriis cauendum, *buss.*
 quæ illuc plurimæ coeunt, hiæntque maioribus clau-
 sulis: nam inde hemorrhagiæ non ita facile suppri-
 muntur. Sub natibus, nervus est, qui si iuxta *Sub natibus*
 supputationem præciditur, aut nudatus violatur
 15 frigore, subiectum crus stupidum relinquit. Idem
 animaduertendum in reliquis partibus, ne nudi
 maneant nervi, & frigore contrahantur. In bu- *In buboni-*
 bonibus glandulæ sunt, quas perreptant venæ & *buss.*
 20 nervi. Ideoque si quando inurendum, apprehen-
 denda prius cutis est, & in vulneribus, quæ ferro
 fiunt, eadem ratio seruari debet. Hoc reliquis
 partibus commune est, quibus subiectæ venæ,
 nervi, & arteriæ. In articulis perpetuò suspen- *In articulis.*
 25 ctus ferri & cauteriorum vsus. Ideoque ischia- *In ischiad-*
 dicis inferiore parte quàm malum est, ignem ad- *tic.*
 hibemus: in perinæi tumoribus qui inciduntur,
 summopere cauendum, ne quid intus vulneres,
 quod postea egerimè glutinetur. Hæc omnia per-
 30 ricula faciliè declinabit, & alia, quæ breuitatis stu-
 dio omilla sunt, quisquis in anatomicis operibus
 fuerit exercitatus. Alioqui sæpenumerò errare ne-
 cesse est. Et quia non semper similiter, sed variè, nervi,
 35 venæ, arteriæ in corpus diducuntur, si quid è pro- *hoc n*
fun- do rescindendum ferro, lente quidem, & per-
 petuò ducere oculo culter dirigendus est. Id quod in *In alto*
 firmitis, & vbi pus altius desedit, facere oportet. *pure.*
 Primum ergo cutem nudabis, si quid vasorum aut
 nervi occurrit, id ipsum digito, vel ligneo veruculo

Cauteria.

Figura vul-
nerum.

separandum distinctis fibris, nec ita momentaneis
membranis, quibus illa inter se coniugantur. Atque
vbi ad locū perueneris, in quo colluies latet, & iam
omnia tuta sunt, opportunè parti gladiolum infis-
ges, & ita vomicam repurgabis. In reliquis vomicis
videndum, vt quantum oporteat, culter descendat.
Profundius vulnus hæmorrhagias commouet. Su-
perficiale sæpenumero frustra est. Eodem modo
cauterium superficiem exurit, vel altius imprimi-
tur. Et hoc quidem in molliore corpore mollius, 10
quale è subere, & quibusdam radicibus confingi po-
test. In metallicis aureum æneo & ferreo clementius
est. Sed de his alio loco pluribus. Rectum verò, an
transuersum, vel obliquum vulnus esse debeat, fi-
gura partium, flexus, rugæ, fibræ primū indicant, 15
quemadmodū consilium iuuant subiecta vasa &
corpora: præterea in collo, qua parte eunt vena, ar-
teria, & nervus, rectum magis quàm transuersum
adigitur. Alioqui transuersum melius. In fronte è ru-
gis transuersum sit nec ita profundum, quia mēbra 20
na subest: aliis rectum placuit magis. In inguinibus
è flexu trāsuerso ducitur: duplex interim angustum,
& oblongum in myrti folium. In ventre, nisi flexus
prohibeant, vt sunt fibræ musculorum. Eodē modo
in reliquis. Simplex aliquandò sufficit decliui parte, 25
duplici aliquandò & trigono opus est. Atque om-
ninò ea parte scalprum imprimitur, quæ mollior di-
gito cedit, magis acuminatur: & qua commodius fa-
nies effluat, ὡς ῥέισις appellat exanitionem: vel vt
aliq, exaniationem, in qua & ἐκδραϊσσις est, & ἀντι- 30
δραϊσσις. Nam vbi propensa parte foramen est, facile
purgatur sordes: vbi verò in sublimi, restitare solet,
deorsumq; subsidet, & sinuat: siquidem vomico-
sa pars nequeat pro arbitrio cominutari. Quale est 35
in trunco corporis, ac ferè capite & parotidibus.
In manu & crure, etiamsi altius os vlceris pos-
tum sit: poterit tamen ita inclinari, vt sanies li-
berè excurrat: tūmq; manus quidem è mitella
suspendi

ἀπὸ ῥέισις.

ἐκδραϊσσις.

ἀντιδραϊσσις.

ἀντιδραϊσσις.

ἀντιδραϊσσις.

fuspēdi debet, vt carpus gibbero fit altior. Crus au-
 tem puluino innitatur, sublato genu & declui in
 coxas femore. Vtrumque ea ratione collocandum,
 vt sine dolore ita persiliat. At si cui parti id denegat-
 5 tum est, nec ea potest pro libidine conuerti, aduersa
 parte vulnus inferendum, quod *avridiaipetip* appella-
 lant. In aliis quoque manu & crure, quæ commodè
 inuerti possunt, quum sinus longior, cuniculosum
 vlcus, sordes vberior etiam aduersa parte lanceola
 10 immittitur: vt duplici exitu dato, vitiū celerius ex-
 purgetur. Est cum ab ore vlceris ad fundum ducto.
 gladiolo tota cauitas detegitur: vt in fistulis: nonnū-
 quā angustius orificiū ferro ampliatur, aut quod
 amplum quidem sed rotundum, aucto vulnere in
 15 longum, aut aliter deformatur. Sed hoc non tam
 purgando, quā glutinando fit. Quibusdam lo-
 cis plurimæ concurrunt arteriæ, plurima vitalis spi-
 ritus materia est. Hic paruo vulnere contentus eris,
 ne confertim ac semel erumpēte sanie simul, magna
 20 vis spiritus diffluet: vnde animi deliquia, & nec opi-
 natæ mortes consequantur. Et hæc quidem de fer-
 ro & cauterio in aperiendis vomicis breuiter dicta
 sint. Reliquum est, vt eodem compendio de me-
 dicamentis quæ aperiunt dicamus: quibus ideo vtē-
 25 dum, quia mollior æger est, quā qui vel ferrum,
 vel cauterium sustineat: quanquam medicamenta
 hæc cauteria quædam sunt naturā quidem caustica.
 Ideoq; à quibusdam veterum cauteria frigida vo-
 cata, à recentioribus potentialia: cauteria quidem
 30 quia reuera vrunt: frigida, vt ad ferrum & simi-
 lia quæ igne rutilent comparentur. Neque tamen
 sic vrunt: vt quæ caustica & septica postea descri-
 bentur. Theriaca igitur adhibita, vomicas aperi-
 rit: vrticæ semen è vino tritum, frangit, purgat,
 35 incarnat, cicatrice tegit. Caulium radices vstæ,
 tritæ, & vetere axungia exceptæ, ita è radice can-
 næ, volutis ostracodermæ, & testis prius crema-
 tis: adeps collectus è ranis viridibus arboreis: lac

Cautio.

Medicamen-
ta aperi-
tiarvomicae.

518 Institut. Chirurgicarum, Lib. VI.

ficulneum, & rithimalli, cantharidum puluis, batrachij
 caulis, & folia: caninum stercus album tritum:
 terebinthina, vel adipe vetere concorporatur. Mel
 ligo anacardina similiter excepta. Sed hæc ita insi-
 stere oportet, vt aperiant, nec crustas ducant. Mixtū
 est, Fæcis, cremati vini vnc. duæ: fimi columbini,
 propoleos, salis torrefacti, æruginis, ana drach. tres:
 aquæ marinæ, vel in qua subduplum tal illiquaues-
 rit vnc. vnam: olei antiqui, aut feruefacti, vnc. duæ:
 arida seorsum tundito, æruginem, fecem, salem in
 mortario simul terito: tritis in pluuisculum aquam
 conspergito, & iterum oleum misceto, vt fiat vnum
 corpus. Ex quo fictili vase placido igne omnia co-
 quito, dum tota exhalet aqua: postremo præmollitā
 propolim imposito: & vbi sublata igne paululum
 refrixerint, columbinum fimum inspergito, pusillæ
 plagulæ, & oblongæ, quantum medicamento opus
 est, inducito, & conuenienter adaptato: tum am-
 plius splenium malagmate illitum superdato. Fimi
 columbini, nitri, ana drachmas quatuor: caricæ, se-
 prem: quibus arida trita cōmisceto, ac bene pinfito,
 inducitoq; vt prius: quod si durius medicamentū vi-
 debitur, purgatam axungiam & mel coniungito.
 Arsenico, puluere angelico, vel vocato mercurio,
 prudenter vtendum est, vt habeatur ratio corpo-
 rum & vomicarum. Excipiantur butyro, axungia,
 terebinthina, visco. Superponendum folium ex iis
 quæ leniunt, vel molliunt: alioqui splenium epice-
 rastico, vel malactico illitum. Obseruandum in vfu
 horum medicamentorum, vt æstus vomicæ. & phle-
 gmones acquiescat: vt quantum vulnus esse velis,
 tantum splenium constituas, in quo aperiens phar-
 macum positum est: videndum ne venam, neruum,
 arteriam violes, ne diutius relinquas. Quod si dolor
 acciderit, nō cōmittendum diutius vt vexetur æger,
 sed statim reuellendum pharmacum, & leniendus
 dolor est, pauloq; clementius agere oportet. Minus
 vexabit pharmacum, prius fota parte laxante re-
 medio.

medio. Epicerastico iam facto vulnere, temperandus calor. Plura libro decimoquinto Aëtij, & capite de pyroticis.

De purgantibus.

CAP.

VII.



- Equitur: vt purges. Ac si vomica dehis ^{Ratio pur-}
 scit foras, neq; fistulosa est, molli floc; ^{gandi.}
 co, vel linteolo tum sinum ipsum, tum
 labra vlcis expurgabis: deinde medi-
 camentis in concerpto linamento cauū
 implebis, dum rubens, ac nimium neque siccum,
 neq; humidum cauum extiterit. Quod si non ita
 expositū vitiū est, sed intus latet difficilior cura est.
 Et si quidē capite includitur, neq; per aures, nares,
 vel aliter diffiuit modio, cy cliico, ac terebellis par-
 tefacere viā oportet. Ad thoracem vnica ferē via est
 ab ore per asperam arteriam, nisi vulneris orificiū
 in superficiem veniat: hic pyulcis collyriis, suctu
 suppuratio exorberi potest, iisdemq; machinis, vel
 melicratum: vel aliquid tale iniicere licebit, vt ali-
 quid spuris repurgetur. Ad ventriculū, & inte-
 stina prima per gulam aditus est. Clysteribus inte-
 stinum crassius expurgabis. Medicamenta verō
 καθαρτικά detergeant modicē, & siccant. Detergenda
 sordes, quæ corruptelā corporis concreuit. Exies-
 canda sanies, humidumq; recrementum, quod stata
 naturæ lege ab alimento partis reliquum fit, aut
 aliunde illabitur: ac ^{Triplex ex-} ^{crementum} ^{ulcerum.} ^{Vitanda.} ^{καθαρτικά} peculiariter appellant,
 quibus vis purgandi data est. Vitanda quæ adstring-
 gunt, vnde sordes pertinacius inhæreat: quæ laxent,
 vnde robur partium elangueat: acria vt quæ collu-
 uie fordiū cauū impleant. Sale, & eadē materia ideo
 abstinendum, quia vt detergeant, adstringunt tamē
 & sordes impingūt, ac sæpenuerō vellicant. Hæc
 autē ita inaudire necesse est, si non serpit vlcus, atq;
 putredine vicina depascitur: si nō est callus, aut ali-
 quid tale vnde cōsiliū euariet. Vt sunt corpora, &
 sordes vlcis, ita qualitas remediorum distingui

520 Institut. Chirurgicalarum, Lib. VI.

Scopi distm debet. Adde quòd vel recens, vel inueteratum mas
guendi re- lum est. Molli corpori, recenti malo, nimium neque
media. sordido, neque humido, parti præterea sensus acio
Animaduer tione, contrariis consiliis locus est. Quòd si pars ali;
tendum. qua apostematis maturuit quidē, & pus reddit, alia
 verò cruda est, huic sympeptica, illi cathartica: si
 quid durius, illic malactica: si quid phlegmonodes,
 leniētia suis quæque locis eodē tempore accommo
De ratione dabis. In purgando plurimum valet recta abluendi 10
abluendi. ratio, de qua obiter dicēdū est. Vbi ergo molli velle
 re, vel lintheolo sinū & labra exterferis, si præterea
 abluas, magnoperè curationem adiuuabis, vt ad cæ
 tera per se natura sufficiat. Itaq; si sanies acris est, fe
 ro si copiosa sordes, melicrato: si multa simul, & æ
 cris, fero in quo satchari octuplum, vel tantundem
 mellis diffusum sit. Cū iam cœperit cauū esse pus
 rius, ænomelite: post etiam vino è dulci austeriuscu
 lo vtendū erit. In foetido sinu putri & cruento, oxy
 cratū conuenit. Acetum, oxymeli, ænomeli dilutū 20
 marrubij, absinthij, aloës, myrrhæ, pauculo conditum
 melle putredines efficaciter iuuant, & assato
 melle vti, melius fuerit. In fluxis, humētibus, & mas
 lignis vlceribus, ex atramento sutorio, & caricis in
 cinerem vsis, puluisculus ænomeliti inspergitur. 25
 Nec improbadum ligni sancti remedium. Alij æno
 stigma probant, quia siccatur, & putredinem pro
 hibet, cui aliquid mellis infundere licebit. In nos
 mis, phagædenis, chironiis, & omnino malis vlce
 ribus, veteres vsi sunt iis, quæ & detergeant, & 30
 adstringant, sed hæc rectē diluas, vt liquida infun
 dantur. Ideoq; aqua aluminosa, vel in qua malicos
 rium, myrra, ceteraq; eiusmodi coxerint, vsurpari
 possunt: verū melius fuerit detergente materia
 prius expurgare, quàm adstringentia iniicias. Lixi
 uium è calce sæpius elota terget & siccatur, nec sine
 re laudatum est. In callosis, ægrè cohærentibus,
 cuniculosis, nimium sordidis, ex cinere ficus, tithys
 malli

mali aliisq; id genus lixiuia fit, qua quotidie sinus
 perfunduntur. Cancerosa adimit: quæ è fanfa, id
 est, oliuæ nucleo comparata est. Aqua è larigna des-
 stillata, & resinis eiusmodi detergendo idonea est.
 5 Melicrati & eorum quæ mel vel saccharum reci-
 piūt, modus est: vt sit decupla sexcupla: vel octupla
 aqua dilutione vti oportebit, cū iam purior sinus
 est: in fordidiore acrius conuenit. In vlcere satis ex-
 posito linteolum prius insuccatur leniter exprimere
 10 tur, insinuatur cauo: humidiori: exactissimè triti
 puluisculi insperguntur. Sicciori, & quod forde
 offarctum est, eminota vel sine tiltis pharmaca mol-
 lia imponuntur: ex quo bene carminato vellere, os
 vlcis obstitipandum est: deinde superponenda mol-
 15 lis spongia: vel quod Syriaca, & iam vulgari lins-
 gua cotton appellatur. Alioqui linteo aliquoties in
 se conuoluto, tota vlcis regio contegenda est.
 Atque hæc omnia vino inculcabis, & expressa in-
 iicies. Postremò artificiosè colligabis. Omnino ta-
 20 men cauendum erit: ne quid durius aut grauius vl-
 ceri incumbat. Postea verò quā tempus redierit:
 in quo vincula soluantur: atque reuellantur indita
 cathartica recognoscendum sedulò, quanta qualisq;
 fordes fuerit. Si enim minor appareat, bene est. Opti-
 25 me verò si purum vlcus est, & iam aliquid carnis
 succreuit. At si solito magis sordescit, ita distingen-
 dum est. Nam si cauitas maior, nouus calor & dor-
 lor adfuerint, id acriori medicamento attribues.
 Temperabis ergo cerato rosaceo, si maior calor est:
 30 si verò flaccidum vlcus apparet, myrrino. Quòd
 si nihil horum extiterit, magis tamen obsorduerit
 vlcus, imbecillius catharticum adiecto melle tem-
 perabis. Et si humidius, siccantem pollinem sine
 mollibus insperges. Aliquando verò nimium sic-
 35 cando, & contractum, & exuccum vlcus reperies,
 qua in re siccantia humido dilues. In summa: ius-
 tam pharmaci qualitatem æstimabis, si purum
 vlcus inde redditum est, si naturaliter sentit locus

*Catharticus
 quomodo
 tendum.*

*Probatio me-
 dicamenti.*

522 Institut. Chirurgicarum, Lib. VI.

ulceris, qui sensu præditus est: si modicè rubet, ac
nimium neque siccus, neque humidus est. At quis
cunque senius caret si non naturaliter sentit, si ni-
mium aut aridus: aut flaccidus est: si pallidus, albi-
dus liuidus: aut niger est, is nondum purus est.

Vermiculantia ulcera. Accedit aliquando ad sordes ulcerum: ut etiam
vermiculentur, quo tempore aloë cremata inspers-
gitur, veratrum album cum melle, polij & absin-
thij pulvis cum pice imponuntur: vel nuclei peris-
ci è perficariæ succo pisti: plantago arefacta, cen-
taurium minus marrubium, calamyntha porrum,
& similia vsurpantur. Arida teruntur: vel inde ex-
primitur succus. Eidem rei lixium conuenit, vris-
na tilta denique imbuta ieiuni hominis salua.

Cancerosa. In cancerosis canceri fluuiatilis cinis cum cadmia,
aut cerato inditur, Irionis semen conlæuigatum
melle, lens cocta cum melle mel in tegula torrefas-
ctum: & solani succo madidum: oleæ virentis fur-
culi exuccati, malicorium vsutum, Aizoi succus vni-
bilici veneris solani, intybi lactucæ, psyllij, ompha-
cis atriplicis. Exprimere oportet, diu trita mate-
ria pistillo, & mortario plumbeis. Eodem modo
tritrus pompholyx diu conuoluitur, affuso succo qui
conueniat. Floccus: aut vermiculus hñdem succis
madidus imponitur: ac sæpius repetitur: ut succi
frigus contineat. Sed hæc ad accidentia ulcerum ma-

Materia. gis pertinent, quanquam & quædam in his cathar-
tica sunt. Repurgant tincta melle linamenta: aris-
dum mel quod melitaris vasis inhæsit, quodq; in tes-
gula crematum est: mel rosaceum, quod & alienum
calorem attemperat: serum lactis, terebinthina,
cum melle & rosaceo pari mēsurā. Eadem cum bus-
tyro neruis utilis est: liquefieri oportet, & vnā cō-
misceri. Iris serpentibus & plenis sorde: marrubij
succus conditus melle, ærugo lota, caprinum ster-
cus exustum & è vino pistum desperata sanat. Malis-
Radix dra- gna curat dracontij radix, colligitur sub canicula,
contij. siccatur vmbra, aliquot post diebus secta in taleolas
filo

- filo traicitur, atque ita pendens vmbrosa domo, as-
 feruatur: vsus tēpore trita inspergitur: melli mixta
 vel cerato, ne acrior sit imponitur. Ex eadem radis-
 ce cerusa factitia clementer purgat. Cicer orobus
 faba hordeum fresa omnia, & melli intriata: Lupi *Lupinus.*
 5 nus vstus tritus, & inspersus maligna tibiārum vl-
 cera purgat, implet cicatrice claudit. Testarum, &
 voluminum crematorum: cinis eorum, quæ *aspaxib*
dequa. Erinacei cinis, amygdala stoechas, anagallis,
 10 & irionis, humidioribus cancris putrilaginosis,
 gangrænotis, mirificè profunt. Dipſaci radix in
 cinerem vsta. Eadem ad melliginem vino cocta, &
 pyxide seruata. Radices solani cortex, herba ius-
 15 cus, cacoëthe iuuant, & nomode vlcera. In summa,
 quæ nitrosa, & amara: quęcuncq; ita detergēt & sic-
 cant: vt non mordeant, non adstringāt. purgādis vl-
 ceribus idonea sunt. Arsenici, & quæ ex hydragy-
 ro cōficiunt, quādiu acrimoniam retinent irritāt vl-
 20 cera: sed putredini repugnant, vbi nec adstringentis
 bus: vt alumine scissili: nec mordentibus metallicis
 simul, & adstringentibus: vt squama aris, ferri stoe-
 momatis abstīnēdum est. Nā & arsenico, & chryso *Minium.*
 25 hydrargyro fit, his cōiungi debet. Clemētius: quod *Mixta.*
 cerusa vsta comparatur: vel plumbi gleba sterili.
 Secundum genus Græci *συνδίκη* vocant. Ex quo diu-
 turnis vlceribus & maleficis medicamentum parāt. *E sandice.*
 Sandic. lib. vna: olei dulcis, lib. duæ coquantur lento
 30 igne, dum non inquinent. Aerugo octuplo, decuplo, *Ex ærugine.*
 & duodecuplo cerato mixta. Ceræ terebinth. ana
 drach. sex: vel vn. vna: olei vnc. tres: vel 4. liquefiāt
 in vase duplici. Liquefactis adde ærug. drac. 3.
 Clementius est vsta prius, & lora ærug. Potest *Viride An-*
 35 dupla ceræ terebinthina commisceri; terebinth. *dromachi.*
 libro. 2. ceræ, libr. 1. rosacei, vnc. 3. vel 4. ærug. vnc.
 2. vel 3. Liquatis & coctis reliquis ærugo ins-
 spergitur. Quod plus æruginis recepit, magis
 siccatur

524 Institut. Chirurgicarum, Lib. VI.

ficcat, & deterget: quod minùs, glutinādo idoneum
Aegyptiaca. est. Aegyptiaca ferè similia sunt: Aeruginis vnc. 1.
 squamæ æris, vnc. 2. aceti, vnc. 8. mellis, vnc. 2. Arida
 cum aceto terito: mel aduicito: omnia dum ruffescāt,
Cera viridis. coquito: maleficis conuenit. Clementius est, ex mel-
 lis, & terebinthinæ pari pondere. Cera viridis in
 Aegyptiacis numerari potest, trita inspergitur, vel
 mollita oleo imponitur. Maligna iuuat: Lithargy-
 ri libra vna: leniter coquatur in aceti libra vna: olei,
 lib. duabus. Iam inspissatis adde ærug. vnc. 1. iterum
 coquantur, dum ruffescant. Mellis lib. 1. aceti, lib. ses-
 mis: ærug. vn. 1. aluminis, drac. 4. coque ad spissitudi-
 nē, dū ruffescat. Alij quoque aliter, modò vsta, modò
 lota: aliās etiā vsta, & elota ærugine parant cas-
 thartica. Modus sit, vt ne mordeat. Habes χαλκὸν ἐ-
 cruda: καὶ ῥῆμα ἐ cocta descripta à Gal. primis libris de
Alia è farinis. comp. phar. καὶ ῥῆμα. E farina hordei, cicerum, fas-
 barum, orobi, cum vitellis, momento mellis, & te-
 rebinthinæ, fiat catharticum. Alioqui farinæ conue-
 nientis, vnc. tres: succi apij, absinthij, marrubij, vel
 similium, lib. 1. mellis, vnc. nouem: ad iustum corpus
 cōcoquuntur. Hordeacea in duabus partibus aque,
 vna mellis rosacei percoquitur: purgat, lenit, calo-
 rem temperat: poteris addere momentum larignæ,
 quā è succo plantaginis elueris. Farinæ in memo-
 ratis succis coctæ, contra canculos & fistulas valent:
 in laboribus neruorum, terebinthi. conuenienter
 additur: myrrha & aloë, in putredine: in calore, fas-
 bacea & hordeacea præferenda: calidior orobea, &
 è ciceribus. Amicissimum neruis, quod sequitur:
Neruis amicum. Resinæ, mellis, tereb. ana selib. myrrhæ, farcoc. faris-
 næ, foenig. sem. lini, ana vnc. 1. Liquatis aliis reliqua
Pus euocās. commiscentur. Pus educit, & purgat mellis selib.
 terebinth. vnc. 3. farinæ, foeni greci, vnc. 1. radic. ireos
 drachmas quatuor. Puri crassiori, Galbani, ammo-
 niaci, resinæ, terebinthi. sepi taurini, ceræ, olei antis-
Puluis ost. ad fistulas. qui ana in aceto mersa, paulatim fundantur igne.
 Efficaciter purgat, & ficcat, Iris Illyricæ, vn. quinq.,
 fari

farinæ, orobi, vnciæ tres: manna, thuris, calcis lotæ,
 ana vnciæ tres: aristolochiæ, vnciæ tres, & drachmæ
 quatuor: terantur omnia in puluerem: fistulas expur-
 gat, & glutinat. Quod sequitur, vetera vlcera res-
 5 purgat, excrescentem carnem reprimat, cicatricem
 ducit: Chelidoniæ, plantaginis, scabiosæ, ligustici, vr-
 ticæ, ormini sylvestris, ana manip. i. conuassata, ses-
 ptem diebus in oleo macerantur: deinde cocta expri-
 muntur: expresso succo adde ceræ vnc. 3. terebin. vn.
 10 6. resinæ, vnc. 2. bulliant ad corpus. Subductis igne,
 adde sarcoc. aloës, ana vnc. i. aristolochiæ longæ, æru-
 ginis, ana vnc. sex. Fiat vnguentum. Vnguentum
 Apostolorum variæ describunt: respōdet ferè venes-
 15 ri antiquorum, quo hi vsi sunt, attrahendo, mollien-
 do, glutinando, & cōtra ferarum morsus: quod quia
 variè describitur, ex Aëtio vertimus, tantum thure
 addito, & myrrha. Litharg. vnc. 35. ammoniaci, vnc.
 9. Colophon. vnc. 16. æruginis, galbani, ana vnc. 2.
 bdelli, opopan. ana vnc. 3. aristoloch. longæ, vel ros-
 20 tundæ, thuris masc. ana vnc. 6. myrrhæ, vn. 4. cere, ol.
 ana lib. 2. Lithargyron in oleo coquitur, media ebul-
 litione inditur ærugo [recentioribus, decoctionis fis-
 ne, vt melius purget] vbi nō inquinant, puluisculus
 Colophonis inspergitur. Summotis igne, reliqua ex
 25 aceto trita immittuntur: postremo versata in mortar-
 io commiscuntur. Mellis cocti lib. i. thuris drach. 4.
 myrrhæ drac. 2. Efficacius est, si drach. i. æruginis, &
 tantundem terebinthinæ exceperit. Plura ex primo
 de comp. phar. κατὰ γένν. 14. & 15. Aëtij.

*Viride ex
herbis.*

De sarcoticis.

CAP. VIII.



35 **Q**uod iam purum quodq; *ἀνέπισατο* *ἄνελισατο*
 cus est, carne impleri debet. Tale est, *ἄνελισατο*
 quod sordibus purgatum, modicè sic-
 catum, sine rheumate, dolore, phles-
 gmone, callo, intemperie cōstitutum
 est. In summa, cui nihil accidit, quò mi-
 nus impleri possit. Hic ergo carnem regenerato. Sed
 hoc

526 Institut. Chirurgicarum, Lib. VI.

hoc naturæ opus est, quæ carnem è sanguine cōficit. Oportet ergo tātum talēq; sanguinē naturæ suffici, vt indē carnē procreet. Instituenda vitæ lex: cibi boni succi, vitatis acribus, auis, venatio, suilla elixa dari potest. Vinū in dolore & phlegmone alienum est: datum alioqui modicē, nec ita vetus, aliquandō prodest. Reliquum verò sarcoticis medicamentis perfici debet. Quæ reuerà sarcotica, iustam materiā naturæ cōparant, modicē detergent, siccant primo gradu: vel ita, vt ne nimis calfaciant. Licentiæ est vocare sarcotica, quæcunq; repellunt, tēperant, molliūt, intēperiem corrigūt: in summa, summouēt, omnia, quæ naturæ opus intercipient. In sarcoticis vitāda, quæ adstringūt, immodicē siccāt, quæque acrimoniā mordicāt. Illa frugi humiditatē partiū, & materiam carnis ebibunt. Acrīa colliquant, & aucta sorde vlcera amplificāt. Seligēda materia, quæ naturæ corporū & partiū conueniat. Nec si quid Dionis vlcus impleat, statim & Socratē iuuare potest: Nec quod in glāde carnē instaurat, protinūs & præputiū incarnabit. Finge Socratē, cui femur vlcera tum sit: thure alioqui sarcotico putredinem gignes. Aristolochiæ puluere carnē restitues. Etenim Aristolochia carnē generat, vbi thus sordes cōmouet. Ac rursus Dion sit paulō humidior tēperatis: huic thus commodū, Aristolochia inutilis est. Thus quod in Dione carnē constituit, in humidiorē, vel sicciorē nihil tale efficiet. In siccioribus partibus, sicciora: in humidioribus, minūs siccantia vtilia sunt. Ideoq; & præputio, & toti pelli, quæ colem induit, sicciora: peni, & glādi minūs siccantia conueniunt: carni etiā, quæ minūs siccet: oculo minūs, quā nari: huic quā auri. Sinus humidior, sicciorē: aridus minūs siccate curari debet. Nudatis ossibus vitanda pingua, aridis vtē dum, vt carne impleas. Vlcerebus pudendi, quæ humidiōra sunt, anethum vstum inspergitur, cucurbita sicca, vsta, pompholyx, lapis hæmatites, pinī cortex: horum aliquid in pollinē tritum, & mānā momento

mento mixtum. Quæ verò madida nō sunt, aloē sic-
 ca, & mannæ portiuncula incarnantur. Eadem ratio
 in ano, & eius naturæ partibus feruari debet. Om-
 nia ergo remedia suis finibus distinguenda, & na-
 turæ partium vlcerūq; accommodanda sunt. Lan- *Signa imbe-*
 guidius sarcoticum, vel saniem acervat, vel mollem *cilli sarco-*
 carnem, flaccidamq; gignit. Efficaciorē cauū exare- *tici, & a-*
 scit, vel callosum germen enascitur. sæpè etiam exci- *rioris.*
 tatur dolor, & grauiter vlcus arroditur. Sarcotico *Sarcotica*
 rū genus, quod multa perficit, sæpè vsurpatur: quia *improprie.*
 videlicet eo cura celerius absoluitur. Quod volu-
 mus subiecto exēplo intelligas, idq; in vsu reliquorū
 pharmacorum semel dictū sit. Glutinat, siccatur,
 deterget, & carne implet: Strobilinæ vnc. 3. ceræ vn. *Viride Gal.*
 1. æruginis rasæ drach. 4. thuris masculi drach. 2. ace-
 ti, quod sufficit: æruginem pluribus diebus conteris-
 to: thus vno die: tum cæteris, liquatum cōmisceto:
 gangrænis nomis putrilaginosus, & vetustis conues-
 nit. Fiet demētius, strobilina mollita prius, rosaceorū
 vel terebinthina, strobilinæ loco mixta. Quod si tes-
 rebinthina careas, quod sæpè fit, larigna, quæ omnis
 nō terebinthinæ similis est, vtendum erit. Alia laris-
 gnæ differētia, cætera quidem terebinthinæ similis,
 sed gustu mordacior. sensu acrior, & odore grauior
 est. Mitius quoque fuerit cerato mixto, cera lora,
 diutius trita ærugine, aceto, non ita forti, sed vinoso:
 postremò, si æruginem minuas. Atque vbi vincit,
 consilium glutinandi sit thus pari pondere cum æru-
 gine: si magis siccandum, lithargyri, vel similis me-
 tallici bene triti partem aliquam commiscebis. Ex
 aliis etiam acrioribus, vt squammis, rostris, tritis, los-
 tis, aliquid poterit adiūgi. Si flaccidior caro est, præ-
 ter metallica, myrteo oleo, vel melino: si calor extis-
 tit, rosaceo vti oportebit: si parū processit caro, ari-
 stolochiam, & aliquid è sarcoticis vnies. In duritie,
 adipēs, medullas, ammoniacum, & similia colliquas-
 bis. Alumen interes, si quid affluit: Ladanum quod *Ladanum.*
 simul mollit, ac reprimat: Aloē, quæ repellit, terget, *Aloē.*
 dige

528 Institut. Chirurgicarum, Lib. VI.

digerit, & sarcoticum est. Sic ergo *πολύχρηστον* temperabis, quod & aliter aliis accommodes, & ad multa vitia transformes, vt interim carnem repleas. In contumaci vlcere animaduertendum, aliud quidem tale esse, quod suauissima desideret: aliud, cui non nisi acribus, extremisq; auxiliis prodesse possis. Purdendorum, & sedis vlcera maligna, neque acria, neque vim ignis sustinere possunt, qua videlicet parte neruacea, & suauissimis medicamentis curari debent: qualia sunt, oui candidum, cadmia lota, cerusa, pompholyx, amydon, manna, myrrha, styrax, succus solani, Aizoi, & similia extusus in mortario plumbeo, pistillo plumbeo: vel chymicorum oleum, quod extillant plumbo. Spodion, antispodion, quod fit ex oleastri floribus & foliis, ebore, cornu cerui, crematis nucleis dactylorum, ficulno ligno, lentis, cytoni, myrti foliis, cum tenerrimis ramorum partibus, moris immaturis in sole arefactis, vel e buxi coma, rubi, & terebinth. testis, & volutis ostrearum, buccinorum, purpuratum, & similia, taurino glutine, & linteorum cinere, fece vsta & elota: vruntur ea omnia crudo fictili in fornacibus, donec figlina percoquatur: tenuissimè læuigare, & si quid superesse putes qualitatis ignis, eluere oportet: si nolis adstringere, aceto macerabis, & siccabis. In fluxionibus leniter adstringere melius est: in putredinibus, aceto, oxycrato, œnomelite, vel oxymelite: in cancriosis, solani succo & plātaginis imbui, & inde sic cari conuenit. Corallo similiter vt illicet. Cristallum laudant in oris vlceribus & cancriis. In clementibus auxiliis aloë est. Fuligo thuris terebinth. mirrhæ. E styrace, & pice liquida valentior est: ex œsypo, & butyro suauior. Elui potest, quæ acrior videatur. Manna repellit, & ad multa utilior thure est. Coloph. pix, resina, præsertim sicca, humidioribus corporibus conueniunt. Coloph. modò per se, modò cum thuris polline vlceratis genitalibus inspergitur. Caries lignorum, magis ex adstringente, & deterg

detergente materia peculiariter, quæ vltimo collecta est, expurgat, impletq; humida. In Chironiis, maleficis, & extremorum vlceribus per se, vel cerato mixta vsurpatur: farina corticis capparis interdum commiscetur, quæ eadem purgat, siccaturq; maligna: farina hordei & fœni græci humidiora corpora iuuare possunt. In secundum ordinem referuntur: Aristolo. *Secund. ordo.* iris, & similia, quæ detergent, digerunt, euocant, farina lupinorum, orobi. *Pumex.* Pumex crematur carbone puro, & vino albo eluitur: per se tritus, vel cum sexta sulph. parte, iuuat chironia: his longè optimum medicamentum est plumbum vltimum & elotum, vt & putrilaginosus, & cancerosus. In acriore sanie, contumaci vlcere parte humida, quæq; facilius putrescat, *Vitanda.* acria vitanda sunt. Acrimonia multorum, partim vitanda vitrina, partim lotura, vel utroq; diluitur vel cerato *acria.* rosaceo mitescit. Talia sunt quedam metallica, squas *Metallica.* ma, chalcitis atramentum sutorium, quibus vsus longis, & aliis rebus temperatis, & parce quidem vtilis erit. Lauantur pluuia, si queritur adstrictio, *Chryfocolla.* alioqui puteali, fluuiali, vel fontana. Chryfocolla concreta sanies est putri vena metallica, difficultum vlcerum efficax remedium est: factitia quoque ex æruginis, quæ alumen recipit, & salem, in vis, quæ nimio humore madent, & rheumate vtilior est. In hoc genere censentur, quæ Græci vocant κεφαλική, & καταγματική. Illa caluarie, hæc reliquis quoque ossibus fractis imperantur, quanquam interdum vtriusque ratio commiscetur. Cephalica catagmaticis *κεφαλική.* *καταγματική.* *κα.* acriora sunt, squamas & ramenta ossium detrahunt foras euocant, quæ in alto latent: vtraq; tergent, digerunt, & siccant. Miscetur his quod adstringat, sed oportet ex aceto forti tam diu in æstu atteri, dum in tenuissimum pollinem abeat. Sic enim quod influat repercutitur, & vis tergentium altius penetrat. His autem sic vtendum est nudato osse, quod in caluarie sepe fit ad vocatam *Απλάουρ*, arida inspergenda. Nudatis enim ossibus pingua malè conueniunt.

Sintq; paulò acriora, vt non solùm squamas, sed viscidum humorem ex alto trahant, Videndum etiam ne qua parte syderatum vel corruptum os liueat: eliminandum enim, ac omnino repurgandum. Atque vbi cœperit caro succrescere, & os integri, cephalica⁵ cerato temperanda: sic enim coges sarcoticum quia videlicet quæ euocant tergent, discutunt cerato, mixta implere possunt. Cerati modum definient natura vitij, corporis, virtus denique medicamenti.

Materia cephalica.

Parantur cephalica ex iri Ilirica, erui farina manna, aristolochia, panacis Heraclij radice, magis cortice (opopanax calidior est) radice bryonia, in summa, his quæ detergeant sed non rodant. Acrida enim

Cathegetis.

miscentur, vt ramenta auferant, Cephalicon, quod tollit squamas, ossa corrupta rapit, & caua implet, Iridis Iliricæ panacis, ana drach. quatuor: aristol. rotundæ, mannæ, ana drachmæ duæ: tusa leuissimè, & traiecta cribro insperguntur, vel melli

Ex orobis.

mixta imponuntur. Farinæ orobi rubri, drach. octo: iridis, drach. decem: mannæ, aristoloch. rotundæ, squammæ, ana drach. quinque: tritis, vel cum melle vitior. Sunt qui addant radicem bryonia, & aliter parent. Corticis pinei, squammæ, pumicis vsti, ana drach. sex: mannæ, thuris, aristolochiæ, iridis, resinæ, pityinæ, ana drach. quatuor: mirrhæ, aloës, ana drach. duæ: tritis vttere, vel cum melle. Athenæus loco corticis pini, drach. quatuor gallæ miscuit. Plura ex secundo & quarto de composi-

Sarcotica mixta.

sitione pharmacorum κατὰ γένος. Iam verò multa per se vocent, mixta sarcotica sunt. Oleum sordes colligit, sic & cera: ærugo rodit: tria hæc mixta, carnem regenerant: magis etiam, si quid sarcotici ammisceas. Sic enim purgant, & carne implent. Quale est, Cerati rosacei libra vna: æruginis vnc. vna: mannæ, thuris, vnciæ duæ. Cera terebinthinæ, ana vnciæ quatuor: æruginis ex aceto lotæ, vncia vna: vel vt efficacius, vnciæ duæ: thuris, vnciæ duæ. Ita ex oleo, cera, ærugine, resina, terebinthina, thure, manna, & materia

farco

- farcotica, sexcenta pharmaca confinges, ea arte, quam Galenus tradidit, quibus extergeas, sicces, repellas, ac simul impleas. Trigener, Cera, co^{Trigener.} lophonia, terebinthina, pariter colliquantis: refrig^{In fracturis ossium.} gerata hæc in frigidâ coities, diuque manibus volutabis: nuda ossa capitis incarnat, squamas deducit, & cicatricem trahit. Admirandum est mastiche pariter mixta in ossium fracturis. Iudæi, Colophonix libra vna: mastiches vncia vna: olei sesquuncia: liquata, & in frigida pista sine linamento ulceri impones: purgat, & præ cæteris implet, sed cicatricem non generat. Optimè incarnat farina pistrinalis è tritico vnciæ duæ: picis, Colophonix valde trita, vncia vna: arido cauum impletur. Gal. Ceræ drachmas sex: olei vncias tres: liquefactis adde thuris, iridis, aristolochiæ, ana drachmam vnā: æruginis drachmā dimidiū.
- Aliud, Radicis Anchusæ, vnc. duæ: aloës, vnc. quatuor. Fiat pulvis. Theriaca efficacissimè purgat, incarnat, cicatricem ducit. Maleficis viceribus tibiarum, litharg. vnc. sex: cum adipis caprili, olei rosacei, ana vnc. sex, coquito: coctis adde mastiches vnc. sex, parū refrigeratis misce vitella quinque ouorum. Hactenus experimenta veterum, nunc ad recentiorum remedia transeundum est. Aureum Mesuæ. Ceræ vnc. quinque: resinæ vnc. tres: terebinthina lib. vnā: mellis sesquunciam: mastiches, thuris, sarcocollæ, myrrhæ, aloës, croci, ana drach. tres: fiat vnguentum. Fuscum Nicolai multa habet: vnde concoquat, & emolliat. Similiter & quod Croceum describunt. Tetrapharmacum dolorem lenit, maturat phlegmonem, putredinem augere potest: siccare verò & expurgare non potest. Gal. locis aliquot Thessalum reprehendit, & alios, qui tetrapharmaco vt siccante, purgante & incarnante, vterentur. Actuarius iam à doctrina veteri degenerans, vim molliendi, coquendi & incarnandi

532 Institut. Chirurgicarum, Lib. VI.

Omnia vlce tetrapharmaco tribuit. Omnia vlcera per sanat. *Ar-*
ra psanans. temilia, scabiosa, absinthij, ormini, senecionis, tamaricis, apij, verbenæ, pilosellæ, lanceolæ, pimpinellæ, linguæ canis, mille folij, chelidonis, ana manip. vnus ex omnibus reiectis radicibus exprimat iuccus, cui adde axungia veteris, lib. duas. sepi hircini. librâ vnâ: olei libras duas: mellis vncias tres: mediocriter bulliant, & in mortario pista vniantur. *Dia ireos:* Sepi vaccini, selibra: olei rosacei, vnc. tres: ceræ vnc. duæ: radicis ireos, vnc. vna: thuris, sarcocollæ, masti- 10
Dia ireos. ches, aloës, aristolochiæ, ana drac. duæ: cum terebinthina vnc. tribus fiat vnguentum. *Puluis Rasis:* Olis bani, aloës, sarcocollæ, sanguinis draconis, radicis ireos, ana. Ita cum mastiche, farina fœni græci, & id
Puluis Rasis. genus remediis sarcoticos pulueres confinges. *Opor* 15
Puluisculi quo paradi. tetq; exactissimè conleuari, ne asperitate lædant. Itaque materia in pila tunditur, tenui cribro seceinitur, postea molitur, ac deinde tenuius cribratur: quicquid non transmeat, repetitur in pilam, ac tam 20
Vtendi modus. diu conteritur, dum ad extremam tenuitatem perueniat. Hæc arida sunt, quæ humidioribus vlceribus conueniunt. Alia per se induntur cauo, vel penicillo vulnerario capta imponuntur. In fistulas mittuntur clysterio, sed diluta. Ab his thorulus mollis vino madens superdatur. Vinum sit è dulci austeriusculum. 25
 Postremò omnia commodè alligantur. Aestate bis, hyeme semel in die commutantur sæpius etiam si dolor phlegmonæ, vel aliquid tale intercesserit. Ac lintei lanugo bene munda impacta cauo sæpe sufficit. 30

De epuloticis.

C A P. I X.

Natura epulotici.



Lenum vlcus clauditur cicatrice. Epuloticū siccatur, adstringit, sed citra morsum atq; hinc reprimat, & quod in carne humidū est, sorbet: carnem cōtrahit & cute tegit, aut certè callo tenui, qui cuti similis est. Ex quo siccare magis 35
 gis

gis necesse est, quàm quod carnem gignit, vel glutis
 nat. Aliud genus est, quod quia ex crescentē carnem *Secundū ge-*
 adimit, epuloticon appellant, acri natura, & iā mor- *nus epulot.*
 daci. Addunt & tertium genus, quod siccat quidem *Tertium ge-*
 sed non adstringit. Cicatricē ducunt, galla iminatura *nus.*
 myrta, malicoriū, aris squama, chalcitis, misi, arugo *Epulotica.*
 vsta, lora. Et quod præstantissimum est, æs vstum, &
 elotum. Metallis acribus ex crescentis caro cōsumitur
 vstis, & elotis trahitur cicatrix. Vruntur hæc fictulis
 10 bus crudis, carbone puro: extinguuntur vino, mor- *Ratio vrēdi*
 tario interūtur affusa pluuia, mox siccantur, cribra- *metallica.*
 tur linteos: in mortariū aliquoties repetūtur, ne quid
 arenosum aut scabrum reliquum fiat. Abluuntur
 etiam ea ratione, quæ ex Dioscoride & Galeno res
 15 petenda: vt eadem materia excedentem carnem adis-
 mas, in duris ac mollibus corporibus cicatricem du- *Distinctio*
 cas. Erysimi semen, scorïa plūbi, subia, cerato myr- *remediorū.*
 tino excepta. Erinaceorum, purpurarum, buccino-
 20 rum, ostreorum, calculorum marinarum, silicum, &
 similibus crematorum cinere, metallis acribus simi-
 liter vtendum est: vt crematis quidem superfluum
 carnem adimas, vstis & elotis, cicatricem cōtrahas.
 Hæc omnia tam possunt mansuescere lotura, quàm
 25 suavis est cerusa lora. Flaccidis carnibus balaustra
 affatim insperguntur. Liberaliū iniici oportet, vbi
 caro demenda est: parciū, & in subtilissimum pul-
 uerem conleuata, atque acie cultelli capta, vbi cicat-
 30 trice plaga tegenda est. In calloso stupidiq; sensus
 corpore, si neque plethora, neque cacochymia, acro-
 ribus ad cicatricem vti licet. Quæ enim mol-
 liora corpora colliquant, duriora in cicatricem
 contrahunt: & acria cerato rosaceo fracta epulo-
 tica sunt, vt vel pluuia, vel adstringente vino lora.
 35 Vinum sit neque recens, neque ætate mordax, *Vinum.*
 aut languidum: præstat quod annis est & qualis
 rate medium. Siccant, nec ita stringunt, myr-
 rha, argenti spuma, ostrea, diphryges. Iam ve-
 ro alia *intra sa,* quæ arida tenuissimè insperguntur. *intra sa.*

534 Institut. Chirurgicalarum, Lib. VI.

ἡ ἰατρικὴ Alia *ἡ ἰατρικὴ* *ἡ ἰατρικὴ* *ἡ ἰατρικὴ*, & firmo corpore. Hæc in plas-
δν. ty smate adhibentur. Corpus accipiunt à cera, quæ
 pinguis sit: vel natura sua, vel myrtino melino, lens-
 tiscino oleo remollita. Ac sit olei pars decima, vel
 duodecima. Terebinthinâ quoque, & larignâ tem-
 perare licet: vt œsypo, si quid tumoris vel calli vlce-
 rum labris reliquum fuerit. Eodem modo medulla
 cerui & vituli. Sic enim epuloticon diutius insisteret,
 neq; breui exarescet, vnde ladat scabrie, & ante
 tēpus decidat: ac tertio quoq; die absolueri iatis est. 10
 Cerata conueniunt è rosaceo myrtino melino, tere-
 binthino lentiscino fraxinino. In ceratis epulotica
 applicantur multò magis, si hæc acriora: nec ita ma-
 lignum vlcus est. Elarigna, & dupla cera cerotum
 confici potest. Spodos factitia, quod antispodium is
Vitand. vocant, in epuloticis censetur: vis eius eluatur, vt
 sunt corpora, & vlcera fugienda *μαλακωδν*, quæq;
μαλακτικα: adeps maximè suillus oleum cera resina,
 ammoniacum, & similia in vlceribus, quæ difficil-
 ius cicatricem trahant. Fugienda acria piper, sinas 20
 pi: sed præcipuè vbi vel plethora vel cacochymia.
 Ad hæc quæ humectant: vt aqua. Quòd si omni-
 bus ritè institutis vlcus cicatrici pertinacius relus-
 ctatur, aut iam opertum, clausumq; rescinditur,
 horum aliquid subesse coniicies. Nam vel plethor 25
 ra: vel cacochymia est, vnde perpetuò madescit vl-
 cus: hic purgante pharmaco, illic phlebotomia,
 quæ vacuet, & reuellar, opus est. Aliquando in
 quantitate & qualitate vitium est: tumq; primùm
 phlebotomo, deinde cathartico medicamēto occur- 30
 rere oportet. Emulgendus atque etiam præciden-
 dus varix est, si inde materia transfluit. Quibus ab
 hepate, liene, capite, aut alia corporis parte scatur-
 rit colluuius, necessarium parti remedium adhibe-
 bis. Aliàs vicina malè habita scalpro lacerabis: callo 35
 sa labra adimes: partē ægrā, totamq; viciniā, pristis-
 næ naturæ reddes: os subiectū si qua parte syderas-
 tum, aut cariem duxit, abrades, aut etiam cauterio
 inures

*Causa rebel-
 lis viceris.*

- inures: vel si qua resitant ramenta, maturè detra-
hes. In summa omnia summouebis, quæ cicatricem
tardant: aut eandem refricant. Lithargyrus per *Redit ad*
se trita attrita operit. Eadem è vino lota tritaq; re- *materiam.*
5 ficcatur: tenuis plumbi lamina, plumbum vsum,
lorũ summoperè medetur cancris. Implet, & ad cica-
tricẽ ducit cadmia cremata, plurib⁹ diebus ex aceto
vel vino modò giluo, modò albo austeriusculo teres-
re oportet. Ladanum molle & recens è vino, vel
10 salua pistum cum elegantia iuuat. Cerusa, pom- *Mixta veme*
pholyx, calx elota bolus Armenus, terra sigillata, *dia.*
& similia, quæcunque ficcant, adstringunt, nec
mordent. In mixtis prætulit Gal. *δια καδμιας, & δια*
λαδανου medicamenta. Quæ cum multa sint, ac vas
15 riè concinnentur pauca, & paratu facilia describe-
mus. Cadmiæ, lithargyri, cerusæ, ana vnc. vna: ce-
ræ, vnc. quatuor rosacei, vnc. tres. Cerusæ, cadmiæ
ana vnc. quatuor: ceræ, myrtini, ana vnc. sex.
Plumbi vsti vnc. tres: cadmiæ æris vsti, ana vnc.
20 duæ: Colophonix, olei myrtini, ana lib. duæ: vini
antiqui odorati, quod sufficit. Cadmia pluribus
diebus in sole teritur ex aceto: vel conueniente vi-
no. Quod si æs vsum similiter lauatur, melius est *δια λαδανου*
Cratonis.
25 ceribus auxilio est implet, & ad cicatricem perdu-
cit. Picis aridæ denar. centum: æruginis rasæ, de-
nar. viginti quatuor: æris vsti denar. quindecim:
squamæ rubræ, denar. viginti quatuor: ladanu, vnc.
nouem: lithargyri lib. tres, olei vini optimi, ana
30 vnc. triginta. Litharg. oleo coquitur, coctione mes-
dia reliqua metallica iniiciuntur, volutantur rude,
dum non inquinent: hic pix immittitur: refrigeres-
cibus ladanum vnitur è vino tritum: omnia in
mortario conficiuntur: hoc & reliqua medicamen-
35 ta, quæ siccant, & non mordeant, diutius coqui
melius est. Adhibetur hoc in platysmate, deliga-
tur, nec ante quartum diem exolui debet. Alia
quarto de comp. phar. *κατὰ γινω.* Sũt & hæc epulorica:

536 Institut. Chirurgicarum, Lib. VI.

Quomodo hæc adhibenda. Aeruginis, æris cremati, ana semuncia aluminis fufilis drach. duæ: ceræ drach. sex: ærugine vsta melius est: metallica excipiuntur cera pramollita igne, vel cerato ex larignæ semuncia, & ceræ vncia vna alioqui cerato myrteo, vel rosaceo. Squamæ, æruginis ana vncia: ceræ pinguis vnciæ sex: larignæ semuncia. Liquatis ceræ & resinæ reliqua trita coniunguntur hæc in platysmate apponuntur, quod vlcæris locum nec eo amplius circumscribat. Munitur vicinia his, quæ phlegmonem arceant: tertio quoque die, vel quarto, medicamentum reuellitur austro vino fouetur locus platysma innouatur. Repetuntur hæc dum cicatrix duci incipiat resinæ loco, vel cæsyphus vel medulla est, si quid inest durius. Et hæc quidem efficacia sunt, & maligna iuuant. Aliud: Cerusæ lithargyri, ana libra vna olei myrtini libræ duæ: ceræ, selibra: terebinthinæ, vnciæ, tres: aluminis scissilis vncia vna: piperis, semuncia: vel paulò minus: leuius erit si sequunciam thuris addideris. Parabile & mirabile: Aluminis scissilis semuncia, in vini aquæ pluuiæ, vel quæ in casuis quercuum defidet vnc. nouem, diluitur: linteolum vetus, sed mundum aquâ inculcatur, exarescit sole depefcitur, & conceptum imponitur. In sedis vitiis, & inueteratis vino quàm aqua, vti melius est. Aliud in quo veterum & posteriorum consensus est: Linteolum aqua illa, vel vino madens: sed expressum molliter apprimes loco: cui deinde per tenuem plumbi laminam induces, & alligabis.

Lamina plumbi.

Cerusæ drach. duæ gallarum, myrti, recrementis, plumbi, ana drach. vna fiat puluis. In ignis exustionibus & calore: Cerusæ, lithargiri, hordei tostis, ana vnc. vna: ceræ vnc. tres rosacei, vel myrtini, vnc. octo metallica è vino terito, ceram cum oleo liquefacito hordeum cribratum inspergito, omnia coquito, excolato in mortario conficito. Aliud litharg. cerusæ, ana libra vna: coquantur in olei albi libris duabus, aquæ purissimæ selibra, dum aqua exha

exhalauerit, & purum pharmacum consistat: purus sit ignis. Liqueatis adde terebinthinæ, vel lac. *Larigna po*
 rignæ potius in malignis vncias duas, vel tres: cer. *tior est quā*
 ræ albæ, vncias quatuor vel sex, vt augetur resinæ *terebintham*
 ; modus, sic & cera augenda est. Postquam verò *malignis.*
 hæc cum cæteris coierint, adde thuris semunciam,
 pompholygis, ostreorum, cadmiæ, ana vnciam
 vnam. Vsta nec in cinerem trita, & ex aqua lota dul
 ci quidem in acris sanie: marina, vel aceto in cal
 10 losis, & tumentibus labris vsurpentur. Inopiâ ma
 ringæ, subduplum salem aquâ diffundes. Quod si
 multus humor affluit, vino albo pellucido leniter
 adstringente, commodè lauabis. Calx septies elo
 15 ta, è rosaceo: vel aqua diluitur, in æstu medio sub
 inde versatur teritur, abluitor: postremò cum iam
 satis lota, tritaq; exaruit, è rosaceo pista imponi
 tur: cicatricem trahit: vlcera neruorum maligna,
 & ambusta iuuat. Probanda quoque remedia po
 20 steritatis: Cerusæ vncia vna lithargyri semuncia: *Recetiorum*
 rosacei libra vna: aquæ rosacæ sesquincia, *pharmaca.*
 25 mica in mortario fortiter perfricantur pistillo duro, *Vng. album*
 quod cum sit deinceps, ac paulatim liquida affun
 duntur. Vng. deficcatum rubrum. Album Rasis: *comunitatis.*
 Olei rosacei libra vna ceræ vnciæ duæ, cerusæ vnc. *Album Ra-*
 30 vna: caphuræ drach. vna albumina ouorum tria. *sis.*
 Melius fiet cum drach. sex lithargyri. Aliud Eæ *Puluis epu-*
 laustiorum, sanguinis draconis, cadmiæ argenti, *loticus.*
 æris vstri, loti, ana fiat puluis. Addunt santalos, ny
 35 pheam minorem plâtaginem, rosas, vbi calor inest. *Plantago.*
 Vtraque plantago cum radice trita epulotica *Album e ce-*
 est. Emplastrum album è cerusa non omnino dis
 simile albo Galeni. Ceræ vnc. quatuor, rosacei lib.
 dimid. terebinth. vnc. tres, cerusæ vnc. duæ lithar
 gyri vnc. vna thuris, aluminis, cineris è cochleis cres
 35 matis, ana semuncia cera, oleum, terebinth. simul
 funduntur, fufis reliqua commiscuntur, pista omnia
 in mortario vniuntur. Actuarij, Litharg. sesquilib. *Album è ce-*
 cerusæ lib. quatuor: ceræ albæ lib. septem olei myrs *rusa Actu.*

538 Institut. Chirurgicarum, Lib. VI.

*Lithar. nu-
tritiū Raf.
& Auic.* tini quantum sufficit. Litharg. ol. coquitur, cerusa additur, & cera. Litargy. nutritum Kalis & Auis cennæ: Lithargyros tenuissimè teritur, ex aceto & rosaceo diu exercetur in mortario: vt quidam volunt, plumbeo. Modus est, vt inde crassior fermentetur, & exturgeat. Sunt qui addant vni parti lithargyriam nutriti, sextulam aris vitæ: vel cremati plumbi: aut tantundem aluminis, balaustrorum, rubig, sanguinis draconis, cadmiæ argenti. Idq; singulorum ope in malignis & pertinacibus vitis. In can-
crois cerusa iungitur pistillo & mortario plumbeo.

Cerusa.

*Ratio vsus
epulotici.*

Cerusa per se curat abrasa: ex vino trita, humidioribus vlceribus idonea est: ex aqua rosacea lota pellit, cicatricem contrahit, & calorem attemperat, butyro mixta mollit coquit, & epulotica est: vt licet
& emplastro desiccatiuo rubro, & aliis. Epuloticis vtimur, iam propè pleno, sed nondum adæquato vlcere. Celsus linameto è frigida pressio integrit: vbi iam æquatum est, sicco: ac bene fiet, si in frigida alumen maduerit, & quod siccum imponitur, in ea
mersum, postea inaruerit. Et hæc quidem in leni vlcere faciunt satis. In malignis, linteolo bene puro finum molliter extergebis. Epuloticū induces, quod plurimum siccet: deinde si quid est durius, platysma quod attenuet labra, superdabis: quod equali linteo conteges, ex quo splenion subiicies expressum frigida, alioqui vino, ac frigiditatem splenis affusa subinde frigida continebis: postremo commodè ligabis, tertio primū die solues. Hic linteolo sicco, molli, puro, saniem detergebis, & vt prius, omnia reuocabis. Recētiore vino calido cui balaustra cōcoxerint, aut similia, vlcus fouet. Alioqui aqua, quæ vim aluminis conceperit, vbi calor aliquis est, molli vellere humorem sorbent, pharmacum imponunt, superdant stupas vino madidas vel aqua: omnia glutinantibus fasciis cōstringunt. Galenus interdicit aqua nec vlcus nudum contingere oportet. Plurima epulotica ex
1.2.4. de comp. phar. κατὰ γιν & 14. Aetij.

De



- 5 **L**ongius fortasse quam res postulabat
 de glutinantibus sermo dilatus est: ver-
 rum ita nos coëgit, traxitq; consequens
 medelari ratio: nec alius locus obrigit
 commodior, in quo de illis oratione in-
 stitueremus. *κολλητικὰ* Græci vocant, *συμφορικὰ & τραυ-
 ματικὰ*. Quidam etiā *ἰσχυματῖ* & peculiariter quæ cruen- *Facultas*
 10 tis vulneribus adhiberētur. Siccant hæc omnia ad 2. *glutinātū.*
 ferè gradum, media ratione inter ea quæ cicatricem
 trahunt, & quæ carnem regenerant: non detergent,
 sed astringunt, prohibentq; ne quid humoris labris *Cutis quam*
 vlcere obueniat: nec in cruentis solū vlturpari so- *faciat ad ce-*
 15 lent, sed ad sinus, fistulas, maligna verustaq; vlcera *leritatē glu-*
 transferuntur. Opitulantur celerius, si integra pars *tinātū.*
 tium natura est, si paucus sanguis idemq; purus as-
 fluit, si nō abrafa nō præcisa, sed vel salua, vel parte
 aliqua etiamdum hærens cutis est. Etenim cuti cum
 20 subiecta carne naturalis quædam amicitia coit, vt
 ægerrimè sanescant, quibus omninò illa excidit: fas-
 cilius, vbi incolumis seruata est. Mirum quòd præ-
 cisa, sed loco suo reddita coalescit ac mortua reuis-
 uiscit, quodq; è plaga liuore ducto, non in iuvene so-
 25 lo, sed etiam sene viuulum colorem recipit. Magna
 igitur cutis habenda ratio: nō ob id tantū quòd in-
 de celerius glutinatur vlcus: sed quia interiecta cute
 plurimè iuuatur, quæ nuda alioqui caro non perfer-
 rat. Nudum vlcus lintheo, lana, spongia irritatur:
 30 medicamentis paregoricis, fordes colligit: vellicas-
 tur catharticis: iuuatur omnibus si familiari tecto-
 rio munitum est. Ideoq; & abrafa cutis & pen-
 dula, suo loco inducatur, & reducta molliter appri-
 matur: sic enim vnà cum vlcere celerius coalescet.
 35 Animaduertenda quoque labra sunt, quia vides *Rō adhiben-*
 licet, alia contracta alia euerfa plurima dehiscunt. *da labris.*
 Contracta deligatione abducenda, quæ in vices
 re laxior, hinc inde sana parte arctius contrahatur.
 Colli

540 Institut. Chirurgicarum, Lib. VI.

Ratio deli- Colligenda verò quæ plurimùm hiant à sanis partibus
gandi. ineunte fascia quæ vt ad oras proprius accedit, ita
firmius constringatur, sed ita vt ne nimis cogendo
nimis comprimas & dolorem ingeneres. Euerio tan
tùm altero vlceris labro, hinc linthea abduces & in
alteram partem quasi trahendo volutabis. Si utrūq;
euertitur, ea quam *ἐκδοὶν ἀπὸ τῆς ἐπιδόου* vocant, neces
saria est: & vt sunt vlcera, ita remedia distinguuntur.
Paruum vl- In recenti paruoq; vlcere fasciola in orbem ne
cus non ne- xa, satis esse potest: nisi vel à cacochymia, vel ple
*gligendum.*thora, vel acriore sensu partium subesse periculum
videas: hic enim vel si acus minima pupugerit, do
lor, phlegmone, cōuulsio denique ad exitium sequi
consuevit. Statim ergo colleticis abstinendum, & pa
regoricis vtendum erit. In maiori vulnere, maiora
remedia quærēda sunt, deligatio, sutura, fibula, mes
dicatio: hicq; audienda sunt magnum & paruum in
ἐπικαίσι sectione, non quorundam veterum more qui *ἐπικαίσι*
vulnus μι- *σορ* insigne vulnus è natura loci, *μίστα*, è periculo sta
γα. tuunt. Atque in glutinando, natura corporum dis
tinguenda: quia videlicet vt illi loquuntur hoc *δύσ*
σελκίς, illud *ὕπελκίς*. Ac difficultas ferè nascitur ex iis
quæ in rebelli vlcere proximo capite tradita sunt.
Quomodo Primum igitur in cruento vulnere, siquidem neque
extergendus profundum est, neque hamorrhagia extitit, spōgia,
crutor. lana succida, molli panniculo detergendus cruor est,
atque illa prius inculcanda frigida, exprimenda,
atque ita adhibenda. Quòd si altè descendit vul
nus erupitq; sanguis, frigida loco aceto vtendum
erit, vt inde grumum attenues & sanguinem suppri
mas. In neruis, ab aceto metus est: Ideoq; specilli
extremo lintheolum alligabis, quod vel sapa vel
Ratio gluti melicrato madefacies. In lacunis vbi iam glutinan
nandi. dum, vinum & œnomeli idonea sunt. Ac cū iam
deterfus cruor est, nihilq; labris intercedit, qualia
sunt, pilus, grumus, oleum, pluma, & similia, requi
tur vt latera lateribus, ore oris ritè cōeant. Ponimus
autem neque dolore, neque phlegmone, neque vls

lo alio vitio vlcus laborare : ac iustam carnem late-
 ribus vulneris interesse . In rectis vulneribus la- *In rectis vul-*
 bra facile adducuntur multò magis si molle corpus *neribus.*
 est, adducta fasciis continenda sunt, ex duplici ini-
 stio : alioqui simplicibus, sed futura interdum addis-
 ta, & fibulis. In transuerso vulnere, oræ dissident *In transuer-*
 magis, quare futuris & fibulis opus est. In magnis *sis.*
 & profundis vulneribus vincula ex duobus initiis
 necessaria : eadem quoque in latis simul & profun-
 10 dis, sed hæc præterea altis futuris cogenda sunt:
 neutra verò præproperè glutinanda : ac fascias aus-
 stero vino & nigro maduisse iuuat, quod in vul- *Vinū nigrū*
 neribus cæteris præferendum est, quia repellit, phle- *austerum.*
 gmonem prohibet & cogit : in quo etiam aliquid
 15 eorum quæ astringant licet incoquere : sed modus
 sit, ne nimis contrahas, vnde excitetur dolor. In mol- *In quibus*
 li parte, extrema auricula, imò naso, fronte, bucca, *suendum.*
 pericranio, palpebris, cute gutturis, ventre, mem-
 branis quæ non sunt tendines, futura conuenit.
 20 Præputium affluit & infibulatur, vt & carnos. *In quibus e-*
 sum genus vbi nimium dehiscit vulnus, nec oræ fas- *ciam fibula.*
 cile coniunguntur. Sed de his alio loco pluribus.
 Particularis materia, vt sexus: vt molle durumve *Particularis*
 corpus: vt recens vetustum, paruum magnumq; *materie di-*
 25 vlcus est, ita distingui debet, quod in fasciis, futuris *stinctio.*
 ac fibulis similiter seruandum est. Ebulus, sam-
 bucus, symphytum, syderites, palmæ cortex, plan-
 tago, fraga equisetum, pini, tedæ, dracontij folia
 30 recentia, anagallis, salix, androsæmon, astragalus,
 phlounculus, aranæ tela, & ea præcipue cui è pi-
 strino farina infederit. Spongia, lana succida, lin-
 theolum expressa è frigida, vino, vel liquore qui
 contrahat : caseus recens & oxygalactius. Istatis *Istatis sa-*
 35 satia neruos etiam præcisos in fine musculorum *tima.*
 iungit, & duriora corpora conglutinat. Neruos
 etiam iuuat pentaphylli folium cum melle, allia
 affata tritaq; myrrha vlceribus capitis idonea. Sars-
 cocolla, gummi genera & resina quæ non mordeant
 nec

542 Institut. Chirurgicarum, Lib. VI.

nec ita detergeant. Pix sicca magis quàm humidat : hordeum vstum, aloë ex aqua trita : herbæ succus & folia, quam ex India comportant, & patrio nomine zambanam appellant. Aloë vulgaris est quæ tenace vita in multos menses viget: è laquearibus ædium & tabulatis magna viroris commendatione suspenditur. Constat hoc remedium certo experimento nautarum. In colleticis quæ ad manum sunt, præcipua laus attractylidi. Eius cacumina austero vino vel oxycrato incoquantur : excipitur concha quod enatat. vlmi cortex alligatus, eiusdem quoque folium intritum glutinat & ambusta iuuat, vt sine manifesta cicatrice coëant. Purgat, implet, cicatricem ducit, glutinat, & artificialibus balsamis miscetur aqua quæ vlmi folliculis concluditur, bene purgata vermiculis. Et balsamo quodam raro & præcioso principes vtuntur glutinando. Sunt qui aquam quæ castratis viribus exudat vere vitreo vase excipiant, annum integrum bene operculatum vas & clausum exponunt soli, loco subdiali, sed qui ab iniuriis cœli tutus sit : vas subinde ad solem vertunt, melligo tandem concrefcit quæ sit balsamo viribus æqualis. Efficaciora sunt sorbus, mēspilus, pīraſter, quercus, & quæcunque acerba sunt, teruntur, affuso interdum vino, quod astringat: atq; ita alligantur. Addunt bolum Armenum, terram sigillatam & similia. Composita sunt : Cerati myrtini vnc. 3. ceruſi. vn. i. vetusta glutinat. Aloë arida, œnomelite coquitur, emmotum inde tinctum impetratur : capitis vlcera coniungit. Galenus pharmaca temperauit mollioribus naturis ex Lithargyro oxelæo & œnelæo durioribus ex bitumine, ærugine, squamma, aloë & myrrha: Litharg. vn. quatuor, olei & aceti, ana vnc. 8. vel eo plus, vt diutius coquantur, Oxelæo facilius liquefcit argenti spuma : diutius tamen vexari mortario, ac deinde integrum diem excoqui necesse est, idq; luculento foco, & feno aëre: quod bene coctum ritè coit, nigrum euadit,

Zambana.
Aloë.

tractilis

Vlmi è folliculis aqua.

Balsamum.

Aqua vitis.

Composita
remedia.

Ex litharg.
& oxelæo
gram.

- dit, non abfimile ei quod nigrum vocant: fortius fit, si oleum vetus est: acetum verò tenue, pellucidum, & acerrimum. Fistulas sine callo, maiora minoraq; vulnera, cruenta, lacunosa, difficillima. & parotidas glutinat. Quod verò ex œnelæo, cruenta iungit: *Ex œnelæo.*
- 5 Litharg. lib. dimid. teritur diebus quindecim ex vini gilui, tenuis, & odori selibra, vel libra vna: deinde affusa olei libra vna, vt prius coquatur. *Διά χαλκί- Διά χαλκί- Τεωρ.*
- 10 Teωρ, fistulas & magna vlcera coniungit, & cicatrice regit. Axungia veteris bene purgatæ fibris, & sine sale lib. duæ, olei veteris, litharg. ana lib. tres: chalcitidis vnc. sex: conficiatur ex arte: quod si ipa- *loco ligni me rudi*
- 15 tha palmaria defuerit, saligna rudicula commouet his potius, quàm radice cannæ, cui non exigua vis inest abstergerendi. Diuturnis maximisq; vlceribus, *saligna*
- 20 & quæ agrè cicatricem ducunt: Succi foliorum lilij vnc. quinque: mellis & aceti, ana vnc. i. coque ad crassitudinem: efficacissimè glutinat. Cochlearum *Cochlearum caro.*
- rum carnes cum thure, & myrrha tritæ neruorum vulnera. & alia quoque vniunt. Cruentis, fugilatis, excisis, quacunque corporis parte: vitiligini, lepræ, maculis & crustis auxilio est. Attractylidis effossæ cum radice & siccatae umbra, deinde trita, olei dulcis ana vnc. quatuor, Colophonix vnc.
- 25 13. ærug. vnc. 2. ceræ vnc. octo: liquabilia simul liquato: excolatis æruginem primùm: deinde attractylida commisceto, mixta in frigidam conficito, diu manibus versato ac per noctem frigida macerato: postridiè vsui reponito. Barbarum Gal. Ceræ, picis *Barbara. Recentiorum.*
- 30 resinæ, bituminis, thuris, ana vnc. septem. Aliud: Picis lib. i. bituminis, ceræ, ana selib. ammoniaci, manna, anna vnc. 3. ceruli, sesquunc. ol. drach. 18. aceti vn. 18. Aliud ad cruenta: Aerug. rasa, denarij. 12. litharg. denar. 20. aluminis, picis aridæ, resinæ, pini aridis ana denar. i. aceti, ol. ana vnc. 9. Plura primo & secundo de comp. medic. *κατὰ γένος.* Iam verò ad scribenda remedia posteriorum. Pulvis ruber ex *Pulvis ruber.*
- sanguine draconis, & sesquialtera ratione, vel duobus *pla*

544 Institut. Chirurgicalarum, Lib. VI.

pla thuris. Alij calcem, bolum Armenum, vel fantas-
 los commiscunt. Sunt, qui hoc modo cōficiant: Sym-
 phyti maioris, boli Armeni, ana vnc. i. picis Græcæ,
 vn. 3. mastiches, olibani, ana semun. sanguinis draco-
 mummiæ, ana drach. 2. Pulveres futuris inspergun-
 tur, vel in cerato imponuntur. Sanguinem draconis
Sanguis dra- colleticon variè conficiunt. Thus, mastichem, bolū.
conis. Arm. æqualiter mixta, hirci sanguine mactati Aus-
 gusto mense concorporant: alij aliter ex eadem mas-
 teria: quidam bolum Arm. terūt, efficiuntq; vt mul-
 tum forbeat sanguinis hircini, & forborū succi. Plin-
 ius forborum succo, & caprillo sanguine compin-
 git. In his omnibus providendum, ne supra modum
 contrahas: quod si metuitur, cerato pharmaca tēpe-
 rabis. Eidem Plin. & Solino sanguis est draconis, qui
 dum vulneratus elephas concidit, colliso casu draco-
 ne colligitur. Aërius ē succo herbæ Indicæ quā dra-
 conteam vocant, fingi credidit. Dracōtio nostro vis-
Viride Bo- inest glutinandi. Plantaginis vtriusq; cōsolidæ, bez-
nantini. tonicæ, verbenæ, pimpinellæ, pilosellæ, millefolij, lin-
 guæ canis, caudæ equinæ, ana manip. i. Conquassata
 coque cū lib. tribus sepi arietini: colatis adde resinæ,
 ceræ, galbani, ana quart. tres: sarcocollæ quart. i. tere-
 binth. quar. i. & semis. Liquata omnia miscentur.
E centauro. Centaurij minoris manip. 6. macerentur per noctem
 in vino albo: tū in eodē coquito, dū medium vinum
 consumptum sit: colatū succum iterū coquito ad
 mellis crassitudinē: postremò reponito: vsus tēpore
 accipito terebinth. lib. i. ceræ nouę quar. i. resinę, thu-
 ris, gummi Arab. mastiches ana vnc. i. succi prædicti
 vn. 3. lactis muliebri vn. 2. Fiat emplastrū. Betonicę,
Dini. cētaurij, ana manip. 2. coque, & cola vt prius: excola-
 to succo adde resinæ quar. i. terebinth. selibrā: sarco-
 collæ vn. i. cerę vn. 2. Liquata omnia bulliāt, acetum
 paulatim affundatur: vbi refrixerint, omnia mani-
Anserini. bus ē muliebri lacte cōuoluātur. Ceræ albę, resinæ,
 ana quart. i. olei vn. 2. terebinth. lotę, vn. i. thuris, ma-
 stiches, ana semūc. Fiat vnguēt. Pimpinellę, betonice
 cæ,

- cæ, melangiana, vel loco huius telephij, vel maioris
 semperuiui, verbenæ, vermicularis, aut potius sem-
 peruiui minoris, ana manipu. i. coquantur vino vt
 prius, dum duæ partes exhalauerint: & aliis similis
 5 ter percolentur, colatus succus iterum coquatur,
 tum adde resinæ lib. i. ceræ albæ felib. mastiches vnc.
 2. refrigerata vt prius è muliebri lacte subigantur. *Vng. glorie.*
 Aliud: Olei bedegaris lib. i. cere quar. i. seminis alba-
 rum rosarū semunc. Fiat vng. Ol. bedegaris finges,
 10 cymis bedegaris, aut si defit, attractylidos in ol. &
 vino nigro coctis, dum vinum expirauerit. Semen ro-
 sarū est, quod detractis foliis, & apicibus luteis, ex-
 cusso capite decidit. Chelidoniæ, panis cuculli, orz *Viride ex*
 mini, lybistici, scabiose, ana manip. i. sepi arietini li. i. *herbis.*
 15 ol. felib. ceræ, mastiches, thuris, aloës, ærugi ana vn. i.
 E vermibus nerosis partibus glutinandis, vtriusq; *E Vermibus*
 symphyti, cynoglossi, pilosellæ, vtriusque plantæ
 ginis, ana manip. i. vermium terrestrium lib. dimid.
 trita omnia macerentur septem dies in olei sesquilib.
 20 Deinde cocta leuiter excolentur: expresso succo mis-
 sce sepi arietini purgati lib. i. picis naualis felib. picis
 Græc. quart. i. ammoniaci, galbani, opopanacis, teres-
 binth. ana vnc. i. thuris mastiches, ana semunc. maces-
 rata pingua in aceto, & soluta cæteris vniantur.
 25 Lumbrici terræ per se triti, & impositi neruos glu- *Vermes ter-*
 tinant. His ergo vtendum, vt prius, constituto vlcere, *remi.*
 stupra, è vino rubro pressa super ponenda: hipoc-
 desmides, splenia, & reliqua lintea eodem vino in-
 succanda: ligandumque vulnus, vt contineas, refors-
 30 mes, cogas, quantum videlicet vlcus expostulat.

De pyroticis.

CAP. XI.



35

ὕδατα sunt ὑπόστασις, συνπαραμὲς, ποινυ-
 μὲς, καθαρὰ, πικρὰ, ἰσχυρὰ: Δρῶναι.
 ignis denique & inde cauteria. Dro-
 pacas picationes vertūt, non è ver-
 bo quidem, sed πικρὰ & πικρὰ ve-
 teres appellarūt, vnde Latina vox
 conuersa est. Alii etiam ὑποπαραμὲς è

M

Vfus.

Ματασθη-
κριτικα.

Γ-τὸς μ-στα.

Διπλωμα-
τα.

Modus.

pice, & quarta, vel quinta parte olei, quibus subde-
cuplum, plus minusve piperis, pyrethri, euphorbæ,
& similitum, misceri solet. Sic enim melius calfacit,
vt accepto sulphure, cinere sarmentorum, & sale
siccando magis conuenit. Nam & dropax, quicq; des-
scribêtur, sinapismus & phœnigmus, eo sunt vt res
frigerata calfaciant, cōfirmētq; partes, quæ partim
frigore, partim assidua fluxione elanguescunt. Alia
quidem possunt plurima: hic tamen præcipuus eos
rum vsus est, Et hæc in genere μετασθηκριτικα veteres
appellarunt. Alutæ dropax impingitur, vel linteis
complicatis, quæ πύσματα & διπλώματα Græci vo-
cant. Deglabratur cutis eraso pilo, dropacismus cas-
lens inducitur: idem subinde reuellitur, priusquam
refrigescat. Renouatur pharmacum, dum inde efflo-
rescat locus in ruborem, & leniter extumeat. Nimiū
est, cum morâ pharmaci subsidet tumor, & exalbes-
cit. Hoc enim volumus, vt dropacis ope reuocata
anima, pars velut inter mortua renouiscat, calorem
suum, ac spiritum recipiat, & iam proprio alimento
perfruat: postremò etiam corporetur, quæ confes-
câ macie intabuit: verū alia tardius, alia celerius
vitā recipit. Quæ breui rubet, & celeriter instaurat:
tardius quæ ægrè recalescit: desperatio est, quū neq;
frictione, neq; foru tepidæ, neq; dropace melius co-
loratur. Aliis satis fuerit, si tribus aut quatuor die-
bus adhibeatur dropax, nec assiduè quidem, sed bis
hyeme, semel æstate. Aliis bis tēue singulis diebus,
nōnunquā tertio, vel quarto quoque die, vt vides
licet vel facillè cedit, vel contumax languor est. Ac
tepidā prius fouisse confert: vel sinegmate affricasse,
quod aliquid thapsiæ, sinapi, euphorbæ, piperis, py-
rethri, capparis receperit. Quēd si affixus dropax
pertinaciū hæsit, tepidā diluendus est: quem quum
detraxeris, furfurum decocto, & similitum, partem
extergerbis. Sinapismus paralyticos, coxarios,
podagricos, inueterata rheumata, hemicranias,
quæque caloris inopiā languent, adiuvat. Caricæ

vno die aquâ macerandæ: aut cappares, si grauius *Materia.*
 malum est: vel si lenius, & acrior sensus est, panis
 triticeus: hicq; magis, cum in superficiem tantum
 agere oportet. Macerata tundenda sunt: lenis erit
 5. sinapisinus, qui subduplum sinapi seorsum triti
 acceperit: acrior, qui duplum: mediocris, in quo
 vtrunque ex æquo temperatum fuerit. At quo
 tempore pinsitur medicamentum, paulatim affun-
 denda aqua est, in qua illa maduerint. Sunt in ves-
 10. teribus, qui acetum præulerint: alij aquam, quod
 experimento didicerunt, sinapi vim aceto exolesces-
 re. Eodem modo, quo dropax, vsurpari debet. Si
 quis dolor, aut feruor à medicamento extiterit, tepis-
 dæ, vel rosacei fotu, illitu cerati rosacei: cerusa è ros-
 15. faceo trita, & aliis id genus extinguitur. Phœnis
 gmus rubore facto etiam vesicas mouet, & exuls *Phœnigmus*
 cerat: in eorum genere, quæ quia illita exuls
 cerant, vocantur *ἀποκτινὰ*. Ex nasturtio, sinapi, *ἀποκτινὰ*.
 20. radice helenij, bryonia, lepidij, columborum fi-
 mo, maximè syluestrium, caprillo stercore (vnde
διὰ κομπανίας) aceto pistis. Scilla trita, nu- *Materia.*
 cleis alij, & tunicis, lacte tithymalli, ficulis
 neo, pulegio, cantharide, vrtica, ranunculis,
 25. thapsia, euphorbio, sæce vsta, metallis acris
 bus, & aliis id genus: lana sordida bene cars-
 minata, & calente igne, assis carnibus, & ouis,
 dum vehementer calent, impositis. Visco,
 melle, axungia veteri, terebinthina, cerato,
 30. acrioribus, gummi, & resinis, vt res exigit,
 & corpora vel mollia vel dura sunt excipere
 oportet. Alias quoque friabilia affricantur: em-
 plastra verò imponuntur loco: hic prius palpat
 manibus, exercetur ferulis, aut ailerculis euerbes-
 35. ratur: affricatur etiam, vt laxatis spiraculis medica-
 menti virtus celerit penetrat. Anacardia trita *Mel anaca-*
 septem diebus macerant aceto: in eodem coquunt, *dium.*
 dum pars tertia euanescat: refrigerari sinunt: exci-
 piunt concha, quod enatat oleosum. Id mel anacar-

§48 Institut. Chirurgicarum, Lib. VI.

dinum est. Alij conuassant anacardos : sepeliunt melle, dum hoc vim anacardi satis conceperit. Fermentum aceto tinctum, anacardino melle, vel causticis rebus cōcorporatur. Puluisculus ē sinapi, piperis euphorbi, ana drach. vna infricatur : vel inspersus anacardino melli. Ita cerato ē thapsia, & aliis vtendū est. Breui mora rubor fit, deinde bullæ excitentur, vlcus etiam, si diutius insiterint : vesicæ confinguntur, humor exprimitur : relinquitur vlcus, dum vitium reddiderit : hac arte coxarū, podagrici, hemicranici sæpe releuantur : repurgantur viscera, sexcenta q̃ vitia percurantur. Cathæretica sunt q̃s vltimum non lotum, ærugo squama æris, & rubra magis : testa, & terra fumaria, testarum, concharum, & ranarum cinis, alia quoque in epuloticis descripta : hæc ferè in superficiem agunt, excrescentem carnem complanant, ac leniter radunt. Septica altius subeunt, tenellam carnem tabefaciunt calore multo, nec ita crasso corpore. Arsenicum : Sandarach, dryopteris, chrysocolia, pityocampe, aconitum, sanguis equi admiscarij. Escharotica vt nihilo plus caleant, rodunt tamen acrius, crassiore materia, quæ duris & callosis corporibus conueniunt, vt septa mollioribus. In escharoticis calx viua, vini fæx cremata, & aceti, quæ secundum mensem non superet. Nam quæ vetustior, exanimari solet : ignis denique & cauteria : vtriusque generis vsus est in callosis fistulis putrilaginosi, humore fluentibus, ac solutis vlcusculis. Escharoticis peculiariter vtimur in cancri, carbunculis, hæmorrhagiis : hinc frugalis vita, frigida liberaliter pota, vini abstinentia, alimenta refrigerantia, magis etiam si subest febricula, imperanda sunt. Septon, quod exest sine morfu : Sandarachæ, auripigmenti, ana drach. duæ : calcis viuæ, mannæ thuris, aristolochiæ, ana drachm. sex : pumicis, resinæ, ana drachmas quatuor : iridis drach. duæ : teruntur omnia. Arsenici libra vna : calcis viuæ drachmæ duæ : diebus triginta in aqua mersa tundere

Cathæretica

Septica.

Escharotica.

Vsus septonū
& escharoti-
corum.

Ratio vitæ
in vsu escha-
roticorum.

Septa.

tundere oportet, idq; in sole, & bis quotidie aquam commutare. Auripigmenti, sandarachæ, calcis viuæ pumicis, ana drach. quatuor: eodem modo mersa, tusa, & siccata vsurpantur. Squammæ æris drach. quatuor: sandarachæ drach. duæ: ellebori nigri, aluminis scissilis: vel auripig. ana dra ch. vna. Squammæ, sandarachæ auripigmen. ellebori nigri, seminis vrticæ torrefacti ana cum rosaceo tritis vtire.

Sandarachæ, aluminis scissilis, ana drachm. quatuor: auripig. squammæ ana drach. vna: in serpente vlcere, & humore fluido, vteris arido. In cancro, & struma, cum rosaceo subiges: bis in die cōmutatur. Atque hæc ferè materia septicorū est, quam exuras, eluas, cerato & aliis temperare possis. Elleboro

Elleborus.

magna vis inest contra callos: fistulæ iniectus, ad tertium diem callum adimit. Callus, dura quædam est, & compacta caro, vnde pars stupet, albicat nec expirat. *ἑκταλωτικὰ* sunt, quæ callos detrahunt. Op-
Callus quid
ἑκταλωτικὰ
κὰ.
Curatio cal
li.

pugnantur calli, primum quidem malacticis: deinde de causticis: postremo igne & ferro vnguibus eraduntur, lacerantur scalpris, excinduntur cultris ad viuum, & si quid reliquum sit, caustico remedio absumitur, vel candente ferro incutitur: sed fluxio reprimenda, prius quàm execetur callus. Exciso

callo tepida fouendum, tum abluendum aqua, vbi alumen disfluxerit. Repurgandum melle, & ærugine, si qua sordes extiterit. Esculotica sunt: scilicet la cocta, & cum calce trita: nitrum, sal torrefacta: fæx cremata veteris acrisque vini, vel aceti.

Materia.

cortex salicis vsus, & aceto pitus. Vsta calx cum pueri impubis vrina: ærugo mellis, salis, thuris aqua: liter mixta. Laser aut calx cerato irino vel ligustrino capta: Testa terræque furnaria, pumex crematus ex aceto, trita: nasturtij farina aqua subacta bdellium pingue cum melle: ammoniacum aceto fustum cum pari ærug. Radix lilij vsta in cinerē: ærugo cocta, lœuigata: amygdala è melle trita. Squammæ vnciam vnam æruginis drach. duæ: cerati lenis

tiscini, vel myrtini, vncia octo, plus minusue: harz
 pax cum modica ærugine. In hoc genere laudatur
 oleum lentiscinum, quia præterquam quòd mollit:
 & digerit, etiam adstringit repellitq: quibus omnis
 bus difficilia vlcera cum oris induratis egent. Tere-
 binthinum similiter & mastichinum quæq; similia
 sunt *εσχαρωτικά & στυπτικά* iisdem rebus quibus amy-
 ctica excipi possunt, visco & aliis. Satis profecille
 putes, cum suis marginibus vitiosum corpus à sano
 excellere. Quòd si sepius nihil effeceris, ad escharo-
 tica, ignem, & cauteria veniendum, atque omninò
 vis pro magnitudine & contumacia ulceris adhi-
 benda est. Escharotica ex septorum materia con-
 ficiuntur, sed vt firmior trahatur crusta, è metallicis acri-
 bus miscendum erit, quod sit crassa & adstringente
 potentia. Qualis est cadomia, chalcitis, chalcanthum,
 quæ per se cruda, trita, & salina hominis, vel aceto
 capta, crustam contrahunt. Eadem vsta leniora quid-
 dem, verùm escharotica. Septa miscentur, cum al-
 tius imprimenda crusta. Celerius operatur ignis, &
 melius si ægri perferunt. Atque is non vno modo
 adhibetur. Conceptus aqua feruida, ligneo tubulo,
 canali, penna scriptoria inducitur, extrema parte in
 æquabilem circulum circumscripta, quæ clauos ver-
 rucas, & similia, quæ vrere oportet, includat: altero
 extremo dehiscente, aqua feruēs, plumbum fusum,
 vitrum, & similia illiquantur: dum vim suam vna
 collabens ignis satis impresserit. Alioqui lana mol-
 lis, specilli nucleo alligata, feruente oleo vel butyro
 intingitur, atque ita imprimitur. Fortius est, si vel è
 vitreolo, vel antimonio, & vocato sublimato, aliisq;
 id genus, oleum fuerit extillatum. Quidam nucali
 testa, voluta cochleæ & oui vrunt posteaquàm igne
 incanduerint. Alij radice Aristolochiæ, gentianæ,
 struthij, ramento myrti, buxi, & similium, cauteria
 effingunt. Oportet igne cōtineri, dum extrema par-
 te carbunculent. Vstione Arabica veteres, vt
 pōstetiam recentiores, vsi sunt. Auro & argento les-

natis:

nius: are, & ferro acrius inurunt. Cassim punctim
 cauteria imprimuntur. adiguntur longius & latius,
 & in circulum circumferuntur: vno loco vel pluris
 bus: semel ac sepius: vt natura rerū partium & cor-
 5 porum sustinet, & vitia requirūt. Ex quo varię cau-
 teriorum formę affinguntur. Locum igni circum-
 scribere oportet, nicali testa vel re simili, quę suis
 marginibus contans pateat in medio: Cerato rosas-
 ceo: lana vino tincta muniendę sunt vicinę partes,
 10 ne iusto latius euadat ignis violentia. Alioqui sple-
 nis imbutis oui candido mucagine psylli: cerussa
 ē rhodostagmate lota, refrigeratę succo & iis oran-
 no quę ἀφλεγμαίνοντα Gręci vocant. Crusta non fra-
 15 tum detrahenda: sed nutare prius oportet, ac velus-
 ti maturitate sua excidere. Alioqui vis afferri solet
 profundum vlcus relinquitur: dolor fluxio, phle-
 gmonę irritantur. Tempestiua deduci potest buty-
 ro & rhodostagmate loto, farina tritici in porri vel
 20 rutę succo. Lenticula cocta & cum melle mixta, fo-
 lis oleastri cum melle litis, sulphure trito ex oleo,
 contusis nucum interaneis porri foliis salua tinctis,
 & in mollioribus lacte cum melle cocto: albo sterco
 re canino, cinere vstarum hirundinum, & minoris
 centaurij humano stercore siccato crematis cochlea-
 25 rum terrestrium carnibus. Chalcite trita & subtri-
 plo melle vel chalciteos vnc. i. iros semuncia per
 se tritis aut cum melle. Nutrito lithargyro cum vstu-
 lato butyro, radice anonidis: columbino stercore ē
 30 melle quod & carbunculos scarificat. In summa,
 abstergente & incidente materia, quę paregorico
 & molliente remedio temperari potest. Recentio-
 res chiurg. in septis numerant, stuppas canabinas,
 hermodactylos, bryonię radices, alumen vnguen-
 tum apostolorum. Et in carne dura & multa vis
 35 treoli genera & cuperosam quibus pro chalcantho
 & chalcite vti solent, æruginem. Vnguentū viri de
 Aegyptiaco: Troiscos ē viuę calcē vnc. quatuor
 tis & cum melle iunctis, sit autem mellis plus mis-

Que crusta
 detrahunt.

Recentia
 septa.

552 Institut. Chirurgicarum, Lib. VI.

Trocisci de calce. nūsve, vt sunt corpora. Trocisci capsula figulina ordine collocantur, ficcantur in clibano; puluis inde vtilis est. Succī radicis alphodeli vnc. 6. calcis viuæ vnc. 2. auripig. vnc. 1. arida succo mersa sub canicula insolentur, dū squalēāt. Calcē viuā modō melle modō saponē incorporāt. Cantharidū ventres ferments cogunt vel sapo: sed à cantharidibus vrinæ ardor metuitur: Nam & hæ illitę capiti id genus vitij inferre possunt, cui malo gargarismus & infusio è lacte succurrit. Eadem quoque parata è paregoricis. Septa adipe vel sebo excipiunt. In adipibus septicus est è ranis viridibus, quas in arboribus venantur. Quæ sequitur ex quinto de comp. pharm. *κατὰ γινω* transtulerūt: Malicorij drach. 10. Aristoloch. rotundæ, gallæ, drach. 8. aluminis scissilis, aloës ana drach. quatuor: myrrhę, chalcanti (vitreolum vertunt) drach. 2. thuris drach. 4. Exedunt sine morfu: Sandarachæ, id est, arsenici rubri, auripig. ana drach. 2. calcis viuæ, drach. 4. mannæ thuris tantundem: tritis vtitur: Sic enim Galenus. Recentiores hoc modo: Calcis viuæ lib. 1. auripigmenti rubri & citrini, alkali, acaciæ, ana. lib. dimid. trita vniuntur cum capitello. Est autem alkali, sal niger, quem è quercu, corylo, harundinis trunco, carbuncularis & aqua dulci vel marina coctis veteres fingeant: nunc è brassica marina, betis, & nitrosis rebus comparari potest. Alioqui torrefactum salem cum hydragyro, tandiu pistillo volutabis, dum sal nigrescat. Alij aliter alkali interpretantur. Capitellum ita fit: Calcis viuæ salis ammoniaci, ana lib. 1. trita subiungantur lixiuium è fabaceis scapis. Deponuntur olla quæ à fundo hiet angusta rima: aliud figlinum subicitur, in quod paulatim lixiuium diffluit, sed vas vtrunque statim initio defodi terra opus est, vbi septem dies persistet. Cathæreticon, septicon, & lene eschaorricon capitellum est. Alij tres partes cineris fabaceorum, vnā viūæ calcis, subinde perfundunt aqua, identidem conuoluunt, & per quaslibet

Lixiuii f. culneum.
escharoticon

- quasillum rarum transcolant. Rami ficulnei cremantur, cinis aqua maceratur, qui ubi in aqua vim suam demisit, exprimitur & abiicitur, nouus alioquoties reuocatur. Eodem modo è ramis tithymali & causticis cineribus lixiuium parari potest. In quo spongia subinde merfa apponitur. Alia capite de epuloticis: In humido ac sordido vlcere, pingui abstinentum: arida insperguntur. In calloso, & squalente malo arida pingui excepta adhibentur. Septica faciunt Arabes quæ à Græcis descripta sunt, & alterum genus relinquunt, quod humido calore cum foetore partes corrumpit. Quæ ex hydrargyro fiunt, præcipitatum, sublimatum cinabrium, braisicæ succo solani, limonum, & similium attemperant. Licet etiam, quod veteres faciunt, non tribus, sed triginta & quadraginta diebus terere in sole sub canicula, bis mutata aqua. Et ut sunt corpora & vitia ita magis minusve acria comparari possunt: nec lotura solum sed vstrina & mixtura diluuntur. *Minium* *quid sand*
 20 è micis metallicis è sterili gleba plumbi è cerussa vstra, quod alij sy ricon alij sandicen vocant ad epuloticam potius referendum. Quod vero è sulphure & *sy ricon* hydrargyro factitium est, in causticis censi debet. Vsurpant præter hæc, aquas fortes, & ut dicunt Alii *Aque fortes.*
 25 chymistarum. Salis ammoniaci, auripig. rubri & citrini, cuperosæ, æruginis ana trita in alembicum vitreum bene stripatum luto, & vnde quaque clausum deponantur, & ita extillentur lento igni, quod primum fluit, vel abiicitur, vel in alembicum repetitur. Ignis augetur duplo: quod secundo stillat, fideliter reponitur. Alij ex aluminis rotundi, vitreoli Romani ana lib. i. salis nitri aut si defuit crematæ fescis aceti sesquilibra aquam eliciunt, hæc callosis narturis idonea sunt, suspecta in naso labris palpebris
 30 digitis aut pudendis, mollibus atque exiguis partibus, ubi vena, neruus, arteria insignis est: ac primum quidem minimum sit, quod imponitur: deinde vt res exigui augeatur. Aliquando cerato ros

faceo, vnguento albo, dialthæas, & similibus mixta retunduntur: muniunt vicina: doloribus medentur vt prius.

De dolore.

CAP.

XII.



Accidunt multa vomitis & vulneribus, quorum remedia aliquot consperia locis: vt proximo capite contra callos: alio contra vermes, cancrofa putredines: & quæ rheumata intercipiât, præcidantq; phlegmonum causas, ac feruorem partium à phar-

macis extinguant: alia quoq; obiter annotata sunt. Iam de dolore & hæmorrhagia instituenda oratio, quæ vt plurimum curandi consilia inturbant. Itaque dolor omnino fit subita alteratione & solutione continui, cui quam celerrimè occurrèdū, nunquam enim committendum vt diutius crucietur æger, sic enim rheumata commouentur oriuntur phlegmone, labefaciuntur vires, conuulsiones rapiunt ægros, ac sæpe mortes. Et quod ad institutum maxime pertinet, vlcera inde madescere contingit: quæ sicca esse, seruata naturali ratione, & vacua excrementis necesse est: *Αναιδύνα* vocant & *παρρηγορητικά* quæ dolorem leniunt, tenui substantia primo gradu calida: vel ita temperata vt familiaritate elementorum, naturæ partium consentiant. Adde si vis, quæ qualitate contraria causam oppugnant, quale est oleum laurinum in refrigeratis, violaceum in calefactis, stecatis hydreiaum: humiditas nō tam qualitate quā copia dolorem facit. Ideoq; phlebotomia, catharticō clyster, & similia, quæ sublata copia dolorē tollunt, in hoc genere collocare licet. A calore, & frigore dolor acerrimus: à siccitate mediocris: ab humiditate propè nullus, vel stupidus excitari solet. Tertiū quoq; genus adiciūt, sed improprie eorū quæ stupefactio sensu dolori remedio sunt, quia quod doleat sentire necesse est, & extincto sensus dolor necessariò conquiescit *ναρκοτική* & *ιπνωτική* talia appel-

Causa doloris.

Αναιδύνα
& *παρρηγο-*
ρητικά.

2 Genus.

3 Genus.

De Materia chirurgica. 555

appellant. Anodyna sunt oleum dulce ætate me- *Olea.*
 dium, oleum Chamameli, oleum è lini & althææ
 semine, & è dulcibus amygdalinum, oleum lum-
 bricorum, vulpinum, melinum, è meli, è pullis cy-
 gni, extortum tritico candenti ferro, è sarmentis
 vitium, ex ovis pressum, Sambacinum. Sambuz-
 cinum, è floribus, & alia, de quibus postea. In
 quibus distinguenda, quæ non solum leniant dolo-
 rem, sed etiam causæ repugnant: quale est rosas-
 ceum, vbi à calore dolor est: aut à dolore commotus
 calor. Chamamelinum vbi leniendum simul acque
 discutiendum aliquid est. In anodynis sunt butyr- *Adipes.*
 rum, œsopus, lana benè succida, suillus adeps, vitulis
 nus, è cercopitheco, & simia, gallinaceus, arietinus,
 humanus, ex anguilla & cuniculis, vulpinus, meli-
 nus, asinus, lac muliebre, & vaccinum. Althææ,
 maluæ, seminis lini & cydoneorum. lilij, violariæ,
 pedum arietis, caput & interaneorum, hœdi si-
 militer decoctum, & hæc lacte coqui melius est, aut
 cocta lacte butyro condiri, vel conterî rosaceo. *Materia de-
coctorum.*
 Crocum, thus, mannam, galbanum & similia pharma-
 cis commiscant, vt quæ aliquid habeant quod pa-
 regoricon sit. Calorem temperat, & anodyna sunt.
 aqua tepida, oleum rosaceum, violaceum, nym-
 phæon, papauerinum, cucurbitinum, & quod è can-
 dido alterci semine, priuatim vsurpatum feruidis
 doloribus podagricorum: lactucinum, portulacinum,
 psyllinum, cucumerinum. Et ex horum oleorum *Olea anody-
na que refri-*
 materia succus ac muccago colligitur, vel eadem *gerant.*
 in lacte coquitur, ex conuenienti oleo subigitur:
 Lintheola in decocto merguntur, succo & muccag-
 ine imbuuntur, & ita iuuant. Ac subinde inculcas-
 re lintheola & auxilium repetere necesse est. Ceras-
 ra & enchrifa è cera alba lota, oleo conueniente,
 muccaginibus, cerussa, lota populeo vnguento &
 similibus confingi possunt. Dolores è frigore iu- *Contra do-
lores frigi-*
 uant, quæcunque ferè in anodymis numerata sunt, *dos.*
 oleum chamamelinum, anethinum, è leucio meliloto,

hyper

556 Institut. Chirurgicarum, Lib. VI.

hyperico lirinum, atque his magis è baccis lauri & iuniperi vino maceratis extunditur mola coxartis, & frigidis articulorum vitis. In lue venerea frigidus dolores iuuat galbanarium. Sulphurinum styracinum, in quo thus manna, & similia diffusa sunt & quod è nuce myrepica, incude & candenti ferro pressa extringitur. Sed eadem conquassata: vt & cinamonum oleo incoqui possunt: ita è calendula maiorana, roremarino & similibus parare licet. Irinum ex acori radicibus centaury, gentiana aristolochia bryonia, hyssopo, thymo, pulegio, vbi crassius humor impactus cruciat. Sinapinum cnidellaon, & alia id genus efficacissima sunt. Vino ferè & pari oleo materia coquitur: quæ pialo vel mola oleum non reddit. Cum iam vinum exhalauit, ea exprimitur, oleum reliquum vsui est. Terebinthinum oleum, è terebinthinæ lib. i. laterum antiquorum, vel vt Albucasis recentium: quia plus olei combibant, vnc. i. mastiches & styracis ana vnc. i. lateres igniti extinguuntur oleo: extincti tritiq; cæteris commiscuntur in Alembico vitreo: tres liquores effluant, quorum tertius est optimus. Flores rorismarini amphora vitrea duplici lintheo obstopata, deinde etiam cera includuntur: elicitur oleum calida arena, Chymicorum more. Oleum philosophorum Mesuæ petrelæon, & quod ex euphorbio. Contra flatum & dolores frigidus ventris atque vteri: quod sequitur plurimum facit: Olei anethini lib. i. sem. agni castri, seminis rutæ ana vnc. 3. cinnamomi vnc. 6. conquassata hæc 40. diebus insolentur mersa oleo vel lento igne incoquantur, fons è Chamamelino & meracovino calidus, dolores omnium partium corporis compescit. Egaryophillis oleum, & calamo aromatico efficacissimum est. Radix cucumeris agrestis in taleolas cæditur, cum absinthij cacumine hydrelæo coquitur, hinc fons & cataplasma hemicranii singulare. Erinaceus terrefris oleo & vino excoquitur, dum solum oleum reli

Ol. terebinthinum.

E floribus rorismarini.

reliquum sit : contra dolores articulorum. E sex vitellis assis, myrrhæ drachmæ dimid. ellebori nigri granis 4. oleum exprimunt singulare vlcerebus puerorum, callosis ac dolentibus vlcerebus labris, pustulis, trilaginosi ac vermiculantibus vitis & scabiei. Styracis pinguis vn. 2. vel eo plus in sesquilibra olei colliquantur in duritie dolente, addita octaua parte ellebori albi, scabiei conuenit. Agrippa & Marciato quidam vtuntur in frigidis doloribus. Vulgatum est, anodynon : mica panis soluta lacte vel incocta ex tribus vitellis oui & sesquuncia rosacei subigitur, cataplasma fit. Sit panis lib. 1. oua momento croci intingantur. In desperatis narcotica vsurpantur : vnguento rosato, & dialthæas
 15 aliquid populei vnguenti & opij commiscetur. Cerati rosacei vnc. 3. opij. drach. 1. castorei scrup. 2. vnguenti rosacei vnc. 1. terebinthi. vnc. dimid. colligatis adde opij scrup. 1. croci grana 4. Aliquid etiam Philonij scriptis vnguentis & ceratis misce
 20 re licet. Oleum in quo viua torpedo coxerit, narcoticum est. Dialthæa vnc. 2. galbani semuncia, opij scrup. 2. croci grana. 6. Grauiissimis quibusque doloribus singulari ope succurrit, ex aduersa parte detractus sanguis, quem statim initio minuere melius est : Sic enim præciduntur malorum causæ, &
 25 quæ nocent vulneribus omnia ferè sanguinis vitio commouentur, dolor, phlegmone, gangræna, syderatio. Multò magis, si affecta parte venæ sunt insignes, quæ oppressæ copia dolorem cient : postea
 30 ea verò cum non expirent, gangrænam pariunt & ἀσκήλον, id est syderationem : hoc vitium corruptela est, primam quidem ossium, deinde partium reliquarum : cui periculo phlebotomo occurrendum, atque etiam cultello scarificandus locus
 35 cus est, vt leuatus onere & vitio, ad spiritum liberè attollatur. Cucurbitula quoque ad hanc rem
 saepe contulit, de qua seorsum à nobis libellus editus est.

Phlebot.

Scarificatio.

Cucurbitula.



Apertis.

On solum è recenti, sed & inueterato vlcere sanguis effluit, apertis, ruptis, exesis vasis. Et ex arteria hæmorrhagia periculosior: deinde maioribus venis, quæ plus sanguinis effundunt, quas inde *αἱμορρῆς* vocauit Hippocrates. Ap-

ertis astringentia: ruptis, glutinantia: exesis, sarconica, & boni succi alimenta remedio sunt. Aperta simul & rupta iuuat plātago, balauſtia, hypocisthis, rhus, omphacium, galla deflagrans & vino vel aceto tineta, acacia, malicorium, symphyti radix, porrū confusum, polygonon, peruinca, terra sigillata & figlina, bolus Armenus, rhabarbari magna, rubigo ferri, lapis hæmatites, passæ vix nucleus, gallæ flos, laseugo quæ cotoneo & mascula salice infidet, quæ in ea peniculæ dependent, fraga herba, cynosbatus, aqua frigida, vinum astringens, acetum, oxycratum, & alia quæ in epuloricis, glutinantibus, & repellen-

Ruptis.

tibus antea descripta sunt. Peculiariter ruptis conueniunt, thus, manna, aloë, mastiche, tragacatha, amyglum, gummi, glutinum, larina, terebinthina, pix ficca, colophonía, gypſum, farina pistrinalis, cochlea cum domo trita: horum alia in puluerem com-

Vtèd: ratio.

minuta insperguntur: meliora ferè emplastica, ideoq; in oui candido, resina liquida, conueniente succo imponi debent. Linamenta, pili leporis, lanugo illa fascicis & cotonei succis liquidis inculcantur, atque inde penicillus aut vermiculus pharmaco madè hiantivatorum ori inseritur: floccus ex eadem materia & pharmaco saturatus superdatur, ligaturq; commodè, iniectis vasi modò tribus, modò quatuor fasciarum orbibus, ad eam partem vnde profluit sanguis, ex quo fascia radicem versus paulatim adduci debet, vt sursum versus magis magisque stringas atque illabentem sanguinem reprimas. Tertia die res-

sol

soluenda linthea sunt, neque commutanda linamenta, flocci, vermiculi, siquidem firmiter inhaerent, sed tantum irriganda pharmaco, ac ut prius colliganda. Quod si vacillant, digitus vasi imprimendus, reuellenda turunda, & reliqua tum noua ut prius omnia repetenda, eademque ex praescripto vincienda sunt, idque tandiu reuocandum, dum renata carne, ac bene stypto vase, extra periculum omnia videantur. Aliquando vero ubi in superficiali vasa exponuntur, digitus impressus haemorrhagiam sistit, coacto grumo. Quae si in profundo latent, nec facile digito continguntur, hamo prehendere, leniter intorquere & laqueo interciperi oportet. Nonnunquam volfella capta vtrinque *Ferrum.*
 15 quae funiculo illaqueantur, & media praeciduntur, ut extrema in se reuulsa coeant. Id vero in maioribus vasis non caret periculo. Desperatis aliis *Ignis.*
 auxiliis, ad ignem & cauteria veniendum, multo magis si quid putre, vermiculosum, serpens,
 20 rodens: si eiusmodi locus est qui facile compustrescat, qualis est sedes, os, & genitalia, quique vim ignis sine periculo sustineat. Escharotica hoc *Escharotica.*
 loco vehementius contrahere oportet, ut firmam *Phlebot.*
 nec deciduam crustam efficiant. Alioqui maior *Cucurbit.*
 25 vis sanguinis erumpet, ante tempus resoluta cruetur. In remediis laudantur phlebotomia, cucurbitula, sanguisuga, vincula aduersa parte & *Sanguisuga.*
 iuxta *inducuntur* reuellendo adhibita, & constringens epidesis. Cucurbitulae ratio ex libello nostro repetenda. De phlebotomia & sanguisugis alio quod
 30 paramus, opere differemus. Purgatio saepe necessaria, sed tardius opitulatur: his ferè remediis materiae cursus retrahitur: quanquam non temere renitendum sanguini: quia ex omni vulnere
 35 nisi sit in ventre, crebro sanguinem fluere utile est: *Aut.*
 Autore Hippocrate. Tempellius ergo supprime, iuxta ratione leuato corpore: ut inde siccius effectum vlcus celerius possit coalescere. Ac fortasse *vsus refrig.*
 tutius *tantum.*

tutius fuerit vlcus emplasticis obſtypare: frigidis & astringentibus medicamentis vias intercipere, quâ sanguis decurrit. Frigidum enim & astringens vlceribus mordax. Et in iis frigidum vtendum, vnde fluit sanguis vel fluxurus eſt, non ad ipſa, ſed circa ipſa inquit Hippocrates. Aliæ quoque partes, vt thorax & quæ neruaceę ſunt, frigido læduntur magis. Ideoq; iam auerſa materia, neque etiam locis omnibus frigida adhibere conuenit. Columbæ sanguis peculiariter reprimi hæmorrhagias eſt membranæ cerebri. Memorabile remedium eſt quod ſequitur: Spongia noua, alioqui vetus, ſed marina vel lixiuio quærno repurgata, acerrimo aceto inebriatur, tum inquitatur liquefacta pice, deinde trito bitumine, galla, vel re ſimili conſpergitur, atque ita crematur reſta ſingulari clauſa, dum cinereſcat. Alij aceſi loco, taurino ſanguine imbuunt, ex odore vino propinant ſingulari ope dyſenteris, menſtruis, & alijs hæmorrhagijs. Emplaſtra ſunt, gypſum crudum, gyris, ſi oui candido excipias: Thuris partes due, aloës pars vna, vel eo plus in duriore natura: Loco thuris uſurpatur manna, vt quæ melius astringat, ſed thus *ἰμπλάσις κώτερον* pharmacum reddit: conſcorporantur liquore oui: vermiculus eſt molliſſimis pilis leporis medicamento intingitur, & ſi fuerit opus, dehiſcenti vaſi immittitur. Ex iſdem pilis conficitur floccus qui eodem pharmaco imbuitur: atque imponitur cauo, vt incumbat vermiculo. Eunuchus eſt manu ſumma profluens ſanguis eo pharmacum non reſtitit: qui deinde linamentis ex dilutiſſimo oxycrato preſſis omninò conquieuit. Loco pilorum leporis, linoxylo quod vocatur *cotton*, & memorata lanugine bene depexa atque carminata vtilicebit. In eroſione vbi vniuerſo corpori conſulueris, nec aliter mederi datum eſt: veniendum ad paſtillos Andronis, Paſionis, Polydæ, ex lib. s. de comp. phar. κατὰ γένον. In vehementi hæmorrhagia primùm quidem validè astringentibus

Spongia.

vermiculus

Historia.

In eroſione.

tibus materiæ impetus retundi debet, quibus paulatim pastilli commiscentur, postremò solis pastillis ^{Vfus pastillorum.} vtendum erit, ^{τοχαίμα} veterum. Chalcitidis drach. 16. ^{τοχαίμα.} alij 8. manna drachm. 12. alij 16. terebinthina fricta & ^{Escharotice.} aceto extincta drach. 12. Chalcitidis drach. 6. manna dra. 2. tereb. colophoniz ana dra. 4. Mirabile Chalcitis, resina ana drach. 8. manna drach. 16. infriata ænea pyxidicula reponuntur, vñs tempore par pondus gypsi commiscetur. Adduntur his ad crustas, Chalcanthum, misy, auripigmentum, sandaracha, calx viua. Debilior crusta est à calcè viua & auripigmento, nisi astringenti materiæ coniungantur, ferrum candens, æs, aurum, & argentum cauteria sunt: sed ab auro & argento mollior eschara relinquitur. Celes-
 rius auxilium à ferreo, cauterio percipitur. E subere vel spongia orbiculus tenuis feruida pice immergitur, & ita calens impingitur. Alij malicorio, galla, radicibus astringentis prius ignitis. crustas efficiunt. Recentiorum escharotica sunt. Vitreoli Romani ses-
 20 muncia, balaustiorum vnc. 3. aluminis vnc. 1. fiat puluis. Colophoniz vnc. 3. boli armeni sesquincia: mastiches, olibani, sanguinis draconis, ana semuncia: radicis symphiti, rosarum, ana drach. 1. vtuntur puluere rubro, sanguine draconis, & aliis, de quibus antea: ac plura escharotica ex proximo capite repetenda. Adhibitis remediis membrum ita collocari debet, vt altior sit locus, vnde Hamorrhagia, reliquâ venâ, quæ radici, proprior est: vt veluti de-
 cliui quasi vase deorsum, sanguis refluat. Sic mebrum
 30 in quiete, & ea figura situm, quæ dolorem non affert: ac mitella confirmare manus, & puluino crura melius est: æger quoque aduersa parte decumbat, instituatur vita vnde sanguis acquiescat, aqua potus, & similia. Interdicatur iis vnde effertur
 35 uescat, qualia vina quædam sunt fortia, & calida alimenta.

De virili materia in vitijis ossium.

CAP. XIIII.

*Celeriter
medicandum
ossibus.*

Vitiis quæ ossa fecerint, eodem ferè momento succurrere oportet. Alioqui phlegmone succenditur quæ sanie facit, agit cuniculos vlceris dispergit, aita, exesa, & curanda motis *ιμύβρους* inde vocat Hippocrates. Ex quo denigrantur ossa, carie inducunt, & syderationem contrahunt. Laborant fracta, collisa, fissa, forata ossa, & mota articulis. Accessio mali est: si cum vulnere læsa sunt, multo magis in articulis, ubi nerui tendines nuda carne & ossæa loca sunt, in quæ laxa & commota excrementa corporis coire solent. Adde quod ibi charitago quædam est, in qua cicatrix firmari nequit: hic ergo asperior casus, dolor, vigilia, conuulsio, deliria, sæpè numero commouentur. Atque ut maior articulus est, ita grauius periculum creare solet. Verum non alia parte ditior supellex veteris disciplinæ: nusquam hæc curiosa magis, quam in ossium medelis. Infinita propè reperit & literis tradidit, quædam etiam autoritate principum, ære publico in ciuitatibus extruxit, quæ ad hanc curam ossium pertinerent: ferramenta varia, cauteria, excisorios cultros, scalpra rasoria, limas, specilla, aliquot terebrarum genera, modiolos, forfices, *ἰκνιγγοκυλάκας*, volsellas, scalas, scamnæ, repagula, vectes, canales, glossocomia, spheria, stathmia, trochiscos, pennas, inceratos canaliculos, fistulas, setas, fila bysso & auro texta, alia quoque plurima, quæ ad purganda, tendenda, reformanda, constituenda denique ossa facerent. Et in vna deligandi arte quàm plurima vsu diuersa suis etiam nominibus veteres distinxerunt: lintheola, fascias hypodesmidas, splenæia, apodesmos, regulas, ferulas, spathulas, habenas, laqueos, mitellas, puluinos modò scorteos modò molliusculos, nodos, acus, acias, & alia sexcenta: quorum multa quidem retenta, alia antiquata, quedam

*Vitia in articulis.**Multiplex
materia mechanica.**In deligendo
quæ multa.*

dam deserta, quia videlicet multis in rebus facilior,
nec tam operosa cura inuenta est. Corruptum os *Cōpēdiaria*
ad viam scobem elimandum, exterebrandum, *curatio ma*
inurendum, excidendum, etiam vt asperum, maium *tena.*
5 est. Atque hic medicamentis opus est, quæ vehes-
menter siccent: quorum materia capite de purgan-
tibus pharmacis & epuloticis instituta est. Nec
antē vias claudere oportet, quæ ad læsa ossa perti-
nent, quàm hæc omni carie, nigredine, sorde, corros-
10 prela sedulo purgata sint. Quin & præclusum *Aperta sit*
iter vel angustum, ferro ampliare necesse est, spon- *Via ad os.*
giæque aut penicillo implendum cauum, vt ne
coëat, sed dehiscat vulnus, dum vel integendum
carne, vel ferruminandum callo bene purum os
15 & iam incolume, videatur. In altis cuniculis,
spongia, linamenta, penicilli summa parte deum-
cta sint filo, quod foras propendeat, vt illa facilè
reducantur. Videndum quoque priusquàm im-
pleas ne qua squamma, vel fragmentum excesses-
20 rit, quæ scilicet ossi suo coaptanda sunt, aut si acus
mine carnem subintrant, molliter præcidere opor-
tet, verùm incolumi radice aliqui elimanda scal-
pro. Quòd si nihil molestiæ adferunt, verùm non *Squamma.*
possunt ossi suo compingi: in horum altero consi-
25 lium est. Nam vel medicamentis detrahes vel per-
mittes dum veluti maturitate quadam & sponte
sua excidant. Ita enim os celeriter carnem indus-
cet, vel callum contrahet: ex quo medicamentis,
quæ mediocriter siccent, vel adstringant, *cicatr*
30 ce operies. // Quæ verò squammæ, antè maturi- *Que squamæ*
ratem rapiuntur ferro, aut vi reuelluntur, fistulas *non detra-*
agré sanabiles relinquunt. *bunt.* Ommino ergo decli-
nanda vis est. Squammas detrahunt medica-
35 menta, tam superius capite de glutinantibus mes-
morata, tum crucæ radix, cucumeris agrestis,
vtriusque bryoniæ. Aristolochia peculiariter
elicit testulas caluariæ. In abscessu paruo ossium *Abscessus.*

deligatio *καταγματική* idonea est, sed paulò laxior, & sine ferulis. In magno non est deligandum *καταγματικῶς*. Satisfaciunt splenia, insuccata vino nigro, subaustero, quæ deinceps atque continenter, hinc inde adhibenda sunt, non ut hoc illi infideat.

Splenes magnorum abscessuum.

Longiores sunt quàm quæ solum ambitum membri comprehendant: nam si quadrantalibus esse oportet. Obliquè inseruntur membro, & aduersa parte decussant. Sanantur vlcera aliis similiter: nisi quòd ossa magis siccantia desiderant, & quæ continenter ossibus generatur caro, ut est paulò ficior, ita magis siccantibus pharmacis gaudet: ut verò ducenda carne ab ossibus recedis, ita vis siccantium tēperanda est, donec iā cicatrix trahenda sit. Ac carne ossa tegere sæpenumero opus est, ubi callum cogere non licet, nimium dissidentibus fracturæ labris, & ubi in circulum os excisum est: verum è callo multò stabilius vinculum est. In fractis ossibus & luxatis multarum rerum cura est: ac circa initia omnino prohibenda fluxio, dolor, inflammatio. Os ergo quod vel abiit loco, vel fractum dissidet, omnino constituere oportet: deinde ita continere ut ne excidat. In quo hæc sunt præcipuè *τάσις, διάπλασις, ἐπίθεσις, ἀποθεσις* vel *ὑπόθεσις*. Extenditur membrum, ut diductis

τάσις.

& adductis marginibus soluti ossis oris molliter cōsuescāt, nihil exasperetur, nihil diffingatur, quod in fracturis denticulatis, scabris ac serratis sæpe contingit. Videndum quoque, ne in distentione nervus, vena, arteria, musculus, contra naturam extorqueatur. Extensum membrum & loco redditum, manibus palpari, tractari, atque legitime conformari debet: *διάπλασις* appellant. Quòd si tractatum, tensum non constituitur os, ad *μοχλίας*, lorum, habenas, & machinas eiusmodi veniendum erit. Sequitur

Διάπλασις,

ἐπίθεσις, καταγματική.

ἐπίθεσις quam *καταγματικήν* appellant: in qua multorum prouidentia est, sed maximè, ut contineas, phlegmonem arceas procures callum. Ac primum


mam an sit deligandum, statuere oportet: tum
 quæ deligandi forma, ac ferè *ἀπὸ τοῦ ἀρχαίου* varia tas
 men ratione: ex quo decernendum, quibus, quàm
 multis longis latis, quàm deniq; firmis fasciis opus
 sit. Adhuc idonea forma lintheis quærenda est. Cos
 gnoscendum præterea vnde primum iniicias, quæ
 sit futura progressio, quàm multi & quales circuli,
 quomodo distinguendi orbes, quibus intervalis,
 vbi & quando laxior vel astrictior deligatio, qua
 10 parte desinat, quo loco, & qua arte nectantur nodi
 acia figantur conducantur habenæ, quando regu
 læ, ferulæ, pulvinaria, mitellæ adhibenda sint: quâs
 diu continere omnia, & quando solvere oporteat.
 Atque in sano membro probanda prius deligatio,

25 quàm in ægro periculum facias. Postremò prouis
 dendum, vt in ea figura collocetur pars, in qua diu
 rissimè cõstare possit, & minimè doleat. Iustos hæc
 commentarios desiderant, verùm hæc breuiter, nec
 tam docendi, quàm monendi causa dicta fuerint.

30 In fasciis remedia adhibentur quæ repellant, & mas
 dorem scissilium lintheorum contineant: sic enim
 prohibetur dolor atque inflammatio: fasciæ initio
 plures & astrictiores, si neque dolor neq; phlegmo
 ne, vulnus vel aliquid tale prohibeat. Ac ferè in
 25 ebriantur vino crasso nigro, modicè austero: vinum
 hoc superficiem cogit, vim suam ad repellendum al
 tius imprimit, & ita præcidit inflammationum cau
 sas. Quòd nimium stringit, dolorem excitat.

Tenue, album, giluum, fuluum etiam si contrahat
 30 repudiandum tamen est, vt reprimentium genus
 quod humectat, papauer, cicuta, mandragora, mul
to magis si in articulis & neruaceis partibus labor
est. Nec enim qualitas sola: sed horum etiam cor
 pus intrò penetrat & neruosa ladic. Atque inde
 35 calor qui regit corpus, interdum extinguitur.

Vino igitur crasso, nigro, modicè austero fasciæ
 & splenes saturandi sunt. Minister adsit, qui sub
 inde affuso vino ligamenta compluat: alioqui cum



*Que in fa-
 sciis repel-
 lunt.*

*Vinum quæ
 le.*

Vitanda.

Oculorum.

periculo resiccantur, quod ne fiat noctu, præcipue
 providendum erit: hyeme vini loco œnelæo vti sa-
 tius est, quo etiam tempore succida lana splenibus
 præferri debet: fumoso vino & odore abstinens

Oui candi- dum, ne caput feriat. Iustum quoque insuccandis
dum cū ro- lintheis medicamentum ex oui candido, oleo rosas
saceo. ceo vel myrrino. Alij aceto & oxelæo contra phles-

Acetum. gmonem fascias imbuunt. Detur id bene carnosâ
 parte & sine vlcere. Ceratum album in vsu est, sus-
 specta ministri diligentia, ne videlicet linthea inares-

Ceratum al- scant: quod vino quidem minus efficax, repellit ta-
bum. men & phlegmonem inhibet. Verum cerato vti
 post initia satius est, iam abeunte periculo inflam-

mationis, & vbi fractura simplex, nec in fragmen-
 ta varia contritum os est. Cerato ergo pars ægra,
 fasciæ, & splenes illinenda sunt, adhæc extremæ
 partes, sed manus præcipue, ne quod deligatione
 extringitur, infirmum scilicet frigidumq; corpus
 imbibat: Ceratum κατὰ γυναικῶν è cera pingui & du-
 plo oleo conficitur, oleum sit recens rhodinon vel

Ceratum pi- litur. Picato veteres vsi sunt si quid contusum es-
catum. set, si quid coquendum atque mitigandum. Liqui-
 diori cerato albo pix addita picatum facit. Omnia
 verò lenia sint & mollia ne asperitate lædant: vites

Perfusiones. tur pondus, quod callum prohibeat & partem op-
 primat. Perfusiones fiunt ex aqua tepida, ita calor
 re temperata vt in qua manum iucundè contineas:
 In frigidibus hydrelæum melius est. Perfunditur
 pars tertio ac quinto die, quoties videlicet linthea
 dissoluuntur, idq; liberaliter vt inde prurigo ac-
 quiescat, & materia eius dispergatur. In articulis res-
 pida, tensa relaxat, lenit dolentia, & phlegmonē ad-
 uersatur. Septimo die vel nono iam affunditur, nō

Περσους. vt discutiat, sed vt euocet sanguinem vnde concre-
Περσικὰ. to poro ossa conserantur (περσους Græcè vocant,
 & inde περσικὰ quæ callum gignant.) Callus ne-
 que caro est neque os, sed inter vtrumque ambigit.

Itaq;

Itaque deposito metu inflammationis, circa hoc tempus omnino cogitandum, vt coëat porus, vnde effracta solidantur: sic ergo moderanda perfusio, vt inde pars viuido colore efflorescat, & leniter attollatur: ^{Alimenta.} nimium est, si subsidet & pallorem ducit. Alimenta sunt, quæ probum sanguinem, multum, crassum, viscidum & creent. Panis triticeus est farina primaria: triticum legatur graue densum, vnde pituita comparatur: charta laginea animalium partes, neruaceæ cutaceæ & pingues, ligamēta, tendines, petioli, ventres, linguæ, rostra: capita hædorum, veruecum, & porcellorum, agnina caro & suilla, palmulæ pingues, castaneæ, vinum stringens, & similia. ^{Medicamenta.} Medica-
¹⁰ menta sunt emplastica, quæ modicè calfaciant è gy-
¹⁵ ri, ^{ta.} similia, thure, manna, gummi, fabrilī glutine, mastiche, tragacantha, liquore oui, pingui cera, oleo, lachrymis & succis, quibus emplasticum nec ita calens corpus est. Ac iam antea de catagmaticis, & cephalicis fermo habitus est: sed hic quoque ea materia locupletanda est. ^{Caninum cerebrum.} Caninum cerebrum in lintheo
²⁰ adhibetur: superdatur lana inculcata oui candido: vbi squalescit remedium, commutari debet: quatuordecim diebus solidat. Aliis purgatur hybiscus
²⁵ dix, atque hinc medulla eraditur, quæ per se farinæ tritici mixta liquori oui, effracta iungit. Radix hæc aquæ indita & sub dio posita: aquam cogit. Musco viticis vtuntur veterinarij: alij quernum præferunt. In honore est veteri exemplo, quam conseruam vocant. ^{Conserua.} Muscus est densus, herbaceus, spongiosus, ^{quid sit Historia.}
³⁰ herens aquatilibus petris. Putator quidam ex alta arbore deciderat: omnibus ferè ossibus confractis: præsto aderant amici, qui corpus eius vniuersum eo musco obligarunt: atque ita relatum domum in quiete tenuerunt, subinde conspersa aqua, ne muscus emarcesceret. Raro nec nisi deficiente herba remedium mutatum est. Atque hac medela vix credibili celeritate conualuit. Aestate, bene carnosio duroq; corpore, recenti malo, exime

568 Institut. Chirurgicarum, Lib. VI.

plum vetus liceat imitari. Farinæ triticeæ vnc. 6. sanguinis draconis, mastiches, thuris, sarcocollæ ana. vnc. i. trita hæc cum farina & oui candido subiguntur. Triticea farina, gummi, & manna incoquantur aqua: fit cataplasma, quod reprimat, continet, & peritonæon generat. Exiguæ partibus effractis, pelliculæ affiguntur illitæ gummi & fabrilis glutine. Canaliculi afformantur cauis, emplastro inducitur: ut & contineant, solident. Fuligo thuris liquori oui & farinæ tritici coniungitur. Emplasta quæ peritæ 10

Panalithes.

Panalithes nacijs hærent, repida foris reuelluntur. *Panalithes* ad contusa fracta etiam cum vulnere, vulnera nervorum, vertebrarum, purgandas collectiones, incisum scrotum, bestiarum etiam venenatarum morsus, & alia. Olei dulcis, vnc. 9. bituminis ceræ, resinæ piceæ, picis aridæ ana lib. i. litharg. cerussæ, æruginis ana drach. 10. thuris, ammoniaci myrrhæ, aloës, ana drach. 8. opij, succi pomorum mandragoræ ana drach. 6. aluminis scissilis, chalcanti, chalcitidis, croci ana drach. 4. aceti, quod sufficit. Omnia à litharg. ad crocum in puluerem trita, & affusa conducuntur mortario, ut sit luti crassitudo: oleum, cera, bitumen in fabiles pillulas diuisum nihil versando colliquantur: liquatis pix & resinæ ammiscentur, colantur omnia, atque recoquantur. 25

Aegyptium Andromachæ.

Aegyptium Andromachæ, eadem potest, mollit, ac maligna operit. Ceræ, litharg. ana vnc. 5. & semis, ammoniaci vnc. 7. & drach. 6. terebinth. vnc. 4. succidæ lanæ vstæ, vnc. 2. & drach. 2. Aristolochiæ, thuris, squamarum æris & stomomaris, id est, perperugati ferri ana vnc. i. myrrhæ drach. 3. opoponacis drach. 2. ol. ricinini, sicyonij, vel antiqui lib. 3. litharg. oleo coquitur, dum concrescar: squamma iniicitur: ubi non inquinant: cera & ammoniac. exactissime tusum imponuntur: liquatis terebinthini. additur: sublatis igne thus, & lanarum cinis insperguntur: refrigerata manibus subiguntur. 35

Nigrum Asclepi.

Nigrum Asclepiadæ mirabiliter vnit laxata & contra fracta

fracta. Litharg. vnc. 8. bituminis vnc. 6. ceræ, pi-
 cis, ana vnc. 3. resinæ picæ sesquuncia aluminis pro-
 poleos ana vnc. 1. ammoniaci drach. 6. æruginis
 drach. 2. & semis. ol. quod suffi. In oleo litharg. co-
 5 quitur dum non contaminet: cera & bitumen teors-
 sum liquefcunt, neque commouentur: his pix ad-
 iungitur: traiecta colo omnia, lythargyro coctæ
 vniuntur: ammoniacum vehementer tulum immittit-
 10 titur atque ita in solidum corpus omnia conco-
 quantur, hic præmollita cera & propolis coniun-
 guntur: vbi coierint probè & igne decesserint, alu-
 men & ærugo in pollinem trita insperguntur: vers-
 fantur omnia & oxycrato mersa manibus subiguntur. *Moschionis.*
 Litharg. vnc. 3. picis
 15 aridæ, adipis vituli, ana vnc. 20. teribinth. mannæ
 ana vnc. 10. ceræ vnc. 5. æruginis, opopanacis, gals-
 bani, ana vnc. 1. picis liquidæ selibra: aceti, succi
 mororum, olei ricinini ana lib. 1. litharg. oleo co-
 quitur, vbi efferbuerit, adeps inficitur: iam non
 20 inquinantibus, cera & pix immittuntur, mororū
 succus cum pice liquida seorsum coquitur, cocta
 hæc aliis permiscetur: Subductis igni manna &
 ærugo in puluerem resoluta insperguntur: opopa-
 nax, aceto fufus coniungitur: confectum phar-
 25 macum vino in tertium diem maceratur, & ma-
 nibus pistum sedulo reponitur: vsus tempore tho-
 rulum madentem vino, vel fasciam superponere
 oportet. Alutæ intenditur vel duplo rosaceo di-
 lutum non aliter quàm ceratum album in fasciis
 30 ac plagulis vsurpatur, nam & fracturas conserit,
 vlcera coniungit & phlegmonæ aduersatur.
 Concreti calli signum est, quum iam sine vulnere
 exudat sanguis, qui linthea contaminet. Id ferè
 fit criticis diebus. 14. & aliis. Conueniens callus
 35 est, qui neque maior neque minor, durior aut mol-
 lior quàm oportet, neque distortus est. Iustus cal-
 lus confirmari debet medicamentis quæ *traiqua* voc-
 cant, quæq; cruentis vulneribus adhibentur.

570 Institut. Chirurgicarum, Lib. VI.

Que calli firmant. Siccant leniter, & callum mediocriter confirmant. Ac de en^{em}is multa capite de glutinantibus.

Perfusio. Græci, Latini falsum & marinum vocant, quod ^{παραλασσομινον & θαλάττιον} si deficit, salem vino liquefcere oportet. Rosæ bals^{am} laustria, myrra, muscus è quercu albus, absyn^{thium} & alia vino incoquantur. Addunt paros^{ticis} quæ callum contrahant bolum Armenum, galbulos cupressi & alia. Sed hic moderatio quæ^{dam} adhibenda est: ne nimium stringendo callum ¹⁰ supra modum atteras. Confirmant paron: Ros^{facei} vnc. 4. resinæ vnc. 3. ceræ vnc. 2. colophon, mastiches, thuris ana semuncia, coni cupressi, rad^{icis} rubiæ maioris ana drach. 1. Melius fiet auctis^{emplasticis}, minuto oleo & adiecto momento cro^{ci} ¹⁵ Thuris mastiches, picis, farinæ pistrinalis, boli Armeni ana vnc. 2. sepi arietini, ceræ albæ ana selibra: Liquefactus cera & sepo reliqua infrian^{tur}: In his lintheum sæpius inculcatum fracturæ ²⁰ imponitur. Sparadrapum vocant. Utuntur Apo^{stolico}, oxycroceo, & aliis. Arque hic meminisse oportet instituenda esse callosis corporibus que^{magis} contrahant: mollioribus autem: quæ id me^{diocriter} præstent. Callus maior extenuandus ²⁵ est: deducta parte alimenti & mutata qualitate. Diu lenitèrque affricanda pars est, ex oleo, sale, nitro. Eademq; calida salsa foueri debet, indus^{cisq;} malagmatis quæ discutiant. Colligandum ar^{ctius}: oleribus vtendum & vomitu. Alterum ³⁰ membrum sinapismo linere oportet, vt eo diuer^{tat} alimentum. Paulus in recenti callo qui sus^{percreuit} vehementer stringentia instituit, arctis^{sime} ligat, lamina plumbea interdum apposita. In eo verò qui iam vetustate induruit, & vnde ³⁵ pudendum ac deforme membrum est, neque offi^{cium} facit, cutem aperit, deradit paron, lacerat scalpro, terebra pertundit, & quantum superest execat. Quòd si nulla inde actio naturæ in^{terci}

tercipitur neque conspicuus membri pudor est,
 nullus denique dolor, præstat abstinere ferro. Qui *Minor cal-*
 verò infra modum crescit aut non crescit quidem *lus.*
 suis terminis alia ratione promoueri debet. Idq; con-
 tingit plurimum, cum nimis ac sæpius fouetur lor-
 5 cus: parum conuenienter alligatur, sæpius & ante
 tempus fasciæ resoluuntur. Sæpe etiam in ratione
 vitæ peccatum est. Omnia ergo commutanda in me-
 lius. Quod si atrophiam totius corporis callus non
 10 prouenit, imprimis consulendum corpori. Sæpe etiã
 astrictioribus lintheis, naturæ partis vitio membrum
 quasi syderatum ac marcidum gracilescit: hic affes-
 cto membro instauranda vita est, & laxanda deli-
 gatio. Id verò in dropace magna ex parte descriptum
 15 est, capite de pyroticis. Extenuatam membrum *Extenuate-*
 hementer iuuat commoda deligatio, sed contrà quã *rum mēbro-*
 in fracturis. Marcescente tibia femur superius allis *rum instau-*
 gamus, ab inguine ad genu deducta fascia: arque ini- *ratio-*
 tio quidem arctior, paulatim relaxatur, vt commus-
 20 nibus venis quasi riuus deorsum sanguis exprima-
 tur si more dextro contabescente vel toto crure, si
 sinistro femori fascias iniicimus à genu ductis orbis
 bus, astrictius quidem, qui cum desinant in inguine,
 hic etiam ita constringant, vt parte aliqua veluti dis-
 25 uerticulo, sanguis in gracile membrum deriuetur.
 Sit autem deligatio ea ratione temperata, quæ neq;
 dolorem creet, neque vniuersum sanguinem ab in-
 columi membro reprimat: hoc enim alere fruga-
 lius, nutrire tamen statutum est. Eadem ratio in su-
 30 perioribus membris seruari debet. Distortus *Distortus*
 lous si quidem mollis est, laxante foru & diaphoretic *callus.*
 cis exinaniri debet: fouetur repida, hydreleo, altheæ
 & similium decocto. Discutitur arida sicca misa ser-
 35 cori columbino. Sed de his generibus medicamentor-
 rum capite de resoluentibus abundè dictum prius
 est. Si verò occaluit, eadem quæ in supercrescente &
 inueterato puto, consilia sunt. Mollior astringens *Mollior.*
 tibus emplasticis firmari debet. At vix durior esse
 potest,

572 Institut. Chirurgicarum, Lib. VI.

potest, nisi ea de causa fragilior sit: atque hic tota gignendi calli institutio sæpenumero repetenda est.
Mucosus humor abscedens. Est quum è neruaceis partibus & osseis mucosus humor eliquescit, puri similis, qui ferè in alto latet, nec facillè discutitur: quanquàm laxata parte fusa, incisaq; materia convenientibus pharmacis dissolui debet: alioqui factò vulnere repurgandus est. Atq; is neglectus in scirrhum coit, qui præscriptis antè res medicas capite de malis cicis expugnari debet.

Scirrhus.

FINIS.



*Lapis Eranus Vulgo turqsa-arizeg
 la serpity fex assa foetida
 ebenus .i. ee quaiacum*

*Hic liber est Celandini à Bosen
 Naturali Civitatis Zeraguzi*